Cuando alguien se siente sin ánimo o se aísla

Apoyo práctico en la atención cotidiana

Comprender qué puede estar pasando

El aislamiento, la falta de energía y la menor participación pueden tener muchas causas: enfermedad física, dolor, cansancio, duelo, efectos de la medicación, miedo o preferencias personales. Pregunta qué le importa a la persona en lugar de suponer que le falta motivación.

Considerar qué se puede cambiar

Aborda las barreras a la participación: actividades inaccesibles, falta de materiales o transporte, dolor, expectativas excesivas u horarios poco adecuados. Deja espacio para el descanso y la intimidad. A veces basta con estar presente en silencio; no exijas que la persona participe para demostrar progreso.

Ofrecer apoyo práctico

Ofrece compañía, ayuda con la comida y la bebida o con las rutinas cotidianas, y facilita el contacto con personas de confianza si así lo quiere. Haz más accesibles sus aficiones habituales sin fijar objetivos de participación. Deja que decida qué tiene sentido para ella, incluso si prefiere descansar.

Probar algo en compañía

Propón una opción pequeña y significativa para esa persona: preparar una bebida, escuchar música elegida, cuidar el jardín, hacer algo creativo, salir al aire libre o realizar un movimiento accesible. Participar puede consistir en elegir, mirar, ayudar un momento o simplemente estar presente.

Decisión y seguridad

No interpretes el rechazo como un fracaso ni la participación como prueba de mejoría. Los cambios marcados en el funcionamiento, la incapacidad para atender necesidades básicas, los síntomas físicos preocupantes o las inquietudes sobre autolesiones y suicidio requieren una valoración y una respuesta adecuadas.

Una posible invitación:«¿Te apetece que te acompañe o hay alguna cosa pequeña que te gustaría que hiciéramos juntos?»

Nota sobre la evidencia:La activación conductual estructurada cuenta con evidencia para la depresión (NICE NG222; revisión Cochrane de Uphoff et al., 2020), pero las actividades informales en compañía no equivalen a una terapia. Helsedirektoratet y las orientaciones canadienses centradas en la recuperación respaldan las actividades significativas y los objetivos definidos por cada persona.