

Chapitre 6 · Statistique et probabilités

Fluctuation et probabilités

Ce chapitre dans l'appli





Au travail 🎁 Animation commerciale · 🛎️ Accueil · 📋 Enquêtes clients

Une épicerie fait tourner une roue à **12 secteurs** à chaque client. **Un seul secteur** fait gagner un panier garni. Combien de paniers prévoir pour **600 clients** ? Tu sauras répondre à la fin du chapitre (sujet « vers le bac »).

Dans ce chapitre


- Je saurai placer une probabilité entre 0 et 1.
- Je saurai calculer une probabilité : cas favorables sur cas possibles.
- Je saurai compter les issues avec un arbre ou un tableau.
- Je saurai expliquer pourquoi une fréquence observée fluctue.

📝 Mes notes

Point de départ

un document du métier · 6 questions · sans calculatrice

La roue de la fête des mères



1. Combien la roue a-t-elle de secteurs en tout ?

_____

2. Combien de secteurs donnent « – 10 % » ?

_____

3. Combien de secteurs font gagner quelque chose ?

_____

4. A-t-on plus de chances de gagner quelque chose ou de tomber sur « merci » ?

☐ gagner ☐ merci

5. Rappel : 4 sur 10, c'est quel pourcentage ?

_____

6. Vrai ou faux : « Le bon de 20 € a autant de chances de sortir que « merci ». »

☐ vrai ☐ faux

Mes notes


La leçon

je découvre, je comprends, je vois, je retiens

1 Qu'est-ce qu'une probabilité ?

JE DÉCOUVRE

On lance un dé. Obtenir **7**, obtenir **un nombre pair**, obtenir **moins de 7** : range ces événements du moins au plus probable.



0 ≤ P ≤ 1

JE COMPRENDS


Une **expérience aléatoire** a plusieurs résultats possibles, et on ne peut pas savoir lequel va sortir. Lancer un dé, tourner une roue, tirer un ticket.

Chaque résultat possible est une **issue**. Un **événement** regroupe une ou plusieurs issues : « obtenir un nombre pair ».

La **probabilité** d'un événement mesure ses chances de se produire. C'est un nombre entre 0 et 1. 0 : impossible. 1 : certain. 0,5 : une chance sur deux.

L'**événement contraire** de A, noté « non A », se produit quand A ne se produit pas. Les deux se partagent toutes les chances : leurs probabilités font 1 à elles deux.

JE VOIS



Chaque événement trouve sa place sur la ligne, entre 0 et 1. Un événement et son contraire se partagent toute la ligne.

JE RETIENS

$0 \leq P(A) \leq 1$ · $P(\text{non } A) = 1 - P(A)$

EXEMPLE

P(obtenir 6) = $\frac{1}{6} \approx 0{,}17$.

P(ne pas obtenir 6) = $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6} \approx$ **0,83**.


⚠️ **Attention** · Une probabilité ne dépasse jamais 1. Si tu trouves 1,2 ou 12, tu as divisé dans le mauvais sens.

✅ **Vérifier** · P(A) + P(non A) = 1 : utilise le contraire quand il est plus rapide à calculer.

2 Calculer une probabilité

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Une roue a **12 secteurs identiques**. **Un seul** fait gagner un panier garni. Quelle est la probabilité de le gagner ?



💬 **JE COMPRENDS**


Quand toutes les issues ont la même chance, on dit qu'on est en situation d'**équiprobabilité**. Une roue aux secteurs identiques, un dé équilibré, une urne bien mélangée.

Dans ce cas, la probabilité se calcule. On compte les issues qui réalisent l'événement : ce sont les **cas favorables**. On compte toutes les issues : ce sont les **cas possibles**. Puis on divise.

Le résultat s'écrit en fraction, en décimal ou en pourcentage. 1/12 ≈ 0,083 ≈ 8,3 %.

Si les secteurs ne sont pas identiques, on ne peut plus compter ainsi.

👀 **JE VOIS**



12 secteurs identiques

1 panier garni

3 bons de – 20 %

8 bons de – 5 %

P(panier) = 1 ÷ 12 ≈ 0,083

P(– 20 %) = 3 ÷ 12 = 0,25

cas favorables ÷ cas possibles

On compte les secteurs de chaque couleur. Les 12 secteurs ont la même taille : chacun a une chance sur 12.

📌 **JE RETIENS**

$$P(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

EXEMPLE

P(panier) = $\frac{1}{12} \approx$ **0,083**.

P(gagner un bon de – 20 % ou un panier) = $\frac{4}{12} = \frac{1}{3} \approx$ **0,33**.

⚠️ **Attention** · On divise les cas favorables par les cas possibles, jamais l'inverse : 1 ÷ 12, pas 12 ÷ 1.


💡 **Donner du sens** · Probabilité × nombre de clients = nombre de lots à prévoir, en moyenne.

📝 Mes notes

3 Compter avec un arbre ou un tableau

🔎 JE DÉCOUVRE

Chaque client choisit un sac (**papier ou tissu**) et un paiement (**carte, espèces, sans contact**). Combien de combinaisons possibles ?



💬 JE COMPRENDS


Quand une expérience se fait en deux étapes, on oublie facilement des issues. Il faut une méthode pour les compter toutes.

L'**arbre** suit l'ordre des étapes. Une première branche pour chaque sac, puis une branche pour chaque paiement. Chaque chemin complet est une issue.

Le **tableau à double entrée** range les mêmes issues : une ligne par sac, une colonne par paiement. Chaque case est une issue.

Ici : 2 sacs × 3 paiements = 6 issues. Si chaque issue a la même chance, chacune a la probabilité 1/6.

👀 JE VOIS



l'arbre : sac, puis paiement

	carte	espèces	sans contact
papier	○	○	○
tissu	○	○	●

le tableau : une case par issue

2 × 3 = 6 issues

P(tissu et sans contact) = 1/6

si tous les choix ont la même chance

L'arbre et le tableau donnent les mêmes 6 issues. La case coloriée correspond à « tissu et sans contact ».

📌 JE RETIENS

Deux étapes avec n et p choix : $n \times p$ issues

Arbre : un chemin = une issue. Tableau : une case = une issue.

EXEMPLE

2 sacs et 3 paiements : 2 × 3 = **6 issues**.

P(tissu et sans contact) = $\frac{1}{6} \approx$ **0,17**.

⚠️ **Attention** · Dans un vrai magasin, les choix n'ont pas tous la même chance : la plupart des clients paient par carte.

⚡ **Calculer vite** · Pour vérifier un arbre, compte les bouts de branches : il doit y en avoir n × p.

📝 Mes notes

4 Fréquence et fluctuation

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Sur **600 clients**, **47** ont gagné le panier garni. On en attendait environ 50. Le jeu est-il truqué ?



la fréquence se stabilise

💬 **JE COMPRENDS**

La probabilité dit ce qui devrait se passer en moyenne. La **fréquence** dit ce qui s'est vraiment passé : nombre de fois observé ÷ nombre d'essais.


Sur peu d'essais, la fréquence peut être loin de la probabilité. D'un essai à l'autre, elle change : c'est la **fluctuation** d'échantillonnage.

Quand le nombre d'essais augmente, la fréquence se rapproche de la probabilité. Elle se **stabilise**.

On peut aussi faire l'inverse. Quand on ne connaît pas une probabilité, on l'**estime** par la fréquence observée sur un grand nombre d'essais.

Excel permet de simuler des milliers de tirages avec =ALEA.ENTRE.BORNES(1;6).

👀 **JE VOIS**



Au début, la fréquence saute beaucoup. Avec 2 000 lancers, elle reste très près de 1/6.

📌 **JE RETIENS**

$$f = \frac{\text{nombre de fois observé}}{\text{nombre d'essais}}$$

Beaucoup d'essais : la fréquence se rapproche de la probabilité.

EXEMPLE

47 paniers sur 600 : f = 47 ÷ 600 ≈ **0,078**.
La probabilité vaut 1/12 ≈ 0,083 : l'écart est petit, c'est la fluctuation.

⚠️ **Attention** · Une fréquence un peu différente de la probabilité ne prouve pas que le jeu est truqué.

🎯 **Estimer** · Pour juger un écart, regarde le nombre d'essais : plus il est grand, plus l'écart devrait être petit.

📝 Mes notes

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	Au travail
expérience aléatoire	on ne peut pas prévoir le résultat	*« Tourner la roue du magasin. »*
issue	un résultat possible	*« Le secteur « panier garni ». »*
événement	un ensemble d'issues	*« « Gagner un bon de réduction ». »*
probabilité	nombre entre 0 et 1 qui mesure les chances	*« P(panier) = 1/12. »*
événement contraire	« non A » : A ne se produit pas	*« « Ne rien gagner ». »*
fréquence	nombre de fois observé ÷ nombre d'essais	*« 47 paniers sur 600 clients. »*
fluctuation	la fréquence change d'un échantillon à l'autre	*« Lundi 0,05, mardi 0,11. »*

Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — **Probabilité et événement contraire** — calculatrice

Une roue a **10 secteurs identiques** : **1** « bon de 15 € », **4** « − 10 % », **5** « merci ». Calcule P(bon de 15 €), P(gagner quelque chose), P(ne rien gagner).

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 10 cas possibles	Je compte toutes les issues : les 10 secteurs.
2 P(bon) = 1 ÷ 10 = **0,1**	1 cas favorable.
3 P(gagner) = 5 ÷ 10 = **0,5**	1 + 4 = 5 cas favorables.
4 P(rien) = 1 − 0,5 = **0,5**	« Ne rien gagner » est le contraire de « gagner ».

🔁 **Je vérifie** · 5 secteurs « merci » sur 10 : 5 ÷ 10 = 0,5 ✓.

✅ **P(bon) = 0,1 ; P(gagner) = 0,5 ; P(rien) = 0,5.**

→ Je m'entraîne : exercice 1

Mes notes

✍ À toi : la même méthode

🧮 calculatrice

Une urne contient **40 tickets** : **2** « parfum offert », **6** « − 20 % », **32** « merci ». Calcule P(parfum), P(gagner), P(ne rien gagner).

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 ☐ cas possibles	Je compte toutes les issues : les tickets.
2 P(parfum) = 2 ÷ 40 = ☐	2 cas favorables.
3 P(gagner) = ☐ ÷ 40 = ☐	2 + 6 cas favorables.
4 P(rien) = 1 − 0,2 = ☐	« Ne rien gagner » est le contraire de « gagner ».

🔁 **Je vérifie** · 32 tickets « merci » sur 40 : 32 ÷ 40 = 0,8 ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 1

✏ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 121 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 La roue colorée

notion 2

On tourne la roue. Écris chaque probabilité (fraction ou décimal).



8 secteurs identiques

a. P(rouge) = ☐ a

b. P(bleu) = ☐ b

c. P(pas rouge) = ☐ c

d. P(bleu ou jaune) = ☐ d

2 Les fréquences des lancers

notion 4

On lance un dé et on compte les 6. Calcule chaque fréquence (au centième). Que remarques-tu quand le nombre de lancers augmente ?

Nombre de lancers	10	50	100	500
Nombre de 6	1	11	13	78
Fréquence	☐ a	☐ b	☐ c	☐ d

Probabilité d'obtenir 6 : 1/6 ≈ 0,17.

3 Le tableau des issues

notion 3

Chaque client choisit un sac (papier ou tissu) et un paiement (carte, espèces, sans contact). On suppose que tous les choix ont la même chance.

	carte	espèces	sans contact
papier	papier · carte	…	…
tissu	…	…	…

a. Nombre d'issues : [a]

b. P(tissu et sans contact) = [b]

c. P(papier) = [c]

🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

4 Petit problème Les cartes à gratter

notion 1 S'approprier Réaliser

Pour son anniversaire, un magasin distribue **200 cartes à gratter** : **2** donnent un bon d'achat de 20 €, **18** donnent − 10 %, les autres affichent « Merci ».

a. Calcule la probabilité d'obtenir un bon d'achat.

b. Calcule la probabilité de gagner quelque chose.

c. Déduis-en la probabilité de ne rien gagner.

📝 Mes notes


💡 Coup de pouce · exercice 4 : « Gagner quelque chose » : un bon d'achat ou une réduction, soit 2 + 18 cartes.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Lis bien le graphique : chaque point est un échantillon de 100 clients. La notion 4 explique pourquoi les points ne sont pas tous à la même hauteur.

5 Défi · 4 étapes Le paiement sans contact

notion 4 · S'approprier · Analyser-raisonner · Valider

Une enseigne relève, dans **10 échantillons de 100 clients**, la fréquence des paiements sans contact.



Source : commerce fictif

a. Lis la plus petite et la plus grande fréquence.

min : _____

b. Calcule l'étendue des fréquences.

_____

c. Calcule la moyenne des 10 fréquences.

_____

d. Le directeur dit : « 6 clients sur 10 paient sans contact. » Est-ce raisonnable ? Justifie.

Valider 💼 **Au travail, cela sert à** vérifier une affirmation du directeur avec des données, avant de commander du matériel.

📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 5 : Étendue = plus grande valeur − plus petite valeur.

💬 Voici la question du début du chapitre ! Elle se fait en 5 étapes. Les deux premières ressemblent à l'exemple de la notion 2. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

6 Défi · 5 étapes La roue du commerçant

S'approprier Réaliser Valider Communiquer

Pendant un mois, une épicerie fait tourner une roue à chaque client. La roue a **12 secteurs identiques**.

Document 1 La roue

Lot	Secteurs
Panier garni (30 €)	1
Bon de − 20 %	3
Bon de − 5 %	8

Document 2 Bilan du mois

600 clients ont tourné la roue.
47 ont gagné un panier garni.

1 Calculer la probabilité de gagner un panier garni (au millième). Réaliser

2 Calculer la probabilité de gagner un bon de − 20 %. Réaliser

3 Calculer la fréquence des paniers gagnés pendant le mois (au millième). Réaliser

4 Cette fréquence est-elle cohérente avec la probabilité ? Justifier. Valider

5 Rédiger un conseil sur le nombre de paniers à prévoir pour 600 clients le mois prochain. Communiquer

Communiquer 💼 **Au travail, cela sert à** prévoir le bon nombre de lots pour un jeu en magasin : ni rupture, ni gaspillage.

📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 6 : Probabilité = nombre de secteurs favorables ÷ 12. Fréquence = 47 ÷ 600.

✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer une probabilité.	**1**, **4**	☐	☐	☐
utiliser l'événement contraire.	**4**	☐	☐	☐
compter les issues.	**3**	☐	☐	☐
expliquer la fluctuation.	**2**, **5**, **6**	☐	☐	☐

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

Fluctuation et probabilités

PFMP : animation commerciale dans une parfumerie · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	Je compte les issues avec un arbre ou un tableau.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	Je prévois un nombre de lots avec une probabilité.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule une probabilité et une fréquence.	12 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	J'explique un écart par la fluctuation.	4 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 Automatismes — 4 pts

1 On lance un dé équilibré. Calculer P(obtenir 5) (fraction). — Réaliser 2 pts

_____


2 P(A) = 0,35. Calculer P(non A). — Réaliser 1 pt

_____

3 30 succès sur 200 essais : calculer la fréquence. — Réaliser 1 pt

_____

Exercice 2 L'urne de la fête des mères — 10 pts



Chaque client tire un ticket dans une urne de **50 tickets** : **2** « bon de 20 € », **8** « − 10 % », **40** « merci ». Le ticket est remis dans l'urne après chaque tirage.

4 Calculer la probabilité de gagner un bon de 20 €. — Réaliser 1 pt

_____

5 Calculer la probabilité de gagner quelque chose. — Réaliser 2 pts

_____

6 En déduire la probabilité de ne rien gagner. — Réaliser — 1 pt

7 400 clients sont attendus. Combien de bons de 20 € faut-il prévoir ? — Analyser-raisonner — 2 pts

8 Le jour J, 22 bons ont été gagnés. Calculer la fréquence observée. — Réaliser — 2 pts

9 Ce résultat est-il anormal ? Justifier. — Valider — 2 pts

Exercice 3 Emballage et paiement — 6 pts

Chaque client choisit un sac (**papier ou tissu**) et un mode de paiement (**carte, espèces ou sans contact**).

10 Construire un arbre ou un tableau et donner le nombre d'issues. — S'approprier — 2 pts

11 Si tous les choix ont la même chance, calculer P(tissu et sans contact). — Réaliser — 2 pts

12 En magasin, ces choix ont-ils vraiment la même chance ? Expliquer. — Valider — 2 pts

📝 Mes notes