

数据科学与工程数学基础

作业提交规范及第 3 次作业

教师：黄定江

助教：刘文辉、徐艺玮

2023 年 10 月 20 日

作业提交规范

1. 作业提交形式：建议使用 Word 或 \LaTeX 编写所得到的电子文档。若使用 Word 编写，将其另存为 PDF 形式，然后提交 PDF 文档。若使用 \LaTeX 编写，将其编译成 PDF 形式，然后提交 Tex 和 PDF 两个文档。若使用手写拍照的方式，请务必规整好各题解答的图片，并整合在一个 PDF 文档中，只发图片格式的作业概不批改！
2. 作业命名规范：提交的电子文档必须命名为：“学号_姓名”。命名示例：52200000000_刘某某。
3. 作业提交途径：点击打开每次作业的传送门地址：**第 3 次作业提交传送门**，无需注册和登录，按要求输入个人学号和姓名，然后上传作业文档即可。**注意：传送门将会在截至时间点到达后自动关闭。**
4. 作业更改说明：如果需要修改已经提交的作业，只要在截至日期前，再次上传更改后的作业（切记保持同名），即可覆盖已有作业。
5. 作业评分说明：正常提交作业的按照实际评分记录；逾期补交作业的根据逾期情况在实际评分基础上酌情扣分；**未交作业的当次作业记为 0 分**；若发现存在抄袭的作业时，相似的两份作业均会被记为 0 分。

第 3 次作业



提交截至时间：**2023/10/24 下周二 12:00（中午）**

理论部分

习题 1. 完成以下阅读材料即可。

• **为什么需要 LU 分解？**

为什么不直接求解方程组 $Ax = b$ ？如果了解 LU 分解所需要的计算量与高斯消去法解方程组所需的计算量，便可知计算复杂度均为 $O(n^3)$ 。似乎 LU 分解并没有任何优势。然而，在实际的工程问题中，我们经常会遇到的是这样的问题，需要求解这样一系列的方程组（例如时序的）：

$$Ax = b_1, Ax = b_2, \dots, Ax = b_r.$$

其中的系数矩阵是不变的，只是右边的常数项在改变。这时，如果直接使用高斯消去法求解各个方程组的话，则对应的计算复杂度为 $O(rn^3)$ 。若使用 LU 分解，则只需要的运算量级为 $O(n^3 + rn^2)$ ，这是因为 LU 分解在解方程组时只需要 $O(n^2)$ 。

或许，你会提出直接计算出 A^{-1} ，然后再利用它去求解各个方程组。这时所需要的计算量的效果似乎与 LU 分解是相似的。事实上，在实际计算中往往不会直接计算矩阵的逆。这里给出其中一个原因：通常实际工程中矩阵 A 的维度很大，但有一个优点是它是稀疏的，例如一个“带状的”矩阵。使用 LU 分解，可以保持矩阵的稀疏性（因此，还可以提高运算速度）。然而，直接求解矩阵的逆，则会丢失矩阵的稀疏性。因此，在数据的存储上直接求逆存在明显的劣势。

• **Gauss 消去与 LU 分解**

还记得初中学过的求解二元一次方程组的消元法吗？这就是 LU 分解与 *Cholesky* 分解的全部。假设我们有如下二元一次方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 = 5 \\ 4x_1 + 5x_2 = 3 \end{cases}$$

现在我们考虑方程组的求解。在中学时，我们会通过将第一个等式乘以 -2 加到第二个等式，则得到

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 = 5 \\ 0x_1 - 3x_2 = -7 \end{cases}$$

这个行变换对应的矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ ，它的逆矩阵就是 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 。另外，变换后

的系数矩阵为 $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$ 。

如果我们使用 LU 分解, 则可得到

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

从上可以看出, 高斯消去的变换矩阵的逆恰好对应 LU 分解的 L 矩阵, 变换后的系数矩阵恰好对应 U 矩阵。

习题 2. 对矩阵 $\begin{pmatrix} 5 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ -5 & -3 & 4 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 进行 LU 分解。

习题 3. 设 A 对称且 $a_{11} \neq 0$, 并假经过一步 *Gauss* 消去之后, A 具有如下形式

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_1^T \\ \mathbf{0} & A_2 \end{bmatrix}$$

证明 A_2 仍是对称阵。

解. 记矩阵 A 和高斯变换矩阵分别为:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_1^T \\ a_1 & A_1 \end{bmatrix}, G = \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0}^T \\ l_1 & I \end{bmatrix}$$

则

$$GA = \begin{bmatrix} a_{11} & a_1^T \\ -a_{11}l_1 + a_1 & -l_1a_1^T + A_1 \end{bmatrix}$$

易知 $-a_{11}l_1 + a_1 = \mathbf{0}$ 以及 $A_2 = -l_1a_1^T + A_1$ 。由第一个等式可得 $l_1 = 1/a_{11}a_1$, 代入第二个等式知

$$A_2 = -\frac{1}{a_{11}}a_1a_1^T + A_1.$$

故可知 A_2 仍是对称矩阵。

习题 4. 证明上三角矩阵与上三角矩阵的乘积仍是上三角矩阵。

习题 5. 用 *Householder* 方法求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 的 QR 分解。

习题 6. 定义

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

(i) 给出矩阵 $A^T A$ 的 *Cholesky* 分解 $A^T A = GG^T$

(ii) 试说明 $\|A^T A\|_2 = \|A\|_2^2 = \|G\|_2^2$