

一元微积分学-2 (2021. 01)

1. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且对任一固定的 $x \in [0, +\infty)$, 有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x+n) = 0$ (其中 $n \in \mathbb{N}$). 证明函数列 $\{f(x+n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 0.
2. 设 $\{a_n\}$ 为数列, a, λ 为有限数. 证明:
 - (1) 若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a$;
 - (2). 若存在正整数 p , 使得 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_{n+p} - a_n) = \lambda$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{n} = \frac{\lambda}{p}$.
3. 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a, b_n > 0, c_n = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}$. 证明:
 - (1) 数列 $\{c_n\}$ 收敛;
 - (2) 若级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ 发散, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = a$.
4. 设 $A_n = \frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n^2}$. 求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{\pi}{4} - A_n \right)$. ($= \frac{\pi}{4}$)
5. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上具有连续的三阶导数, 且 $f(-1) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$. 求证: 在开区间 $(-1, 1)$ 内至少存在一点 x_0 , 使得 $f'''(x_0) = 3$.
6. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可微, 且 $f(0) = f(1) = 0, f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$. 证明:
 - (1) 存在一个 $\xi \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使得 $f(\xi) = \xi$;
 - (2) 存在一个 $\eta \in (0, \xi)$, 使得 $f'(\eta) = f(\eta) - \eta$.
7. 设 $n > 1$ 为整数, $F(x) = \int_0^x e^{-t} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) dt$. 证明: 方程 $F(x) = \frac{n}{2}$ 在 $\left(\frac{n}{2}, n\right)$ 内至少有一个根.
8. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有二阶导数, 并且 $f''(x) > 0, \lim_{h \rightarrow +\infty} f'(x) = \alpha > 0, \lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \beta < 0$, 且存在一点 x_0 使得 $f(x_0) < 0$. 证明: 方程 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内恰有两个实根.
9. 设函数 $f(x)$ 二阶可导, 且 $f(0) = f'(0) = 0, f''(0) > 0$. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 f(u)}{f(x) \sin^3 u}$, 其中 u 是曲线 $y = f(x)$ 上点 $p = (x, f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距. ($= 2$)
10. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内有二阶连续导数, 且 $f(0), f'(0), f''(0)$ 均不为零. 证明: 存在唯一一组实数 k_1, k_2, k_3 , 使得

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{k_1 f(h) + k_2 f(2h) + k_3 f(3h) - f(0)}{h^2} = 0.$$
11. 设函数 $f(x)$ 连续, $g(x) = \int_0^1 f(xt) dt$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A, A$ 为常数. 求 $g'(x)$ 并讨论 $g'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性.
12. 设 n 为正整数, 计算 $\int_{e^{-2n\pi}}^1 \left| \frac{d}{dx} \cos \left(\ln \frac{1}{x} \right) \right| dx$. ($= 4n$)
13. 计算定积分 $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x \cdot \arctan e^x}{1 + \cos^2 x} dx$. ($= \frac{\pi^3}{8}$)
14. 计算 $\int_0^{+\infty} e^{-2x} |\sin x| dx$. ($= \frac{e^{2\pi} + 1}{5(e^{2\pi} - 1)}$)
15. 设 $|f(x)| \leq \pi, f'(x) \geq m > 0 (a \leq x \leq b)$. 证明 $\left| \int_a^b \sin f(x) dx \right| \leq \frac{2}{m}$.
16. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, $f(0) = 0$, 且当 $x \in (0, 1), 0 < f'(x) < 1$. 试证当 $a \in (0, 1)$,

$$\left(\int_0^a f(x) dx \right)^2 > \int_0^a f^3(x) dx.$$

17. 设函数 $f \in C[0, 1]$, 且 $\int_0^1 f(x)dx = 0$, $\int_0^1 xf(x)dx = 1$. 试证:
 (1) $\exists x_0 \in [0, 1]$ 使 $|f(x_0)| > 4$;
 (2) $\exists x_1 \in [0, 1]$ 使 $|f(x_1)| = 4$.
18. 设 f 在 $[a, b]$ 上非负连续, 严格单增, 且存在 $x_n \in [a, b]$ 使得 $[f(x_n)]^n = \frac{1}{b-a} \int_a^b [f(x)]^n dx$. 求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$. (= b)
19. 设 $f(x) \in C[a, b]$. 证明: $2 \int_a^b f(x)dx \int_x^b f(t)dt = \left(\int_a^b f(x)dx \right)^2$.
20. 设函数 $f(x) \in C^1[0, 1]$, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\int_0^1 f(x)dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right) = -\frac{1}{2}.$$
21. 设函数 $f(x) \in C[0, 1]$, 且 $I = \int_0^1 f(x)dx \neq 0$. 证明在 $(0, 1)$ 内存在不同的两点 x_1, x_2 , 使得

$$\frac{1}{f(x_1)} + \frac{1}{f(x_2)} = \frac{2}{I}.$$
22. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶连续可导, $f(0) = f(1) = 0$, 且当 $x \in (0, 1)$ 时 $f(x) \neq 0$. 若积分 $\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx$ 存在, 试证:

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq 4$$
23. 证明广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 不是绝对收敛的.
24. 求最小实数 C , 使得满足 $\int_0^1 |f(x)|dx = 1$ 的连续的函数 $f(x)$ 都有 $\int_0^1 f(\sqrt{x})dx \leq C$. (= 2)
25. 设 $f(x) \in C[0, 1]$, 且满足 $\int_0^1 f(x)dx = 1$. 求一个这样的函数 $f(x)$, 使得积分 $I = \int_0^1 (1+x^2)f^2(x)dx$ 取得最小值. (= $\frac{4}{\pi(1+x^2)}$)
26. 求直线 $l_1: \begin{cases} x-y=0, \\ z=0 \end{cases}$ 与直线 $l_2: \frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-3}{-1}$ 的距离. (= $\sqrt{\frac{19}{2}}$)
27. 求通过直线 $l: \begin{cases} 2x+y-3z+2=0, \\ 5x+5y-4z+3=0 \end{cases}$ 的两个相互垂直的平面 π_1 和 π_2 , 使其中一个平面过点 $(4, -3, 1)$.
 ($3x+4y-z+1=0$, $x-2y-5z+3=0$)
28. 设函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2t + t^2, \\ y = \psi t \end{cases}$ 所确定. 且 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{3}{4(1+t)}$, 其中 $\psi(t)$ 具有二阶导数, 曲线 $y = \psi(t)$ 与 $y = \int_1^{t^2} e^{-u^2} du + \frac{3}{2e}$ 在 $t = 1$ 处相切. 求函数 $\psi(t)$. (= $t^3 + \frac{1}{2e}t^2 + (\frac{1}{e} - 3)t + 2$ ($t > -1$))
29. 712 设 M 是以三个正半轴为母线的半圆锥面, 求其方程. ($xy + yz + zx = 0$)
30. 在平面上, 有一条从点 $(a, 0)$ 向右的射线, 线密度为 ρ . 在点 $(0, h)$ 处 (其中 $h > 0$) 有一质量为 m 的质点. 求射线对该质点的引力. (= $(F_x, F_y) = \left(\frac{Gmp}{\sqrt{h^2+a^2}}, \frac{Gmp}{h} \left(1 - \sin \arctan \frac{a}{h} \right) \right)$)
31. 设当 $x > -1$ 时, 可微函数 $f(x)$ 满足条件 $f'(x) + f(x) - \frac{1}{1+x} \int_0^x f(t)dt = 0$, 且 $f(0) = 1$, 试证: 当 $x \geq 0$ 时, 有 $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$ 成立.
32. 已知 $y_1 = xe^x + e^{2x}$, $y_2 = xe^x + e^{-x}$, $y_3 = xe^x + e^{2x} - e^{-x}$ 是某二阶常系数线性非齐次微分方程的三个解, 试求此微分方程. ($y'' - y' - 2y = e^x - 2xe^x$)

33. 设抛物线 $y = ax^2 + bx + 2 \ln c$ 过原点, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $y \geq 0$, 又已知该抛物线与 x 轴及直线 $x = 1$ 所围图形的面积为 $\frac{1}{3}$. 试确定 a, b, c , 使此图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积 V 最小. ($a = -\frac{5}{4}, b = \frac{3}{2}, c = 1$)
34. 过曲线 $y = \sqrt[3]{x} (x \geq 0)$ 上的点 A 作切线, 使该切线与曲线及 x 轴所围成的平面图形的面积为 $\frac{3}{4}$, 求点 A 的坐标. ($= (1, 1)$)