

Matematická analýza III

Tomáš Krejčí <tomas789@gmail.com>

24. prosince 2012

10 Konvergence posloupností a řad funkcí

10.1 Bodová a stejnoměrná konvergence posloupnosti funkcí

Definice. Nechť $J \subset \mathbb{R}$ je interval a nechť máme $f : J \rightarrow \mathbb{R}$ a $f_n : J \rightarrow \mathbb{R}$ pro $n \in \mathbb{N}$. Řekneme, že posloupnost funkcí $\{f_n\}$:

1. konverguje bodově k f na J , pokud pro každé $x \in J$ platí $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$, neboli

$$\forall x \in J \forall \epsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 : |f_n(x) - f(x)| < \epsilon$$

Značíme $f_n \rightarrow f$ na J .

2. konverguje stejnoměrně k f na J , pokud

$$\forall \epsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 \forall x \in J : |f_n(x) - f(x)| < \epsilon$$

Značíme $f_n \Rightarrow f$.

3. konverguje lokálně stejnoměrně, pokud pro každý omezený uzavřený interval $[a, b] \subset J$ platí: $f_n \Rightarrow f$ na $[a, b]$. Značíme $f_n \overset{loc}{\Rightarrow} f$

Věta L 1 (kritérium stejnoměrné konvergence). Nechť $f_n, f : J \rightarrow \mathbb{R}$ pak

$$f_n \Rightarrow f \text{ na } J \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sup\{|f_n(x) - f(x)|; x \in J\} = 0$$

Věta T 2 (Bolzano-Cauchyho podmínka pro stejnoměrnou konvergenci). Nechť $f_n, f : J \rightarrow \mathbb{R}$. Pak

$$f_n \Rightarrow f \text{ na } J \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \exists n_0 \forall m, n \geq n_0 \forall x \in J : |f_n(x) - f_m(x)| < \epsilon$$

Věta T 3 (Moore-Osgood). Nechť x_0 je krajní bod intervalu J (může být i $\pm\infty$). Nechť $f, f_n : J \rightarrow \mathbb{R}$ splňují

1. $f_n \Rightarrow f$ na J ,
2. existuje $\lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = a_n \in \mathbb{R}$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$

Pak existují $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ a $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ a jsou si rovny, neboli:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

Důsledek. Nechť $f_n \Rightarrow f$ na I a nechť f_n jsou na I spojité. Pak f je spojitá na I .

Věta L 4 (o záměně limity a integrálu). Nechť funkce $f_n \Rightarrow f$ na $[a, b]$ a nechť $f_n \in \mathbb{R}([a, b])$. Pak $f \in \mathbb{R}([a, b])$ a

$$(R) \int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} (R) \int_a^b f_n(x) dx$$

Věta T 5 (o záměně limity a derivace). Nechť funkce f_n , $n \in \mathbb{N}$, mají vlastní derivaci na intervalu (a, b) a nechť:

1. existuje $x_0 \in (a, b)$ tak, že $\{f_n(x_0)\}_{n=0}^\infty$ konverguje,
2. pro derivace f'_n platí $f'_n \xrightarrow{loc} f'$ na (a, b)

Potom existuje funkce f tak, že $f_n \xrightarrow{loc} f$ na (a, b) , f má vlastní derivaci a platí $f'_n \xrightarrow{loc} f'$ na (a, b) .

10.2 Stejnomořná konvergence řady funkcí

Definice. Řekneme, že řada funkcí $\sum_{k=1}^\infty u_k(x)$ konverguje stejnoměrně (popřípadě lokálně stejnoměrně) na intervalu J , pokud posloupnost částečných součtů $s_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$ konverguje stejnoměrně (popřípadě lokálně stejnoměrně) na J .

Věta L 6 (nutná podmínka stejnoměrné konvergence řady). Nechť $\sum_{n=1}^\infty u_n(x)$ je řada funkcí definovaná na intervalu J . Pokud $\sum_{k=1}^\infty u_n \Rightarrow$ na J , pak posloupnost funkcí $u_n(x) \Rightarrow 0$ na J .

Věta L 7 (Weierstrassovo kritérium). Nechť $\sum_{k=1}^\infty u_n(x)$ je řada funkcí definovaná na intervalu J . Pokud pro $a_n := \sup\{|u_n(x)|; x \in J\}$ platí, že číselná řada $\sum_{n=1}^\infty a_n$ konverguje, pak $\sum_{n=1}^\infty u_n \Rightarrow$ na J .

Věta L 8 (o spojitosti a derivování řad funkcí). Nechť $\sum_{n=1}^\infty u_n(x)$ je řada funkcí definovaná na intervalu (a, b) .

1. Nechť u_n jsou spojité na (a, b) a nechť $\sum_{n=1}^\infty u_n(x) \xrightarrow{loc} F(x)$ na (a, b) . Pak $F(x) = \sum_{n=1}^\infty u_n(x)$ je spojitá na (a, b) .
2. Nechť funkce u_n , $n \in \mathbb{N}$ mají vlastní derivace na intervalu (a, b) a nechť
 - (a) existuje $x_0 \in (a, b)$ tak, že $\sum_{n=1}^\infty u_n(x_0)$ konverguje,
 - (b) pro derivace u'_n platí $\sum_{n=1}^\infty u'_n \xrightarrow{loc} F'(x)$ na (a, b)

Potom je funkce $F(x) = \sum_{n=1}^\infty u_n(x)$ dobře definovaná diferencovatelná a navíc $\sum_{n=1}^\infty u_n(x) \xrightarrow{loc} F(x)$ a $\sum_{n=1}^\infty u'_n(x) \xrightarrow{loc} F'(x)$ na (a, b) .

Vraťme se ke konvergenci obyčejných řad. Následující kritérium bude užitečné v kapitole Fourierovy řady. Existuje i varianta tohoto tvrzení pro stejnoměrnou konvergenci, tu však nebudeme potřebovat.

Věta T 9 (Abel-Dirichletovo kritérium, bez důkazu). *Nechť $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ je posloupnost reálných čísel a $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ je nerostoucí posloupnost nezáporných čísel. Jestliže je některá z následujících podmínek splněna, pak je $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ konvergentní.*

1. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ je konvergentní,
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ a $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ má omezené součty, tedy

$$\exists K > 0 \quad \forall m \in \mathbb{N} \quad : |s_m| = \left| \sum_{i=1}^m a_i \right| < K$$

11 Mocninné řady

Definice. Nehť $x_0 \in \mathbb{R}$ a $a_n \in \mathbb{R}$ pro $n \in \mathbb{N}_0$. Řadu funkcí $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ nazýváme mocninnou řadou s koeficienty a_n o středu x_0 .

Definice. Poloměrem konvergence mocninné řady $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ nazveme

$$R = \sup \left\{ r \in [0, \infty) : \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n \text{ konverguje } \forall x \in [x_0 - r; x_0 + r] \right\}$$

Věta L 1 (o poloměru konvergence mocninné řady). Nehť $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ je mocninná řada a $R \in [0, \infty]$ její poloměr konvergence. Pak řada konverguje absolutně pro všechna x taková, že $|x - x_0| < R$ a diverguje pro všechna x taková, že $|x - x_0| > R$.

Věta L 2 (výpočet poloměru konvergence). Nehť $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ je mocninná řada a $R \in [0, \infty]$ její poloměr konvergence. Pak platí

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

Pokud existuje $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|}$, pak $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|}$.

Věta L 3. Nehť $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ je mocninná řada s poloměrem konvergence $R > 0$. Pak řada konverguje lokálně stejnoměrně na $(x_0 - R, x_0 + R)$ (je-li $R = \infty$, pak na celém \mathbb{R}).

Věta L 4 (o derivaci mocninné řady). Nehť $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ je mocninná řada s poloměrem konvergence $R > 0$. Pak $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n(x - x_0)^{n-1}$ je také mocninná řada se stejným středem a poloměrem konvergence. Navíc pro $x \in (x_0 - R, x_0 + R)$ (\mathbb{R} pro $R = \infty$) platí

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n(x - x_0)^{n-1}$$

Věta L 5 (o integrování mocninné řady). Nehť $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ je mocninná řada s poloměrem konvergence $R > 0$. Pak $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x - x_0)^{n+1}$ je také mocninná řada se stejným poloměrem konvergence. Navíc platí

$$\int \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x - x_0)^{n+1} + C \quad \text{na } (x_0 - R, x_0 + R)$$

Věta T 6 (Abelova). Nehť $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ je mocninná řada s poloměrem konvergence $R > 0$. Nehť navíc $\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$ konverguje. Potom řada $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ konverguje stejnoměrně na $[x_0, x_0 + R]$ a platí

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n = \lim_{r \rightarrow R-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n$$

Důkaz. Předpokládejme bez újmy na obecnosti, že $x_0 = 0$. Označme $t_N = \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n R^n$. Víme, že $\sum a_n R^n$ konverguje, tedy

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \quad \forall n \geq n_0 \quad : \quad |t_N| < \varepsilon$$

$$\begin{aligned}
a_n &= a_n R^n \left(\frac{x}{R}\right)^n \\
&= -t_N \left(\left(\frac{x}{R}\right)^n - \left(\frac{x}{R}\right)^{n+1} \right) + t_{n-1} \left(\frac{x}{R}\right)^n - t_n \left(\frac{x}{R}\right)^{n+1}
\end{aligned}$$

Sečteme od N do $N+k$

$$\sum_{n=N}^{N+k} a_n x^n = \left[\sum_{n=N}^{N+k} -t_n \left(\left(\frac{x}{R}\right)^n - \left(\frac{x}{R}\right)^{n+1} \right) \right] + t_{N-1} \left(\frac{x}{R}\right)^N - t_{N+k} \left(\frac{x}{R}\right)^{N+k+1}$$

Protože $x \in [0, R]$, tak $\left(\frac{x}{R}\right)^n \in [0, 1]$. Dále platí $\left(\frac{x}{R}\right)^n - \left(\frac{x}{R}\right)^{n+1} \geq 0$.

$$\begin{aligned}
\left| \sum_{n=N}^{N+k} a_n x^n \right| &\leq \sum_{n=N}^{N+k} |t_n| \left(\left(\frac{x}{R}\right)^n - \left(\frac{x}{R}\right)^{n+1} \right) + |t_{N-1}| + |t_{N+k}| \\
&\leq \epsilon \sum_{n=N}^{N+k} \left(\left(\frac{x}{R}\right)^n - \left(\frac{x}{R}\right)^{n+1} \right) + 2\epsilon \\
&= \epsilon \left(\left(\frac{x}{R}\right)^N - \left(\frac{x}{R}\right)^{N+k+1} \right) + 2\epsilon \\
&\leq 3\epsilon
\end{aligned}$$

Z BC podmínky pro stejnoměrnou konvergenci řady dostaneme $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \Rightarrow$ na $[0, R]$ Z MO věty dostaneme

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{r \rightarrow R_-} \sum_{n=0}^N a_n R^n &= \lim_{r \rightarrow R_-} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N a_n R^n \\
\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{r \rightarrow R_-} \sum_{n=0}^N a_n R^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N a_n R^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n \\
\lim_{r \rightarrow R_-} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N a_n R^n &= \lim_{r \rightarrow R_-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n
\end{aligned}$$

□

Příklad. Sečtěte $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{3n-2}$

Řešení. Nechť $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{3n-2} x^{3n-2}$. To je mocninná řada poloměrem konvergence $R = 1$. Podle Laibnitze $f(1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{3n-2}$ konverguje.

Tedy podle Abelovy věty $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{3n-2} = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$

Dle věty o derivaci mocninné řady máme $\forall x \in (-1, 1)$

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{3n-2} (3n-2) x^{3n-3} = \sum_{n=1}^{\infty} (-x^3)^{n-1} = \frac{1}{1+x^3}$$

$$f(x) = \int \frac{1}{1+x^3} dx = \dots = \frac{1}{3} \ln(x+1) - \frac{1}{6} \ln(x^2-x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right) + C$$

$$0 = f(0) = \frac{1}{3}0 - \frac{1}{6}0 + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + C \Rightarrow C = \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{3n-2} &= \lim_{x \rightarrow 1-} \left(\frac{1}{3} \ln(x+1) - \frac{1}{6} \ln(x^2-x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right) \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \right) \\ &= \frac{1}{3} \ln(2) + \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \end{aligned}$$

□

12 Fourierovy řady

Definice. Nechť $a_k \in \mathbb{R}$ pro $k \in \mathbb{N}_0$ a $b_k \in \mathbb{R}$ pro $k \in \mathbb{N}$. Řadu $\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$ pro $x \in \mathbb{R}$ nazveme trigonometrickou řadou. Pro dané n je $\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$ trigonometrický polynom stupně n . $\mathcal{P}_{2\pi}$ značí množinu všech 2π -periodických funkcí majících Riemannův integrál na $[0, 2\pi]$

Cílem je danou $f \in \mathcal{P}_{2\pi}$ rozvinout do trigonometrické řady a:

1. spočítat a_k, b_k
2. zjistit, zda-li je řada rovna původní funkci

Věta BD 1. Nechť $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ je posloupnost reálných čísel a $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ je nerostoucí posloupnost reálných čísel. Jestliže buď

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ je konvergentní, nebo

(D) $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ a $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ má omezené částečné součty

Pak $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ konverguje.

Příklad. Vyšetřete konvergenci řady

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n}$$

Řešení. Pokud $x = \pi k$, $k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \sum 0 \leftarrow$ konverguje.

Dále předpokládejme, že $x \neq \pi k$. Označme $a_n = \sin(nx)$, $b_n = \frac{1}{n}$. b_n je monotonní nerostoucí a $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$. Nechť $m \in \mathbb{N}$.

$$\left| \sum_{n=a}^m \sin(nx) \right| = \left| \operatorname{Im} \left(\sum_{n=0}^m e^{inx} \right) \right| = \left| \operatorname{Im} \left(\frac{1 - (e^{ix})^{n+1}}{1 - e^{ix}} \right) \right| \leq \frac{3}{|1 - e^{ix}|}$$

Dle Dirichletova kritéria tato suma konverguje.

□

Věta L 2 (o ortogonalitě trigonometrických funkcí). Nechť $m, n \in \mathbb{N}$, pak

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \sin(nx) \cos(mx) dx &= 0 \\ \int_0^{2\pi} \sin(nx) \sin(mx) dx &= \pi \text{ (pro } n = m), 0 \text{ (pro } n \neq m) \\ \int_0^{2\pi} \cos(nx) \cos(mx) dx &= \pi \text{ (pro } n \neq m), 0 \text{ (pro } n = m) \end{aligned}$$

Poznámka proč se věta jmenuje o ortogonalitě trigonometrických funkcí? Vraťme se zpět k lineární algebře. Skalární součin vektorů x a y jsme definovali jako $\langle x, y \rangle = \sum_{i=0}^n x_i y_i$. Zcela ekvivalentně byl zaveden skalární součet funkcí f a g jako $\langle f, g \rangle = \int f(x)g(x)dx$. O vektorech řekneme, že jsou na sebe kolmé (ortogonální), pokud je jejich skalární součin roven nule. Nejinak je tomu i u skalárního součinu funkcí.

Poznámka 2 Skalární součin funkcí se nazývá Hilbertovy prostory

Důkaz.

$$\begin{aligned}\sin \alpha \sin \beta &= \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)) \\ \cos \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)) \\ \sin \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta))\end{aligned}$$

$$\int_0^{2\pi} \sin(nx) \cos(mx) dx = \int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{2} \cos((n-m)x) - \frac{1}{2} \cos((n+m)x) \right] dx =$$

Pro $n \neq m$

$$= \left[\frac{1}{2} \frac{\sin((n-m)x)}{n-m} \right]_0^{2\pi} - \left[\frac{1}{2} \frac{\sin((n+m)x)}{n+m} \right]_0^{2\pi} = 0$$

Pro $n = m$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \cos 0 dx = \pi$$

Zbylé rovnosti analogicky. □

Opakování (Vlastnosti Reimanovsky integrovatelných funkcí).

1. $f \in R((a, b)) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0$ dělení $(a, b) : S(f, D) - s(f, D) < \varepsilon$
2. $f \in R((a, b))$ a $f \in R((b, c)) \Leftrightarrow f \in R((a, c))$ pro $a < b < c$
3. f je spojitá na $[a, b] \Rightarrow f \in R((a, b))$
4. f je spojitá na (a, b) a omezená na $[a, b] \Rightarrow f \in R((a, b))$
5. $f, g \in R((a, b)) \Rightarrow f \pm g, f * g \in R((a, b))$

Věta L 3 (Fourierovy vzorce). Nechť $f \in \mathcal{P}_{2\pi}$ a nechť $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)$, nechť navíc řada napravo konverguje stejnoměrně. Pak

$$\begin{aligned}a_k &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(kx) dx, \quad k \in \{0, 1, 2, \dots\} \\ b_k &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(kx) dx, \quad k \in \{1, 2, \dots\}\end{aligned}$$

Důkaz. Idea důkazu je, že identitu pro $f(x)$ přenásobíme $\cos(kx)$ resp. $\sin(kx)$ a přintegrujeme přes $[0, 2\pi]$ a díky větě "Věta L 2" (! odpovídá značení na přednášce, nikoliv v tomto skriptu) mnoho členů vypadne.

Opakování. $f_n \Rightarrow f$ na $(a, b) \Rightarrow \int_a^b f_n \rightarrow \int_a^b f$

Pozorování. $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(kx) \sin(lx) + b_k \sin(kx) \sin(lx))$ konverguje stejnoměrně.

$$\int_0^{2\pi} f(x) \sin(lx) dx = \int_0^{2\pi} \left[\frac{a_0}{2} \sin(lx) + \sum (a_k \cos(kx) \sin(lx) + b_k \sin(kx) \sin(lx)) \right] dx =$$

$$b_k \int_0^{2\pi} \sin^2(lx) dx = b_k \pi \Rightarrow b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(lx) dx$$

podobně přenásobím funkcí $\sin(lx)$ dostanu vzorec pro a_k pro $k \in \mathbb{N}$.

Přenásobím funkcí $\cos(0x) = 1$:

$$\int_0^{2\pi} 1 * f(x) dx = \int_0^{2\pi} \frac{a_0}{2} + 0 + 0 + \dots + 0 \Rightarrow a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(0x) dx$$

□

Definice. *Nechť $f \in \mathcal{P}_{2\pi}$. Pak definujeme čísla*

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(kx) dx, & k = 0, 1, \dots \\ b_k &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(kx) dx, & k = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

a nazveme je Fourierovými koeficienty funkce f a

$$aF_f = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)$$

nazveme Fourierovou řadou funkce f .

Poznámka.

- díky 2π -periodicitě lze funkci integrovat přes libovolný interval délky 2π (velmi často $\int_{-\pi}^{\pi}$)
- Fourierovy řady lze zavést i pro funkce s periodou l , pak mají vzorce tvar

$$\begin{aligned} F_f &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos\left(\frac{2k\pi}{l}x\right) + b_k \sin\left(\frac{2k\pi}{l}x\right) \\ a_k &= \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos\left(\frac{2k\pi}{l}x\right) dx \\ b_k &= \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin\left(\frac{2k\pi}{l}x\right) dx \end{aligned}$$

- někdy se pracuje s rozvoji vůči jinému systému než je trn trigonometrický
- je-li f lichá, pak platí $\forall k : a_k = 0$

- je-li f sudá, pak platí $\forall k : b_k = 0$
- opecně neplatí $F_f = f$

Příklad. Rozviňte funkci $f(x) = x^2$ do Fourierovy řady na $(-\pi, \pi)$.

Funkce f je sudá $\Rightarrow \forall k b_k = 0$.

$$\begin{aligned}
 a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{\pi} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^{\pi} = \frac{2}{3} \pi^2 \\
 a_k &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos(kx) dx = \frac{2}{\pi} \left(\left[x^2 \frac{\sin(kx)}{k} \right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} 2x \frac{\sin(kx)}{k} dx \right) \\
 &= \frac{2}{\pi} \left(0 - 0 - \frac{2}{k} \int_0^{\pi} x \sin(kx) dx \right) = \frac{4}{k^2 \pi} \left(\left[x \frac{\cos(kx)}{k} \right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} 1 * \frac{\cos(kx)}{k} dx \right) \\
 &= \frac{4}{k^2 \pi} (\pi \cos(k\pi) - 0 - 0) = \frac{4}{k^2} \cos(k\pi) = \frac{4}{k^2} (-1)^k
 \end{aligned}$$

$$F_f(x) = \frac{1}{3} \pi^2 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{k^2} (-1)^k \cos(kx)$$

Definice. Nechť $n \in \mathbb{N}$. Pak Dirichletovým jádrem nazveme funkci

$$D_n(x) = \frac{1}{2} + \cos(x) + \cos(2x) + \dots + \cos(nx)$$

Důsledek. 1. D_n je spojitá funkce, sudá, 2π -periodická, $D_n(0) = n + \frac{1}{2}$

2. $\int_{-\pi}^{\pi} D_n(x) dx = \pi$

3. $D_n(x) = \frac{\sin(n + \frac{1}{2}x)}{2 \sin(\frac{x}{2})}, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{2k\pi\}_{k \in \mathbb{Z}}$

Důkaz. 1. č

□

Věta L 4 (vlastnosti Dirichletova jádra). Pro Dirichletovo jádro D_n platí

1. D_n je spojitá, sudá, 2π -periodická funkce

2. $\int_{-\infty}^{\infty} D_n(x) dx = \pi$

3. $D_n(x) = \frac{\sin(n + \frac{1}{2}x)}{2 \sin(\frac{x}{2})}, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \{2k\pi\}$

Důkaz. 1. plyne bezprostředně z definice

2.

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(kx) dx = \left[\frac{\sin(kx)}{k} \right]_{-\pi}^{\pi} = 0$$

3.

$$\begin{aligned}
D_n(x) &= \frac{1}{2} + \operatorname{Re} (e^{ix} + e^{2ix} + \dots + e^{nix}) = \frac{1}{2} + \operatorname{Re} \left(e^{ix} \frac{1 - e^{inx}}{1 - e^{ix}} \right) \\
&= \frac{1}{2} + \operatorname{Re} \left(\frac{e^{ix} (1 - e^{inx}) (1 - e^{-ix})}{(1 - e^{ix}) (1 - e^{-ix})} \right) \\
&= \frac{1}{2} + \operatorname{Re} \left(\frac{e^{ix} (1 - e^{-ix} - e^{inx} + e^{i(n-1)x})}{2 - e^{ix} - e^{-ix}} \right) \\
&= \frac{1}{2} + \operatorname{Re} \left(\frac{e^{ix} - 1 - e^{i(n+1)x} + e^{inx}}{2 - 2 \cos(x)} \right) \\
&= \frac{1}{2} + \frac{\cos(x) - 1 - \cos(n+1)x + \cos(x)}{2 - 2 \cos(x)} \\
&= \frac{\cos(mx) - \cos(n+1)x}{2 - 2 \cos(x)} \\
&= \frac{-2 \sin \left(n + \frac{1}{2} \right) x \sin \frac{x}{2}}{4 \left(\sin \frac{x}{2} \right)^2} = \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) x}{2 \sin \frac{x}{2}}
\end{aligned}$$

Pozn.: Důkaz třetí rovnosti je až na znaménko, na přednášce nevyšel. Snad se má použít jiný součtový vzorec goniometrických funkcí (?). Pokud někdo víte, jak to má vyjít, dejte mi prosím vědět. \square

Věta L 5 (částečné součty Fourierovy řady). *Nechť $f \in \mathcal{P}_{2\pi}$ a F_f je Fourierova řada pro f . Potom pro částečné součty $s_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$ platí*

$$s_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+z) D_n(y) dy = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (f(x+y) + f(x-y)) D_n(y) dy$$

Důkaz.

$$\begin{aligned}
s_n(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n [a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)] \\
&= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n (\cos(ky) \sin(kx) + \sin(ky) \cos(kx)) \right) f(y) dy \\
&= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{1}{2} \cos(k(y-x)) \right) f(y) dy \\
&= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_n(y-x) f(y) dy \\
&= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_n(t-x) f(t) dt
\end{aligned}$$

substituce za $t-x = y$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi-x}^{\pi-x} f(x+y) dy = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_n(y) f(x+y) dy$$

Dále platí

$$\int_{-\pi}^{\pi} = \int_{-\pi}^0 + \int_0^{\pi}$$

Integrál $\int_{-\pi}^0$ spočteme substitucí $y \rightarrow -y$ (korektně bysme měli použít pomocnou proměnnou). $D_n(y)$ je sudá funkce, proto $f(x+y) \rightarrow f(x-y)$ □

Věta T 6 (Riemann-Lebesgueovo lemma). *Nechť $[a, b] \subset \mathbb{R}$ a $f \in R([a, b])$. Potom*

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \cos(tx) dx = 0 \text{ a } \lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin(tx) dx = 0$$

Speciálně pro Fourierovy koeficienty funkce $f \in \mathcal{P}_{2\pi}$ platí $a_k \rightarrow 0$ a $b_k \rightarrow 0$.

Důkaz. Nechť $[c, d] \subset [a, b]$ a $f(x) = \chi_{[c, d]}(x)$.

$$\chi_{[c, d]}(x) = \begin{cases} 1 & x \in [c, d] \\ 0 & \text{jinak} \end{cases}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^b \chi_{[c, d]}(x) \cos(tx) dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_c^d \cos(tx) dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \left[\frac{\sin(tx)}{t} \right]_c^d = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sin(dt) - \sin(ct)}{t} = 0$$

Tvrzení platí pro $\chi_{[c, d]}(x)$, tedy platí pro $\alpha \chi_{[c, d]}(x) \Rightarrow$ pro pevné dělení $D = a = x_0 < x_1 < \dots < x_m = b$ a α_i platí tvrzení pro

$$f(x) = \sum_{i=1}^m \alpha_i \chi_{[x_{i-1}, x_i]}(x)$$

Nechť nyní $f \in R([a, b])$ a $\varepsilon > 0$. Pak \exists dělení D , že $0 \leq (R) \int_a^b f(x) dy - s(f, D) < \varepsilon$

Označme

$$\alpha_i = \min_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \text{ a } g(x) = \sum_{i=1}^m \alpha_i \chi_{[x_{i-1}, x_i]}(x)$$

t. j. $(R) \int_a^b g = s(f, D)$.

Víme $\lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^b g(x) \cos(tx) = 0$ tedy $\exists t_0 \forall t \geq t_0 : \left| \int_a^b g(x) \cos(tx) dx \right| < \varepsilon$

Nyní pro $t \geq t_0$

$$\left| \int_a^b f(x) \cos(tx) dx \right| \leq \left| \int_a^b (f(x) - g(x)) \cos(tx) dx \right| + \left| \int_a^b g(x) \cos(tx) dx \right| \leq$$

Poznamenejme $f(x) \geq g(x) \Rightarrow f(x) - g(x) \geq 0 : \left| \int F(x) \right| \leq \int |F(x)|$

$$\leq \int_a^b (f(x) - g(x)) |\cos(tx)| dx + \varepsilon \leq \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx + \varepsilon < 2\varepsilon$$

Pro sinus budeme postupovat analogicky □

Věta T 7 (Diniho kritérium). *Nechť $f \in \mathcal{P}_{2\pi}$ a $x \in \mathbb{R}$. Nechť existují vlastní limity $f(x+) = \lim_{y \rightarrow x+} f(y)$ a $f(x-) = \lim_{y \rightarrow x-} f(y)$ a nechť existují vlastní limity*

$$\lim_{y \rightarrow x+} \frac{f(y) - f(x+)}{y - x} \quad \text{a} \quad \lim_{y \rightarrow x-} \frac{f(y) - f(x-)}{y - x}$$

Potom Fourierova řada funkce f konverguje v bodě x k hodnotě $\frac{f(x+) + f(x-)}{2}$.

Důsledek. *Nechť $x \in \mathbb{R}$ a nechť pro $f \in \mathcal{P}_{2\pi}$ existuje $f'(x)$. Potom $f(x) = F_f(x)$.*

Důkaz. Chceme $F_f(x) = \frac{f(x+) + f(x-)}{2}$, tedy $s_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty}$

$$\begin{aligned} s_n(x) - \frac{f(x+) + f(x-)}{2} &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (f(x+y) + f(x-y)) D_n(y) dy - \frac{f(x+) + f(x-)}{2} \frac{2}{\pi} \int_0^\pi D_n(y) dy \\ &\stackrel{V5, VL4(ii)}{=} \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (f(x+y) - f(x+) + f(x-y) - f(x-)) D_n(y) dy \\ &\stackrel{VL4(iii)}{=} \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \underbrace{\left(\frac{f(x+y) - f(x+) + f(x-y) - f(x-)}{2 \sin\left(\frac{y}{2}\right)} \right)}_{\text{pokud } \in R([0, \pi]), \text{ pak VT6 dokončí důkaz}} \sin\left(n + \frac{1}{2}\right) y dy \end{aligned}$$

$$\text{Chceme } F(y) = \frac{f(x+y) - f(x+) + f(x-y) - f(x-)}{2 \sin\left(\frac{y}{2}\right)} \in R([0, \pi]).$$

Existuje

$$\lim_{y \rightarrow 0} F(y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y}{2 \sin\left(\frac{x}{2}\right)} \lim_{y \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+y) - f(x+)}{y} + \frac{f(x-y) - f(x-)}{y} \right) = A \in \mathbb{R}$$

Tvrzení. $h \in R([a, b])$ spojitá na $[a, b]$, $0 < \delta \leq g \leq D$. Pak $\frac{h}{g} \in R([a, b])$.

Nechť $\varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall y \in [0, \delta] : |F(y) - A| < \varepsilon$

Nyní δ je pevné a tedz dle tvrzení $F(y) \in R([\delta, \pi])$, $g(y) = 2 \sin \frac{y}{2}$.

Tedy $\exists \overline{D}$ dělení $[\delta, \pi]$ že $S(F, \overline{D}) - s(f, \overline{D}) < \varepsilon$.

Nechť D je dělení $[0, \pi]$ mající interval k \overline{D} a interval k $[0, \delta]$. Pak

$$S(F, D) - s(f, D) = \left(\max_{x \in [0, \delta]} F(x) - \min_{x \in [0, \delta]} F(x) \right) \delta + S(F, \overline{D}) - s(F, \overline{D}) \leq 2\varepsilon\delta + \varepsilon \leq \varepsilon(2\pi + 1)$$

□

Věta T 8 (Jordan-Dirichletovo kritérium - bez důkazu). *Nechť $f \in \mathcal{P}_{2\pi}$ je po částech monotónní. Tedy nechť existuje konečně mnoho bodů $0 = a_1 < a_2 < \dots < a_m = 2\pi$ tak, že f je monotónní na (a_i, a_{i+1}) pro $i \in \{1, \dots, m-1\}$. Potom Fourierova řada funkce f konverguje v bodě x k hodnotě $\frac{f(x+) + f(x-)}{2}$ pro všechna $x \in \mathbb{R}$.*

13 Základy komplexní analýzy

Připomenutí vlastností \mathbb{C} a operací $+$ a \times na \mathbb{C} . Limita posloupnosti $z_n = a_n + ib_n \in \mathbb{C}$ je definována jako $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$, pokud obě limity reálných čísel existují.

13.1 Holomorfní funkce a křivkový integrál

Definice. Nechť f je funkce definovaná na okolí bodu $z_0 \in \mathbb{C}$ a zobrazující do \mathbb{C} . Komplexní derivací f v z_0 nazýváme komplexní číslo

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

pokud tato limita existuje.

Definice. Nechť $G \subset \mathbb{C}$ je otevřená. Funkce $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ se nazývá holomorfní, má-li ve všech bodech G komplexní derivaci.

Poznámka. Jsou-li f a g holomorfní na G , pak jsou $f + g$ i fg holomorfní na G a f/g je holomorfní na $G \cap \{g \neq 0\}$.

Definice. Zobrazení $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ je křivka a $f : \langle \varphi \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitě zobrazení. Definujeme křivkový integrál

$$\int_{\langle \varphi \rangle} f(z) dz = \int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

existuje-li integrál na pravé straně. Tento integrál můžeme značit i $\int_{\varphi} f(z) dz$.

Věta T 1 (Cauchyho věta pro trojúhelník). Nechť f je holomorfní na otevřené množině $G \subset \mathbb{C}$ a $\Delta \subset G$ je trojúhelník. Pak $\int_{\partial \Delta} f(z) dz = 0$.

Věta BD 2 (Cauchy). Nechť f je holomorfní na otevřené množině $G \subset \mathbb{C}$. Nechť $\langle \varphi \rangle \subset G$ je uzavřená křivka taková, že vnitřek $\langle \varphi \rangle \subset G$ (tedy případné "díry" uvnitř G nejsou uvnitř $\langle \varphi \rangle$). Pak $\int_{\varphi} f(z) dz = 0$.

Věta L 3 (Cauchyův vzorec). Nechť f je holomorfní na kruhu $B(z_0, R)$ a $0 < r < R$. Pro křivku $\varphi(t) = z_0 + re^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, platí

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\varphi} \frac{f(z)}{z - s} = \begin{cases} f(s) & \text{pro } |s - z_0| < r \\ 0 & \text{pro } |s - z_0| > r \end{cases}$$

Věta T 4 (Liouville). Nechť f je holomorfní a omezená na \mathbb{C} . Pak f je konstantní.

Věta L 5 (Základní věta algebry). Každý nekonstantní polynom (s komplexními koeficienty) má v \mathbb{C} alespoň jeden kořen.

13.2 Rozvoj do Taylorovy a Laurentovy řady

Definice. *Nechť $z_0 \in \mathbb{R}$ a $a_n \in \mathbb{C}$ pro $n \in \mathbb{N}_0$. Řadu funkcí $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ pro $z \in \mathbb{C}$ nazýváme mocninnou řadou s koeficienty a_n o středu z_0 .*

Věta T 6 (o rozvoji do Taylorovy řady). *Nechť f je holomorfní na kruhu $B(z_0, R)$. Pak existuje právě jedna mocninná řada s poloměrem konvergence alespoň R , že na $B(z_0, R)$ platí*

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$$

Navíc platí $a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$ pro všechna $n \in \mathbb{N}_0$.

Jako u reálných mocninných řad lze na kruhu konvergence prohazovat \sum a derivaci a důkaz je podobný.

Důsledek. *Je-li f holomorfní na G , pak na G existují derivace všech řádů $f^{(k)}$ pro $k \in \mathbb{N}$.*

Definice. *Množina $G \subset \mathbb{C}$ se nazývá oblast, pokud je otevřená a souvislá. Tedy pokud platí*

$$\forall A, B \in G \text{ otevřené v } G, G = A \cup B, A \cap B = \emptyset \Rightarrow A = \emptyset \text{ nebo } B = \emptyset$$

Věta L 7 (o jednoznačnosti holomorfní funkce). *Nechť $G \subset \mathbb{C}$ je oblast a f, g jsou holomorfní na G . Předpokládáme, že množina*

$$M = \{z \in G : f(z) = g(z)\}$$

má hromadný bod v G , neboli existují $z_n \in M$ a $z_0 \in G$ takové, že $z_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} z_0$. Pak $f = g$ na G .

Definice. *Řekneme, že funkce f má v bodě z_0 pól násobnosti nejvýše $k \in \mathbb{N}$, je-li funkce*

$$F(z) = \begin{cases} (z - z_0)^{k+1} f(z) & \text{pro } z \neq z_0 \\ 0 & \text{pro } z = z_0 \end{cases}$$

holomorfní na nějakém okolí bodu z_0 . Řekneme, že má pól násobnosti k , je-li $k \in \mathbb{N}$ nejmenší s touto vlastností.

Například funkce $f(z) = 1/z^k$ má v bodě 0 pól násobnosti k .

Definice. *Nechť $M \subset G \subset \mathbb{C}$ je konečná množina. Řekneme, že funkce $f : G \setminus M \rightarrow \mathbb{C}$ je meromorfní v G , pokud je f holomorfní na $G \setminus M$ a v bodech M má f póly (konečné násobnosti).*

Věta T 8 (o rozvoji do Laurentovy řady). *Nechť f je holomorfní na mezikruží $B(z_0, R) \setminus \overline{B(z_0, r)}$, $0 < r < R$. Pak existují jednoznačně určená čísla $a_k \in \mathbb{C}$, $k \in \mathbb{Z}$, že platí*

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k(z - z_0)^k \text{ pro všechna } z \in B(z_0, R) \setminus \overline{B(z_0, r)}$$

13.3 Reziduová věta a její aplikace

Definice. Necht $\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k(z - z_0)^k$ je Laurentova řada funkce f . Reziduum funkce f v bodě z_0 nazveme koeficient $a_{(-1)}$ a značíme ho $\text{res}_{z_0} f$.

Definice. Index bodu z_0 vzhledem v uzavřené křivce φ je definován jako

$$\text{ind}_{\varphi} z_0 = \frac{1}{2\pi i} \int_{\varphi} \frac{1}{z - z_0} dz$$

Index bodu udává, kolikrát oběhne křivka φ okolo bodu z_0 , pokud uvažujeme násobnost a obíhání v opačném směru bereme s opačným znaménkem.

Věta T 9 (Reziduová věta). Necht $G \subset \mathbb{C}$ je oblast, f je meromorfní funkce na G , φ je křivka a póly f neleží na $\langle \varphi \rangle (\subset G)$. Pak platí

$$\int_{\varphi} f(z) dz = 2\pi i \sum_{\{z: z \text{ je pól } f\}} \text{res}_z f \text{ind}_z f$$

Důkaz. Označme $P = \{z \in G : f(z) = +\infty \text{ resp. } f \text{ má pól v } z\}$. Pro $z_0 \in G$ označme

$$H_{z_0} = \sum_{k=-kz}^{-1} a_k(z - z_0)^k$$

část rozvoje f do Laurentovy řady. Pak

$$F(z) = f(z) - \sum_{z_0 \in P} H_{z_0}(z)$$

je F holomorfní na G . Podle Cauchyovy věty $\int_{\varphi} F(z) dz = 0$. Tedy

$$\begin{aligned} \int_{\varphi} F(z) dz &= \int_{\varphi} \sum_{z_0 \in P} H_{z_0}(z) dz \\ &= \sum_{z_0 \in P} \sum_{k=-kz}^{-1} \int_{\varphi} a_k(z - z_0)^k dz \\ &= \sum_{z_0 \in P} \text{res}_{z_0} f \int_{\varphi} \frac{1}{z - z_0} dz \\ &= 2\pi i \sum_{z_0 \in P} \text{res}_{z_0} f \text{ind}_{\varphi} z_0 \end{aligned}$$

□

Pravidla pro výpočet rezidua

1. Je-li h holomorfní na okolí a a g má v a jednoduchý pól, pak

$$\text{res}_a(hg) = h(a)\text{res}_a(g)$$

2. Jsou-li h, g holomorfní na okolí a a g má v a jednoduchý kořen, pak

$$\operatorname{res}_a \left(\frac{h}{g} \right) = \frac{h(a)}{g'(a)}$$

3. Má-li f v a pól násobnosti n , pak lze residuum spočítat za pomoci derivování řádu $(n-1)$ jako

$$\operatorname{res}_a(f) = \lim_{z \rightarrow a} \frac{1}{(n-1)!} [(z-a)^n f(z)]^{(n-1)}$$

Výpočet integrálů za pomoci reziduové věty:

Nechť Q je racionální funkce.

1. $\int_0^{2\pi} Q(\cos(t), \sin(t)) dt$
2. $\int_{-\infty}^{\infty} Q(x) dx$
3. $\int_{-\infty}^{\infty} Q(x) \sin(x) dx$
4. $\int_{-\infty}^{\infty} Q(x) \cos(x) dx$
5. $\int_0^{\infty} Q(x) x^{p-1} dx$

14 Metrické prostory II

Definice. Metrickým prostorem budeme rozumět dvojici (P, ϱ) , kde P je množina bodů a $\varrho : P \times P \rightarrow \mathbb{R}$ splňuje

1. $\forall x, y \in P : \varrho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
2. $\forall x, y \in P : \varrho(x, y) = \varrho(y, x)$ (symetrie)
3. $\forall x, y, z \in P : \varrho(x, z) \leq \varrho(x, y) + \varrho(y, z)$ (trojúhelníková nerovnost)

Funkce ϱ nazýváme metrika.

Definice. Nechť (P, ϱ) je metrický prostor a $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ je posloupnost prvků P a $x \in P$. Řekneme, že $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ konverguje k x (v (P, ϱ)), pokud $\lim_{n \rightarrow \infty} \varrho(x_n, x) = 0$. Značíme $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, nebo $x_n \xrightarrow{\varrho} x$.

Definice. Nechť (P, ϱ) je metrický prostor v $K \subset P$. Řekneme, že K je kompaktní, jestliže z každé posloupnosti prvků K lze vybrat konvergentní podposloupnost s limitou v K .

Věta BD 1 (charakterizace kompaktních množin \mathbb{R}^n). Množina $K \subset \mathbb{R}^n$ je kompaktní, právě když je omezená a uzavřená.

Věta L 2 (nabývání extrémů na kompaktu). Nechť (P, ϱ) je metrický prostor a $K \subset P$ je kompaktní. Nechť $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá. Pak f nabývá na K svého maxima i minima. Speciálně je tedy f na K omezená.

14.2 Úplné metrické prostory

Definice. Nechť (P, ϱ) je metrický prostor a nechť $x_n \in P, n \in \mathbb{N}$, je posloupnost bodů z P . Posloupnost $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ nazveme cauchyovskou, pokud

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall m, n \geq n_0 : \varrho(x_n, x_m) < \varepsilon$$

Posloupnost $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ nazveme konvergentní, pokud existuje $x \in P$ tak, že

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varrho(x_n, x) = 0$$

Řekneme, že (P, ϱ) je úplný, pokud je každá cauchyovská posloupnost konvergentní.

Věta L 3 (úplnost \mathbb{R}^n). Metrický prostor $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ je úplný.

Příklad. 1. Metrický prostor $(Q, |\cdot|)$ není úplný.

2. Metrický prostor všech spojitých funkcí $C([0, 1])$ s metrikou

$$\varrho_1(f, g) = (R) \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx$$

není úplný.

3. Metrický prostor všech Lebesgueovsky integrovatelných funkcí $L([0, 1])$ s metrikou

$$\varrho(f, g) = (L) \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx$$

je úplný

Věta T 4 (úplnost spojitých funkcí). Metrický prostor spojitých funkcí $(C([0, 1]), \varrho)$ se supremovou metrikou

$$\varrho(f, g) = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|$$

je úplný

Věta T 5 (Banachova věta o kontrakci). Nechť (P, ϱ) je úplný metrický prostor a $K < 1$. Nechť $T : P \rightarrow P$ je zobrazení takové, že

$$\varrho(Tx, Ty) \leq K \varrho(x, y) \quad \forall x, y \in P$$

Pak existuje právě jeden bod $x_0 \in P$ tak, že $T(x_0) = x_0$

Věta T 6 (o zúplnění metrického prostoru). Nechť (Q, ϱ) je metrický prostor. Pak existuje úplný metrický prostor (P, σ) tak, že $Q \subset P$ a

$$\sigma(x, y) = \varrho(x, y) \quad \forall x, y \in Q$$

Věta L 7 (úplnost a uzavřená podmnožina). Nechť (P, ϱ) je úplný metrický prostor a $F \subset P$ je uzavřená podmnožina. Pak je metrický prostor (F, ϱ) úplný.