

MPEI 2018-2019

Aula 26

Teorema do Limite Central e aplicações

Exercícios de consolidação

- Sendo X_1, X_2, \dots i.i.d com média finita μ e variância finita σ^2 :
- E
- e $M_n = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$
- $E[M_n] = ?$
- $Var[M_n] = ?$
- $P(|M_n - E[M_n]| \geq \epsilon) \leq ???$
- $P(|M_n - E[M_n]| \geq \epsilon) \leq \frac{Var(M_n)}{\epsilon^2}$
- M_n converge em probabilidade para μ

Exercícios de consolidação

- f : fracção da população que gosta de futebol
- Queremos fazer uma sondagem/inquérito a n pessoas
- Quantas pessoas devemos inquirir para ter uma confiança (probabilidade) de 95% de que **não cometemos um erro superior a 1 %**
- Considere:
 - Resultado de um inquérito à pessoa i :
$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{se gosta} \\ 0, & \text{se não gosta} \end{cases}$$
 - $M_n = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ fracção de “gosta” na amostras

Resolução

- Sugestões ?
- Uma das formas (veremos outra) é usando a Desigualdade de Chebyshev ...
- O que diz a desigualdade ?
- $P(|M_n - E[M_n]| \geq \epsilon) \leq \frac{Var(M_n)}{\epsilon^2}$

O que sabemos ?

- $\epsilon = ?$
- $\epsilon = 0.01$
- $Var(M_n) = ?$
- $Var(M_n) = \frac{Var(X_i)}{n}$

$$Var(X_i) = ?$$

- Todas as X_i são v. a. de Bernoulli
 - Mas não sabemos p (o inquérito é para estimar isso)
- Para o nosso caso é útil o valor máximo de $Var(X_i)$. Qual esse valor ?
- $Var(X_i) = p(1 - p) \leq \frac{1}{4}$

Voltando à desigualdade

- Substituindo temos:

- $$P(|M_n - E[M_n]| \geq 0,01) \leq \frac{\frac{1}{4}n}{0,01^2} = \frac{1}{4 n 10^{-4}}$$

- Como queremos $P(\quad) \leq 0,05$

- $$\frac{1}{4 n 10^{-4}} \leq 0,05$$

- $$n = ?$$

- $$n \geq 50\,000 \quad (\text{valor conservador})$$

E se $\epsilon = 0,05$?

- $P(|M_n - E[M_n]| \geq 0,05) \leq \frac{1}{4 n (0,05)^2}$
- Obtendo-se n de:
- $\frac{1}{4 n (0,05)^2} \leq 0,05$
- $n \geq 2000$

Discussão

- Problemas com os valores de n que obtivemos:
 1. São muito grandes
 2. Baseiam-se numa desigualdade que apenas pode dar um majorante/minorante
 - E não um valor “exacto”
- Veremos de seguida que se pode fazer melhores estimativas de n
 - Mas para isso precisamos saber mais sobre a distribuição de M_n

Qual a distribuição de M_n para valores de n muito grandes ?

Questão










- Já vimos o comportamento limite da média de uma sequência de variáveis aleatórias
- Conseguimos avançar mais e dizer alguma coisa quanto à distribuição ?
- Começemos com alguns exemplos ...

Exemplo 1

- Consideremos um jogo em lançamos uma moeda ao ar e **perdemos 1 Euro se sair CARA** e **ganhámos 2 Euros se sair COROA**
- A moeda é honesta e existe independência entre as jogadas
- Como se comporta a distribuição com as jogadas ?


Continuando o jogo

- Recorrendo a simulação em Matlab...







E se tivermos outras distribuições iniciais ?

- Exponencial: $y = -\log(\text{rand}(1, \text{len})). / \text{lambda}$



Outro exemplo

- **Usando geração** de números aleatórios:
- Geradas 10 sequências de números aleatórios com distribuição uniforme no intervalo $[0,1]$ e somadas ...



Demos online

- Wolfram Demonstrations Project : **The Central Limit Theorem**

The central limit theorem states that the sampling **distribution of the sample mean approaches a normal distribution as the size of the sample grows**.

This means that the histogram of the means of many samples should approach a bell-shaped curve.

Each sample consists of 200 pseudorandom numbers between 0 and 100, inclusive.

- <http://demonstrations.wolfram.com/TheCentralLimitTheorem/>

Demos online

- **Central Limit Theorem for the Continuous Uniform Distribution**
- <http://demonstrations.wolfram.com/CentralLimitTheoremForTheContinuousUniformDistribution/>
- This Demonstration illustrates the central limit theorem for the continuous uniform distribution on an interval.

Demos

- **Central Limit Theorem Applied to Samples of Different Sizes and Ranges**
- <http://demonstrations.wolfram.com/CentralLimitTheoremAppliedToSamplesOfDifferentSizesAndRanges/>
- This Demonstration shows the applicability of the central limit theorem (CLT) to the means of samples of random integer or real numbers having random ranges.
- It allows the user to generate such datasets and plot the histogram of their means.
- Superimposed on the histogram is the normal (Gaussian) distribution function that gives the theoretical distribution of these sample means.
- Also shown for comparison are the numeric values of the mean and standard deviation, both of the theoretical distribution and of the generated data.

Teorema do Limite Central

- Nos exemplos, para valores grandes de n , temos sempre uma distribuição com a forma da Gaussiana
- De facto **demonstra-se que a soma de variáveis i.i.d. tende para uma distribuição normal quando o número de variáveis é grande**
 - Teorema do Limite Central
- A média é, como já vimos, igual à das variáveis originais

De uma forma mais formal

- Sendo:
 - X_1, X_2, \dots variáveis aleatórias i.i.d.
 - X_i com distribuição F e $E[X_i] = \mu$ e $Var(X_i) = \sigma^2$
 - μ e σ^2 finitos
 - S_n a soma das n primeiras variáveis
 - $Z_n = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$ v.a. de média nula e variância unitária

- O Teorema do Limite Central afirma:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(Z_n \leq z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

- Isto é, a função de distribuição de Z_n tende para a distribuição de uma variável Normal normalizada $N(0,1)$

Aplicando à média

- Fazendo $M_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$
- Pelo TLC temos

$$M_n \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \text{quando } n \rightarrow \infty$$

A distribuição da média das n variáveis i.i.d. tende para a distribuição normal com parâmetros μ e $\frac{\sigma^2}{n}$

Teorema do Limite Central

- O Teorema do Limite Central é a **razão da importância da distribuição Normal/Gaussiana**
 - É um **resultado extremamente importante e abre caminho a muitas aplicações**
- “Formulação qualitativa”:

Coisas que são o resultado da soma de muitos pequenos efeitos tendem a ser Gaussianas

Exemplo de aplicação do TLC

- Suponha que as despesas feitas por cada cliente de um restaurante são variáveis aleatórias I.I.D. com média 6.5 Euros e desvio padrão 2.5 Euros.
- Estime a probabilidade de os primeiros 100 clientes gastarem um total superior a 600 Euros


Resolução

- Consideremos $S_{100} = X_1 + X_2 + \cdots + X_{100}$
- Como $E[S_{100}] = 100\mu = 650$
- E $n\sigma^2 = 625$
- Teremos $Z_{100} = \frac{S_{100} - 650}{25}$
- Como pelo TLC Z_{100} segue um lei $N(0,1)$:
- $P(S_{100} > 600) = P\left(Z_{100} > \frac{600 - 650}{25}\right)$
- $= P\left(Z_{100} > \frac{600 - 650}{25}\right) = \mathbf{P(Z_{100} > -2)}$

Calc. probabilidades na $N(0,1)$

- $P(Z_{100} > -2)$?
- Como se obtém ?
- Existem valores tabelados de

$$P(Z \leq z) = \Phi(z)$$



– Exemplo:

<http://www.professores.uff.br/patricia/images/stories/arquivos/TabelaNormal.pdf>

- $P(Z_{100} > -2) = 1 - \Phi(-2)$
- $= 1 - (1 - \Phi(2)) = \Phi(2) =$

1,7	0,96446	0,96447
1,8	0,96407	0,96485
1,9	0,97128	0,97193
2,0	0,97725	0,97778
2,1	0,98214	0,98257
2,2	0,98610	0,98645

$= 0,97725$

Em Matlab

- Obter $\Phi(2)$

z=2

m=0

sigma=1

p = cdf('Normal',z,m,sigma)

>> 0.9772

Nota: usa Statistics Toolbox

Em Matlab

- Com ferramentas como Matlab não é necessário estar a efectuar a normalização
- Aplicando directamente a S_{100} :

```
s=600           % pq queremos  $P(S_{100} > s=600)$ 
```

```
m=650           % média de  $S_{100}$ 
```

```
sigma=25        % desvio padrão de  $S_{100}$ 
```

```
p = 1- cdf('Normal',600,m,sigma)
```

```
>>> 0.9772
```

Retomemos o nosso inquérito futebolístico ...

- Relembremos o problema:
- f : fracção da população que gosta de futebol
- Queremos fazer uma sondagem/inquérito a n pessoas
- Quantas pessoas devemos inquirir para ter uma **confiança (probabilidade) de 95% de que não cometemos um erro superior a 5 %**
- Considere:
 - Resultado de um inquérito à pessoa i :
$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{se gosta} \\ 0, & \text{se não gosta} \end{cases}$$
 - $M_n = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ fracção de “gosta” na amostras

Resolução usando TLC

- Pretendemos $P(|M_n - f| \leq 0,05) \geq 0,95$
- O evento que nos interessa calcular a probabilidade é $|M_n - f| \leq 0,05$
- Pretendemos portanto $P\left(\left|\frac{S_n - \textcolor{teal}{n}f}{n}\right| \leq 0,05\right)$
- Como $Z_n = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$ manipulamos para obter $\sqrt{n}\sigma$ no denominador, obtendo
- $P\left(\left|\frac{S_n - nf}{\sqrt{n}\sigma}\right| \leq \frac{0,05\sqrt{n}}{\sigma}\right)$

Resolução usando TLC (cont.)

- Como Z_n tende para $N(0,1)$
- Teremos:
- $P(|M_n - f| \leq 0,05) \approx P(|Z| \leq 0,05 \frac{\sqrt{n}}{\sigma})$
- E usando majorante para a variância
$$p(1 - p) \leq 1/4 \quad (=> \sigma = 1/2)$$
- $P(|M_n - f| \leq 0,05) \leq P(|Z| \leq 0,1\sqrt{n})$

$$P(|Z| \leq 0.1\sqrt{n}) ?$$

- $P(|Z| \leq 0.1\sqrt{n})$
- $= P(-0.1\sqrt{n} \leq Z \leq 0.1\sqrt{n})$
- $= F_{N(0,1)}(0.1\sqrt{n}) - F_{N(0,1)}(-0.1\sqrt{n})$
- Para permitir usar tabelas, coloquemos em função de $Q(z) = 1 - F_{N(0,1)}(z)$
 - Sabe-se também que $F_{N(0,1)}(-z) = Q(z)$
- $= 1 - Q(0.1\sqrt{n}) - Q(0.1\sqrt{n})$
- $= 1 - 2 Q(0.1\sqrt{n})$

Terminando...

- $1 - 2 Q(0,1\sqrt{n})$ terá de ser $\geq 0,95$
- $1 - 2 Q(0,1\sqrt{n}) \geq 0,95$
- $\Rightarrow Q(0,1\sqrt{n}) \geq \mathbf{0,025}$
- $\Rightarrow 0,1\sqrt{n} \geq \mathbf{1,96}$ por consulta a tabela
- Resolvendo em ordem a n temos, finalmente,
- $\sqrt{n} \geq (1,96)^2 \Rightarrow n \geq 384,16$
- $\mathbf{n = 385}$ é o número mínimo que procurávamos

Para mais informação

- Capítulo 5, “Somas de variáveis aleatórias”, do livro de F. Vaz