

# Elementos de Física



## Exame Final

Ano lectivo 2009/10

1º Semestre

Data: 22 de Janeiro 2010

Hora: 10:00 horas

Duração: 3 horas

## Cotação

I-3 valores

II-3.5 valores

III-3.5 valores

IV-3.5 valores

V-3.5 valores


VI-3 valores

*Não é permitido o uso de máquina de calcular*

I

Considere um objecto (O) com 2 cm de altura colocado a uma distância de 30 cm de uma lente biconvexa de distância focal de 20 cm. No outro lado da lente está colocado, a 100 cm desta, um espelho côncavo de raio  $R=60$  cm.

- Determine a posição da imagem dada pela lente L.
- Qual a posição da imagem final formada após a reflexão no espelho?
- Caracterize a imagem final formada após reflexão no espelho.



## *Solução:*

- Posição

$$\frac{1}{p_1} + \frac{1}{q_1} = \frac{1}{f_1} \rightarrow q_1 = \frac{p_1 f_1}{p_1 - f_1} = 60 \text{ cm}$$

- Imagem final


$$d = q_1 + p_2 \rightarrow p_2 = 40 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{p_2} + \frac{1}{q_2} = \frac{1}{f_2} = \frac{2}{R} \rightarrow q_2 = \frac{p_2 f_2}{p_2 - f_2} = 120 \text{ cm} < 0 \text{ imagem real}$$

$$m = m_1 * m_2 = \left(-\frac{q_1}{p_1}\right) \left(-\frac{q_2}{p_2}\right) > 0 \text{ imagem direita}$$

## II

Uma mola é montada horizontalmente, com a extremidade esquerda mantida em estado estacionário. Fixando um dinamómetro à extremidade livre da mola e aplicando uma força de tracção verificou-se a proporcionalidade entre a força exercida e a deformação da mola, em que uma força de 6,0 N provoca uma deformação de 3,0 cm. O dinamómetro foi então substituído por um bloco de 0,50 kg que após libertado a 4,0 cm da posição de equilíbrio oscila em torno da posição de equilíbrio, como se ilustra na figura.



- Determine a constante da mola, e diga qual o seu significado físico.
- Estabeleça a equação do movimento do bloco.
- Determine o instante (em  $\pi$  segundos) em que o bloco passa pela 2ª vez na posição de equilíbrio.
- Determine o valor máximo e mínimo da aceleração do bloco e respectivas posições do bloco.
- Explique o que esperaria acontecer ao sistema físico anterior, quando sobre ele passa a actuar uma força do tipo  $\vec{F} = -b\vec{V}$ , onde  $\vec{V}$  representa o vector velocidade. Para um coeficiente de amortecimento de 2 kg/s estabeleça a nova equação do movimento. Como poderia contrariar este efeito?

### Solução:

- Constante da mola

$$F_{elastica} = kx \rightarrow k = \frac{F_{elas}}{x} = 200 \text{ N.m}^{-1}$$

- Equação

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{1}{2} * \frac{1}{200}} = \frac{\pi}{10} \text{ s}$$

$$qd \ t = 0 \quad y(t = 0) = A = A \sin\left(2\pi\frac{t}{T} + \phi\right) \rightarrow \sin\phi = 1 \rightarrow \phi = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

$$y(t) = 4 \sin\left(20t + \frac{\pi}{2}\right)$$

- Instante t (2ª vez em y=0)

$$y(t) = 0 = 4 \sin\left(20t + \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow 20t + \frac{\pi}{2} = \pi \text{ ou } 2\pi \text{ ou } 3\pi$$

Note: não pode ser =0 porque é um momento anterior. Segundo instante é =2 $\pi$ .

$$20t + \frac{\pi}{2} = 2\pi \rightarrow t = \frac{3\pi}{40} \text{ s}$$

- Aceleração

$$a(t) = -\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 y(t) \rightarrow |a_{max}| = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 A \quad qd \quad y = \pm A$$

e) Amortecimento

Devido à aplicação duma força proporcional e contrária à velocidade, o movimento harmónico simples transforma-se em movimento harmónico amortecido, ou seja a amplitude do movimento vai diminuir com o tempo e a frequência angular modifica-se.

$$A = A_0 e^{-\frac{b}{2m}t} \quad e \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m} - \left(\frac{b}{2m}\right)^2}$$

$$y(t) = A_0 e^{-\frac{b}{2m}t} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

Para contrária o amortecimento é necessário aplicar uma força periódica que teria uma expressão do tipo

$$F = F_0 \cos \omega_f t$$

### III

A amplitude de um movimento ondulatório transversal que se propaga da direita para a esquerda ao longo de uma corda é  $0,6\sqrt{2}$  m. A corda tem um densidade linear de 4 kg/m e está sujeita a uma tensão de 4 N. No instante  $t=0$  s o deslocamento da extremidade da corda é  $y=-0,6$  m e desloca-se no sentido negativo. No instante  $t= 3/8$  s o deslocamento da extremidade é agora  $-0,6\sqrt{2}$  m. Determine:

- a fase inicial;
- o período da oscilação;
- a velocidade de propagação;
- o comprimento de onda.

**Solução:**

$$V_{prop} = \sqrt{\frac{F}{\rho}} = 1 \text{ m.s}^{-1}$$

$$qd \ t = 0 \ y(x = 0; t = 0) = -0.6 = 0.6\sqrt{2} \sin(0 - 0 + \phi)$$

$$\sin \phi = -\frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow \begin{cases} \phi = -\frac{\pi}{4} \\ \phi = -\frac{3\pi}{4} \end{cases}$$

$$V_{osc}(0; 0) = \frac{2\pi}{T} \cos \phi < 0 \rightarrow \cos \phi < 0 \rightarrow \phi = -\frac{3\pi}{4} \text{ rad}$$

$$qd \ t = \frac{3}{8} \text{ s} \ y\left(0; \frac{3}{8}\right) = -0.6\sqrt{2} = 0.6\sqrt{2} \sin\left(2\pi \frac{3}{8T} - 0 - \frac{3\pi}{4}\right)$$

$$\sin\left(2\pi \frac{3}{8T} - 0 - \frac{3\pi}{4}\right) = -1 \rightarrow 2\pi \frac{3}{8T} - 0 - \frac{3\pi}{4} = -\frac{\pi}{2}$$

$$T = 3 \text{ s}$$


$$\lambda = V_{prop} * T = 3 \text{ m}$$

Para os problemas IV, V e VI ver “AC2 09/10”

Prof. Claude Boemare - Universidade de Aveiro

## IV


Duas ondas de igual amplitude são emitidas **em oposição de fase** a partir de duas fontes pontuais sonoras,  $F_1$  e  $F_2$ , separadas de 2 km e posicionadas simetricamente relativamente à origem, como se indica na figura. As ondas propagam-se com uma velocidade de 400m/s, e têm associado um c.d.o de  $\lambda=1$ km:



- Determine a diferença de fase entre as ondas no eixo das ordenadas. Explique claramente o seu raciocínio.
- Determine a diferença de fase entre as ondas para qualquer ponto do eixo das abcissas exterior à linha que une as fontes. Explique claramente o seu raciocínio.
- Escreva uma expressão em função do ângulo  $\theta$  (ver figura) que permita determinar o ponto de coordenadas (1km,  $y_{\min}$ ), para o qual se dá interferência construtiva das duas ondas. Onde  $y_{\min}$ , representa o valor mínimo de ordenada nessas condições.

## V

Fotões de 60keV de energia, emitidos por uma fonte radioactiva de  $^{241}\text{Am}$ , incidem no alvo de berílio ( $W_{\text{Be}}=4,98$  eV), tal como se mostra na figura ao lado. ( $h.c=1240$  eV.nm;  $\lambda_c=h/m_e c =2,43 \times 10^{-3}$  nm)



- Qual o comprimento de onda mínimo dos fotões que poderá ser observado no lado esquerdo após a interacção da radiação incidente com o alvo de berílio.
- Qual a sua energia mínima?
- Considere agora que substituímos a fonte de  $^{241}\text{Am}$  por uma lâmpada com emissão no ultravioleta, de comprimento de onda de 200nm. Estabeleça uma expressão analítica, a mais simplificada possível, que a partir das grandezas conhecidas, lhe permita determinar o comprimento de onda mínimo que poderá ser atribuído aos electrões produzidos no Be,.

## VI

Uma amostra de material radioactivo contém  $10^{18}$  átomos. A meia vida do material é de  $2 \times 10^3$  dias.

- Mostre que o nº de átomos por decair num dado instante  $t$  é dado por  $N(t)=N_0/2^n$ , quando  $t=nT_{1/2}$  (sendo  $n=0,1,2,\dots$ ).
- Determine a fracção de átomos do material inicial que ainda existe após  $6 \times 10^3$  dias.
- Determine a actividade inicial da amostra.
- Este material pode ser utilizado para datação de achados arqueológicos? Justifique.