

---

## Aprendizagem Automática

FICHA N. 4

ENUNCIADO

---

Nome: Tomas Miguel Baptista de Matos

Número: A48286

---

ATENÇÃO: Fixa de respostas múltiplas. Só uma única resposta em cada alínea está correta. Cada alínea vale 2 valores. Respostas erradas descontam 0.5 valores.

---

1. No ficheiro `A48286_Q001_data.p` encontra-se disponível uma variável independente  $x$  e uma variável dependente  $y$ . Pretende-se estimar a variável  $y$  através de uma regressão polinomial da variável  $x$ , minimizando o erro quadrático médio.
  - (a) Considere o conjunto de treino composto pelo “fold” 0, e o conjunto de teste composto pelo “fold” 1. Considere ainda que, através da minimização do erro quadrático médio do conjunto de treino, se estimou um modelo regressão polinomial de 3ª ordem:  $\hat{y} = w_0 + w_1x + w_2x^2 + w_3x^3$ .
    - i. No conjunto de teste, o coeficiente de determinação,  $R^2$ , é igual a 1.040.
    - ii. No conjunto de teste, o erro quadrático médio é igual a 0.31.
    - iii. Todas as respostas anteriores.
    - iv. Nenhuma das respostas anteriores.
  - (b) Considere o conjunto de treino composto pelo “fold” 0, e o conjunto de teste composto pelo “fold” 1. Considere ainda que, através da minimização do erro quadrático médio do conjunto de treino, se estimou um modelo regressão polinomial de 4ª ordem:  $\hat{y} = w_0 + w_1x + w_2x^2 + w_3x^3 + w_4x^4$ .
    - i. No conjunto de teste, o erro quadrático médio é igual a 0.11.
    - ii. No conjunto de treino, o erro absoluto médio é igual a 0.44.
    - iii. Todas as respostas anteriores.
    - iv. Nenhuma das respostas anteriores.
2. Considere o conjunto “diabetes” disponível em `sklearn.datasets` (usar a função `load_diabetes()`). Pretende-se estimar e avaliar modelos de regressão polinomial com os dados deste conjunto: use as primeiras 174 amostras para treino e as restantes para teste.
  - (a) Considere que utiliza função Lasso (sub-módulo `linear_model` do `sklearn`) para uma regressão polinomial de 3ª ordem dos dados de treino. Instancie o regressor somente com os seguintes parâmetros:  
`Lasso(random_state=42, alpha=0.01)`
    - i. Excluindo  $w_0$ , o número de coeficientes do polinómio diferentes de zero é 17.
    - ii. No conjunto de teste, o erro absoluto médio é igual a 43.21.
    - iii. Todas as respostas anteriores.

- iv. Nenhuma das respostas anteriores.
  - (b)
    - i. O número de coeficientes, incluindo  $w_0$ , numa regressão polinomial de ordem 3, é igual a 286.
    - ii. O número de coeficientes, incluindo  $w_0$ , numa regressão polinomial de ordem 4, é igual a 1001.
    - iii. Todas as respostas anteriores.
    - iv. Nenhuma das respostas anteriores.
3. No ficheiro `A48286_Q003_data.p`, encontra-se um conjunto de dados bidimensionais divididos em duas classes  $\Omega = \{\varpi_0, \varpi_1\}$  (negativos e positivos). Há duas variáveis num dicionário:  $\mathbf{X}$  é uma matriz de dados, e  $\mathbf{y}$  é um array com as classes dos dados. Considere o seguinte modelo linear de classificação:
- $\hat{y} = \mathbf{w}^\top \mathbf{x} = w_0 + w_1 x_1 + w_2 x_2$ , com  $\mathbf{x} \in \varpi_1$  para  $\hat{y} \geq 0$ , e para  $\mathbf{w} = [w_0, w_1, w_2]^\top$  e  $\mathbf{x} = [1, x_1, x_2]^\top$ .
- Considere ainda que o vetor  $\mathbf{w}_{\text{MSE}}$  é o vetor de pesos que minimiza o erro quadrático médio deste conjunto:  $\mathcal{E} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (y[n] - \hat{y}[n])^2$ , onde  $N$  é o número total de pontos, e  $n = 1, \dots, N$ . As saídas desejadas são:  $y[n] = -1$  para  $\mathbf{x}[n] \in \varpi_0$  e  $y[n] = +1$  para  $\mathbf{x}[n] \in \varpi_1$ .
- (a) Consider o classificador com o seguinte vetor de pesos  $\mathbf{w} = [0.00, 0.70, -0.72]$ .
    - i. O número de acertos na classe  $\varpi_0$  é de 638.
    - ii. O valor do *recall* é de 0.953.
    - iii. Todas as respostas anteriores.
    - iv. Nenhuma das respostas anteriores.
  - (b) Considere o classificador com vetor de pesos,  $\mathbf{w}_{\text{MSE}}$ , que minimiza o erro quadrático médio do conjunto.
    - i. O número de acertos na classe  $\varpi_1$  é de 1476.
    - ii. O erro quadrático médio é igual a 0.473.
    - iii. Todas as respostas anteriores.
    - iv. Nenhuma das respostas anteriores.