


Glikozydy

Dość liczną grupę związków organicznych występujących w przyrodzie stanowią glikozydy. Są to pochodne form pierścieniowych cukrów, w których pólacetalowe grupy hydroksylowe są zastąpione inną grupą organiczną. Rozróżniamy między innymi O-glikozydy (reszta OR zamiast grupy OH) i N-glikozydy (reszta NHR albo NR₂ zamiast grupy OH).

Poniżej zaprezentowane są wzory łańcuchowe Fischera aldopentoz szeregu konfiguracyjnego D:

**Polecenia:**

a. Narysuj wzory Hawortha form pierścieniowych: pięciocząłowej (furanozowej) i sześciocząłowej (piranozowej) D-rybozy w postaci anomerów β.




b. Narysuj wzór urydyny, nukleozydu utworzonego z D-rybozy i uracylu.





Fragment RNA, N-glikozyd, D-ryboza w postaci anomeru β formy furanozowej.

c. Narysuj wzór O-glikozydu utworzonego z D-ksylozy (forma piranozowa, anomer β) i łańcucha bocznego seryny. Jest to często występujący składnik w glikoproteinach.

d. Poniżej podany jest wzór pewnego disacharydu, składnika niektórych glikozydów roślinnych, złożonego z dwóch pentoz.

Zidentyfikuj te monosacharydy (podaj ich nazwy) oraz określ konfiguracje (α czy β) w dwóch pozycjach anomerycznych.



<i>a.</i> 	<i>b.</i> 
<i>c.</i> 	<i>d.</i> 

Komentarz do odpowiedzi *d*:

