

Numeros complejos.

Definición de un numero complejo.

Para empezar a hablar de numeros complejos primero hay que definir a la unidad imaginaria.

$$\sqrt{-1} = i$$

Todos los numeros de la forma bi donde $b \in \mathbb{R}$ son numeros puramente imaginario.


Un numero complejo es la suma entre un numero real y uno imaginario y se suelen llamar z tal que:

$$z = a + bi$$

Con $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$ y $z \in \mathbb{C}$

Representación geometrica en el plano complejo

Los complejos pueden representarse en un plano mediante pares ordenados de numeros reales, esto se debe al isomorfismo que tiene $(\mathbb{C}, +)$ con $(\mathbb{R}^2, +)$ por lo tanto pueden representarse como vectores.



Igualdad.

La igualdad entre numeros complejos se define asi:

$$z_1 = a + bi \quad \wedge \quad z_2 = c + di$$

$$z_1 = z_2 \Leftrightarrow a = c \quad \wedge \quad b = d$$

Modulo.

Geometricamente es el modulo del vector asociado a z .

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Adición.

$$z = z_1 + z_2 = a + bi + c + di = a + c + bi + di = (a + c) + (b + d)i$$

Es equivalente a la suma de vectores, por lo tanto tiene sus mismas propiedades. **Multiplicación.**

$$z = z_1 \cdot z_2 = (a + bi) \cdot (b + di) = (a \cdot c - b \cdot d) + i(a \cdot d + b \cdot c)$$

No es necesario recordar esta formula de memoria pues la suma es distributiva respecto de la multiplicación y se puede llegar al resultado operando con esta propiedad y recordando que $i^2 = -1$.

Conjugado.

El conjugado de un numero complejo $z = a + bi$ se define:

$$\bar{z} = a - bi$$

Es decir, tiene la misma parte real y opuesta parte imaginaria. El conjugado es distributiva respecto de la suma, multiplicación y división. Además hay una propiedad muy interesante que nos ayudará a resolver divisiones.

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2$$

Esta propiedad es util para deshacerse de un denominador complejo multiplicando arriba y abajo por su conjugado similar a como se suele hacer con la radicación.

Potencias naturales en forma Binomica

$$z^0 = 1$$

$$z^1 = z$$

$$z^{n+1} = z^n \cdot z$$

De acuerdo podemos calcular las potencias de la unidad imaginaria:

$$i^0 = 1 \tag{1}$$

$$i^1 = i \tag{2}$$

$$i^2 = -1 \tag{3}$$

$$i^3 = -i \tag{4}$$

$$i^n = i^r \tag{5}$$

Siendo r el resto de dividir a n por 4.

Para poder calcular potencias en forma binomica $(a + bi)$ debemos utilizar el binomio de Newton:

$$(a + bi)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Esta sumatoria no es muy complicada de entender, tendremos n terminos donde el coeficiente principal de cada uno está dado por el numero combinatorio entre n y k . A medida que "avanzamos" en la sumatoria k va aumentando de a 1 haciendo que en cada termino la potencia de b vaya aumentando hasta n y la de a disminuyendo desde n . No resulta de gran complejidad entender que está sucediendo y para llegar a las mismas conclusiones podemos tomar una potencia muy alta de un numero complejo y descomponerla en muchas multiplicaciones. Si intentamos generalizar ese proceso llegaremos al binomio de Newton. Una forma muy elegante de calcular complejos pero sin duda con demasiado trabajo. Mas adelante veremos como simplificar esta tarea.

Raiz cuadrada en forma Binomica.

Diremos que u es la raiz cuadrada de $z \Leftrightarrow z = u^2$ Para esta operación realizaremos algunos calculos ya que no se puede ver a tan simple vista por donde comenzar.

Sea $z = a + bi$ y $u = x + yi$:

$$u^2 = z \tag{6}$$

$$(x + yi)^2 = a + bi \tag{7}$$

$$x^2 + 2ixy - y^2 = a + bi \tag{8}$$

$$\tag{9}$$

Por igualdad de complejos podemos deducir:

$$a = x^2 - y^2 \quad (10)$$

$$b = 2xy \quad (11)$$

Por otro lado tambien podemos argumentar lo siguiente:

$$u^2 = z \quad (12)$$

$$|u^2| = |z| \quad (13)$$

$$|u|^2 = |z| \quad (14)$$

$$x^2 + y^2 = |z| \quad (15)$$

Si ahora sumamos miembro a miembro (10) y (15) obtenemos:

$$|z| + a = 2x^2 \quad (16)$$

$$x = \sqrt{\frac{|z| + a}{2}} \quad (17)$$

Y si restamos miembro a miembro (10) y (15).

$$|z| - a = 2y^2 \quad (18)$$

$$y = \sqrt{\frac{|z| - a}{2}} \quad (19)$$

Es decir:

$$u = \pm \sqrt{\frac{|z| + a}{2}} \pm i \sqrt{\frac{|z| - a}{2}}$$


Lo cual nos dá como resultado 4 posibles raices, pero sabemos que por el teorema fundamental del algebra, todo polinomio de grado 2 tiene exactamente 2 raices en el conjunto de los complejos.

Podemos reestringir 2 raices y dejarlas fuera gracias a la ecuación (11). Recordemos que estamos calculando \sqrt{z} . Los distintos valores de u vienen dados por los signos de x e y . Por la ecuación (11) podemos ver que los mismos están ligados al signo de b . Es decir, si x e y tienen el mismo signo, entonces b será positivo, si tienen distinto signo entonces b será negativo. De esta forma podemos resolver la distorsión. Si b es positivo tendremos dos soluciones para \sqrt{z} , una donde x e y son positivos y otra donde x e y son negativos. Si b es negativo aún tendremos dos soluciones pero en una de estas x será positivo e y negativo y en la otra x será negativo e y positivo.

Forma polar de un complejo.

Al igual que los vectores de \mathbb{R}^2 , los numeros complejos pueden representarse en forma polar, de nuevo, gracias al isomorfismo que existe entre los conjuntos.

La forma polar de un numero complejo está representada por ρ y φ tal que $\rho = |z|$ y $\varphi = \arg(z)$. Observar que φ o $\arg(z)$ es el ángulo que el vector asociado al numero complejo z forma con el semieje real positivo.



Relación entre forma binomica y polar.

Por pitagoras es muy sencillo encontrar la siguiente relación:

$$a = \rho \cos(\varphi) \quad (20)$$

$$b = \rho \sin(\varphi) \quad (21)$$

Esto es útil si se quiere pasar de polar a binómica ya que tenemos despejados los valores de a y b en función de ρ y φ . Veremos ahora como pasar de binómica a polar. Con un poco de pensamiento llegamos a:

$$\rho = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (22)$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) \quad (23)$$

Estas formulas se deducen sencillamente con algunas propiedades de trigonometría y sin duda son ciertas y muy útiles pero, para algunos casos especiales, hay que pensar un poco más.

Por ejemplo, ¿Qué pasa si $a = 0$? Entonces el número es imaginario puro, ya que a es la parte real. Los números imaginarios puros se encuentran sobre el eje imaginario (o eje de ordenadas) es decir, su argumento será de $\frac{\pi}{2}$ o bien $3\frac{\pi}{2}$ dependiendo de su signo.

Pero aún hay un problema, la función $\tan(x) = y$ no es biyectiva en todo el dominio y por lo tanto se utiliza con el dominio restringido a $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$ para que exista su inversa $\arctan(x) = y$. Y todo esto, ¿Qué significa? Pues que la función de φ en la calculadora sirve para calcular valores entre $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$, es decir, complejos en el primer y cuarto cuadrante. Con un poco de pensamiento podemos solucionar esto solo sumando π al valor cuando sabemos que nuestro número está en el segundo o tercer cuadrante.

Veremos un ejemplo para clarificar todo este palabrerío. Escribamos en polar el siguiente número: $-1 + i\sqrt{3}$. Primero que nada notemos que como a es negativo y b positivo, sabemos que el número se encuentra en el segundo cuadrante.


Ahora calculemos el módulo que es bastante sencillo:

$$\rho = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$$

Ahora usamos la fórmula del argumento y vemos que obtenemos:

$$\varphi = \arctan(-\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}$$

Pensamos un poco y nos damos cuenta que un argumento de $-\frac{\pi}{3}$ deja el complejo en el cuarto cuadrante, pero el complejo original se encontraba en el segundo.



Aquí se nota porque se debe sumar π o medio giro para obtener el argumento del complejo original. Y nuestro complejo queda:

$$z = [2; 2\frac{\pi}{3}]$$

Forma trigonométrica de un complejo.

$$z = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

En esta fórmula se esconden todas las relaciones entre binómica y polar que vimos anteriormente. Pero además el famoso matemático Euler demostró:

$$\rho e^{i\varphi} = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

No entraremos en detalle sobre la demostración de esta fórmula, pero recomiendo fuertemente buscar información al respecto porque la demostración es una de las más bellas de las matemáticas. Para la materia solo la tomaremos

como verdadera y diremos que la forma exponencial de un numero complejo z es $\rho e^{i\varphi}$ donde $\rho = |z|$ y $\varphi = \arg(z)$. De aquí además es de donde sale la bella identidad: $e^{i\pi} + 1 = 0$ ya que -1 tiene modulo 1 y argumento π .

Operaciones en forma polar.

Iguadad