

Statistica I

Unità 0: tabelle di contingenza

Tommaso Rigon

Università Milano-Bicocca

Anno Accademico 2020-2021

Argomenti affrontati

- Tabelle di contingenza
- Distribuzione congiunta, marginale e condizionata
- Indipendenza in distribuzione
- Frequenze attese, indice χ^2 di Pearson

Riferimenti al libro di testo

- §7.1 — §7.5

Descrizione del problema

- Dopo il **disastro del Titanic**, una commissione d'inchiesta del **British Board of Trade** ha compilato una lista di tutti i 1316 passeggeri includendo le seguenti aggiuntive:
 - l'esito (salvato, non salvato)
 - la classe (I, II, III) in cui viaggiavano
 - il sesso, l'età, etc.
- In questa unità ci limitiamo a considerare le informazioni sull'esito e la classe. I dati sono quindi costituiti da una lunga lista del tipo:

| Passeggero | Classe | Esito |
|------------|--------|-------------|
| Nome 1 | II | Salvato |
| Nome 2 | III | Non salvato |
| Nome 3 | I | Non salvato |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| Nome 1316 | III | Salvato |

Le frequenze marginali

- La variabile **Classe** ha la seguente distribuzione di **frequenza marginale**:

| Classe | Frequenze assolute | Frequenze relative |
|--------|--------------------|--------------------|
| I | 325 | 0.247 |
| II | 285 | 0.216 |
| III | 706 | 0.537 |

- La variabile **Esito** ha la seguente distribuzione di **frequenza marginale**:

| Esito | Frequenze assolute | Frequenze relative |
|-------------|--------------------|--------------------|
| Salvato | 499 | 0.379 |
| Non salvato | 817 | 0.621 |

Le frequenze congiunte

- Una sintesi che possiamo operare consiste nel costruire una tabella, detta **tabella di contingenza** oppure **tabella a doppia entrata**.

| Esito | Classe | | | Totale |
|-------------|--------|-----|-----|--------|
| | I | II | III | |
| Salvato | 203 | 118 | 178 | 499 |
| Non salvato | 122 | 167 | 528 | 817 |
| Totale | 325 | 285 | 706 | 1316 |

- In questa tabella sono riportate le **frequenze congiunte**, ad esempio, il valore 203 rappresenta il numero di passeggeri che viaggiavano in I classe e che sono sopravvissuti.
- È quindi evidente che viaggiatori della I classe hanno ricevuto un **trattamento preferenziale**.
- La frazione di individui della I classe che si sono salvati è $203/325 \approx 0.63$.
- Invece, la frazione di viaggiatori della III classe che si sono salvati è $178/706 \approx 0.25$.

Le frequenze congiunte relative

- Possiamo anche considerare le **frequenze congiunte relative**, ottenute dividendo le frequenze congiunte per il numero totale $n = 1316$.

| Esito | Classe | | | Totale |
|-------------|--------|-------|-------|--------|
| | I | II | III | |
| Salvato | 0.154 | 0.090 | 0.135 | 0.38 |
| Non salvato | 0.093 | 0.127 | 0.401 | 0.62 |
| Totale | 0.247 | 0.217 | 0.536 | 1 |

- La frazione di individui della I classe che si sono salvati è $0.154/0.247 \approx 0.63$.
- Invece, la frazione di viaggiatori della III classe che si sono salvati è $0.135/0.536 \approx 0.25$.

Tabella di contingenza

- Siano x ed y due variabili aventi modalità c_1, \dots, c_k e d_1, \dots, d_h , rispettivamente.
- Una **tabella di contingenza** (a due variabili) per le coppie di dati $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ si presenta nella seguente forma:

| Variabile x | Variabile y | | | | | Totale |
|---------------|-------------|-----|----------|-----|----------|----------|
| | d_1 | ... | d_j | ... | d_k | |
| c_1 | n_{11} | ... | n_{1j} | ... | n_{1k} | n_{1+} |
| \vdots | \vdots | | \vdots | | \vdots | \vdots |
| c_i | n_{i1} | ... | n_{ij} | ... | n_{ik} | n_{i+} |
| \vdots | \vdots | | \vdots | | \vdots | \vdots |
| c_h | n_{h1} | ... | n_{hj} | ... | n_{hk} | n_{h+} |
| Totale | n_{+1} | ... | n_{+j} | ... | n_{+k} | n |

- La frequenza n_{ij} è il numero di unità statistica che presentano contemporaneamente le modalità c_i e d_j .

Tabella di contingenza, frequenze relative

- Dividendo per n ciascun termine della precedente tabella, si ottiene inoltre:

| Variabile x | Variabile y | | | | | Totale |
|---------------|---------------|-----|----------|-----|----------|----------|
| | d_1 | ... | d_j | ... | d_k | |
| c_1 | f_{11} | ... | f_{1j} | ... | f_{1k} | f_{1+} |
| \vdots | \vdots | | \vdots | | \vdots | \vdots |
| c_i | f_{i1} | ... | f_{ij} | ... | f_{ik} | f_{i+} |
| \vdots | \vdots | | \vdots | | \vdots | \vdots |
| c_h | f_{h1} | ... | f_{hj} | ... | f_{hk} | f_{h+} |
| Totale | f_{+1} | ... | f_{+j} | ... | f_{+k} | 1 |

- La frequenza relativa $f_{ij} = n_{ij}/n$ è quindi la frazione di osservazioni che presentano contemporaneamente le modalità c_i e d_j .

Alcune proprietà

- Proprietà. Per definizione, vale quindi che

$$n_{i+} = \sum_{j=1}^k n_{ij}, \quad n_{+j} = \sum_{i=1}^h n_{ij}, \quad n = \sum_{i=1}^h \sum_{j=1}^k n_{ij}.$$

- Proprietà. Sempre per definizione, vale quindi che

$$f_{i+} = \frac{n_{i+}}{n} = \sum_{j=1}^k f_{ij}, \quad f_{+j} = \frac{n_{+j}}{n} = \sum_{i=1}^h f_{ij}, \quad \sum_{i=1}^h \sum_{j=1}^k f_{ij} = 1.$$

- Esercizio. Si verifichino le proprietà precedenti nel caso del Titanic.

Terminologia & notazione

Distribuzione congiunta

- Una tabella di contingenza nel suo complesso ci mostra la distribuzione congiunta di x ed y . Le n_{ij} per $i = 1, \dots, h$ e $j = 1, \dots, k$ sono chiamate frequenze congiunte.
- I valori f_{ij} per $i = 1, \dots, h$ e $j = 1, \dots, k$ sono chiamate frequenze congiunte relative.

Distribuzione marginale

- Le distribuzioni marginali per x e per y sono invece pari a

| Variabile x | c_1 | ... | c_i | ... | c_h | Totale |
|---------------------------------|----------|-----|----------|-----|----------|---------------|
| Frequenze assolute | n_{1+} | ... | n_{i+} | ... | n_{h+} | n |
| Frequenze relative | f_{1+} | ... | f_{i+} | ... | f_{h+} | 1 |

| Variabile y | d_1 | ... | d_j | ... | d_k | Totale |
|---------------------------------|----------|-----|----------|-----|----------|---------------|
| Frequenze assolute | n_{+1} | ... | n_{+j} | ... | n_{+k} | n |
| Frequenze relative | f_{+1} | ... | f_{+j} | ... | f_{+k} | 1 |

Terminologia & notazione

Distribuzione condizionata ($x \mid y = d_j$)

- La j -esima colonna mostra la distribuzione di x **condizionata** ad $y = d_j$ oppure, equivalentemente, la distribuzione di x dato $y = d_j$.

| Distribuzione $x \mid y = d_j$ | c_1 | ... | c_i | ... | c_h | Totale |
|--------------------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|----------|
| Frequenze assolute | n_{1j} | ... | n_{ij} | ... | n_{hj} | n_{+j} |
| Frequenze relative | n_{1j}/n_{+j} | ... | n_{ij}/n_{+j} | ... | n_{hj}/n_{+j} | 1 |

Distribuzione condizionata ($y \mid x = c_i$)

- La i -esima colonna mostra la distribuzione di y **condizionata** ad $x = c_i$ oppure, equivalentemente, la distribuzione di y dato $x = c_i$.

| Distribuzione $y \mid x = c_i$ | d_1 | ... | d_j | ... | d_k | Totale |
|--------------------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|----------|
| Frequenze assolute | n_{i1} | ... | n_{ij} | ... | n_{ik} | n_{i+} |
| Frequenze relative | n_{i1}/n_{i+} | ... | n_{ij}/n_{i+} | ... | n_{ik}/n_{i+} | 1 |

Il disastro del Titanic, distribuzioni condizionate

| (Esito Classe = I) | Salvato | Non Salvato | Totale |
|----------------------|---------|-------------|--------|
| Frequenze assolute | 203 | 122 | 325 |
| Frequenze relative | 0.625 | 0.375 | 1 |

| (Esito Classe = II) | Salvato | Non Salvato | Totale |
|-----------------------|---------|-------------|--------|
| Frequenze assolute | 118 | 167 | 285 |
| Frequenze relative | 0.41 | 0.59 | 1 |

| (Esito Classe = III) | Salvato | Non Salvato | Totale |
|------------------------|---------|-------------|--------|
| Frequenze assolute | 178 | 528 | 706 |
| Frequenze relative | 0.25 | 0.75 | 1 |

Il disastro del Titanic, distribuzioni condizionate

| (Classe Esito = Salvato) | I | II | III | Totale |
|----------------------------|------|------|------|--------|
| Frequenze assolute | 203 | 118 | 178 | 499 |
| Frequenze relative | 0.41 | 0.24 | 0.36 | 1 |

| (Classe Esito = Non salvato) | I | II | III | Totale |
|--------------------------------|------|------|------|--------|
| Frequenze assolute | 122 | 167 | 528 | 817 |
| Frequenze relative | 0.15 | 0.20 | 0.65 | 1 |

Distribuzione congiunta

- La distribuzione congiunta è il “nucleo” della tabella. Comprende il numero di osservazioni che presentano una modalità della prima variabile contemporaneamente (**congiuntamente**) ad una modalità della seconda variabile.

Distribuzione condizionata

- Le distribuzioni condizionate considerano le frequenze della prima variabile solamente (**condizionatamente**) per certi valori della seconda variabile.

Distribuzione marginale

- Le distribuzioni marginali considerano le frequenze della prima variabile a prescindere (**marginalmente**) dall'esito della seconda variabile.

La dipendenza tra variabili

- Ri-consideriamo i dati del disastro del Titanic.
- Abbiamo notato che la sopravvivenza **dipende** dalla classe in cui viaggiava il passeggero visto che la frazione di sopravvissuti all'incidente varia al variare della classe.
- Indichiamo con y la **Classe** e con x l'**Esito**. Diremo quindi che la variabile x **dipende** dalla variabile y .
- Dipendenza di x dato y . La variabile x **dipende** dalla variabile y se le distribuzioni condizionate di x dato y sono tra loro diverse in termini di **frequenze relative**.
- La dipendenza di y dato x ovviamente è definita in maniera speculare.

L'indipendenza tra variabili

- Supponiamo che la distribuzione congiunta sia la seguente.

| Esito | Classe | | | Totale |
|-------------|--------|-----|-----|--------|
| | I | II | III | |
| Salvato | 150 | 200 | 300 | 650 |
| Non salvato | 300 | 400 | 600 | 1300 |
| Totale | 450 | 600 | 900 | 1950 |

- Nonostante le frequenze assolute delle distribuzioni condizionate (**Esito** | **Classe**) siano diverse tra loro, le frequenze relative risultano invece uguali.

| Esito | Classe | | |
|-------------|--------|------|------|
| | I | II | III |
| Salvato | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Non salvato | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Totale | 1 | 1 | 1 |

Indipendenza tra variabili

- Nel caso della tabella precedente è quindi ragionevole affermare non esiste dipendenza di x da y .
- Si ricordi che n_{ij}/n_{+j} è la frequenza relativa di c_i nella distribuzione di x condizionata a $y = d_j$.
- **Indipendenza di x da y .** La variabile x è **indipendente in distribuzione** da y se per ogni $i = 1, \dots, h$ vale che

$$\frac{n_{i1}}{n_{+1}} = \dots = \frac{n_{ij}}{n_{+j}} = \dots = \frac{n_{ik}}{n_{+k}}.$$

Viceversa, diremo che x dipende in distribuzione da y .

- In altri termini, x è indipendente da y se tutte le distribuzioni condizionate ($x \mid y = d_j$) sono uguali in termini di frequenze relative, per ogni $j = 1, \dots, k$.

Indipendenza, distribuzione marginale

- **Proprietà.** Se x è indipendente da y , allora le distribuzioni condizionate sono tutte uguali e pari alla distribuzione marginale di x . In altri termini

$$f_{i+} = \frac{n_{i+}}{n} = \frac{n_{ij}}{n_{+j}}, \quad i = 1, \dots, h,$$

per ogni valore di $j = 1, \dots, k$.

- Per dimostrare questa proprietà, si noti anzitutto che l'indipendenza implica che

$$\frac{n_{ij'}}{n_{+j'}} = \frac{n_{ij}}{n_{+j}} \implies n_{ij'} = n_{ij} \frac{n_{+j'}}{n_{+j}},$$

per ogni $j, j' = 1, \dots, k$ e $i = 1, \dots, h$. Quindi:

$$\frac{n_{i+}}{n} = \frac{1}{n} \sum_{j'=1}^k n_{ij'} = \frac{1}{n} \sum_{j'=1}^k \frac{n_{ij} n_{+j'}}{n_{+j}} = \frac{n_{ij}}{n_{+j}} \sum_{j'=1}^k \frac{n_{+j'}}{n} = \frac{n_{ij}}{n_{+j}} \frac{n}{n} = \frac{n_{ij}}{n_{+j}}.$$

Indipendenza tra variabili

- **Proprietà.** Se x è indipendente in distribuzione da y , allora y è indipendente in distribuzione da x . In altri termini, per ogni $j = 1, \dots, k$ vale anche che

$$\frac{n_{1j}}{n_{1+}} = \dots = \frac{n_{ij}}{n_{i+}} = \dots = \frac{n_{hj}}{n_{h+}} = \frac{n_{+j}}{n} = f_{+j}.$$

- **Nota.** L'indipendenza è pertanto un concetto **simmetrico**. Possiamo quindi parlare di indipendenza tra x ed y senza dover indicare necessariamente una direzione.
- Per dimostrare questa proprietà, si noti che se x è indipendente da y , allora per la proprietà precedente

$$f_{i+} = \frac{n_{i+}}{n} = \frac{n_{ij}}{n_{+j}}, \quad i = 1, \dots, h, \quad j = 1, \dots, k.$$

Di conseguenza, avremo che

$$\frac{n_{ij}}{n_{i+}} = \frac{n_{+j}}{n} = f_{+j}, \quad i = 1, \dots, h, \quad j = 1, \dots, k.$$

Le frequenze attese

- Supponiamo siano note le **distribuzioni marginali** delle variabili x ed y .
- Inoltre, supponiamo che x ed y siano indipendenti in distribuzione. Le frequenze congiunte pertanto devono essere necessariamente pari a $n_{ij} = (n_{i+}n_{+j})/n$.
- **Frequenze attese**. Le frequenze attese (assolute e relative) sono definite a partire dalle frequenze marginali come segue

$$\hat{n}_{ij} = \frac{n_{i+}n_{+j}}{n}, \quad \hat{f}_{ij} = \frac{\hat{n}_{ij}}{n} = f_{i+}f_{+j}, \quad i = 1, \dots, h, \quad j = 1, \dots, k.$$

- In altri termini, le frequenze attese sono le frequenze **congiunte** che è lecito attendersi sotto l'**ipotesi di indipendenza** tra le variabili x ed y .

Disastro del Titanic, frequenze attese

■ Frequenze attese

| Esito | Classe | | | Totale |
|-------------|--------|-------|-------|--------|
| | I | II | III | |
| Salvato | 123.2 | 108.1 | 267.7 | 499 |
| Non salvato | 201.8 | 176.9 | 438.3 | 817 |
| Totale | 325 | 285 | 706 | 1316 |

■ Frequenze attese relative

| Esito | Classe | | | Totale |
|-------------|--------|-------|-------|--------|
| | I | II | III | |
| Salvato | 0.094 | 0.082 | 0.203 | 0.38 |
| Non salvato | 0.153 | 0.134 | 0.333 | 0.62 |
| Totale | 0.247 | 0.217 | 0.536 | 1 |

- **Esercizio.** Si verifichi che le frequenze condizionate relative sono tutte uguali.

La massima dipendenza

- La **massima dipendenza** di x dato y si verifica, viceversa, quando la conoscenza della variabile y determina univocamente la variabile x .
- Supponiamo di osservare il seguente insieme di dati

| Esito | Classe | | | Totale |
|-------------|--------|-----|-----|--------|
| | I | II | III | |
| Salvato | 325 | 285 | 0 | 610 |
| Non salvato | 0 | 0 | 706 | 706 |
| Totale | 325 | 285 | 706 | 1316 |

- Condizionatamente alla variabile **Classe**, la variabile **Esito** è univocamente determinata.
- Il viceversa non è vero. Conoscere l'**Esito** non determina univocamente la **Classe**.
- **Nota.** La (perfetta) dipendenza è quindi un concetto **asimmetrico**. La perfetta dipendenza di x dato y non implica il contrario.

Connessione e indice χ^2

- Siamo interessati a trovare un indice di **connessione**, ovvero un indice utilizzato per **quantificare la dipendenza** tra due variabili x ed y .
- È ragionevole basare tale indice sulle **contingenze**, ovvero sulle differenze

$$(\text{contingenza}_{ij}) = n_{ij} - \hat{n}_{ij}, \quad i = 1, \dots, h, \quad j = 1, \dots, k.$$

- Indice χ^2 di Pearson. L'indice di connessione χ^2 è definito come

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^h \sum_{j=1}^k \frac{(n_{ij} - \hat{n}_{ij})^2}{\hat{n}_{ij}} = n \left(\sum_{i=1}^h \sum_{j=1}^k \frac{f_{ij}^2}{f_{i+} f_{+j}} - 1 \right).$$

- L'indice χ^2 è pertanto sempre maggiore o uguale a zero. È pari a zero in particolare in caso di indipendenza.

Indice χ^2 normalizzato

Teorema (senza dimostrazione)

- L'indice χ^2 di Pearson è tale che

$$\chi^2 \leq n \min\{h - 1, k - 1\}.$$

- Se $k \leq h$ l'indice raggiunge il suo massimo in caso di dipendenza perfetta di x dato y .
- Se $h \leq k$ l'indice raggiunge il suo massimo in caso di dipendenza perfetta di y dato x .

- Il precedente teorema consente di definire un indice χ^2 **normalizzato**, ovvero

$$\chi_{\text{norm}}^2 = \frac{\chi^2}{(\text{massimo valore di } \chi^2)} = \frac{\chi^2}{n \min\{h - 1, k - 1\}},$$

che è ovviamente tale che $0 \leq \chi_{\text{norm}}^2 \leq 1$.

- Utilizzando i dati del Titanic, si ottiene $\chi^2 = 133.05$ e $\chi_{\text{norm}}^2 = 0.1011$.