

Probabilità e Test Diagnostici

Riccardo Ievoli

*Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della
Prevenzione*

CdL in Biotecnologie

Per il presente materiale si ringrazia la
collega Prof.ssa L. Grisotto

Probabilità

Definizioni di probabilità

Definizione classica

Se un esperimento può dar luogo a n esiti che si escludono a vicenda e che sono ugualmente possibili, e se m di questi esiti hanno la caratteristica A , la probabilità di A è data dal rapporto $\frac{m}{n}$: $P(A) = \frac{m}{n}$

Esempio. Probabilità di estrarre una figura da un mazzo di 40 carte: $12/40 = 3/10$

Definizione frequentista

Se si ripete un esperimento un gran numero di volte n e se un certo evento con caratteristica A si verifica m volte; la frequenza relativa $\frac{m}{n}$ sarà approssimativamente uguale alla probabilità di A : $P(A) = \frac{m}{n}$

Esempio. Probabilità che una moneta bilanciata dia testa: $1/2$

Definizioni di probabilità

Definizione soggettiva:

La probabilità dell'evento A misura il grado di fiducia che un individuo ripone nel verificarsi di determinati eventi, in base alle proprie conoscenze

Esempio. Probabilità che a Pasquetta piova = 0,5

Esempi

Mazzo di carte

$$P(\text{pescare un asso}) = 4/40 = 0.1 \rightarrow 10\%$$

Lancio di un dado

$$P(\text{ottenere 6}) = 1/6 = 0.16 \rightarrow 16\%$$

Esame di statistica

$$P(\text{passare}) = 14/16 = 0.92 \rightarrow 92\%$$

Eventi complementari

Due eventi A ed \bar{A} si dicono *complementari* quando il verificarsi dell'uno esclude il verificarsi del secondo ma uno dei due si verificherà di sicuro

Ad esempio nel lancio di un dado:

Evento A , esce il 6 \rightarrow evento \bar{A} , non esce il 6

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

Esempio del lancio di un dato

$$P(A) = \frac{1}{6} \longrightarrow P(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

Probabilità dell'unione di due eventi

Se A e B sono eventi *incompatibili* (non possono verificarsi contemporaneamente):

$$P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B)$$

Se A e B non sono incompatibili:

$$P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ e } B)$$

Probabilità dell'unione di due eventi

Esempio eventi incompatibili

Nel lancio del dado:

Evento A = esce il 2 $P(A) = \frac{1}{6}$

Evento B = esce il 3 o il 4 $P(B) = \frac{2}{6}$

$$P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B) = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Probabilità dell'unione di due eventi

Esempio eventi non **incompatibili**

	Polvere	Altri allergeni
Pomodoro	2	3
Altri allergeni	15	80

Qual è la probabilità di essere allergico al Pomodoro o alla polvere?

$$P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ e } B)$$

$$P(\text{pomodoro}) + P(\text{polvere}) - P(\text{pomodoro e polvere}) =$$
$$\downarrow \quad \quad \downarrow \quad \quad \downarrow$$
$$5/100 \quad + \quad 17/100 \quad - \quad 2/100 = 20/100$$

$$P(\text{essere allergico al pomodoro o alla polvere}) = 20/100$$

Probabilità dell'intersezione di due eventi

Se A e B sono *indipendenti* (il realizzarsi dell'uno non influenza la probabilità che si realizzi l'altro):

$$P(A \text{ e } B) = P(A) \times P(B)$$

Se A e B non sono indipendenti:

$$P(A \text{ e } B) = P(A) \times P(B|A) = P(B) \times P(A|B)$$

dove $P(B|A)$ è la *probabilità condizionata* di B dato A e
 $P(A|B)$ è la probabilità condizionata di A dato B

Probabilità dell'intersezione di due eventi

Esempio

Supponiamo di estrarre due carte da gioco da un mazzo di carte francesi, avendo cura di reinserire nel mazzo la prima carta dopo l'estrazione; consideriamo i due seguenti eventi:

A: esce una carta di cuori

B: esce una figura

Calcoliamo la probabilità composta dei due eventi

$$P(A \text{ e } B) = P(A) \times P(B) = \frac{13}{52} \times \frac{12}{52} = \frac{1}{4} \times \frac{3}{13} = \frac{3}{52}$$

Probabilità dell'intersezione di due eventi

Esempio

	Pressione alta	Pressione bassa	Totale
Beve vino rosso	7	3	10
Non beve vino rosso	25	65	90
Totale	32	68	100

$P(\text{pressione alta e bevitore}) = ?$

$$P(A \text{ e } B) = P(A) \times P(B|A) = P(B) \times P(A|B)$$

$$P(\text{bevitore}) \times P(\text{pressione alta}|\text{bevitore})$$

$$(10/100) \times (7/10) = 7/100$$

Teorema di Bayes

$$P(A|B) = P(A) \times \frac{P(B|A)}{P(B)}$$

Dove $P(A)$ è la probabilità a priori di A

$P(A|B)$ è la probabilità a posteriori di A

$\frac{P(B|A)}{P(B)}$ è la verosimiglianza di B dato A

$P(B) = P(B|A) \times P(A) + P(B|\bar{A}) \times P(\bar{A})$ per cui il teorema di Bayes può essere scritto come:

$$P(A|B) = \frac{P(A) \times P(B|A)}{P(B|A) \times P(A) + P(B|\bar{A}) \times P(\bar{A})}$$

Test diagnostici

Test diagnostici

Per fare una diagnosi, il medico o il professionista sanitario sottopone i pazienti a test diagnostici.

La maggior parte dei test clinici (segni, sintomi, test di laboratorio, radiologia, ecc.) è «IMPRECISA» (soggetta a incertezza)

Per interpretarli è necessario conoscere la VALIDITÀ, vale a dire la capacità di classificare gli individui tenendo conto di quale sia la verità.

Test Diagnostici

- Nel campo delle scienze sanitarie le leggi e i concetti di probabilità vengono ampiamente usati per la valutazione dei test diagnostici.
- In ambito sanitario vengono comunemente utilizzati test diagnostici per determinare l'eventuale presenza di una malattia in un soggetto.

A cosa siamo interessati?

- Valutazione del rendimento di un test diagnostico
- L'uso di un test diagnostico per valutare la probabilità di malattia

A cosa siamo interessati?

- Valutazione del rendimento di un test diagnostico

TEST DIAGNOSTICI

Per valutare i test diagnostici dobbiamo quindi classificare gli individui rispetto alla presenza o meno della malattia e al risultato positivo o negativo ad un test diagnostico.

Possiamo sintetizzare i nostri dati in nella seguente tabella:

Risultato del test	Malattia		Totale
	Presente (M)	Assente (S)	
Positivo (+)	a	b	a+b
Negativo (-)	c	d	c+d
Totale	a+c	b+d	n

TEST DIAGNOSTICI

Per valutare i test diagnostici dobbiamo quindi classificare gli individui rispetto alla presenza o meno della malattia e al risultato positivo o negativo ad un test diagnostico.

Possiamo sintetizzare i nostri dati in nella seguente tabella:

Risultato del test	Malattia		Totale
	Presente (M)	Assente (S)	
Positivo (+)	a	b	a+b
Negativo (-)	c	d	c+d
Totale	a+c	b+d	n

Come misurare l'efficacia di un test?

Esempio

		Malati	Sani	Totale
Test 1	Positivo	40	50	90
	Negativo	10	900	910
Test 2	Positivo	0	0	0
	Negativo	50	950	1000
Test 3	Positivo	20	0	20
	Negativo	30	950	980
Totale		50	950	1000

- Calcoliamo la proporzione di diagnosi corrette?

Esempio

		Malati	Sani	Totale
Test 1	Positivo	40	50	90
	Negativo	10	900	910
Test 2	Positivo	0	0	0
	Negativo	50	950	1000
Test 3	Positivo	20	0	20
	Negativo	30	950	980
Totale		50	950	1000

- Test 1: 94%
- Test 2: 95%
- Test 3: 97%

Allora.. come misuro l'efficacia?

- Non c'è un indice solo che in modo semplice metta nella condizione di valutare l'efficacia del test!
- Perché ci sono due fattori da misurare:
 - La capacità del test di individuare correttamente la presenza della malattia quando il paziente è malato;
 - La capacità del test di segnalarne l'assenza quando il paziente è realmente sano!

Valutazione del test diagnostico

Le **probabilità condizionate** sono particolarmente utili quando si tratta di descrivere il rendimento di un test diagnostico.

Sensibilità e Specificità

Risultato del test	Malattia		Totale
	Presente (M)	Assente (S)	
Positivo (+)	a	b	a+b
Negativo (-)	c	d	c+d
Totale	a+c	b+d	n

Sensibilità: probabilità che il test risulti positivo dato che il soggetto è malato (M)

$$P(+|M) = \frac{a}{a + c}$$

Sensibilità e Specificità

Risultato del test	Malattia		Totale
	Presente (M)	Assente (S)	
Positivo (+)	a	b	a+b
Negativo (-)	c	d	c+d
Totale	a+c	b+d	n

Specificità: probabilità che il test risulti negativo dato che il soggetto è sano (S)

$$P(-|S) = \frac{d}{b + d}$$

Sensibilità e Specificità

Risultato del test	Malattia		Totale
	Presente (M)	Assente (S)	
Positivo (+)	a	b	a+b
Negativo (-)	c	d	c+d
Totale	a+c	b+d	n

Probabilità di falsi positivi: il test risulta positivo su un soggetto sano

$P(\text{falso positivo}) = P(+|S) = 1 - P(-|S) = 1 - \text{specificità}$

$$P(+|S) = \frac{b}{b + d}$$

Sensibilità e Specificità

Risultato del test	Malattia		Totale
	Presente (M)	Assente (S)	
Positivo (+)	a	b	a+b
Negativo (-)	c	d	c+d
Totale	a+c	b+d	n

Probabilità di falsi negativi: il test è negativo su un soggetto ammalato

$P(\text{falso negativo}) = P(-|M) = 1 - P(+|M) = 1 - \text{sensibilità}$

$$P(-|M) = \frac{c}{a + c}$$

Esempio

- Test 1:
 - $P(+|M)=80\%$
 - $P(-|S)=95\%$
- Test 2:
 - $P(+|M)=0\%$
 - $P(-|S)=100\%$
- Test 3:
 - $P(+|M)=40\%$
 - $P(-|S)=100\%$

		Malati	Sani	Totale
Test 1	Positivo	40	50	90
	Negativo	10	900	910
Test 2	Positivo	0	0	0
	Negativo	50	950	1000
Test 3	Positivo	20	0	20
	Negativo	30	950	980
Totale		50	950	1000

- Quando il test ha un'eccellente SENSIBILITA', un risultato negativo del test permette di escludere la diagnosi di malattia, perché la probabilità di un risultato falsamente negativo è bassa!
- Il risultato positivo di un test molto SPECIFICO permette di confermare la diagnosi, perché la probabilità di un risultato falsamente positivo è bassa!

La scelta del test migliore non è sempre facile!!!

- Dobbiamo tener conto di molteplici fattori...
- Per farlo a volte è necessario dare un giudizio sull'importanza relativa di sensibilità e specificità nei vari casi.
- A volte bisogna valutare costi e benefici: Anche se un test ha performance diagnostiche superiori, potrebbe non essere preferito se il costo o il tempo richiesto per la somministrazione è troppo elevato rispetto ai benefici clinici marginali.

Se a decidere è la statistica...

- **Indice di Youden (J)**

$$J = \text{sens} + \text{spec} - 1$$

- L'indice varia da -1 a 1, dove:
 - **1** indica un test perfetto, con una sensibilità e specificità pari a 1.
 - **0** indica che il test non fornisce alcuna informazione (equivalente a una scelta casuale).
 - Un valore negativo indica che il test è peggiore della scelta casuale.

Esempio

		Malati	Sani	Totale
Test 1	Positivo	40	50	90
	Negativo	10	900	910
Test 2	Positivo	0	0	0
	Negativo	50	950	1000
Test 3	Positivo	20	0	20
	Negativo	30	950	980
Totale		50	950	1000

- Test 1:
 - $P(+|M)=80\%$
 - $P(-|S)=95\%$ **$J=0.8+0.95-1=0.75$**
- Test 2:
 - $P(+|M)=0\%$
 - $P(-|S)=100\%$ **$J=0+1-1=0$**
- Test 3:
 - $P(+|M)=40\%$
 - $P(-|S)=100\%$ **$J=0.40+1-1=0.40$**

Sensibilità e Specificità

Esempio

Risultato del test	Alzheimer		Totale
	Presente (M)	Assente (S)	
Positivo (+)	436	5	441
Negativo (-)	14	495	509
Totale	450	500	950

Sensibilità = $P(+|M) = 436/(436+14) = 0,97$

Specificità = $P(-|S) = 495/(495+5) = 0,99$

Falsi positivi = 5

$P(\text{falso positivo}) = 1 - \text{specificità} = 1 - 0,99 = 0,01$

Falsi negativi = 14

$P(\text{falso negativo}) = 1 - \text{sensibilità} = 1 - 0,97 = 0,03$

$J = 0.97 + 0.99 - 1 = 0.96$

Sensibilità e Specificità

La *Sensibilità* e la *Specificità* misurano la validità di un test diagnostico


I valori di specificità e sensibilità possono essere ottenuti attraverso esperimenti ad hoc.

A cosa siamo interessati?

- L'uso di un test diagnostico per valutare la probabilità di malattia
- Il paziente è risultato positivo al test,
Qual è la probabilità che sia malato?

Aggiornamento della probabilità

Ok, ma se risulato positivo al test, sono malato?



probabilità post-test = probabilità pre-test & informazione del test



TEOREMA DI BAYES!

Teorema di Bayes

$$P(A|B) = P(A) \times \frac{P(B|A)}{P(B)}$$

Dove $P(A)$ è la probabilità a priori di A

$P(A|B)$ è la probabilità a posteriori di A


$\frac{P(B|A)}{P(B)}$ è la verosimiglianza di B dato A

$P(B) = P(B|A) \times P(A) + P(B|\bar{A}) \times P(\bar{A})$ per cui il teorema di Bayes può essere scritto come:

$$P(A|B) = \frac{P(A) \times P(B|A)}{P(B|A) \times P(A) + P(B|\bar{A}) \times P(\bar{A})}$$

Aggiornamento della probabilità

Ok, ma se risuldo positivo al test, sono malato? $P(M|+)$?



probabilità post-test = probabilità pre-test & informazione del test

$$P(M|+) = P(M) \times \frac{P(+|M)}{P(+)}$$

Valore predittivo di un test diagnostico

Valore predittivo positivo (VPP)

$$P(M|+) = P(M) \times \frac{P(+|M)}{P(+)} = P(M) \times \frac{P(+|M)}{P(+|M) \times P(M) + P(+|S) \times P(S)}$$

Valore predittivo negativo (VPN)

$$P(S|-) = P(S) \times \frac{P(-|S)}{P(-)} = P(S) \times \frac{P(-|S)}{P(-|S) \times P(S) + P(-|M) \times P(M)}$$

$P(M)$ = prevalenza della condizione o malattia

$P(S) = 1 - P(M)$

Valore predittivo di un test diagnostico

Esempio

Risultato del test	Alzheimer		Totale
	Presente (M)	Assente (S)	
Positivo (+)	436	5	441
Negativo (-)	14	495	509
Totale	450	500	950

$$\text{Sensibilità} = P(+|M) = 436/(436+14) = 0,97$$

$$\text{Specificità} = P(-|S) = 495/(495+5) = 0,99$$

$$P(M) = 450/950 = 0,47$$

$$P(+) = 441/950 = 0,46$$

$$\text{Valore predittivo positivo } P(M|+) = P(M) \times \frac{P(+|M)}{P(+)} = 0,47 \times \frac{0,97}{0,46} = 0,99$$

$$P(M|+) = \frac{a}{a+b} = \frac{436}{441} = 0,99$$

Valore predittivo di un test diagnostico

Esempio

Risultato del test	Alzheimer		Totale
	Presente (M)	Assente (S)	
Positivo (+)	436	5	441
Negativo (-)	14	495	509
Totale	450	500	950

$$\text{Sensibilità} = P(+|M) = 436/(436+14) = 0,97$$

$$\text{Specificità} = P(-|S) = 495/(495+5) = 0,99$$

$$P(S) = 500/950 = 0,53$$

$$P(-) = 509/950 = 0,54$$

$$\text{Valore predittivo negativo } P(S|-) = P(S) \times \frac{P(-|S)}{P(-)} = 0,53 \times \frac{0,99}{0,54} = 0,97$$

$$P(S|-) = \frac{\overset{d}{495}}{\underset{c+d}{509}} = 0,97$$

Valore predittivo di un test diagnostico

La prevalenza di Alzheimer nella popolazione di interesse (eta' maggiore di 65 anni) è del 4,4%

Un test diagnostico ha una sensibilità del 97% e una specificità dell'99%

Qual è la probabilità che un soggetto sia malato se è risultato positivo al test?

Dati:

$P(M) = 0,044$; $P(S) = 0,956$; Sensibilità: $P(+|M) = 0,97$;

Specificità' $P(-|S) = 0,99$; $P(+|S) = 0,01$

$$P(M|+) = P(M) \times \frac{P(+|M)}{P(+|M) \times P(M) + P(+|S) \times P(S)}$$

$$P(M|+) = 0,044 \times \frac{0,97}{0,97 \times 0,044 + 0,01 \times 0,956} = 0,82$$

Valore predittivo di un test diagnostico

La prevalenza di Alzheimer nella popolazione di interesse (eta' maggiore di 65 anni) è del 4,4%

Un test diagnostico ha una sensibilità del 97% e una specificità dell'99%

Qual è la probabilità che un soggetto **non** sia malato se è risultato negativo al test?

Dati:

$P(M) = 0,044$; $P(S) = 0,956$; Sensibilità: $P(+|M) = 0,97$; $P(-|M) = 0,03$

Specificità' $P(-|S) = 0,99$;

$$P(S|-) = P(S) \times \frac{P(-|S)}{P(-|S) \times P(S) + P(-|M) \times P(M)}$$

$$P(S|-) = 0,956 \times \frac{0,99}{0,99 \times 0,956 + 0,03 \times 0,044} = 0,99$$

La decisione diagnostica

La decisione diagnostica (VPP, VPN) non dipende solo dall'efficacia del test (sensibilità e specificità), ma anche dalla probabilità a priori.

Maggiore è la probabilità a priori, maggiore è il valore predittivo del test (a parità di sensibilità e specificità).