问题 C: 【NOIP模拟赛】平均值 未启用

文件提交：无需freopen　　内存限制：512 MB　　时间限制：1.000 S

评测方式：普通裁判　　命题人：mayulong (userinfo.php?user=mayulong)

提交：1　　解决：1

题目描述

设 $\mathrm{mex}(s_1, s_2, \ldots, s_k)$ 表示最小的没有出现在 $s_1, s_2, \ldots, s_k$ 中的自然数。 给定序列 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，定义一个区间 $[l, r]$ 的 **mex 平均值** 为：

$$\frac{\mathrm{mex}(a_l, a_{l+1}, \ldots, a_r)}{r - l + 1}$$

你需要求所有区间的 mex 平均值之和，即：

$$\sum_{l=1}^{n} \sum_{r=l}^{n} \frac{\mathrm{mex}(a_l, a_{l+1}, \ldots, a_r)}{r - l + 1}$$

输入

– 第 1 行：一个整数 n。 – 第 2 行：n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

输出

– 一行一个整数，表示所求的答案。 同样，答案可表示为 $\frac{p}{q}$ （$\gcd(p, q) = 1$ 或 $p = 0$），输出唯一的 $x \in [0, 998244353)$ 满足：

$$qx \equiv p \pmod{998244353}$$

样例输入

复制

```
3
3 0 1
```

样例输出

```
166374062
```

复制

提示

- 对于 10% 的数据，$1 \leq n \leq 500$；
- 对于 30% 的数据，$1 \leq n \leq 5000$；
- 对于 100% 的数据，$1 \leq n \leq 500000$，$0 \leq a_i \leq 500000$。

返回比赛 (contest.php?cid=1093) **提交 (submitpage.php?cid=1093&pid=2&langmask=4194300)**

LBOJ's OJ is powered by LH, Theme by LH
© 2022-2025 lboj.com.cn版权所有ICP证： 渝ICP备2022011577号，渝公网安备 50011202504576 号 (https://beian.miit.gov.cn/)