


```
rm(list=ls()); gc(); gc(); #<1>
if (!require("pacman")) install.packages("pacman") #<2>
pacman::p_load(tidyverse, magrittr, estimatr, car, modelsummary, ggrepel, patchwork) #<3>
```

- ① r
- ② pacman
- ③

```
ice4_1 <- read_csv("data/ice4_1.csv")
ice4_1
```

```
# A tibble: 20 x 3
  num kion kyaku
  <dbl> <dbl> <dbl>
1     1     33  382
2     2     33  324
3     3     34  338
4     4     34  317
5     5     35  341
6     6     35  360
7     7     34  339
8     8     32  329
9     9     28  218
10    10     35  402
11    11     33  342
12    12     28  205
13    13     32  368
14    14     25  196
15    15     28  304
16    16     30  294
17    17     29  275
18    18     32  336
19    19     34  384
20    20     35  368
```

```
kion kyaku
```

```

g <- ggplot(data = ice4_1, #<1>
            aes(x = kion, y = kyaku) #<2>
            ) %>%
+ geom_point() %>% #<3>
+ geom_smooth(method = "lm", se=FALSE) #<4>

plot(g)


```

①

② x y

③

④ (lm)



```

g <- ggplot(data = ice4_1, #
            aes(x = kion, y = kyaku) #x y
            ) %>%
+ geom_point() %>% #
+ geom_smooth(method = "lm", se=FALSE) %>%
+ geom_hline(aes(yintercept=320),
             color = "salmon") %>% #<1>

```

```

+ geom_abline(intercept = 150, slope = 5,
              color = "yellowgreen")#<2>

# (lm)
plot(g)

```

- ① 320
- ② 5 150

