

GARTENEFFIZIENZKLASSE · GEK

Pflanzendatenbank Hessen

Heimische Gehölze, Stauden, Gräser und Bodendecker
mit Bestimmungsmerkmalen, Standortansprüchen und ökologischer Bewertung

186

Arten

163

voll anrechenbar

70

essbar / Heilpflanze

49

giftig

14

§ geschützt

Gesamtausgabe Version 4.0 · Stand 17.08.2026

GartenArt & BauProjekte · Tom Seehafer · Saalburgstraße 21 · 61440 Oberursel

Interne Fachunterlage — nicht zur Weitergabe an Dritte

Inhalt

Zur Benutzung, Kennziffern und Abkürzungen	3
Bäume	5
Sträucher über 2 Meter	16
Kleinsträucher bis 2 Meter	27
Halb- und Zwergsträucher	31
Stauden und Wildkräuter	35
Bodendecker	46
Frühjahrsgeophyten	59
Gräser, Seggen und Binsen	62
Sumpf- und Wasserpflanzen	71
Korrekturverzeichnis	72
Negativliste	74
Rechtsrahmen	75
Register botanisch	76
Register deutsch	78

Zur Benutzung

Dieses Werk führt die Module 1, 2 und 4 der GEK-Pflanzendatenbank zusammen. Alle Angaben sind über den botanischen Namen entdoppelt.

Anrechenbarkeit

voll — in Hessen indigen, gärtnerisch verwendbar, zählt vollständig zur heimischen Artenzahl.

bedingt — heimisch, aber mit einer Einschränkung: Ausbreitungsverhalten, Krankheitsdruck, Giftigkeit oder Wirtspflanzeigenschaft. Verwendung nur mit dem im Eintrag genannten Vorbehalt.

nein — nicht anrechenbar. Entweder nicht indigen oder im Garten nicht beherrschbar.

Ökologischer Wert

Die Punkte geben den faunistischen Wert an: fünf für Arten, an denen zahlreiche spezialisierte Insekten hängen oder die eine Trachtlücke schließen, eins für Arten ohne nennenswerte Bedeutung für heimische Tiere. Die Skala bewertet nicht die gärtnerische Qualität.

Lebensbereiche

G	Gehölz — Schatten unter Bäumen, Wurzeldruck
GR	Gehölzrand — halbschattiger Saum, die artenreichste Zone
Fr	Freifläche — offen und sonnig, Wiesencharakter
B	Beet — gepflegte Pflanzfläche mit regelmäßiger Bodenbearbeitung
St	Steinanlage — Fugen, Kies, Mauerkronen, Dachbegrünung
FS	Felssteppe — flachgründig, heiß, extrem trocken
H	Heide und Steppenheide — sauer bis kalkig, stets mager
M	Matten — alpine und subalpine Rasen
WR	Wasserrand — Ufer und Sumpfbzone
W	Wasser — Flachwasser und Röhricht
1 / 2 / 3	Feuchtestufe: trocken · frisch · feucht bis nass

Die Systematik geht auf Hansen und Stahl zurück und ist im Garten- und Landschaftsbau allgemeiner Fachstandard. Mehrfachnennungen bedeuten, dass eine Art in beiden Bereichen dauerhaft bestehen kann.

Geselligkeit

I	Solitär — einzeln gestellt, wirkt als Einzelpflanze
II	Trupp aus 3 bis 10 Stück
III	Gruppe aus 10 bis 20 Stück
IV	Großer Trupp, über 20 Stück
V	Flächig deckend, bestandsbildend

Die Stufe bestimmt die Pflanzmenge im Angebot. Ein Solitär in Zwölfergruppen ergibt ein unruhiges Bild, ein Flächendecker als Einzelpflanze ergibt Lücken und damit Pflegeaufwand.

Bodenart

S · IS	Sand · lehmiger Sand
sL · L	sandiger Lehm · Lehm
tL · T	toniger Lehm · Ton
Hn · Hu	Niedermoor · humoser Oberboden

Nicht zu verwechseln mit den Bodenklassen der DIN 18300.

Die Kürzel folgen der bodenkundlichen Kartieranleitung KA5 und beschreiben die Bodenart nach Korngrößenanteilen. Die früheren Bodenklassen 1 bis 7 der DIN 18300 wurden mit der Fassung von 2015 abgeschafft und durch Homogenbereiche ersetzt, die der Auftraggeber leistungsbezogen selbst beschreibt. Wer heute im Angebot noch von Bodenklasse 4 spricht, beruft sich auf eine seit über zehn Jahren zurückgezogene Einteilung — im Streit um Erschwerniszuschläge ist das keine belastbare Grundlage.

Herkunft der Angaben

Blütenfarbe, Blattmerkmale, Wuchsform, Lebensbereich und Geselligkeit sind eigene fachliche Zuordnungen der GartenArt & BauProjekte. Es wurden keine Datensätze aus urheberrechtlich geschützten Pflanzenbüchern übernommen. Grundlage der floristischen Einstufung sind die Hessische Florenliste des HLNUG, die Bundesartenschutzverordnung und die Unionsliste invasiver Arten nach Verordnung (EU) Nr. 1143/2014.

Bäume

31 Arten

Die Gerüstbildner. Standzeit 80 bis über 300 Jahre — jede Entscheidung hier ist die langlebigste des ganzen Gartens.

Bergahorn *Acer pseudoplatanus*



VOLL

GEK-001

Höhe	bis 30 m	Wuchsform	Großbaum
Blütezeit	Apr-Mai	Blütenfarbe	grünlich, hängende Rispen
Blattform	einfach, 5-lappig, grob gesägt	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	gelb bis braun		

Standort	Halbschatten / frisch	Bodenart	sL-L, tiefgründig
Boden	tiefgründig	Lebensbereich	G2
Geselligkeit	I	Stück je m²	Solitär
Ausbreitung	Großbaum	Vorkommen	Mittelgebirge
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Nektar und Pollen; Rindenstruktur für Flechten und Moose

Praxis: —

Eberesche *Sorbus aucuparia*



VOLL

GEK-002

essbar giftig

Höhe	bis 15 m	Wuchsform	Kleinbaum, schlank
Blütezeit	Mai-Jun	Blütenfarbe	cremeweiß, Doldenrispen
Blattform	unpaarig gefiedert, 9-19 Fiedern, gesägt	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	orangerot bis scharlach		

Standort	Sonne-HS / frisch	Bodenart	skelettreich, Grus/Schotter · S-IS — sandig · sL-L, Auelehm · S-IS, sauer
Boden	sauer, sandig-steinig	Lebensbereich	GR2
Geselligkeit	I	Stück je m²	Solitär
Ausbreitung	Kleinbaum	Vorkommen	Mittel- und Nordhessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Früchte für über 60 Vogelarten — das ertragreichste heimische Vogelnährgehölz

Essbar: ja (NUR gekocht) · Ernte Aug-Okt · Gelee, Mus, Schnaps

Giftigkeit: roh giftig (Parasorbinsäure)

Praxis: Rohverzehr im Kundengespräch ausdrücklich ausschließen. Verträgt kleine Gärten und Straßennähe.

Elsbeere *Sorbus torminalis*



VOLL

GEK-003

essbar

Höhe	bis 25 m	Wuchsform	Großbaum
Blütezeit	Mai-Jun	Blütenfarbe	weiß, Doldenrispen
Blattform	einfach, ahornartig gelappt, spitze Lappen	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	leuchtend orangerot		

Standort	Sonne-HS / warm, trocken	Bodenart	L-tL über Kalk
Boden	kalkig	Lebensbereich	GR1
Geselligkeit	I	Stück je m²	Solitär
Ausbreitung	Großbaum	Vorkommen	Rheingau, Odenwald
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Wärmeliebende Rarität; Früchte für Vögel; wertvollstes heimisches Nutzholz

Essbar: ja (sehr reif) · Ernte Okt-Nov · Most-Spezialität, Destillat

Praxis: Baum des Jahres 2011. Hoher Erzählwert bei kommunalen Projekten.

Feldahorn *Acer campestre*

VOLL

GEK-004

Höhe	bis 15 m	Wuchsform	Kleinbaum bis Großstrauch
Blütezeit	Mai	Blütenfarbe	gelbgrün
Blattform	einfach, 3-5-lappig, stumpf, Milchsaft im Stiel	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	leuchtend goldgelb		

Standort	Sonne-HS / trocken-frisch	Bodenart	L-tL über Kalk
Boden	kalkverträglich	Lebensbereich	GR1, GR2
Geselligkeit	I	Stück je m²	Solitär / 3 lfd. m Hecke
Ausbreitung	Kleinbaum, schnittfest	Vorkommen	Süd- und Mittelhessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Frühe Nektarquelle; Blattlausdichte zieht Marienkäfer und Vögel an

Praxis: Der wichtigste heimische Hausgartenbaum: bleibt klein, verträgt Schnitt, Hitze und Kalk.

Feldulme *Ulmus minor*

BEDINGT

GEK-005

Höhe	bis 30 m	Wuchsform	Großbaum
Blütezeit	Mär-Apr	Blütenfarbe	rötlich, sitzende Büschel
Blattform	einfach, asymmetrisch, derb, glänzend	Blattstellung	wechselständig, zweizeilig
Herbstfärbung	gelb		

Standort	Sonne / warm	Bodenart	sL-L — sandiger bis reiner Lehm
Boden	lehmig	Lebensbereich	GR2
Geselligkeit	I	Stück je m²	Solitär
Ausbreitung	Großbaum	Vorkommen	Süd- und Mittelhessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Sehr frühe Blüte; Raupenfutter mehrerer Falterarten

Praxis: Stark anfällig für Ulmensterben (Ophiostoma). Neupflanzung nur mit resistenter Sorte oder stattdessen U. laevis.

Korrektur gegenüber der Ausgangsquelle: Von 'voll' auf 'bedingt' herabgestuft — Ulmensterben in der Quelle nicht erwähnt

Flatterulme *Ulmus laevis*

VOLL

GEK-006

Höhe	bis 30 m	Wuchsform	Großbaum, Brettwurzeln
Blütezeit	Mär-Apr	Blütenfarbe	rötlich, lang gestielte Büschel
Blattform	einfach, stark asymmetrische Blattbasis, doppelt gesägt	Blattstellung	wechselständig, zweizeilig
Herbstfärbung	gelb		

Standort	Sonne / nass-feucht	Bodenart	sL-L, Auelehm
Boden	Aue	Lebensbereich	WR3
Geselligkeit	I	Stück je m²	Solitär
Ausbreitung	Großbaum	Vorkommen	Auenwälder
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Raupenfutter des Großen Fuchses; resistenter gegen Ulmensterben als andere Ulmen

Praxis: Die einzige Ulme, die dem Ulmensterben weitgehend standhält — bei Ulmenwunsch immer diese Art.

Gemeine Esche *Fraxinus excelsior*

BEDINGT

GEK-007

Höhe	bis 40 m	Wuchsform	Großbaum, lichte Krone
Blütezeit	Apr-Mai	Blütenfarbe	purpurn-schwärzlich, vor dem Laub
Blattform	unpaarig gefiedert, 7-13 Fiedern, schwarze Knospen	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	gelblich, oft grün abfallend		

Standort	Sonne-HS / frisch-feucht	Bodenart	L-tL, basenreich
Boden	basisch	Lebensbereich	G3, WR3
Geselligkeit	I	Stück je m²	Solitär
Ausbreitung	Großbaum	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Samen für Gimpel; lichte Krone lässt Unterwuchs zu

Praxis: WARNUNG: Eschentriebsterben (*Hymenoscyphus fraxineus*) befällt flächendeckend. Neupflanzung nur aus nachweislich toleranten Herkünften — sonst Ausfallrisiko und Haftungsfrage bei Verkehrssicherung.

Korrektur gegenüber der Ausgangsquelle: Von 'voll' auf 'bedingt' herabgestuft — Eschentriebsterben in der Quelle nicht erwähnt

Grauerle *Alnus incana*

VOLL

GEK-008

Höhe	bis 20 m	Wuchsform	Großbaum, schlank
Blütezeit	Feb-Apr	Blütenfarbe	bräunliche Kätzchen
Blattform	einfach, eiförmig, zugespitzt, unterseits graufilzig	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	keine		

Standort	Sonne / feucht	Bodenart	skelettreich, Grus/Schotter
Boden	kiesig	Lebensbereich	WR3
Geselligkeit	II	Stück je m²	Solitär
Ausbreitung	Großbaum	Vorkommen	Gebirgsbach-Auen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Frühblüher; N₂-Fixierung; Pioniergehölz auf Rohböden

Praxis: Pionier auf kiesigem Rohboden — geeignet für Baustellenrekultivierung.

Korrektur gegenüber der Ausgangsquelle: Schreibweise korrigiert: Quelle führte 'Graucrlé'

Hainbuche *Carpinus betulus*

VOLL

GEK-009

Höhe	bis 25 m	Wuchsform	Großbaum, sehr schnittfest
Blütezeit	Apr-Mai	Blütenfarbe	grünlich, hängende Kätzchen
Blattform	einfach, eiförmig, doppelt gesägt, gefaltete Nerven	Blattstellung	wechselständig, zweizeilig
Herbstfärbung	goldgelb		

Standort	HS-Schatten / frisch	Bodenart	sL-L — sandiger bis reiner Lehm
Boden	lehmig, verdichtungstolerant	Lebensbereich	G2, GR2
Geselligkeit	I	Stück je m²	4 / lfd. m Hecke
Ausbreitung	Großbaum, sehr schnittfest	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Samen für Kernbeißer und Finken; dichteste heimische Schnitthecke

Praxis: Verträgt Bodenverdichtung und Schatten besser als die Buche. Erste Wahl für Hecken auf Baustellenböden.

Hängebirke *Betula pendula*



VOLL

GEK-010

essbar

Höhe	bis 25 m	Wuchsform	Großbaum, überhängende Zweige, weiße Rinde
Blütezeit	Apr-Mai	Blütenfarbe	grünliche hängende Kätzchen
Blattform	einfach, dreieckig-rautenförmig, doppelt gesägt, lang zugespitzt	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	leuchtend goldgelb		

Standort	Sonne / trocken-frisch	Bodenart	S-IS — sandig · sL-L, Auelehm · S-IS, sauer
Boden	sauer, sandig	Lebensbereich	GR1
Geselligkeit	II	Stück je m²	Solitär
Ausbreitung	Großbaum	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Über 100 Insektenarten; Samen für Erlenzeisig und Meisen; Pionier

Essbar: Birkensaft · Ernte Mär · Birkensaft

Praxis: Pollen ist ein Hauptallergen. Bei Allergikern im Haushalt vorher ansprechen — sonst Reklamationsrisiko.

Korbweide *Salix viminalis*



VOLL

GEK-011

Höhe	bis 6 m	Wuchsform	Großstrauch, Kopfschnittform
Blütezeit	Mär-Apr	Blütenfarbe	gelbe Kätzchen
Blattform	einfach, sehr schmal lanzettlich, unterseits silbrig	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	gelblich		

Standort	Sonne / nass-feucht	Bodenart	sL-L, Auelehm
Boden	Aue	Lebensbereich	WR3
Geselligkeit	II	Stück je m²	1 / 4 m²
Ausbreitung	Strauchbaum, Kopfschnitt	Vorkommen	Flusstäler
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Früher Pollen; Ruten für Flechtwerk und Weidentunnel

Praxis: Kopfweidenschnitt alle 2-3 Jahre. Ruten sind ein verkaufbares Nebenprodukt.

Mehlbeere *Sorbus aria*



VOLL

GEK-012

essbar

Höhe	bis 15 m	Wuchsform	Kleinbaum, kompakt
Blütezeit	Mai-Jun	Blütenfarbe	weiß, in Doldenrispen
Blattform	einfach, elliptisch, doppelt gesägt, unterseits weißfilzig	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	gelbbraun		

Standort	Sonne / trocken	Bodenart	skelettreich, Grus/Schotter · L-tL über Kalk
Boden	kalkig, steinig	Lebensbereich	GR1, FS1
Geselligkeit	I	Stück je m²	Solitär
Ausbreitung	Kleinbaum	Vorkommen	Kalk-Mittelgebirge
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Blüte für Insekten, Früchte für Vögel; silbrige Blattunterseite als Gestaltungselement

Essbar: ja (nach Frost) · Ernte Sep-Nov · Mehl aus Früchten, Gelee

Praxis: Hitze- und trockenheitsfest — guter Klimabaum für sonnige Vorgärten.

Moorbirke *Betula pubescens*

VOLL

GEK-013

essbar

Höhe	bis 20 m
Blütezeit	Apr-Mai
Blattform	einfach, rundlich-eiförmig, Triebe behaart
Herbstfärbung	gelb

Wuchsform	Kleinbaum
Blütenfarbe	hängende Kätzchen
Blattstellung	wechselständig

Standort	Sonne / nass-feucht	Bodenart	sL-L, Auelehm · S-IS, sauer
Boden	sauer	Lebensbereich	WR3
Geselligkeit	II	Stück je m²	Solitär
Ausbreitung	Kleinbaum	Vorkommen	Nordhessen, Moore
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Raupenfutter zahlreicher Falter; Moor- und Feuchtstandorte**Essbar:** Birkensaft · Ernte Mär · Birkensaft, Tee**Praxis:** —**Rotbuche** *Fagus sylvatica*

VOLL

GEK-014

essbar

giftig

Höhe	bis 35 m
Blütezeit	Apr-Mai
Blattform	einfach, elliptisch, ganzrandig, wellig, bewimpert
Herbstfärbung	leuchtend goldgelb bis kupferbraun

Wuchsform	Großbaum, Hecke schnittfest
Blütenfarbe	grünlich, unscheinbar
Blattstellung	wechselständig, zweizeilig

Standort	Halbschatten / frisch	Bodenart	sL-L — sandiger bis reiner Lehm · sL-L, tiefgründig
Boden	lehmig, tiefgründig	Lebensbereich	G2
Geselligkeit	I	Stück je m²	4 / lfd. m Hecke
Ausbreitung	Großbaum, schnittfest	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Bucheckern für Vögel und Kleinsäuger; als Schnitthecke ganzjährig Deckung durch Marzeszenz (Laub bleibt hängen)**Essbar:** Bucheckern in Kleinmengen · Ernte Sep-Okt · geröstet essbar**Giftigkeit:** roh in Menge giftig (Fagin)**Praxis:** Als Hecke die heimische Alternative zu Thuja: wintergrün wirkend durch anhaftendes Laub, ohne immergrün zu sein.**Salweide** *Salix caprea*

VOLL

GEK-015

Höhe	bis 10 m
Blütezeit	Mär-Apr
Blattform	einfach, breit elliptisch, runzelig, unterseits filzig
Herbstfärbung	gelblich

Wuchsform	Kleinbaum, breit ausladend
Blütenfarbe	silbrig-gelbe Kätzchen, vor dem Laub
Blattstellung	wechselständig

Standort	Sonne-HS / frisch-trocken	Bodenart	S-IS — sandig
Boden	sandig	Lebensbereich	GR2
Geselligkeit	I	Stück je m²	Solitär
Ausbreitung	Kleinbaum	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Die wichtigste Frühjahrstracht überhaupt: Pollen und Nektar zur Zeit der Hummelköniginnen; Raupenfutter für über 100 Falterarten**Praxis:** Verträgt auch trockene Standorte — die einzige Weide für den normalen Hausgarten. Zweihäusig: männliche Exemplare liefern Pollen, weibliche Nektar.

Schwarzerle *Alnus glutinosa*



VOLL

GEK-016

Höhe	bis 25 m
Blütezeit	Feb-Apr
Blattform	einfach, rundlich, vorn ausgerandet, klebrig
Herbstfärbung	keine, grün abfallend

Wuchsform	Großbaum, kegelförmig
Blütenfarbe	rötlich-braune Kätzchen
Blattstellung	wechselständig

Standort	Sonne / nass-feucht	Bodenart	sL-L, Auelehm
Boden	Aue	Lebensbereich	WR3
Geselligkeit	I	Stück je m²	Solitär
Ausbreitung	Großbaum	Vorkommen	Flusstäler, Nordhessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Sehr frühe Blüte; Samen für Erlenzeisig; N2-Fixierung über Wurzelknöllchen

Praxis: Nur an dauerhaft feuchten Standorten. Achtung Phytophthora-Erlensterben — Pflanzware aus gesunden Beständen.

Schwarzpappel *Populus nigra*



VOLL

GEK-017

Höhe	bis 30 m
Blütezeit	Mär-Apr
Blattform	einfach, dreieckig-rautenförmig
Herbstfärbung	gelb

Wuchsform	Großbaum, mächtige Krone
Blütenfarbe	rote Kätzchen
Blattstellung	wechselständig

Standort	Sonne / feucht	Bodenart	sL-L, Auelehm
Boden	Aue	Lebensbereich	WR3
Geselligkeit	I	Stück je m²	Solitär
Ausbreitung	Großbaum	Vorkommen	Rhein-Main, Auen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Stark gefährdete Auenart; hoher Insektenwert

Praxis: Echte *P. nigra* ist in Hessen sehr selten; im Handel meist Hybridpappeln. Herkunftsnachweis zwingend, sonst kein GEK-Wert.

Silberweide *Salix alba*



VOLL

GEK-018

Höhe	bis 25 m
Blütezeit	Mär-Apr
Blattform	einfach, lanzettlich, seidig behaart, silbrig
Herbstfärbung	gelblich

Wuchsform	Großbaum, überhängende Zweige
Blütenfarbe	gelbliche Kätzchen
Blattstellung	wechselständig

Standort	Sonne / nass-feucht	Bodenart	sL-L — sandiger bis reiner Lehm · sL-L, Auelehm
Boden	Aue, lehmig	Lebensbereich	WR3
Geselligkeit	I	Stück je m²	Solitär
Ausbreitung	Großbaum	Vorkommen	Rhein-Main, Flusstäler
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Weiden tragen die höchste Zahl an Schmetterlingsraupen aller heimischen Gehölze; erste Pollenquelle im Jahr

Praxis: Nur für große Grundstücke mit Wasserzugang. Wurzeln suchen Leitungen — Abstand zu Kanal beachten.

Sommerlinde *Tilia platyphyllos*



VOLL

GEK-019

essbar

Höhe	bis 40 m	Wuchsform	Großbaum
Blütezeit	Jun	Blütenfarbe	gelblichweiß, duftend
Blattform	einfach, herzförmig, größer, Achselbärte weiß	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	gelb		
Standort	Sonne / frisch-feucht	Bodenart	L-tL über Kalk
Boden	kalkig	Lebensbereich	G2
Geselligkeit	I	Stück je m²	Solitär
Ausbreitung	Großbaum	Vorkommen	Mittel- und Südhessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Blüht 2 Wochen vor der Winterlinde — Kombination verlängert die Tracht

Essbar: ja (Blüten) · Ernte Jun · Tee

Praxis: —

Speierling *Sorbus domestica*



VOLL

GEK-020

essbar

Höhe	bis 20 m	Wuchsform	Großbaum, rundkronig
Blütezeit	Mai	Blütenfarbe	weiß, Rispen
Blattform	unpaarig gefiedert, ähnlich Eberesche	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	gelborange bis rot		
Standort	Sonne / trocken-frisch	Bodenart	L-tL über Kalk
Boden	warm, kalkig	Lebensbereich	GR1
Geselligkeit	I	Stück je m²	Solitär
Ausbreitung	Großbaum	Vorkommen	Südhessen, Rhein-Main
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Extrem selten; Blüte und Frucht; Symbolart des hessischen Streuobstbaus

Essbar: ja (überreif) · Ernte Okt-Nov · Most-Veredlung (Apfelwein), Rarität

Praxis: In Hessen kulturhistorisch zentral (Speierlings-Apfelwein). Trägt über 200 Jahre. Fehlt in Modul 1 der Quelle vollständig.

Korrektur gegenüber der Ausgangsquelle: Aus Modul 2 nachgetragen — in Modul 1 nicht enthalten

Spitzahorn *Acer platanoides*



VOLL

GEK-021

Höhe	bis 30 m	Wuchsform	Großbaum, rundliche Krone
Blütezeit	Apr	Blütenfarbe	leuchtend gelbgrün, vor dem Laub
Blattform	einfach, 5-lappig, zugespitzt, Milchsaft	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	goldgelb		
Standort	Sonne-HS / frisch	Bodenart	sL-L, nährstoffreich
Boden	nährstoffreich	Lebensbereich	G2, GR2
Geselligkeit	I	Stück je m²	Solitär
Ausbreitung	Großbaum	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Sehr frühe Nektartracht vor dem Laubaustrieb — wichtig für Hummelköniginnen

Praxis: Starke Selbstausaat, Sämlinge im Beet einplanen.

Stieleiche *Quercus robur*



VOLL

GEK-022

giftig

Höhe	bis 40 m	Wuchsform	Großbaum, breit ausladende Krone
Blütezeit	Apr-Mai	Blütenfarbe	grünlich-gelb, unscheinbar
Blattform	einfach, buchtig gelappt, kurz gestielt	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	gelbbraun bis braun		
Standort	Sonne-HS / frisch-wechselfeucht	Bodenart	S-IS — sandig · sL-L — sandiger bis reiner Lehm
Boden	lehmig-sandig	Lebensbereich	G2, GR2
Geselligkeit	I	Stück je m²	Solitär
Ausbreitung	Großbaum	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Über 300 Insektenarten leben an der Eiche — höchster faunistischer Wert aller heimischen Bäume; Eicheln für Eichelhäher, Specht, Kleinsäuger

Giftigkeit: Eicheln roh giftig (Gerbstoffe)

Praxis: Braucht 15 m Abstand zur Bebauung. In Gärten unter 500 m² unrealistisch — dann Traubeneiche oder Feldahorn.

Traubeneiche *Quercus petraea*



VOLL

GEK-023

giftig

Höhe	bis 30 m	Wuchsform	Großbaum, kegelförmige Krone
Blütezeit	Apr-Mai	Blütenfarbe	grünlich-gelb
Blattform	einfach, buchtig gelappt, lang gestielt	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	gelbbraun		
Standort	Sonne / trocken-frisch	Bodenart	IS — lehmiger Sand · S-IS — sandig · sL-L — sandiger bis reiner Lehm · sL-L, Auelehm · S-IS, sauer
Boden	sauer, sandig-lehmig	Lebensbereich	G1, GR1
Geselligkeit	I	Stück je m²	Solitär
Ausbreitung	Großbaum	Vorkommen	Mittel- und Nordhessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Wie Stieleiche; verträgt Trockenheit besser — Klimabaum der Zukunft für Hessen

Giftigkeit: Eicheln roh giftig

Praxis: Trockenheitsverträglicher als Q. robur. Bei Neupflanzung im Rhein-Main-Gebiet dieser Art den Vorzug geben.

Traubenkirsche *Prunus padus*



VOLL

GEK-024

essbar

giftig

Höhe	bis 15 m	Wuchsform	Kleinbaum, mehrstämmig
Blütezeit	Apr-Mai	Blütenfarbe	weiß, in hängenden Trauben, duftend
Blattform	einfach, elliptisch, fein gesägt	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	gelb bis rötlich		
Standort	Halbschatten / feucht	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig
Boden	humos	Lebensbereich	WR3, GR3
Geselligkeit	I	Stück je m²	Solitär
Ausbreitung	Kleinbaum	Vorkommen	Nordhessen, Auen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Duftende Blütentrauben; Früchte für Vögel

Essbar: ja (nur gekocht) · Ernte Jul-Aug · Gelee, Saft

Giftigkeit: roh bitter, Samen blausäurehaltig

Praxis: Anfällig für Gespinstmotte — Kahlfraß im Mai sieht dramatisch aus, ist aber harmlos. Kunden vorab informieren, sonst Reklamation.

Vogelkirsche *Prunus avium*



VOLL

GEK-025

essbar giftig

Höhe	bis 25 m	Wuchsform	Großbaum, quirlständige Äste
Blütezeit	Apr-Mai	Blütenfarbe	reinweiß, doldig, Massenblüte
Blattform	einfach, elliptisch, gesägt, hängend, Nektardrüsen am Stiel	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	orangerot bis purpur		

Standort	Sonne / frisch	Bodenart	sL-L, nährstoffreich
Boden	nährstoffreich	Lebensbereich	GR2
Geselligkeit	I	Stück je m²	Solitär
Ausbreitung	Großbaum	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Massentracht im Frühjahr; Früchte für über 20 Vogelarten; Herbstfärbung

Essbar: ja (Früchte) · Ernte Jun-Jul · Direktverzehr, Marmelade, Likör, Kirschwasser

Giftigkeit: Samen blausäurehaltig

Praxis: Wildform trägt kleinere, dunklere Früchte als Kulturkirschen. Vögel ernten mit — das ist gewollt und muss dem Kunden vorher gesagt werden.

Waldkiefer *Pinus sylvestris*



VOLL

GEK-026

essbar immergrün

Höhe	bis 40 m	Wuchsform	Großbaum, im Alter schirmförmig, rotbraune Rinde
Blütezeit	Mai	Blütenfarbe	gelblich-rötlich
Blattform	Nadeln zu zweit, gedreht, 4-7 cm	Blattstellung	in Zweiernadelbüscheln
Herbstfärbung	immergrün		

Standort	Sonne / trocken-frisch	Bodenart	S-IS — sandig · sL-L, Auelehm · S-IS, sauer
Boden	sauer, sandig	Lebensbereich	H1, FS1
Geselligkeit	I	Stück je m²	Solitär
Ausbreitung	Großbaum	Vorkommen	Nordhessen, Sandgebiete
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Immergrün; Trockenheitskünstler; Lebensraum spezialisierter Sandarten

Essbar: Nadeln, junge Triebe · Ernte Mai · Sirup, Tee

Praxis: Der heimische immergrüne Großbaum für trockene Sandböden — echte Alternative zu Fremdkoniferen.

Weißtanne *Abies alba*



VOLL

GEK-027

essbar immergrün

Höhe	bis 50 m	Wuchsform	Großbaum, kegelförmig
Blütezeit	Mai	Blütenfarbe	unscheinbar, Zapfen aufrecht stehend
Blattform	Nadeln flach, stumpf, zwei weiße Streifen unterseits, gescheitelt	Blattstellung	spiralig, zweizeilig gescheitelt
Herbstfärbung	immergrün		

Standort	Halbschatten / frisch	Bodenart	sL-L — sandiger bis reiner Lehm · sL-L, tiefgründig
Boden	tiefgründig, lehmig	Lebensbereich	G2
Geselligkeit	I	Stück je m²	Solitär
Ausbreitung	Großbaum	Vorkommen	Vogelsberg, Rhön, Odenwald
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Immergrüne Deckung; Samen für Kreuzschnabel und Eichhörnchen

Essbar: Nadeln (Tee) · Ernte ganzjährig · Tannenwipfel-Sirup

Praxis: Nur in Höhenlagen mit ausreichend Niederschlag. In Rhein-Main klimatisch am Rand.

Wildapfel *Malus sylvestris*

VOLL

GEK-028

essbar giftig

Höhe bis 10 m
 Blütezeit Apr-Mai
 Blattform einfach, eiförmig, gesägt
 Herbstfärbung gelb

Wuchsform Kleinbaum, breit, dornig
 Blütenfarbe weiß bis zartrosa
 Blattstellung wechselständig

Standort	Sonne / frisch	Bodenart	sL-L — sandiger bis reiner Lehm
Boden	lehmig	Lebensbereich	GR2
Geselligkeit	I	Stück je m²	Solitär
Ausbreitung	Kleinbaum, dornig	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Stammform der Kulturäpfel; Blüte und Frucht; dorniger Vogelschutz

Essbar: ja (Früchte) · Ernte Sep-Nov · Most, Essig, Dörrobst

Giftigkeit: Samen blausäurehaltig

Praxis: Echte *M. sylvestris* ist selten; im Handel oft Hybriden mit *M. domestica*. Auf Bestimmungsnachweis bestehen.

Wildbirne *Pyrus pyraster*

VOLL

GEK-029

essbar

Höhe bis 20 m
 Blütezeit Apr-Mai
 Blattform einfach, rundlich bis eiförmig, lang gestielt
 Herbstfärbung gelb bis rotbraun

Wuchsform Kleinbaum, sparrig, dornig
 Blütenfarbe reinweiß mit roten Staubbeuteln
 Blattstellung wechselständig

Standort	Sonne / trocken-frisch	Bodenart	L-tL über Kalk
Boden	kalkig	Lebensbereich	GR1
Geselligkeit	I	Stück je m²	Solitär
Ausbreitung	Kleinbaum, dornig	Vorkommen	Südhessen, Rhön
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Frühe Tracht; Rarität mit hohem Erzählwert; sehr hartes Holz

Essbar: ja (nach Frost) · Ernte Okt-Nov · Most, Gelee

Praxis: In Hessen stark gefährdet. Echte Wildbirnen sind im Handel selten — Herkunft prüfen, meist werden Sämlinge von Kulturbirnen verkauft.

Winterlinde *Tilia cordata*

VOLL

GEK-030

essbar

Höhe bis 30 m
 Blütezeit Jun-Jul
 Blattform einfach, herzförmig, gesägt, unterseits
 Achselbärte rostbraun
 Herbstfärbung goldgelb

Wuchsform Großbaum, schnittfest
 Blütenfarbe gelblichweiß, duftend, mit Flügelblatt
 Blattstellung wechselständig

Standort	Sonne-HS / frisch	Bodenart	sL-L — sandiger bis reiner Lehm
Boden	lehmig	Lebensbereich	G2, GR2
Geselligkeit	I	Stück je m²	Solitär
Ausbreitung	Großbaum, schnittfest	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Wichtigste Sommertracht für Honigbienen; Blüte in der Trachtlücke Juni/Juli

Essbar: ja (Blüten, junge Blätter) · Ernte Jun-Jul · Lindenblütentee, Honig

Praxis: Standardbaum für Dorfplätze und kommunale Projekte. Honigtau tropft auf Autos — Standort mit Bedacht.

Zitterpappel / Espe *Populus tremula*

BEDINGT

GEK-031

Höhe	bis 25 m	Wuchsform	Großbaum, Wurzelbrut
Blütezeit	Mär-Apr	Blütenfarbe	graue hängende Kätzchen
Blattform	einfach, rundlich, buchtig gezähnt, Stiel seitlich abgeflacht	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	leuchtend gelb		
Standort	Sonne / trocken-frisch	Bodenart	sL-L, Auelehm · S-IS, sauer
Boden	sauer	Lebensbereich	GR1, GR2
Geselligkeit	II	Stück je m²	Solitär
Ausbreitung	Großbaum, Wurzelbrut	Vorkommen	Nordhessen, Hochlagen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Raupenfutter zahlreicher Falter; sehr früher Pollen; Pioniergehölz

Praxis: Starke Wurzelbrut über 10 m Entfernung — im Hausgarten ein Dauerproblem. Nur auf Freiflächen.

Korrektur gegenüber der Ausgangsquelle: Von 'voll' auf 'bedingt' — Wurzelbrutproblem in der Quelle nicht erwähnt

Sträucher über 2 Meter

28 Arten

Hecke, Sichtschutz, Vogelnährgehölz. Die Schicht, die Nistplatz und Nahrung gleichzeitig liefert.

Berberitze *Berberis vulgaris*



BEDINGT

GEK-032

essbar giftig

Höhe	1-3 m	Wuchsform	Strauch, dreiteilige Dornen
Blütezeit	Mai-Jun	Blütenfarbe	goldgelb, hängende Trauben
Blattform	einfach, verkehrt-eiförmig, stachelig gezähnt, an Kurztrieben	Blattstellung	büschelig an Kurztrieben
Herbstfärbung	leuchtend rot bis orange		

Standort	Sonne / trocken	Bodenart	L-tL über Kalk
Boden	kalkig	Lebensbereich	GR1, FS1
Geselligkeit	II	Stück je m²	1 / 2 m²
Ausbreitung	dornig	Vorkommen	Südhessen, Rhön
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Wildbienen; Vogelnährgehölz; Raupenfutter

Essbar: ja (Beeren, Samen giftig) · Ernte Aug-Okt · Gelee, Essig

Giftigkeit: Samen und Wurzel giftig

Praxis: Zwischenwirt des Getreide-Schwarzrostes (*Puccinia graminis*). NICHT in unmittelbarer Nähe von Getreideflächen pflanzen – in Randlagen zur Feldflur vorher prüfen.

Korrektur gegenüber der Ausgangsquelle: Als 'bedingt' eingestuft — Schwarzrost-Problematik in der Quelle nicht erwähnt

Besenginster *Cytisus scoparius*



VOLL

GEK-033

giftig

Höhe	1-2 m	Wuchsform	Strauch, rutenförmig, grün bleibende Triebe
Blütezeit	Mai-Jun	Blütenfarbe	leuchtend goldgelb, Schmetterlingsblüte
Blattform	dreizählig bis einfach, klein, früh abfallend	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	keine, Triebe grün		

Standort	Sonne / trocken	Bodenart	S-IS — sandig · sL-L, Auelehm · S-IS, sauer
Boden	sauer, sandig	Lebensbereich	H1
Geselligkeit	II	Stück je m²	1 / 2 m²
Ausbreitung	aufrecht	Vorkommen	Nordhessen, Sandgebiete
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Kraftblume: nur schwere Bienen können sie öffnen; N2-Fixierung; Pionier auf Sauersand

Giftigkeit: giftig (Sparteine)

Praxis: Kurzlebig (10-15 Jahre), verkahlt von unten. Als Pionier planen, nicht als Dauerbestand.

Brombeere *Rubus fruticosus agg.*

BEDINGT

GEK-034

essbar

Höhe	1–2 m	Wuchsform	Rankstrauch, bogig, bewurzelnd, Stacheln
Blütezeit	Jun–Aug	Blütenfarbe	weiß bis rosa
Blattform	gefingert, 3–5 Blättchen, gesägt	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	teils wintergrün		

Standort	Sonne–HS / frisch–trocken	Bodenart	bodenvag — alle Bodenarten
Boden	alle	Lebensbereich	GR2
Geselligkeit	IV	Stück je m²	2 / lfd. m
Ausbreitung	rankend, wurzelnd	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Lange Blühdauer; höchste Insektenfrequenz aller heimischen Sträucher im Hochsommer; dichte Deckung

Essbar: ja (Früchte, Blätter) · Ernte Aug–Sep · Saft, Marmelade, Wein, Blättertee

Praxis: Sammelart mit über 200 Kleinarten. Überwuchert alles — nur an Grundstücksrändern mit jährlichem Rückschnitt. Im Hausgarten dornenlose Kultursorten erwägen, die aber ökologisch schwächer sind.

Korrektur gegenüber der Ausgangsquelle: Als Sammelart (agg.) gekennzeichnet — Quelle führte 'Rubus fruticosus' als Einzelart

Echter Kreuzdorn *Rhamnus cathartica*

VOLL

GEK-035

giftig

Höhe	2–4 m	Wuchsform	Strauch, sparrig, Kurztriebe dornig
Blütezeit	Mai–Jun	Blütenfarbe	unscheinbar grünlich, vierzählig
Blattform	einfach, elliptisch, fein gekerbt, Bogennerven	Blattstellung	gegenständig bis fast gegenständig
Herbstfärbung	gelb		

Standort	Sonne / trocken	Bodenart	L–tL über Kalk
Boden	kalkig	Lebensbereich	GR1
Geselligkeit	II	Stück je m²	1 / 3 m²
Ausbreitung	dornig	Vorkommen	Südhessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Raupenfutter des Zitronenfalters; dorniger Nistschutz

Giftigkeit: Früchte stark abführend giftig

Praxis: Zusammen mit dem Faulbaum die einzige Raupennahrung des Zitronenfalters — starkes Argument in der Kategorie Insekten.

Eingriffeliger Weißdorn *Crataegus monogyna*

VOLL

GEK-036

essbar

Höhe	2–6 m	Wuchsform	Großstrauch, dornig, schnittfest
Blütezeit	Mai–Jun	Blütenfarbe	weiß, ein Griffel, Doldenrispen
Blattform	einfach, tief 3–7-lappig, Lappen schmal	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	gelbbraun bis rötlich		

Standort	Sonne / trocken–frisch	Bodenart	L–tL über Kalk
Boden	kalkverträglich	Lebensbereich	GR1, GR2
Geselligkeit	II	Stück je m²	1 / 3 m²
Ausbreitung	aufrecht, dornig	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Über 30 Vogelarten nutzen Frucht und Deckung; dichtester heimischer Nistschutz

Essbar: ja (mehlig) · Ernte Sep–Nov · Mus, Tee, Heilpflanze

Praxis: Feuerbrand-Wirtspflanze. In Obstbaugebieten (Südhessen) vor Pflanzung die Meldepflicht der Kommune prüfen.

Färberginster *Genista tinctoria*



VOLL

GEK-037

Höhe	0,3–1 m	Wuchsform	Zwergstrauch, aufsteigend
Blütezeit	Jun–Aug	Blütenfarbe	goldgelb, Schmetterlingsblüte, Trauben
Blattform	einfach, schmal lanzettlich, klein	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	keine		
Standort	Sonne / trocken	Bodenart	S-IS, mager · sL-L, Auelehm · S-IS, sauer
Boden	sauer, mager	Lebensbereich	H1, St1
Geselligkeit	III	Stück je m²	3–4 / m²
Ausbreitung	niederliegend	Vorkommen	Nordhessen, Magerrasen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: N2-Fixierung; Kraftblume für Hummeln; Magerrasenart

Praxis: Historische Färbepflanze — Erzählwert in Schau- und Lehrgärten.

Korrektur gegenüber der Ausgangsquelle: FACHFEHLER korrigiert: Quelle führte *Genista tinctoria* unter dem Namen 'Besenginster'. Besenginster ist *Cytisus scoparius*. *Genista tinctoria* heißt Färberginster.

Gemeiner Schneeball *Viburnum opulus*



VOLL

GEK-038

giftig

Höhe	2–5 m	Wuchsform	Strauch, aufrecht
Blütezeit	Mai–Jun	Blütenfarbe	weiß, Randblüten steril und groß, innen klein
Blattform	einfach, 3–5-lappig, ahornartig	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	leuchtend orangerot		
Standort	Halbschatten / feucht-frisch	Bodenart	sL–L — sandiger bis reiner Lehm
Boden	lehmig	Lebensbereich	GR3, WR3
Geselligkeit	II	Stück je m²	1 / 3 m²
Ausbreitung	aufrecht	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Randblüten steril, Innenblüten fruchtbar; Früchte für Vögel im Winter

Giftigkeit: Früchte roh giftig

Praxis: Die Gartensorte 'Roseum' (Schneeball) ist vollständig steril — kein Pollen, kein Nektar, keine Frucht. Im GEK nicht anrechenbar.

Gewöhnlicher Wacholder *Juniperus communis*



VOLL

GEK-039

essbar giftig § geschützt immergrün

Höhe	1-6 m	Wuchsform	Säulenstrauch bis Kleinbaum, sehr langsam
Blütezeit	Apr-Mai	Blütenfarbe	unscheinbar, zweihäusig
Blattform	Nadeln zu dritt im Quirl, stechend, ein weißer Streifen oben	Blattstellung	dreizählig quirlständig
Herbstfärbung	immergrün, blaugrün		

Standort	Sonne / trocken	Bodenart	L-tL über Kalk · S-IS, mager · sL-L, Auelehm · S-IS, sauer
Boden	mager, kalkig-sauer	Lebensbereich	H1, FS1
Geselligkeit	I	Stück je m²	1 / 3 m²
Ausbreitung	säulenförmig, sehr langsam	Vorkommen	Rhön, Vogelsberg, Magerrasen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Immergrüne Nistdeckung; Beerenzapfen für Wacholderdrossel

Essbar: ja (Beerenzapfen) · Ernte Sep-Okt (2. Jahr) · Gewürz, Gin-Aroma

Giftigkeit: in Menge unverträglich; Sorten meiden

Schutzstatus: besonders geschützt (BArtSchV)

Praxis: Heimische immergrüne Säulenform — die ehrliche Antwort auf Thuja. Zwischenwirt für Birnengitterrost: nicht neben Birnbäume. Nur Baumschulware.

Korrektur gegenüber der Ausgangsquelle: Schutzstatus in der Quelle nicht vermerkt

Hasel *Corylus avellana*



VOLL

GEK-040

essbar

Höhe	2-5 m	Wuchsform	Großstrauch, mehrstämmig, Stockausschlag
Blütezeit	Feb-Mär	Blütenfarbe	gelbe hängende Kätzchen, rote Narbenbüschel
Blattform	einfach, rundlich, doppelt gesägt, kurz zugespitzt, rau	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	gelb		

Standort	Halbschatten / frisch	Bodenart	sL-L, nährstoffreich
Boden	nährstoffreich	Lebensbereich	GR2
Geselligkeit	II	Stück je m²	1 / 4 m²
Ausbreitung	Stockausschlag	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Früheste Pollenquelle des Jahres (Februar); Nüsse für Eichhörnchen, Haselmaus, Kleiber

Essbar: ja (Nüsse) · Ernte Sep-Okt · Direktverzehr, Nussmus, Öl

Praxis: Windblütig — liefert Pollen, aber keinen Nektar. Wirtschaftlich die ertragreichste heimische Art (200-500 €/Jahr aus 3-5 Sträuchern).

Heckenrose *Rosa corymbifera*



VOLL

GEK-041

essbar

Höhe	1–2 m
Blütezeit	Jun
Blattform	unpaarig gefiedert, unterseits behaart
Herbstfärbung	gelblich

Wuchsform	Strauch, dornig
Blütenfarbe	weiß bis blassrosa
Blattstellung	wechselständig

Standort	Sonne / warm, trocken	Bodenart	L–tL über Kalk
Boden	kalkig	Lebensbereich	GR1
Geselligkeit	II	Stück je m²	1 / 2,5 m²
Ausbreitung	dornig	Vorkommen	Südhessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Wie *R. canina*; wärmeliebende Kleinart

Essbar: ja (Hagebutten) · Ernte Sep–Okt · Tee, Marmelade

Praxis: —

Himbeere *Rubus idaeus*



VOLL

GEK-042

essbar

Höhe	1–2 m
Blütezeit	Jun–Jul
Blattform	unpaarig gefiedert, 3–5 Fiedern, unterseits weißfilzig
Herbstfärbung	gelblich

Wuchsform	Halbstrauch, zweijährige Ruten, Wurzelausläufer
Blütenfarbe	weiß, klein, nickend
Blattstellung	wechselständig

Standort	Halbschatten / frisch	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig · sL–L, Auelehme · S–IS, sauer
Boden	sauer, humos	Lebensbereich	GR2
Geselligkeit	IV	Stück je m²	3 / lfd. m
Ausbreitung	Wurzelausläufer	Vorkommen	Mittel- und Nordhessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Sehr hohe Nektarleistung; eine der besten Bienenweiden überhaupt; Deckung

Essbar: ja (Früchte, Blätter) · Ernte Jun–Aug · Direktverzehr, Marmelade, Blättertee

Praxis: Ausläuferbildend, braucht jährliche Begrenzung. Im Pflegeabo als feste Position einplanen.

Hundsrose *Rosa canina*



VOLL

GEK-043

essbar

Höhe	1–3 m
Blütezeit	Jun
Blattform	unpaarig gefiedert, 5–7 Fiedern, kahl
Herbstfärbung	gelblich

Wuchsform	Strauch, überhängend, Hakenstacheln
Blütenfarbe	zartrosa bis weiß, 5 Kronblätter, ungefüllt
Blattstellung	wechselständig

Standort	Sonne / trocken–frisch	Bodenart	L–tL über Kalk
Boden	kalkig	Lebensbereich	GR1
Geselligkeit	II	Stück je m²	1 / 3 m²
Ausbreitung	überhängend, dornig	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Ungefüllte Pollenblume für Wildbienen; Hagebutten bis in den Winter; dorniger Nistschutz

Essbar: ja (Hagebutten) · Ernte Sep–Nov · Tee, Marmelade — sehr vitaminreich

Praxis: Ungefüllt ist entscheidend: gefüllte Gartenrosen liefern weder Pollen noch Nektar und zählen im GEK nicht.

Kornelkirsche *Cornus mas*



VOLL

GEK-044

essbar

Höhe	3–6 m	Wuchsform	Großstrauch, schnittfest
Blütezeit	Feb–Mär	Blütenfarbe	goldgelb, vor dem Laub, Döldchen
Blattform	einfach, eiförmig, ganzrandig, Bogennerven	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	gelborange bis rot		

Standort	Sonne-HS / trocken	Bodenart	L–tL über Kalk
Boden	warm, kalkig	Lebensbereich	GR1
Geselligkeit	II	Stück je m²	1 / 4 m²
Ausbreitung	aufrecht, schnittfest	Vorkommen	Südhessen, Rheingau
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Eine der frühesten Gehölzblüten (Februar/März); Früchte für Vögel und Menschen

Essbar: ja (Früchte) · Ernte Aug–Sep · Marmelade, Likör, Olivenersatz (unreif eingelegt)

Praxis: Schnittfest genug für Formhecken. Deckt die kritische Trachtlücke Februar zusammen mit Hasel und Seidelbast.

Kratzbeere *Rubus caesius*



BEDINGT

GEK-045

essbar

Höhe	0,5–1 m	Wuchsform	kriechender Halbstrauch, bereifte Triebe
Blütezeit	Jun–Aug	Blütenfarbe	weiß
Blattform	dreizählig, blaugrün bereift	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	teils wintergrün		

Standort	Sonne-HS / frisch	Bodenart	sL–L — sandiger bis reiner Lehm · L–tL über Kalk
Boden	kalkig, lehmig	Lebensbereich	GR2
Geselligkeit	IV	Stück je m²	2–3 / m²
Ausbreitung	kriechend, wurzelnd	Vorkommen	Auen, Südhessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Blüte und Frucht; bodendeckende Deckung

Essbar: ja (Früchte) · Ernte Aug–Sep · Marmelade

Praxis: Kriecht großflächig. Nur an Böschungen/Randlagen, nicht in Staudenflächen.

Liguster *Ligustrum vulgare*



VOLL

GEK-046

giftig

Höhe	2–4 m	Wuchsform	Strauch, aufrecht, sehr schnittfest
Blütezeit	Jun–Jul	Blütenfarbe	cremeweiß, aufrechte Rispen, streng duftend
Blattform	einfach, schmal lanzettlich, ganzrandig, derb	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	wintergrün bis halbbimmergrün		

Standort	Sonne-HS / trocken-frisch	Bodenart	L–tL über Kalk
Boden	kalkig	Lebensbereich	GR1, GR2
Geselligkeit	III	Stück je m²	3–4 / lfd. m Hecke
Ausbreitung	schnittfest	Vorkommen	Süd- und Mittelhessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Duftende Blüte für Falter und Schwebfliegen; Beeren für Vögel; wintergrün bis halbbimmergrün

Giftigkeit: Beeren giftig für Menschen

Praxis: Die heimische Alternative zu Kirschlorbeer für Sichtschutz. Beeren giftig — bei Familiengärten schriftlich hinweisen.

Pfaffenhütchen *Euonymus europaeus*



BEDINGT

GEK-047

giftig

Höhe	2–5 m	Wuchsform	Großstrauch, aufrecht
Blütezeit	Mai–Jun	Blütenfarbe	unscheinbar grünlich, vierzählig
Blattform	einfach, elliptisch, fein gesägt, Triebe vierkantig	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	leuchtend karminrot		

Standort	Halbschatten / frisch	Bodenart	L–tL über Kalk
Boden	kalkig	Lebensbereich	GR2
Geselligkeit	II	Stück je m²	1 / 3 m²
Ausbreitung	aufrecht	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Unscheinbare Blüte mit hoher Insektenfrequenz; auffälliger Fruchtschmuck; Raupenfutter der Gespinstmotte

Giftigkeit: STARK GIFTIG (alle Teile)

Praxis: Kinder greifen nach den rosa Früchten. Nicht in Familiengärten ohne schriftlichen Hinweis in der Übergabe.

Korrektur gegenüber der Ausgangsquelle: Giftigkeit in der Quelle nicht vermerkt

Rote Johannisbeere *Ribes spicatum*



VOLL

GEK-048

essbar

Höhe	1–2 m	Wuchsform	Strauch, aufrecht
Blütezeit	Apr–Mai	Blütenfarbe	grünlich, hängende Trauben
Blattform	einfach, 3–5-lappig, herzförmige Basis	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	gelb		

Standort	Halbschatten / frisch	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig
Boden	humos	Lebensbereich	G2
Geselligkeit	II	Stück je m²	1 / 2 m²
Ausbreitung	aufrecht	Vorkommen	Nordhessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Frühe Blüte; Beeren

Essbar: ja (Beeren) · Ernte Jun–Jul · Saft, Gelee, Direktverzehr

Praxis: Die heimische Wildform, nicht die Kultursorte *R. rubrum* — im Einkauf gezielt nachfragen.

Roter Hartriegel *Cornus sanguinea*



VOLL

GEK-049

Höhe	2–4 m	Wuchsform	Strauch, Ausläufer, rote Winterrinde
Blütezeit	Mai–Jun	Blütenfarbe	cremeweiß, flache Trugdolden
Blattform	einfach, eiförmig, ganzrandig, Bogennerven	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	leuchtend blutrot		

Standort	Halbschatten / frisch-feucht	Bodenart	L–tL über Kalk
Boden	kalkig	Lebensbereich	GR2
Geselligkeit	III	Stück je m²	1 / 3 m²
Ausbreitung	Ausläufer	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Blüte für Schwebfliegen; Früchte für Vögel; rote Winterrinde

Praxis: Ausläuferbildend. Rote Rinde ist im Winter das stärkste Gestaltungselement der heimischen Gehölze.

Roter Holunder *Sambucus racemosa*

VOLL

GEK-050

essbar giftig

Höhe	2–4 m	Wuchsform	Großstrauch, aufrecht
Blütezeit	Apr–Mai	Blütenfarbe	gelblichgrün, eiförmige Rispen
Blattform	unpaarig gefiedert, 5–7 Fiedern, schmal	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	gelblich		

Standort	Halbschatten / frisch	Bodenart	sL–L, Auelehm · S–IS, sauer
Boden	sauer	Lebensbereich	GR2
Geselligkeit	II	Stück je m²	1 / 4 m²
Ausbreitung	aufrecht	Vorkommen	Mittel- und Nordhessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Frühere Blüte als *S. nigra*; Beeren für Vögel**Essbar:** ja (NUR gekocht) · Ernte Jul–Aug · Gelee, Saft**Giftigkeit:** roh giftig**Praxis:** Samen müssen vor der Verarbeitung entfernt werden. Rohverzehr ausdrücklich ausschließen.**Sanddorn** *Hippophae rhamnoides*

NEIN

GEK-051

essbar

Höhe	2–5 m	Wuchsform	Strauch, sparrig, dornig, Wurzelbrut
Blütezeit	Apr–Mai	Blütenfarbe	unscheinbar grünlich, zweihäusig
Blattform	einfach, sehr schmal lanzettlich, silbrig schuppig	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	keine, silbrig bleibend		

Standort	Sonne / trocken	Bodenart	S–IS — sandig · L–tL über Kalk
Boden	sandig, kalkig	Geselligkeit	III
Stück je m²	1 / 4 m²	Ausbreitung	starke Wurzelausläufer
Vorkommen	Küsten und Alpen-Flussschotter; in Hessen angepflanzt	Status	NICHT indigen in Hessen

Ökologische Funktion: N2-Fixierung; vitaminreiche Früchte; Ausbreitung über Wurzelbrut**Essbar:** ja (Früchte) · Ernte Sep–Okt · Saft, Marmelade — sehr vitamin-C-reich**Praxis:** AUSSCHLUSS: Der Sanddorn ist in Hessen nicht heimisch. Sein natürliches Areal sind Nord- und Ostseeküsten sowie alpine Flussschotter. In Hessen ausschließlich angepflanzt und stellenweise verwildernd. Zählt nicht zur heimischen Artenzahl. Zweihäusig — ohne männliche Pflanze kein Ertrag.**Korrektur gegenüber der Ausgangsquelle:** AUS DER HEIMISCH-LISTE ENTFERNT: Quelle führte Sanddorn als heimisch für 'Sandgebiete'. Das ist floristisch nicht haltbar.

Schlehe *Prunus spinosa*

BEDINGT

GEK-052

essbar giftig

Höhe	1–3 m	Wuchsform	Großstrauch, sparrig, dornig, Ausläufer
Blütezeit	Mär–Apr	Blütenfarbe	reinweiß, vor dem Laub, Massenblüte
Blattform	einfach, klein, elliptisch, gesägt	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	gelb bis rotbraun		

Standort	Sonne / trocken–frisch	Bodenart	L–tL über Kalk
Boden	kalkverträglich	Lebensbereich	GR1
Geselligkeit	IV	Stück je m²	1 / 3 m²
Ausbreitung	starke Wurzelausläufer	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Sehr frühe Massentracht vor Laubaustrieb; dorniger Nistplatz für Neuntöter und Dorngrasmücke; Raupenfutter zahlreicher Falter

Essbar: ja (nach Frost) · Ernte Okt–Nov · Likör, Gelee, Schlehengin

Giftigkeit: Samen blausäurehaltig

Praxis: Treibt Wurzelausläufer bis 10 m. Im Reihengarten nur mit Rhizomsperre — sonst wächst sie in den Nachbargarten und das wird ein Rechtsstreit.

Schwarze Johannisbeere *Ribes nigrum*

VOLL

GEK-053

essbar

Höhe	1–2 m	Wuchsform	Strauch, aufrecht
Blütezeit	Apr–Mai	Blütenfarbe	rötlich–grün, hängende Trauben
Blattform	einfach, 3–5-lappig, Blatt riecht beim Reiben	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	gelb		

Standort	Halbschatten / feucht	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig
Boden	humos	Lebensbereich	WR3
Geselligkeit	II	Stück je m²	1 / 2 m²
Ausbreitung	aufrecht	Vorkommen	Nordhessen, Auen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Frühe Blüte; Beeren und Blätter

Essbar: ja (Beeren, Blätter) · Ernte Jun–Jul · Saft, Marmelade, Likör, Blättertee

Praxis: —

Schwarzer Holunder *Sambucus nigra*

VOLL

GEK-054

essbar giftig

Höhe	3–7 m	Wuchsform	Großstrauch, breit ausladend
Blütezeit	Jun	Blütenfarbe	cremeweiß, große flache Schirmolden, duftend
Blattform	unpaarig gefiedert, 5–7 Fiedern, gesägt	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	gelbgrün, unauffällig		

Standort	Halbschatten / frisch	Bodenart	sL–L, nährstoffreich
Boden	nährstoffreich	Lebensbereich	GR2
Geselligkeit	I	Stück je m²	1 / 6 m²
Ausbreitung	breit ausladend	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Blütendolden für Schwebfliegen und Käfer; Beeren für über 60 Vogelarten; hohle Triebe als Nisthilfe

Essbar: ja (Blüten; Beeren gekocht) · Ernte Jun / Aug–Sep · Sirup, Sekt, Saft, Gelee, Likör

Giftigkeit: Beeren roh giftig (Sambunigrin)

Praxis: Wirtschaftlich stärkste Einzelart: 5–8 m Hecke ergeben 300–800 €/Jahr. Braucht viel Platz, wird schnell 4 m breit.

Korrektur gegenüber der Ausgangsquelle: Dublette in der Quelle: Sambucus nigra war zweimal gelistet

Weinrose *Rosa rubiginosa*



VOLL

GEK-055

essbar

Höhe	1–3 m	Wuchsform	Strauch, aufrecht, dicht bestachelt
Blütezeit	Jun	Blütenfarbe	kräftig rosa
Blattform	unpaarig gefiedert, unterseits Drüsen, Apfelduft	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	gelb		

Standort	Sonne / trocken	Bodenart	L-tL über Kalk · S-IS, mager
Boden	kalkig, mager	Lebensbereich	GR1, H1
Geselligkeit	II	Stück je m²	1 / 3 m²
Ausbreitung	dornig	Vorkommen	Süd- und Mittelhessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Apfelduftende Blätter; besonders große Hagebutten

Essbar: ja (Hagebutten groß) · Ernte Sep–Okt · Marmelade — großfrüchtig

Praxis: Blätter duften bei Regen nach Apfel — starkes Verkaufsargument im Sinnesgarten.

Korrektur gegenüber der Ausgangsquelle: Aus Modul 2 nachgetragen — in Modul 1 nicht enthalten

Wilde Stachelbeere *Ribes uva-crispa*



VOLL

GEK-056

essbar

Höhe	1–1,5 m	Wuchsform	Strauch, überhängend, dreiteilige Dornen
Blütezeit	Apr–Mai	Blütenfarbe	grünlich bis rötlich, hängend, einzeln
Blattform	einfach, 3–5-lappig, klein	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	gelb		

Standort	Halbschatten / frisch	Bodenart	skelettreich, Grus/Schotter · Hn/Hu — humos bis anmoorig
Boden	steinig, humos	Lebensbereich	GR2
Geselligkeit	II	Stück je m²	1 / 2 m²
Ausbreitung	dornig	Vorkommen	Mittel- und Nordhessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Frühe Blüte; Ernteprodukt; dorniger Schutz

Essbar: ja (Beeren) · Ernte Jun–Aug · Kompott, Marmelade

Praxis: Mehltauanfälligkeit — luftige Standorte wählen, nicht in Heckeninnenlage.

Wolliger Schneeball *Viburnum lantana*



VOLL

GEK-057

giftig

Höhe	2–4 m	Wuchsform	Strauch, aufrecht, kompakt
Blütezeit	Mai–Jun	Blütenfarbe	cremeweiß, flache Schirmrispen
Blattform	einfach, breit eiförmig, runzelig, unterseits sternförmig	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	gelbbraun bis rot		

Standort	Sonne–HS / trocken	Bodenart	L-tL über Kalk
Boden	kalkig	Lebensbereich	GR1
Geselligkeit	II	Stück je m²	1 / 3 m²
Ausbreitung	aufrecht	Vorkommen	Süd- und Mittelhessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Blüte für Käfer und Schwebfliegen; Früchte rot bis schwarz reifend

Giftigkeit: Früchte schwach giftig

Praxis: Trockenheitsverträglich, guter Klimastrauch.

Wollrose *Rosa tomentosa*

VOLL

GEK-058

essbar

Höhe	1–2 m
Blütezeit	Jun
Blattform	unpaarig gefiedert, beidseitig filzig behaart
Herbstfärbung	gelblich

Wuchsform	Strauch, aufrecht
Blütenfarbe	blassrosa
Blattstellung	wechselständig

Standort	Sonne / frisch	Bodenart	L–tL über Kalk
Boden	kalkig	Lebensbereich	GR1
Geselligkeit	II	Stück je m²	1 / 2,5 m²
Ausbreitung	dornig	Vorkommen	Mittelhessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Filzige Blätter, Hagebutten**Essbar:** ja · Ernte Sep–Okt · Tee**Praxis:** —**Zweiggriffeliger Weißdorn** *Crataegus laevigata*

VOLL

GEK-059

essbar

Höhe	2–5 m
Blütezeit	Mai
Blattform	einfach, flach 3-lappig, breitere Lappen
Herbstfärbung	gelbbraun

Wuchsform	Großstrauch, dornig
Blütenfarbe	weiß, zwei Griffel
Blattstellung	wechselständig

Standort	Halbschatten / frisch	Bodenart	sL–L — sandiger bis reiner Lehm
Boden	lehmig	Lebensbereich	GR2
Geselligkeit	II	Stück je m²	1 / 3 m²
Ausbreitung	aufrecht, dornig	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Wie *C. monogyna*, verträgt mehr Schatten**Essbar:** ja · Ernte Sep–Nov · Mus, Gelee**Praxis:** Ebenfalls Feuerbrand-Wirtspflanze.

Kleinsträucher bis 2 Meter

10 Arten

Für Grundstücke unter 400 Quadratmetern. Enthält die heimischen Immergrünen als Ersatz für Thuja und Kirschlorbeer.

Alpen-Johannisbeere *Ribes alpinum*



VOLL

GEK-060

essbar

Höhe	100-150 cm	Wuchsform	Kleinstrauch, dicht, sehr schnittfest
Blütezeit	Apr-Mai	Blütenfarbe	grünlichgelb, aufrechte Trauben
Blattform	einfach, 3-lappig, klein, glänzend	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	gelb		
Standort	HS-Schatten / frisch	Bodenart	sL-L — sandiger bis reiner Lehm · L-tL über Kalk
Boden	kalkhaltig, lehmig	Lebensbereich	G2
Geselligkeit	III	Stück je m²	2-3 / lfd. m Hecke
Ausbreitung	aufrecht, schnittfest	Vorkommen	Fels-/Mittelgebirgslagen
Status	regional indigen		

Ökologische Funktion: Sehr frühe Blüte; Vogelbeeren; schnittverträgliche niedrige Hecke

Essbar: Früchte fad, ungiftig

Praxis: Die beste heimische Antwort auf 'niedrige, schattenverträgliche Formhecke'. Ersetzt Liguster-Sorten und Lonicera nitida.

Bibernell-Rose *Rosa spinosissima*



VOLL

GEK-061

essbar

Höhe	60-150 cm	Wuchsform	Kleinstrauch, dicht bestachelt, Wurzelausläufer
Blütezeit	Mai-Jun	Blütenfarbe	cremeweiß, einzeln, ungefüllt
Blattform	unpaarig gefiedert, 7-11 sehr kleine Fiedern	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	braunrot		
Standort	Sonne / trocken	Bodenart	S-IS — sandig · L-tL über Kalk · S-IS, mager
Boden	sandig, kalkig, mager	Lebensbereich	H1, St1
Geselligkeit	III	Stück je m²	1 / 1,5 m²
Ausbreitung	Wurzelausläufer	Vorkommen	Sand-/Kalkstandorte
Status	regional indigen		

Ökologische Funktion: Pollenblume für Wildbienen; schwarze Hagebutten; dorniger Vogelschutz

Essbar: Hagebutten essbar

Praxis: Ausläuferbildend – Wurzelsperre oder Freifläche einplanen. Extrem trockenheitsresistent (Klimaanpassung).

Eibe *Taxus baccata*



VOLL

GEK-062

essbar

giftig

§ geschützt

immergrün

Höhe	150-500 (schnittfest)	Wuchsform	Strauch bis Baum, extrem schnittfest
Blütezeit	Mär-Apr	Blütenfarbe	unscheinbar, zweihäusig
Blattform	Nadeln flach, weich, zweizeilig gescheitelt, unterseits mattgrün	Blattstellung	spiralig, zweizeilig gescheitelt
Herbstfärbung	immergrün, dunkelgrün		
Standort	Schatten-Sonne / frisch	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig · L-tL über Kalk
Boden	kalkhaltig, humos	Lebensbereich	G2
Geselligkeit	II	Stück je m²	2-3 / lfd. m
Ausbreitung	sehr schnittfest	Vorkommen	Kalk-/Schluchtwaldlagen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Immergrüne Hecke; Samenmantel für Vögel; dichte Nistdeckung

Essbar: Samenmantel ungiftig, Samen tödlich giftig

Giftigkeit: STARK GIFTIG (Taxin)

Schutzstatus: besonders geschützt (BartSchV)

Praxis: Formschnittfähig wie Buchs, ohne Zünsler. Giftigkeit dokumentieren; nicht auf Pferdeweiden-Grenzen.

Faulbaum *Frangula alnus*

VOLL

GEK-063

giftig

Höhe	150-400 cm	Wuchsform	Strauch, aufrecht, dornenlos
Blütezeit	Mai-Sep (Dauerblüher)	Blütenfarbe	grünlichweiß, unscheinbar, dauerblühend
Blattform	einfach, verkehrt-eiförmig, ganzrandig, Bogennerven	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	gelb		

Standort	HS / feucht	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig · sL-L, Auelehm · S-IS, sauer
Boden	sauer, humos	Lebensbereich	WR3, G3
Geselligkeit	II	Stück je m²	1 / 3 m²
Ausbreitung	aufrecht	Vorkommen	Feucht-/Moorstandorte
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Blüht 4 Monate durch; Raupenfutter Zitronenfalter**Giftigkeit:** Rinde/Früchte abführend giftig**Praxis:** Einziges heimisches Gehölz mit durchgehender Blüte Mai-September. Für die Kategorie 'Insekten' überproportional wertvoll.**Feld-Rose** *Rosa arvensis*

VOLL

GEK-064

essbar

Höhe	50-200 cm	Wuchsform	niederliegend bis kletternd
Blütezeit	Jun-Jul	Blütenfarbe	reinweiß, ungefüllt, Griffel verwachsen
Blattform	unpaarig gefiedert, 5-7 Fiedern	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	gelblich		

Standort	HS / frisch	Bodenart	sL-L — sandiger bis reiner Lehm
Boden	lehmig	Lebensbereich	G2, GR2
Geselligkeit	II	Stück je m²	1 / 2 m²
Ausbreitung	niederliegend/kletternd	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Schattenverträglichste heimische Wildrose**Essbar:** Hagebutten**Praxis:** Einzige Wildrose für halbschattige Lagen.**Gewöhnliche Felsenbirne** *Amelanchier ovalis*

VOLL

GEK-065

essbar

giftig

Höhe	100-200 cm	Wuchsform	Kleinstrauch, aufrecht
Blütezeit	Apr-Mai	Blütenfarbe	reinweiß, aufrechte Trauben
Blattform	einfach, oval, gesägt, jung weißfilzig	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	leuchtend orangerot		

Standort	Sonne / trocken	Bodenart	skelettreich, Grus/Schotter · L-tL über Kalk
Boden	kalkhaltig, skelettreich	Lebensbereich	FS1, St1
Geselligkeit	II	Stück je m²	1 / 2 m²
Ausbreitung	aufrecht	Vorkommen	Kalkfels-/Trockenlagen
Status	regional indigen		

Ökologische Funktion: Frühe Blüte; Früchte für Vögel und Menschen; Herbstfärbung**Essbar:** ja (Früchte)**Giftigkeit:** Samen enthalten Blausäureglykoside**Praxis:** WICHTIG: Die im Handel dominierende *Amelanchier lamarckii* ist ein Neophyt aus Nordamerika. Nur *A. ovalis* ist heimisch – Verwechslung im Einkauf aktiv prüfen.

Gewöhnliche Zwergmispel *Cotoneaster integerrimus*



VOLL

GEK-066

giftig

Höhe	50–150 cm	Wuchsform	Kleinstrauch, breit ausladend
Blütezeit	Mai–Jun	Blütenfarbe	blassrosa, nickend, klein
Blattform	einfach, rundlich, ganzrandig, unterseits filzig	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	gelb bis rötlich		
Standort	Sonne / trocken	Bodenart	skelettreich, Grus/Schotter · L–tL über Kalk
Boden	kalkhaltig, skelettreich	Lebensbereich	FS1, St1
Geselligkeit	II	Stück je m²	1 / 2 m²
Ausbreitung	aufrecht/breit	Vorkommen	Kalkfelslagen
Status	regional indigen, selten		

Ökologische Funktion: Hummelblüte; rote Früchte für Vögel

Giftigkeit: schwach giftig

Praxis: Der einzige heimische Cotoneaster. Ersetzt *C. dammeri/horizontalis* (China, Feuerbrand-Wirtspflanze).

Ohr-Weide *Salix aurita*



VOLL

GEK-067

Höhe	100–300 cm	Wuchsform	Kleinstrauch, buschig
Blütezeit	Mär–Apr	Blütenfarbe	gelbliche Kätzchen
Blattform	einfach, verkehrt-eiförmig, runzelig, Öhrchen am Stiel	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	gelblich		
Standort	Sonne–HS / feucht-nass	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig · sL–L, Auelehm · S–IS, sauer
Boden	sauer, moorig	Lebensbereich	WR3
Geselligkeit	II	Stück je m²	1 / 3 m²
Ausbreitung	aufrecht, buschig	Vorkommen	Feucht-/Moorstandorte
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Sehr früher Pollen; Raupenfutter für über 100 Falterarten

Praxis: Für Regenmulden und Teichränder – die kleinste heimische Buschweide.

Rote Heckenkirsche *Lonicera xylosteum*



VOLL

GEK-068

giftig

Höhe	100–200 cm	Wuchsform	Strauch, breit, dicht verzweigt
Blütezeit	Mai–Jun	Blütenfarbe	gelblichweiß, paarweise
Blattform	einfach, breit eiförmig, ganzrandig, beidseitig behaart	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	gelb		
Standort	HS–Schatten / frisch	Bodenart	sL–L — sandiger bis reiner Lehm · L–tL über Kalk
Boden	kalkhaltig, lehmig	Lebensbereich	G2
Geselligkeit	II	Stück je m²	1 / 1,5 m²
Ausbreitung	aufrecht	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Hummelblüte; Vogelnährgehölz; dichte Nistdeckung

Giftigkeit: Beeren für Menschen giftig

Praxis: Heimischer Ersatz für *Lonicera nitida/pileata* (China). Verträgt Wurzeldruck und Schatten – Nordseite von Reihenhäusern.

Stechpalme *Ilex aquifolium*

VOLL

GEK-069

giftig § geschützt immergrün

Höhe	150-400 (Strauchschnitt)	Wuchsform	Strauch bis Kleinbaum, sehr schnittfest
Blütezeit	Mai-Jun	Blütenfarbe	weiß, klein, zweihäusig
Blattform	einfach, ledrig, wellig, dornig gezähnt, glänzend	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	immergrün, dunkelgrün glänzend		
Standort	HS-Schatten / frisch	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig · sL-L, Auelehm · S-IS, sauer
Boden	sauer bis neutral, humos	Lebensbereich	G2
Geselligkeit	II	Stück je m²	2-3 / lfd. m
Ausbreitung	langsam, schnittfest	Vorkommen	West-/Mittelhessen (atlantisch getönt)
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Immergrüne Deckung; Winterbeeren für Vögel; Blüte für Bienen

Giftigkeit: Beeren giftig

Schutzstatus: besonders geschützt (BartSchV)

Praxis: Die heimische Kirschlorbeer-Alternative. Zweihäusig – für Fruchtschmuck männliche und weibliche Pflanzen setzen. Nur Baumschulware, Naturentnahme verboten.

Halb- und Zwergsträucher

12 Arten

Die Schicht zwischen Staude und Strauch. Verholzt, oft wintergrün, damit auch im Februar strukturgebend.

Behaarter Ginster *Genista pilosa*



VOLL

GEK-070

Höhe	20–40 cm	Wuchsform	Zwergstrauch, niederliegend
Blütezeit	Mai–Jun	Blütenfarbe	goldgelb, Schmetterlingsblüte
Blattform	einfach, klein, unterseits seidig behaart	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	keine		

Standort	Sonne / trocken	Bodenart	S-IS — sandig · S-IS, mager · sL-L, Auelehm · S-IS, sauer
Boden	sauer, sandig, mager	Lebensbereich	H1, St1
Geselligkeit	IV	Stück je m²	4–5
Ausbreitung	niederliegend	Vorkommen	Sand-/Heidegebiete
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Bodendeckender Zwergstrauch auf Sautersand

Praxis: Deckt Böschungen auf saurem Sand ohne Bewässerung.

Berg-Gamander *Teucrium montanum*



BEDINGT

GEK-071

immergrün			
Höhe	5–15 cm	Wuchsform	Polster, niederliegend
Blütezeit	Jun–Aug	Blütenfarbe	gelblichweiß
Blattform	einfach, schmal, Rand umgerollt, unterseits filzig	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	immergrün, graugrün		

Standort	Sonne / trocken	Bodenart	skelettreich, Grus/Schotter · L-tL über Kalk
Boden	kalkhaltig, skelettreich	Lebensbereich	FS1
Geselligkeit	IV	Stück je m²	10–12
Ausbreitung	Polster	Vorkommen	Kalkfelslagen
Status	regional indigen, selten		

Ökologische Funktion: Kalkfels-Spezialist

Praxis: Sehr selten – nur zertifizierte Vermehrungsware, keine Naturentnahme.

Besenheide / Heidekraut *Calluna vulgaris*



VOLL

GEK-072

immergrün			
Höhe	20–50 cm	Wuchsform	Zwergstrauch, polsterartig
Blütezeit	Aug–Sep	Blütenfarbe	rosaviolett bis weiß, Ähren
Blattform	schuppenförmig, sehr klein, dachziegelig	Blattstellung	gegenständig, vierzeilig
Herbstfärbung	immergrün, im Winter bronzefarben		

Standort	Sonne / trocken-frisch	Bodenart	S-IS, mager · sL-L, Auelehm · S-IS, sauer
Boden	stark sauer (pH 3,5–5), mager	Lebensbereich	H1
Geselligkeit	V	Stück je m²	6–8
Ausbreitung	Polster	Vorkommen	Nord-/Osthessen, Spessart, Odenwald
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Spätsommer-Massentracht; Seidenbiene *Colletes succinctus* (monolektisch); Heidespezialisten

Praxis: Braucht echten Sauerboden. Auf Rhein-Main-Lösslehm ohne Bodenaustausch chancenlos – häufigster Planungsfehler. Rückschnitt jährlich ins mehrjährige Holz vermeiden.

Deutscher Ginster *Genista germanica*



VOLL

GEK-073

Höhe	20–50 cm
Blütezeit	Mai–Jun
Blattform	einfach, lanzettlich, behaart
Herbstfärbung	keine

Wuchsform	Zwergstrauch, dornig
Blütenfarbe	goldgelb, kurze Trauben
Blattstellung	wechselständig

Standort	Sonne / trocken	Bodenart	S–IS, mager · sL–L, Auelehm · S–IS, sauer
Boden	sauer, mager	Lebensbereich	H1
Geselligkeit	III	Stück je m²	3–4
Ausbreitung	dornig	Vorkommen	Magerstandorte
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Dorniger Schutz für Kleinvögel; N2-Fixierung

Praxis: —

Edel-Gamander *Teucrium chamaedrys*



VOLL

GEK-074

immergrün

Höhe	15–30 cm
Blütezeit	Jul–Sep
Blattform	einfach, klein, eichenblattartig gekerbt, glänzend
Herbstfärbung	immergrün, glänzend dunkelgrün

Wuchsform	Zwergstrauch, aufrecht, schnittfest
Blütenfarbe	purpurrosa, Lippenblüte ohne Oberlippe
Blattstellung	gegenständig

Standort	Sonne / trocken	Bodenart	L–tL über Kalk
Boden	kalkhaltig, warm	Lebensbereich	St1, FS1
Geselligkeit	IV	Stück je m²	8–10
Ausbreitung	Ausläufer	Vorkommen	Wärmelagen Südhessen/Rheingau
Status	regional indigen		

Ökologische Funktion: Spätsommer-Nektar; Wollbienen, Falter

Praxis: Wintergrüne, schnittverträgliche heimische Alternative zu Buxus – auch als niedrige Einfassung. Kein Buchsbaumzünsler-Risiko.

Feld-Beifuß *Artemisia campestris*



VOLL

GEK-075

Höhe	30–60 cm
Blütezeit	Jul–Sep
Blattform	fein 2–3-fach fiederteilig, fadenförmige Zipfel
Herbstfärbung	graugrün, wintergrüne Rosette

Wuchsform	Halbstrauch, aufsteigend
Blütenfarbe	gelblich bis rötlich, unscheinbare Körbchen
Blattstellung	wechselständig

Standort	Sonne / trocken	Bodenart	S–IS — sandig · S–IS, mager
Boden	sandig, mager	Lebensbereich	H1, FS1
Geselligkeit	II	Stück je m²	4–5
Ausbreitung	horstig	Vorkommen	Rhein-Main-Sandgebiete
Status	regional indigen		

Ökologische Funktion: Sandtrockenrasen-Leitart; spezialisierte Käfer und Wildbienen

Praxis: Charakterart genau des Naturraums, in dem GartenArt arbeitet – regionaler Alleinstellungswert.

Gewöhnliches Sonnenröschen *Helianthemum nummularium*



VOLL

GEK-076

Höhe	10–30 cm	Wuchsform	Zwergstrauch, niederliegend
Blütezeit	Jun–Sep	Blütenfarbe	leuchtend gelb, 5 Kronblätter, zerknittert
Blattform	einfach, elliptisch, unterseits filzig, Nebenblätter	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	teils wintergrün		

Standort	Sonne / trocken	Bodenart	L–tL über Kalk · S–IS, mager
Boden	kalkhaltig, mager	Lebensbereich	St1, FS1
Geselligkeit	IV	Stück je m²	7–9
Ausbreitung	niederliegend	Vorkommen	Kalkmagerrasen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Raupenfutter mehrerer Bläulingsarten; Pollenblume ohne Nektar

Praxis: Pollenblume: liefert keinen Nektar. Immer mit Nektarquellen kombinieren – ein Detail, das echte Fachlichkeit belegt.

Heidelbeere *Vaccinium myrtillus*



VOLL

GEK-077

essbar

Höhe	20–50 cm	Wuchsform	Zwergstrauch, Triebe grün kantig
Blütezeit	Apr–Jun	Blütenfarbe	grünlichrosa, kugelig-glockig
Blattform	einfach, eiförmig, fein gesägt, hellgrün	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	leuchtend rot		

Standort	HS / frisch	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig · sL–L, Auelehm · S–IS, sauer
Boden	sauer, humos	Lebensbereich	G1, H1
Geselligkeit	V	Stück je m²	6–8
Ausbreitung	Rhizom	Vorkommen	Mittelgebirge, Nordhessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Frühe Hummeltracht; Raupenfutter zahlreicher Falter; Ernteprodukt

Essbar: ja (Früchte)

Praxis: Verbindet Modul 2 (essbar) und Modul 4. Kulturheidelbeere (*V. corymbosum*) ist Nordamerika – nicht anrechenbar.

Hufeisenklee *Hippocrepis comosa*



VOLL

GEK-078

Höhe	10–30 cm	Wuchsform	niederliegend, mattenbildend
Blütezeit	Mai–Jul	Blütenfarbe	goldgelb, Schmetterlingsblüte, Dolde
Blattform	unpaarig gefiedert, 7–15 kleine Fiedern	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	teils wintergrün		

Standort	Sonne / trocken	Bodenart	L–tL über Kalk · S–IS, mager
Boden	kalkhaltig, mager	Lebensbereich	St1, FS1
Geselligkeit	IV	Stück je m²	8–10
Ausbreitung	niederliegend	Vorkommen	Kalkmagerrasen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Raupenfutter Bläulinge (u. a. *Polyommatus*); N2-Fixierung

Praxis: —

Kriech-Weide *Salix repens*

VOLL

GEK-079

Höhe	30-100 cm	Wuchsform	Zwergstrauch, kriechend, wurzelnd
Blütezeit	Mär-Apr	Blütenfarbe	gelbliche Kätzchen
Blattform	einfach, klein, elliptisch, seidig silbrig behaart	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	gelblich		

Standort	Sonne / feucht-wechselfeucht	Bodenart	S-IS — sandig · Hn/Hu — humos bis anmoorig · sL-L, Auelehm · S-IS, sauer
Boden	sauer, sandig bis moorig	Lebensbereich	WR3, H1
Geselligkeit	IV	Stück je m²	2-3
Ausbreitung	kriechend, wurzelnd	Vorkommen	Sand-/Moorstandorte
Status	regional indigen		

Ökologische Funktion: Sehr früher Pollen/Nektar (Sandbienen); Raupenfutter zahlreicher Falter

Praxis: Weiden sind die wichtigste Frühjahrs-Pollenquelle überhaupt. In Kleingärten die einzige realistische Weiden-Option.

Preiselbeere *Vaccinium vitis-idaea*

VOLL

GEK-080

☐ essbar ☒ immergrün

Höhe	10-30 cm	Wuchsform	Zwergstrauch, kriechend
Blütezeit	Mai-Jun / Jul-Aug	Blütenfarbe	weiß bis zartrosa, glockig, Trauben
Blattform	einfach, ledrig, verkehrt-eiförmig, Rand umgerollt	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	immergrün, dunkelgrün		

Standort	HS / frisch	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig · sL-L, Auelehm · S-IS, sauer
Boden	stark sauer, humos	Lebensbereich	H1
Geselligkeit	V	Stück je m²	8-10
Ausbreitung	Rhizom	Vorkommen	Rhön, Hochlagen
Status	regional indigen		

Ökologische Funktion: Wintergrün, zweimal blühend; Früchte

Essbar: ja (Früchte, gekocht)

Praxis: In Rhein-Main nur mit Substrataufbau realistisch.

Seidelbast *Daphne mezereum*

BEDINGT

GEK-081

☒ giftig ☒ § geschützt

Höhe	50-120 cm	Wuchsform	Kleinstrauch, aufrecht, wenig verzweigt
Blütezeit	Feb-Mär	Blütenfarbe	purpurrosa, direkt am Trieb, stark duftend, vor dem Laub
Blattform	einfach, verkehrt-lanzettlich, in Trieb-Endrosetten	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	gelb		

Standort	HS / frisch	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig · L-tL über Kalk
Boden	kalkhaltig, humos	Lebensbereich	G2
Geselligkeit	I	Stück je m²	1-2
Ausbreitung	aufrecht, langsam	Vorkommen	Buchen-/Kalklagen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Früheste Gehölzblüte überhaupt; Nektar für Winterüberwinterer

Giftigkeit: STARK GIFTIG (alle Teile, Beeren tödlich)

Schutzstatus: besonders geschützt (BartSchV)

Praxis: Nicht in Gärten mit Kleinkindern. Giftigkeit schriftlich in die Übergabedokumentation aufnehmen – Haftungsthema.

Stauden und Wildkräuter

33 Arten

Die Krautschicht. Trägt den größten Teil der Blühleistung von März bis Oktober.

Berg-Flockenblume *Centaurea montana*



VOLL

GEK-082

Höhe	30–60 cm	Wuchsform	Horst mit Ausläufern
Blütezeit	Mai–Jul	Blütenfarbe	kornblumenblau, große Körbchen
Blattform	einfach, lanzettlich, am Stängel herablaufend	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	keine		

Standort	Halbschatten / frisch	Bodenart	sL–L — sandiger bis reiner Lehm
Boden	lehmig	Lebensbereich	GR2
Geselligkeit	III	Stück je m²	5–7 / m²
Ausbreitung	Ausläufer	Vorkommen	Mittelgebirgslagen
Status	regional indigen		

Ökologische Funktion: Frühe Hummelweide; verträgt Halbschatten

Praxis: In Hessen nur in Höhenlagen natürlich; im Flachland gepflanzt. Regional prüfen.

Blutweiderich *Lythrum salicaria*



VOLL

GEK-083

Höhe	60–120 cm	Wuchsform	straff aufrechter Horst
Blütezeit	Jun–Sep	Blütenfarbe	purpurrosa, dichte Scheinähren
Blattform	schmal lanzettlich, sitzend, weidenartig	Blattstellung	gegenständig bis quirlig
Herbstfärbung	gelbrot		

Standort	Sonne / feucht-nass	Bodenart	sL–L, nährstoffreich
Boden	nährstoffreich	Lebensbereich	WR3
Geselligkeit	III	Stück je m²	4–5 / m²
Ausbreitung	horstig	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Hervorragende Hummel- und Falterweide; Ufer- und Regenmuldenzone

Praxis: Beste Art für die Böschung von Versickerungsmulden — verbindet Wasser- und Insektenkategorie.

Brennnessel *Urtica dioica*



VOLL

GEK-106

essbar

Höhe	60–150 cm	Wuchsform	Rhizom, straff aufrecht
Blütezeit	Jul–Okt	Blütenfarbe	grünlich, hängende Rispen, zweihäusig
Blattform	einfach, herzförmig, grob gesägt, Brennhaare	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	keine		

Standort	Sonne–HS / frisch	Bodenart	L, stark N-versorgt
Boden	stickstoffreich	Lebensbereich	Fr2, GR2
Geselligkeit	V	Stück je m²	4–5 / m²
Ausbreitung	Rhizom	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Raupenfutter von Tagpfauenauge, Kleiner Fuchs, Admiral und Landkärtchen — für diese Arten alternativlos

Essbar: ja (junge Blätter, Tribspitzen) · Ernte Feb–Jun · Tee, Suppe, Spinat-Ersatz, Jauche

Praxis: Ohne Brennnessel keine Tagpfauenaugen. Eine sonnige Fläche ab 2 m² an einer ungestörten Ecke ist ökologisch wirksamer als die meisten gekauften Insektenhotels — und kostet nichts.

Bärlauch *Allium ursinum*

VOLL

GEK-084

essbar

Höhe	20–50 cm	Wuchsform	Zwiebel, flächig
Blütezeit	Apr–Mai	Blütenfarbe	reinweiß, sternförmig, in Scheindolde
Blattform	breit lanzettlich, gestielt, Parallelnerven, Knoblauchgeruch	Blattstellung	grundständig
Herbstfärbung	keine, zieht im Juni ein		

Standort	Schatten / feucht	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig · L-tL, basenreich
Boden	humos, basenreich	Lebensbereich	G3
Geselligkeit	V	Stück je m²	20–25 / m²
Ausbreitung	Zwiebel, Selbstausaat	Vorkommen	Auwald, Kalklagen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Frühe Nektarquelle; flächige Frühjahrsdecke unter Gehölzen

Essbar: ja (Blätter, Blüten, Zwiebel) · Ernte Mär–Mai · Pesto, Butter, Quark

Praxis: LEBENSGEFÄHRLICHE VERWECHSLUNG mit Herbstzeitlose und Maiglöckchen. Sicheres Merkmal ist der Knoblauchgeruch beim Zerreiben — aber nur beim ERSTEN Blatt, danach haften die Finger. Bei Workshops schriftlicher Haftungshinweis.

Wirtschaftlich: 20 m² ergeben 200–400 €/Jahr.

Echter Aronstab *Arum maculatum*

BEDINGT

GEK-085

giftig

Höhe	20–50 cm	Wuchsform	Knolle
Blütezeit	Apr–Mai	Blütenfarbe	Kolben mit grünem Hochblatt, dann roter Fruchtstand
Blattform	pfeilförmig, glänzend, oft dunkel gefleckt	Blattstellung	grundständig
Herbstfärbung	keine, zieht ein		

Standort	Schatten / frisch-feucht	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig
Boden	humos	Lebensbereich	G2
Geselligkeit	III	Stück je m²	7–9 / m²
Ausbreitung	Knolle	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Kesselfallenblüte mit Mückenbestäubung; roter Fruchtstand

Giftigkeit: STARK GIFTIG (alle Teile, besonders Beeren)

Praxis: Leuchtend rote Beeren im Sommer sind für Kinder attraktiv. NICHT in Familiengärten. In der Quelle stand er ohne jede Warnung in der Staudentabelle.

Korrektur gegenüber der Ausgangsquelle: Giftigkeit in der Quelle nicht vermerkt — schwerwiegende Auslassung

Echtes Labkraut *Galium verum*

VOLL

GEK-086

essbar

Höhe	30–80 cm	Wuchsform	Rhizom, aufsteigend
Blütezeit	Jun–Sep	Blütenfarbe	leuchtend goldgelb, dichte Rispen, honigduftend
Blattform	nadelförmig schmal, im Quirl zu 8–12	Blattstellung	quirlständig
Herbstfärbung	keine		

Standort	Sonne / trocken	Bodenart	S-IS, mager
Boden	mager	Lebensbereich	Fr1, H1
Geselligkeit	IV	Stück je m²	7–9 / m²
Ausbreitung	Rhizom	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Honigduftende Blüte; Raupenfutter mehrerer Schwärmerarten

Essbar: ja (Blüten, Kraut) · Ernte Jun–Sep · Käseherstellung (Lab), Tee, Duftkraut

Praxis: —

Feld-Mannstreu *Eryngium campestre*

VOLL

GEK-087

§ geschützt

Höhe	30–60 cm	Wuchsform	Horst, Pfahlwurzel
Blütezeit	Jul–Sep	Blütenfarbe	weißlichgrün, distelartige Köpfchen
Blattform	fiederteilig, sehr derb, stachelig, blaugrün	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	Winterskelett, Steppenroller		
Standort	Sonne / trocken	Bodenart	L–tL über Kalk
Boden	kalkig	Lebensbereich	St1, FS1
Geselligkeit	II	Stück je m²	5–7 / m²
Ausbreitung	Pfahlwurzel	Vorkommen	Wärmelagen Südhessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Käfer, Wespen und Wildbienen; Winterstruktur als Steppenroller**Schutzstatus:** besonders geschützt (BartSchV)**Praxis:** Tiefe Pfahlwurzel — nach dem Pflanzen nicht mehr versetzbar. Extrem trockenheitsfest.**Korrektur gegenüber der Ausgangsquelle:** Schutzstatus in der Quelle nicht vermerkt**Gewöhnlicher Hornklee** *Lotus corniculatus*

VOLL

GEK-088

Höhe	10–30 cm	Wuchsform	niederliegend bis aufsteigend, Pfahlwurzel
Blütezeit	Mai–Sep	Blütenfarbe	goldgelb, oft rot überlaufen, Dolde zu 3–7
Blattform	gefiedert, 5-zählig (3 oben, 2 als Nebenblätter)	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	keine		
Standort	Sonne / frisch-trocken	Bodenart	S-IS, mager
Boden	mager	Lebensbereich	Fr1, Fr2
Geselligkeit	IV	Stück je m²	8–10 / m²
Ausbreitung	tiefwurzelnd	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Raupenfutter des Hauhechel-Bläulings und weiterer Arten; N2-Fixierung**Praxis:** Einer der wenigen echten Raupenfutter-Bodendecker – zählt direkt auf die GEK-Kategorie 'Insekten' ein, nicht nur auf 'Blüten'.**Giersch** *Aegopodium podagraria*

NEIN

GEK-107

essbar

Höhe	30–90 cm	Wuchsform	aggressive Rhizome, flächig
Blütezeit	Jun–Jul	Blütenfarbe	weiß, Dolden
Blattform	doppelt dreizählig, Blattstiel dreikantig	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	keine		
Standort	Sonne–HS / frisch	Bodenart	sL–L, nährstoffreich
Boden	nährstoffreich	Lebensbereich	G2, GR2
Geselligkeit	V	Ausbreitung	aggressive Rhizome
Vorkommen	ganz Hessen	Status	indigen

Ökologische Funktion: Doldenblüte für Schwebfliegen und Käfer**Essbar:** ja (junge Blätter) · Ernte Apr–Jun · Smoothie, Salat, Spinat-Ersatz**Praxis:** NICHT PFLANZEN. Rhizome regenerieren aus jedem Bruchstück; eine Ansiedlung ist praktisch irreversibel. Nur als vorhandener Bestand nutzen — dann aber ehrlich als Ernteprodukt vermarkten statt aussichtslos zu bekämpfen.**Korrektur gegenüber der Ausgangsquelle:** Als 'nein' gesetzt — Modul 2 führte ihn ohne Warnung als Nutzpflanze

Großes Hexenkraut *Circaea lutetiana*



VOLL

GEK-089

Höhe	20–60 cm
Blütezeit	Jun–Aug
Blattform	einfach, eiförmig, entfernt gezähnt
Herbstfärbung	keine

Wuchsform	Ausläufer, flächig
Blütenfarbe	weiß bis blassrosa, sehr klein, zweizählig
Blattstellung	gegenständig

Standort	Schatten / feucht	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig
Boden	humos	Lebensbereich	G3
Geselligkeit	IV	Stück je m²	7–9 / m²
Ausbreitung	Ausläufer	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Schattenverträglicher Lückenfüller; geringer Blühwert

Praxis: Ökologisch schwach und ausläuferbildend. Nur als Begleitart, nie als Leitart planen.

Großes Windröschen *Anemone sylvestris*



VOLL

GEK-090

giftig § geschützt

Höhe	20–40 cm
Blütezeit	Apr–Jun
Blattform	3-zählig, tief geteilt, behaart
Herbstfärbung	keine

Wuchsform	Ausläufer, lockere Bestände
Blütenfarbe	reinweiß, groß, nickend, duftend
Blattstellung	grundständig

Standort	Sonne-HS / frisch	Bodenart	L-tL über Kalk
Boden	kalkig	Lebensbereich	St1, GR1
Geselligkeit	III	Stück je m²	7–9 / m²
Ausbreitung	Ausläufer	Vorkommen	Kalkmagerrasen
Status	indigen, in Hessen selten		

Ökologische Funktion: Frühe Pollenquelle im Halbtrockenrasen

Giftigkeit: giftig (Protoanemonin)

Schutzstatus: besonders geschützt (BartSchV)

Praxis: In Hessen stark gefährdet. Nur zertifizierte Vermehrungsware.

Korrektur gegenüber der Ausgangsquelle: Schutzstatus und Giftigkeit in der Quelle nicht vermerkt

Gänseblümchen *Bellis perennis*



VOLL

GEK-108

essbar

Höhe	5–15 cm
Blütezeit	Mär–Nov
Blattform	spatelförmig, Rosette, gekerbt
Herbstfärbung	wintergrün

Wuchsform	Rosette mit Ausläufern
Blütenfarbe	weiße Zungenblüten, oft rot gespitzt, gelbe Scheibe
Blattstellung	grundständige Rosette

Standort	Sonne / frisch	Bodenart	bodenvag — alle Bodenarten
Boden	alle	Lebensbereich	Fr2
Geselligkeit	V	Stück je m²	Ansaat / Bestand
Ausbreitung	Rosette, Ausläufer	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Blüht fast ganzjährig; erste und letzte Nektarquelle im Rasen

Essbar: ja (Blüten, Blätter) · Ernte Mär–Nov · Salatdeko, Tee, essbare Blüte

Praxis: Verschwindet bei Mahdhöhe unter 5 cm. Der einfachste Beleg dafür, warum die Mahdhöhe im GEK ein eigenes Kriterium ist.

Gänsefingerkraut *Potentilla anserina*



VOLL

GEK-109

essbar

Höhe	10–30 cm	Wuchsform	lange oberirdische Ausläufer
Blütezeit	Mai–Aug	Blütenfarbe	goldgelb, einzeln, langgestielt
Blattform	unpaarig gefiedert, unterseits silbrig seidig	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	keine		
Standort	Sonne / frisch	Bodenart	sL–L, nährstoffreich · tL–T, verdichtet
Boden	verdichtet, nährstoffreich	Lebensbereich	Fr2, WR3
Geselligkeit	V	Stück je m²	8–10 / m²
Ausbreitung	Ausläufer	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Pionier auf verdichteten Böden; silbrige Blattunterseite

Essbar: ja (Blätter, Wurzel) · Ernte Mär–Sep · Tee, junge Blätter als Salat

Praxis: Wächst auf verdichteten Wegrändern, wo sonst nichts wächst — Pionier nach Baustellen.

Kartäuser-Nelke *Dianthus carthusianorum*



VOLL

GEK-091

§ geschützt

Höhe	20–50 cm	Wuchsform	straff aufrechter Horst
Blütezeit	Jun–Sep	Blütenfarbe	karminrot, Köpfchen mit braunen Hüllschuppen
Blattform	schmal linealisch, grasartig, blaugrün	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	wintergrün		
Standort	Sonne / trocken	Bodenart	L–tL über Kalk · S–IS, mager
Boden	kalkig, mager	Lebensbereich	St1, H1
Geselligkeit	III	Stück je m²	9–12 / m²
Ausbreitung	horstig	Vorkommen	Magerrasen, Süd- und Mittelhessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Falterblume für langrüsselige Arten; Magerrasen-Leitart

Schutzstatus: besonders geschützt (BArtSchV)

Praxis: Nur zertifizierte Vermehrungsware — Entnahme aus der Natur verboten.

Korrektur gegenüber der Ausgangsquelle: Schutzstatus in der Quelle nicht vermerkt

Kohldistel *Cirsium oleraceum*



VOLL

GEK-092

essbar

Höhe	60–150 cm	Wuchsform	Horst, aufrecht
Blütezeit	Jun–Sep	Blütenfarbe	blassgelb, Köpfchen mit hellen Hochblättern
Blattform	fiederteilig, weich, nur schwach stachelig	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	keine		
Standort	Halbschatten / feucht	Bodenart	sL–L, nährstoffreich
Boden	nährstoffreich	Lebensbereich	WR3
Geselligkeit	III	Stück je m²	4–5 / m²
Ausbreitung	horstig	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Hummeln und Falter; Feuchtwiesenart

Essbar: junge Blätter · Ernte Apr–Jun · Gemüse (historisch)

Praxis: —

Lungenkraut *Pulmonaria officinalis*

VOLL

GEK-093

Höhe	15–30 cm	Wuchsform	Horst
Blütezeit	Mär–Mai	Blütenfarbe	erst rosa, dann blau, trichterförmig
Blattform	einfach, eiförmig, weiß gefleckt, rau behaart	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	teils wintergrün		

Standort	Halbschatten / frisch	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig
Boden	humos	Lebensbereich	G2
Geselligkeit	IV	Stück je m²	7–9 / m²
Ausbreitung	horstig	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Sehr frühe Hummelweide; Blütenfarbwechsel rosa zu blau signalisiert Nektarstand

Praxis: Der Farbwechsel ist ein Vorführeffekt: rosa Blüten haben Nektar, blaue sind abgeerntet.

Löwenzahn *Taraxacum sect. Ruderalia*

VOLL

GEK-110

essbar

Höhe	10–40 cm	Wuchsform	Rosette, Pfahlwurzel
Blütezeit	Apr–Okt	Blütenfarbe	leuchtend goldgelb, Körbchen aus Zungenblüten
Blattform	schrotsägeförmig gebuchtet, Rosette, Milchsaft	Blattstellung	grundständige Rosette
Herbstfärbung	wintergrüne Rosette		

Standort	Sonne / frisch	Bodenart	sL–L, nährstoffreich
Boden	nährstoffreich	Lebensbereich	Fr2
Geselligkeit	IV	Stück je m²	Selbstaussaat
Ausbreitung	Pfahlwurzel, Flugsamen	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Massentracht im April, wenn kaum etwas anderes blüht; Pollen und Nektar zugleich

Essbar: ja (Blätter, Blüten, Wurzel) · Ernte Mär–Nov · Salat, Kaffee-Ersatz, Löwenzahnhonig, Tee

Praxis: Die erste Mahd erst nach der Löwenzahnblüte — das ist der wirksamste kostenlose Einzelbeitrag zur Insektenkategorie im ganzen System.

Korrektur gegenüber der Ausgangsquelle: Botanischer Name präzisiert: 'Taraxacum off.' ist eine Sammelgruppe, korrekt Taraxacum sect. Ruderalia

Mädesüß *Filipendula ulmaria*

VOLL

GEK-094

essbar

Höhe	80–150 cm	Wuchsform	Rhizom, aufrecht
Blütezeit	Jun–Aug	Blütenfarbe	cremeweiß, dichte Rispen, stark duftend
Blattform	unpaarig gefiedert, unterseits weißfilzig, Endblatt gelappt	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	keine		

Standort	Halbschatten / feucht-nass	Bodenart	sL–L, nährstoffreich
Boden	nährstoffreich	Lebensbereich	WR3
Geselligkeit	III	Stück je m²	4–5 / m²
Ausbreitung	Rhizom	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Duftende Blütenwolke; Pollenblume ohne Nektar; historische Ausgangspflanze der Salicylsäure

Essbar: ja (Blüten, Blätter) · Ernte Jun–Aug · Sirup, Tee, Dessertaroma

Praxis: Pollenblume ohne Nektar — immer mit Nektarquellen kombinieren. Workshop-Thema Mädesüß-Sirup.

Natternkopf *Echium vulgare*

VOLL

GEK-095

Höhe	30–80 cm	Wuchsform	zweijährig, aufrecht, Pfahlwurzel
Blütezeit	Jun–Sep	Blütenfarbe	erst rosa, dann leuchtend blau, Wickel
Blattform	schmal lanzettlich, borstig rau	Blattstellung	wechselständig, grundständige Rosette
Herbstfärbung	wintergrüne Rosette		
Standort	Sonne / trocken	Bodenart	skelettreich, Grus/Schotter · L–tL über Kalk
Boden	kalkig, skelettreich	Lebensbereich	St1, FS1
Geselligkeit	II	Stück je m²	Selbstaussaat
Ausbreitung	zweijährig, Selbstausaat	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Höchste Nektarleistung aller heimischen Stauden; Nektar wird laufend nachproduziert; Natternkopf-Mauerbiene monolektisch

Praxis: Zweijährig — als Dynamik einplanen, nicht als feste Position. Bewährt auf Schotter- und Baustellenböden ohne Oberboden.

Korrektur gegenüber der Ausgangsquelle: Zweijährigkeit in der Quelle nicht vermerkt

Rainfarn *Tanacetum vulgare*

VOLL

GEK-096

giftig

Höhe	60–120 cm	Wuchsform	Rhizom, straff aufrecht
Blütezeit	Jul–Sep	Blütenfarbe	goldgelb, knopfförmige Körbchen ohne Zungenblüten
Blattform	fiederschnittig, farnartig, stark aromatisch	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	keine		
Standort	Sonne / trocken-frisch	Bodenart	sL–L, nährstoffreich
Boden	nährstoffreich	Lebensbereich	Fr2
Geselligkeit	III	Stück je m²	4–5 / m²
Ausbreitung	Rhizom	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Spätsommertracht; Pflanzenjauche zur Schädlingsregulierung

Giftigkeit: giftig (Thujon)

Praxis: Ausläuferbildend, in Staudenbeeten dominant. Besser in Wiesen- oder Saumflächen.

Scharbockskraut *Ficaria verna*

VOLL

GEK-111

essbar

giftig

Höhe	10–20 cm	Wuchsform	Knöllchen, Brutknöllchen, flächig
Blütezeit	Mär–Mai	Blütenfarbe	leuchtend goldgelb, glänzend lackartig
Blattform	einfach, herz- bis nierenförmig, glänzend, fleischig	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	keine, zieht im Mai ein		
Standort	Halbschatten / feucht	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig
Boden	humos	Lebensbereich	G3, WR3
Geselligkeit	V	Stück je m²	15–20 / m²
Ausbreitung	Brutknöllchen	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Sehr frühe Pollen- und Nektarquelle; Frühjahrsephemer

Essbar: ja (NUR jung vor der Blüte) · Ernte Feb–Apr · Frühjahrssalat, vitamin-C-reich

Giftigkeit: nach Blühbeginn giftig (Protoanemonin)

Praxis: Der Giftgehalt steigt mit Blühbeginn sprunghaft. Bei Workshops ist der Erntezeitpunkt haftungsrelevant — schriftlich festhalten.

Schlangen-Knöterich *Bistorta officinalis*



VOLL

GEK-112

essbar

Höhe	30–100 cm	Wuchsform	Rhizom, aufrecht
Blütezeit	Mai–Jul	Blütenfarbe	blassrosa, dichte walzliche Scheinähre
Blattform	länglich, Basis herablaufend, unterseits blaugrün	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	keine		
Standort	Sonne / feucht	Bodenart	sL–L, nährstoffreich
Boden	nährstoffreich	Lebensbereich	WR3
Geselligkeit	IV	Stück je m²	5–7 / m²
Ausbreitung	Rhizom	Vorkommen	Feuchtwiesen, Mittelgebirge
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Feuchtwiesenart; Falter und Wildbienen; Raupenfutter des Blauschillernden Feuerfalters

Essbar: ja (Blätter, Wurzel) · Ernte Apr–Jun · nordeuropäische Küche

Praxis: —

Sumpfdotterblume *Caltha palustris*



VOLL

GEK-097

giftig § geschützt

Höhe	20–50 cm	Wuchsform	Horst, kriechend
Blütezeit	Mär–Mai	Blütenfarbe	leuchtend goldgelb, glänzend, schalenförmig
Blattform	einfach, nierenförmig, glänzend, gekerbt	Blattstellung	wechselständig, grundständig
Herbstfärbung	keine		
Standort	Sonne / nass-feucht	Bodenart	sL–L, nährstoffreich
Boden	nährstoffreich	Lebensbereich	WR3, W3
Geselligkeit	III	Stück je m²	5–7 / m²
Ausbreitung	horstig	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Sehr frühe Nektarquelle an Gewässern

Giftigkeit: giftig (Protoanemonin)

Schutzstatus: besonders geschützt (BartSchV)

Praxis: Nur zertifizierte Vermehrungsware.

Korrektur gegenüber der Ausgangsquelle: Schutzstatus und Giftigkeit in der Quelle nicht vermerkt

Tauben-Skabiose *Scabiosa columbaria*



VOLL

GEK-098

Höhe	30–60 cm	Wuchsform	Horst, lange Blütenstiele
Blütezeit	Jun–Okt	Blütenfarbe	hellblauviolett, flache Körbchen
Blattform	Grundblätter ungeteilt, Stängelblätter fiederschnittig	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	teils wintergrün		
Standort	Sonne / trocken	Bodenart	L–tL über Kalk · S–IS, mager
Boden	kalkig, mager	Lebensbereich	St1, Fr1
Geselligkeit	III	Stück je m²	7–9 / m²
Ausbreitung	horstig	Vorkommen	Kalkmagerrasen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Falter- und Wildbienenmagnet; sehr lange Blühdauer bis Oktober

Praxis: Schließt die Trachtlücke September/Oktober auf Trockenstandorten.

Vogelmiere *Stellaria media*

VOLL

GEK-113

essbar

Höhe	5–30 cm	Wuchsform	einjährig, niederliegend
Blütezeit	ganzjährig	Blütenfarbe	weiß, sehr klein, Kronblätter tief gespalten
Blattform	eiförmig, klein, Stängel mit einreihiger Haarleiste	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	wintergrün		

Standort	Sonne-HS / frisch	Bodenart	sL–L, nährstoffreich
Boden	nährstoffreich	Lebensbereich	Fr2
Geselligkeit	V	Stück je m²	Selbstaussaat
Ausbreitung	Selbstaussaat	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Blüht auch im Winter; Samen für Finken**Essbar:** ja (junges Kraut) · Ernte ganzjährig · Salat — ganzjährig erntefähig**Praxis:** Einjährig, keine Planposition. Als geduldete Dynamik ins Pflegeprotokoll, nicht in die Pflanzliste.**Wiesen-Flockenblume** *Centaurea jacea*

VOLL

GEK-099

Höhe	30–80 cm	Wuchsform	Horst, aufrecht
Blütezeit	Jun–Okt	Blütenfarbe	purpurrosa, Körbchen mit hellbraunen Hüllschuppen
Blattform	einfach, lanzettlich, ungeteilt bis buchtig	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	keine		

Standort	Sonne / frisch-trocken	Bodenart	sL–L, nährstoffreich
Boden	mäßig nährstoffreich	Lebensbereich	Fr2
Geselligkeit	III	Stück je m²	5–7 / m²
Ausbreitung	horstig	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Sehr lange Blühdauer; Falter, Hummeln, Wildbienen; Samen für Distelfink**Praxis:** Samenstände über Winter stehen lassen — Nahrung für Finken und Winterstruktur.**Wiesen-Margerite** *Leucanthemum vulgare*

VOLL

GEK-100

essbar

Höhe	30–80 cm	Wuchsform	Rosettenhorst
Blütezeit	Mai–Aug	Blütenfarbe	weiße Zungenblüten, gelbe Scheibe
Blattform	Grundblätter spatelförmig gekerbt, Stängelblätter schmal	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	wintergrüne Rosette		

Standort	Sonne / frisch	Bodenart	L–tL über Kalk · sL–L, Auelehm · S–IS, sauer
Boden	kalkig-sauer	Lebensbereich	Fr2
Geselligkeit	IV	Stück je m²	7–9 / m²
Ausbreitung	horstig	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Korbblüte für Käfer, Schwebfliegen, Falter; Leitart der Glatthaferwiese**Essbar:** ja (junge Blätter) · Ernte Apr–Mai · Salat**Praxis:** —

Wiesen-Sauerampfer *Rumex acetosa*

VOLL

GEK-114

essbar

giftig

Höhe	30–100 cm	Wuchsform	Horst, Pfahlwurzel
Blütezeit	Mai–Jul	Blütenfarbe	rötlich, Rispen
Blattform	pfeilförmig, saurer Geschmack, gestielt	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	rötlich		

Standort	Sonne / frisch	Bodenart	sL–L, nährstoffreich
Boden	nährstoffreich	Lebensbereich	Fr2
Geselligkeit	III	Stück je m²	5–7 / m²
Ausbreitung	Pfahlwurzel	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Raupenfutter des Kleinen Feuerfalters; Wiesenart**Essbar:** ja (Blätter) · Ernte Mär–Sep · Salat, Suppe, Sauce verte**Giftigkeit:** Oxalsäure — bei Nierenleiden meiden**Praxis:** —**Wiesen-Schafgarbe** *Achillea millefolium*

VOLL

GEK-101

essbar

Höhe	30–60 cm	Wuchsform	Rhizom, aufrecht
Blütezeit	Jun–Okt	Blütenfarbe	weiß bis zartrosa, flache Schirmrispen
Blattform	2–3-fach fiederteilig, fein, aromatisch	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	wintergrün		

Standort	Sonne / frisch-trocken	Bodenart	bodenvag — alle Bodenarten
Boden	alle	Lebensbereich	Fr1, Fr2
Geselligkeit	IV	Stück je m²	7–9 / m²
Ausbreitung	Ausläufer	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Lange Blühdauer; Käfer, Schwebfliegen, Wildbienen**Essbar:** ja (Blätter, Blüten) · Ernte Jun–Okt · Tee, Würzkräut, Heilpflanze**Praxis:** Verträgt Mahd und Tritt — Bestandteil des Kräuterrasens.**Wiesen-Storachschnabel** *Geranium pratense*

VOLL

GEK-102

Höhe	30–60 cm	Wuchsform	Horst, aufrecht
Blütezeit	Jun–Aug	Blütenfarbe	blauviolett, große Blüten
Blattform	rundlich, tief 7-teilig, geschlitzt	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	gelbrot		

Standort	Sonne–HS / frisch	Bodenart	sL–L, nährstoffreich
Boden	nährstoffreich	Lebensbereich	Fr2
Geselligkeit	III	Stück je m²	5–7 / m²
Ausbreitung	horstig	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Pollen und Nektar; Storachschnabel-Scherenbiene**Praxis:** —

Wiesensalbei *Salvia pratensis*



VOLL

GEK-103

essbar

Höhe	30–60 cm	Wuchsform	Rosettenhorst
Blütezeit	Mai–Jul	Blütenfarbe	kräftig blauviolett, Lippenblüte in Scheinquirlen
Blattform	einfach, runzelig, gekerbt, grundständige Rosette	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	wintergrüne Rosette		
Standort	Sonne / frisch-trocken	Bodenart	L–tL über Kalk
Boden	kalkig	Lebensbereich	Fr1, Fr2
Geselligkeit	III	Stück je m²	7–9 / m²
Ausbreitung	horstig	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Hebelmechanismus für Hummeln — lehrreiche Blüte; Massentracht

Essbar: ja (Blätter) · Ernte Mai–Sep · Würzkräut, Tee

Praxis: Der Bestäubungsmechanismus lässt sich vorführen — starkes Element in Führungen und Workshops.

Wilde Möhre *Daucus carota*



VOLL

GEK-104

essbar

Höhe	30–100 cm	Wuchsform	zweijährig, aufrecht, Pfahlwurzel
Blütezeit	Jun–Sep	Blütenfarbe	weiß, Dolde mit schwarzroter Mittelblüte, später Vogelnest
Blattform	2–3-fach fiederteilig, fein	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	Winterskelett		
Standort	Sonne / frisch-trocken	Bodenart	L–tL über Kalk
Boden	kalkig	Lebensbereich	Fr1
Geselligkeit	II	Stück je m²	Selbstaussaat
Ausbreitung	zweijährig, Selbstaussaat	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Doldenblüte für Käfer, Wespen, Schwebfliegen; Raupenfutter des Schwalbenschwanzes

Essbar: ja (Wurzel jung) · Ernte Jun–Sep · Wurzel, Samen als Gewürz

Praxis: TÖDLICHE VERWECHSLUNG mit Geflecktem Schierling (*Conium maculatum*). Merkmal: Wilde Möhre hat behaarten Stängel ohne Flecken und eine schwarze Mittelblüte. Bei Workshops zwingend ansprechen.

Wilder Majoran / Oregano *Origanum vulgare*



VOLL

GEK-105

essbar

Höhe	30–60 cm	Wuchsform	Horst mit Ausläufern
Blütezeit	Jun–Sep	Blütenfarbe	purpurrosa, Trugdolden mit roten Hochblättern
Blattform	einfach, eiförmig, aromatisch	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	keine		
Standort	Sonne / trocken	Bodenart	L–tL über Kalk
Boden	kalkig	Lebensbereich	Fr1, St1
Geselligkeit	IV	Stück je m²	7–9 / m²
Ausbreitung	horstig, Ausläufer	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Eine der besten Falter- und Wildbienenweiden im Hochsommer; Massentracht

Essbar: ja (Blätter) · Ernte Jun–Sep · Gewürz, Tee — heimischer Oregano

Praxis: Verbindet Ökologie, Küche und Verkauf: die überzeugendste Einzelart für Kundengespräche.

Bodendecker

37 Arten

Der Ersatz für Rindenmulch und Schotter. Ohne diese Schicht bleibt der Boden offen, und offener Boden ist Pflegeaufwand.

Arznei-Thymian *Thymus pulegioides*



VOLL

GEK-115

essbar immergrün

Höhe	5-15 cm	Wuchsform	Polster bis aufsteigend
Blütezeit	Jun-Sep	Blütenfarbe	purpurrosa, Scheinquirle
Blattform	einfach, sehr klein, elliptisch, aromatisch, Stängel kantig behaart	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	immergrün		

Standort	Sonne / trocken	Bodenart	L-tL über Kalk · S-IS, mager
Boden	mager, kalkhaltig bis neutral	Lebensbereich	St1, H1
Geselligkeit	V	Stück je m²	10-12
Ausbreitung	polsterbildend	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Top-Wildbienen- und Falterweide; Raupenfutter Thymian-Widderchen

Essbar: ja (Gewürz, Tee)

Praxis: Bedingt trittverträglich – Baustein für den Kräuterrasen als Schotterrasen-Ersatz.

Blut-Storchschnabel *Geranium sanguineum*



VOLL

GEK-116

Höhe	20-40 cm	Wuchsform	Rhizom, breite Polster
Blütezeit	Jun-Aug	Blütenfarbe	leuchtend purpurrot, große Einzelblüten
Blattform	rundlich, tief 5-7-teilig, fein geschlitzt	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	leuchtend rot		

Standort	Sonne / trocken	Bodenart	L-tL über Kalk
Boden	kalkhaltig, warm	Lebensbereich	GR1, St1
Geselligkeit	III	Stück je m²	5-7
Ausbreitung	Rhizom, horstig	Vorkommen	Rheingau, Südhessen (Wärmelagen)
Status	regional indigen		

Ökologische Funktion: Wärmeliebender Saum; Wildbienen

Praxis: Der einzige heimische Storchschnabel mit echter Bodendecker-Wirkung auf Trockenstandorten.

Buschwindröschen *Anemone nemorosa*



VOLL

GEK-117

giftig

Höhe	10-25 cm	Wuchsform	Rhizom, flächig, Frühjahrsephemer
Blütezeit	Mär-Mai	Blütenfarbe	reinweiß, außen rosa überlaufen, einzeln
Blattform	3-zählig, tief eingeschnitten, im Quirl unter der Blüte	Blattstellung	quirlständig
Herbstfärbung	keine, zieht im Juni ein		

Standort	Schatten / frisch	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig · L-tL, basenreich
Boden	humos, basenreich	Lebensbereich	G2
Geselligkeit	V	Stück je m²	15-20 (Rhizome)
Ausbreitung	Rhizom	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Erste Pollenquelle im Laubwald; Frühjahrsaspekt

Giftigkeit: ja (Protoanemonin)

Praxis: Frühjahrsephemer – zieht ab Juni ein. NUR in Kombination mit einer sommergrünen Schicht (z. B. Luzula, Carex) planen.

Echter Ehrenpreis *Veronica officinalis*

VOLL

GEK-118

essbar

Höhe	5–20 cm	Wuchsform	kriechend, an Knoten wurzelnd
Blütezeit	Mai–Aug	Blütenfarbe	hellblau bis lila, aufrechte Trauben
Blattform	einfach, elliptisch, gekerbt, beidseitig behaart	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	teils wintergrün		
Standort	Sonne–HS / trocken–frisch	Bodenart	S–IS, mager · sL–L, Auelehm · S–IS, sauer
Boden	sauer, mager	Lebensbereich	H1, G1
Geselligkeit	IV	Stück je m²	10–12
Ausbreitung	kriechend	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Kleine Wildbienen; magerer Waldrand**Essbar:** ja (Tee)**Praxis:** —**Efeu** *Hedera helix*

VOLL

GEK-119

giftig

immergrün

Höhe	20 (flächig) / bis 20 m kletternd	Wuchsform	Kletterer mit Haftwurzeln, flächig kriechend
Blütezeit	Sep–Okt	Blütenfarbe	gelbgrün, kugelige Dolden, September
Blattform	Jugendform 3–5-lappig, Altersform rautenförmig ganzrandig	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	immergrün, dunkelgrün glänzend		
Standort	HS–Schatten / frisch	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig · L–tL über Kalk
Boden	humos, kalkhaltig bis neutral	Lebensbereich	G2
Geselligkeit	V	Stück je m²	3–4
Ausbreitung	Ranken/Haftwurzeln	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Späteste Nektarquelle des Jahres; Efeu-Seidenbiene (*Colletes hederae*) monolektisch; Winterbeeren für Amsel, Mönchsgrasmücke; Nist- und Winterquartier**Giftigkeit:** Beeren giftig**Praxis:** Blüht erst an Altersform (ab ca. 8–10 J.). Nur Altersform bringt den ökologischen Wert – im Angebot ausdrücklich mitkalkulieren. An gesunden Bäumen kein Parasit.**Felsen-Fetthenne** *Sedum rupestre*

VOLL

GEK-120

immergrün

Höhe	10–20 cm	Wuchsform	Polster mit aufsteigenden Trieben
Blütezeit	Jun–Aug	Blütenfarbe	goldgelb, große Trugdolden
Blattform	dick fleischig, blaugrün bereift, spitz	Blattstellung	dicht spiralig
Herbstfärbung	immergrün, blaugrün		
Standort	Sonne / trocken	Bodenart	skelettreich, Grus/Schotter · S–IS, mager
Boden	mager, skelettreich	Lebensbereich	St1, FS1
Geselligkeit	V	Stück je m²	12–16
Ausbreitung	Polster	Vorkommen	Fels-/Weinberglagen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Trockenmauer, Fels, Dach**Praxis:** —

Frühlings-Fingerkraut *Potentilla neumanniana*



VOLL

GEK-121

Höhe	5–15 cm	Wuchsform	niederliegend, mattenbildend
Blütezeit	Mär–Mai	Blütenfarbe	leuchtend goldgelb, 5 Kronblätter
Blattform	gefingert, 5-zählig, gesägt	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	teils wintergrün		

Standort	Sonne / trocken	Bodenart	L–tL über Kalk · S–IS, mager
Boden	kalkhaltig, mager	Lebensbereich	St1, FS1
Geselligkeit	V	Stück je m²	10–12
Ausbreitung	kriechend	Vorkommen	Kalklagen Süd-/Mittelhessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Sehr frühe Pollenquelle im Magerrasen

Praxis: Deckt die kritische Lücke März/April auf Trockenstandorten.

Gelbes Windröschen *Anemone ranunculoides*



VOLL

GEK-122

giftig

Höhe	10–20 cm	Wuchsform	Rhizom, flächig
Blütezeit	Mär–Apr	Blütenfarbe	leuchtend goldgelb
Blattform	3-zählig, tief geschlitzt	Blattstellung	quirlständig
Herbstfärbung	keine, zieht ein		

Standort	Schatten / frisch	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig · L–tL über Kalk
Boden	humos, kalkhaltig	Lebensbereich	G2
Geselligkeit	V	Stück je m²	15–20
Ausbreitung	Rhizom	Vorkommen	Auen- und Kalklagen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Frühjahrspollen; Ergänzung zum weißen Aspekt

Giftigkeit: ja

Praxis: Wie BD-07: einziehend.

Gewöhnliches Katzenpfötchen *Antennaria dioica*



VOLL

GEK-123

§ geschützt

Höhe	5–15 cm	Wuchsform	Rosette mit Ausläufern
Blütezeit	Mai–Jun	Blütenfarbe	weiß bis rosa, Körbchen, zweihäusig
Blattform	spatelförmig, oberseits grün, unterseits weißfilzig	Blattstellung	grundständige Rosette
Herbstfärbung	wintergrün, silbrig		

Standort	Sonne / trocken	Bodenart	S–IS — sandig · S–IS, mager · sL–L, Auelehm · S–IS, sauer
Boden	sauer, mager, sandig	Lebensbereich	H1, FS1
Geselligkeit	IV	Stück je m²	12–16
Ausbreitung	Ausläufer	Vorkommen	Magerrasen, rückläufig
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Magerrasen-Spezialist; zweihäusig

Schutzstatus: besonders geschützt (BArtSchV)

Praxis: In Hessen stark rückläufig. Nur mit sicherem Herkunftsnachweis – hoher Erzählwert im Zertifikat.

Große Braunelle *Prunella grandiflora*



VOLL

GEK-124

Höhe	15–30 cm	Wuchsform	Rosette mit Ausläufern
Blütezeit	Jun–Aug	Blütenfarbe	kräftig blauviolett, große Lippenblüte
Blattform	einfach, eiförmig, ganzrandig	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	keine		

Standort	Sonne / trocken	Bodenart	L–tL über Kalk · S–IS, mager
Boden	kalkhaltig, mager	Lebensbereich	St1, H1
Geselligkeit	IV	Stück je m²	8–10
Ausbreitung	Ausläufer	Vorkommen	Kalklagen Südhessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Langrüsselige Hummeln, Falter; Kalkmagerrasen

Praxis: Optisch der stärkste heimische Bodendecker auf Kalk.

Große Fetthenne *Hylotelephium maximum*



VOLL

GEK-125

Höhe	30–50 cm	Wuchsform	aufrechter Horst
Blütezeit	Jul–Sep	Blütenfarbe	gelblichweiß, große flache Trugdolden
Blattform	dick fleischig, breit oval, gezähnt, blaugrün	Blattstellung	gegenständig bis quirlig
Herbstfärbung	Winterstruktur bleibt stehen		

Standort	Sonne / trocken	Bodenart	skelettreich, Grus/Schotter · S–IS, mager
Boden	mager, skelettreich	Lebensbereich	FS1, St1
Geselligkeit	II	Stück je m²	5–7
Ausbreitung	horstig	Vorkommen	Fels-/Weinbergslagen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Spätsommer-Nektar; Winterstruktur

Praxis: Heimische Alternative zu Sedum-'Herbstfreude'-Sorten, die als steril und nektararm gelten.

Große Sternmiere *Stellaria holostea*



VOLL

GEK-126

Höhe	20–40 cm	Wuchsform	Rhizom, mit Stützen aufsteigend
Blütezeit	Apr–Jun	Blütenfarbe	reinweiß, Kronblätter bis zur Mitte gespalten
Blattform	schmal lanzettlich, sitzend, steif, rau	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	keine		

Standort	HS / frisch	Bodenart	sL–L — sandiger bis reiner Lehm · sL–L, Auelehm · S–IS, sauer
Boden	lehmig, mäßig sauer	Lebensbereich	GR2
Geselligkeit	IV	Stück je m²	7–9
Ausbreitung	Rhizom	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Raupenfutter mehrerer Eulenfalter; Saumart am Heckenfuß

Praxis: Die klassische Art für den Heckensaum – die Zone, die in Privatgärten fast immer gemulcht statt bepflanzt wird.

Gundermann *Glechoma hederacea*

BEDINGT

GEK-127

essbar giftig

Höhe	10–20 cm	Wuchsform	lange oberirdische Ausläufer
Blütezeit	Apr–Jun	Blütenfarbe	blauviolett, Lippenblüte, achselständig
Blattform	einfach, nierenförmig, gekerbt	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	teils wintergrün		
Standort	HS / frisch-feucht	Bodenart	sL–L — sandiger bis reiner Lehm · sL–L, nährstoffreich
Boden	nährstoffreich, lehmig	Lebensbereich	GR2
Geselligkeit	V	Stück je m²	6–8
Ausbreitung	lange Ausläufer	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Frühe Hummelweide; Wildbienen (Anthophora)**Essbar:** ja (Würzkräut)**Giftigkeit:** in Menge**Praxis:** WARNUNG: wuchert in Rasenflächen. Nur mit Rhizomsperre oder in geschlossenen Pflanzflächen. Für Pflegeabo-Kunden dokumentieren.**Haselwurz** *Asarum europaeum*

VOLL

GEK-128

giftig immergrün

Höhe	8–15 cm	Wuchsform	Rhizom, dichter Teppich
Blütezeit	Mär–Mai	Blütenfarbe	braunrot, glockig, bodennah verborgen
Blattform	einfach, nierenförmig, ledrig, glänzend	Blattstellung	gegenständig am Rhizom
Herbstfärbung	immergrün, dunkelgrün glänzend		
Standort	Schatten / frisch	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig · L–tL über Kalk
Boden	kalkhaltig, humos	Lebensbereich	G2
Geselligkeit	V	Stück je m²	12–15
Ausbreitung	Rhizom, langsam	Vorkommen	Kalk- und Buchenwaldlagen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Bodenfeuchte-Puffer, Streuabbau; Ameisenausbreitung**Giftigkeit:** ja (Oxalate, Aristolochiasäure)**Praxis:** Sehr langsam (3–4 Jahre bis Schluss). Hochpreisige Fläche, kaum Pflege. Nicht in Kinder-Spielbereiche.**Heide-Nelke** *Dianthus deltoides*

VOLL

GEK-129

§ geschützt

Höhe	10–25 cm	Wuchsform	lockerrasig, kriechend
Blütezeit	Jun–Sep	Blütenfarbe	karminrosa mit dunklem Ring, einzeln
Blattform	schmal linealisch, gegenständig, blaugrün	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	teils wintergrün		
Standort	Sonne / trocken	Bodenart	IS — lehmiger Sand · S-IS — sandig · S-IS, mager · sL–L, Auelehm · S-IS, sauer
Boden	sandig, sauer, mager	Lebensbereich	H1, St1
Geselligkeit	IV	Stück je m²	10–12
Ausbreitung	lockerrasig	Vorkommen	Sandgebiete, Magerrasen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Falterblume (langrüsselig), Nachtfalter**Schutzstatus:** besonders geschützt (BartSchV)**Praxis:** Nur Baumschul-/Regiosaatgutware. Entnahme aus der Natur verboten – im Kundengespräch als Qualitätsmerkmal nutzen.

Kleine Braunelle *Prunella vulgaris*



VOLL

GEK-130

essbar

Höhe	10–25 cm	Wuchsform	Rosette mit Ausläufern
Blütezeit	Jun-Sep	Blütenfarbe	blauviolett, Lippenblüte, kopfige Ähre
Blattform	einfach, eiförmig, gestielt	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	keine		

Standort	Sonne-HS / frisch	Bodenart	sL–L, nährstoffreich
Boden	mäßig nährstoffreich	Lebensbereich	Fr2
Geselligkeit	V	Stück je m²	10–12
Ausbreitung	Ausläufer	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Wichtige Hummelweide; verträgt Mahd und Tritt

Essbar: ja (Tee)

Praxis: Kernart des Kräuterrasens. Verträgt 4–6 Schnitte/Jahr – d. h. abo-kompatibel.

Kleiner Wiesenknopf *Sanguisorba minor*



VOLL

GEK-131

essbar

Höhe	20–40 cm	Wuchsform	Horst, aufrecht
Blütezeit	Mai-Aug	Blütenfarbe	grünlich mit roten Narben, kugelige Köpfchen
Blattform	unpaarig gefiedert, 9–25 gesägte Fiedern	Blattstellung	wechselständig, grundständig
Herbstfärbung	wintergrün		

Standort	Sonne / trocken	Bodenart	L–tL über Kalk · S–IS, mager
Boden	kalkhaltig, mager	Lebensbereich	St1, Fr1
Geselligkeit	III	Stück je m²	7–9
Ausbreitung	horstig	Vorkommen	Kalkmagerrasen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Windblütig, aber Käfer/Wanzen; Salatkraut (Pimpinelle)

Essbar: ja (Blätter)

Praxis: Wintergrüne Struktur auf Kalk – gute Basis zwischen Sedum und Gräsern.

Kleines Habichtskraut *Pilosella officinarum*



VOLL

GEK-132

Höhe	5–20 cm	Wuchsform	Rosette mit oberirdischen Ausläufern
Blütezeit	Mai-Sep	Blütenfarbe	hellgelb, Körbchen, außen rot gestreift
Blattform	einfach, lanzettlich, oberseits borstig, unterseits weißfilzig	Blattstellung	grundständige Rosette
Herbstfärbung	teils wintergrün		

Standort	Sonne / trocken	Bodenart	S–IS, mager · sL–L, Auelehm · S–IS, sauer
Boden	sauer bis neutral, mager	Lebensbereich	H1, St1
Geselligkeit	V	Stück je m²	10–12
Ausbreitung	oberird. Ausläufer	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Lange Blühdauer; Pollen für Furchenbienen

Praxis: Wächst auf verdichtetem Rohboden – Pionier nach Baustellen.

Kleines Immergrün *Vinca minor*



BEDINGT

GEK-133

giftig immergrün

Höhe	15–25 cm	Wuchsform	kriechend, an Knoten wurzelnd
Blütezeit	Mär–Mai	Blütenfarbe	blauviolett, radförmig, fünfzählig
Blattform	einfach, elliptisch, ledrig, glänzend	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	immergrün, dunkelgrün glänzend		
Standort	HS-Schatten / frisch	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig · L-tL über Kalk
Boden	humos, kalkhaltig	Lebensbereich	G2
Geselligkeit	V	Stück je m²	6–8
Ausbreitung	kriechend, wurzelnd	Vorkommen	ganz Hessen, meist verwildert
Status	Archaeophyt (nicht sicher indigen)		

Ökologische Funktion: Wintergrüne Deckung; geringer faunistischer Wert

Giftigkeit: ja (Alkaloide)

Praxis: KRITISCH: wird im GaLaBau pauschal als 'heimisch' verkauft. Vorkommen in Hessen gilt weit überwiegend als alte Verwilderung aus Klostergärten. GEK: nur mit Kennzeichnung, kein Punkt in der Kategorie 'heimische Artenzahl'.

Knollen-Beinwell *Symphytum tuberosum*



VOLL

GEK-134

giftig

Höhe	20–40 cm	Wuchsform	Rhizom, aufrecht
Blütezeit	Apr–Mai	Blütenfarbe	blassgelb, röhrig-glockig, hängend
Blattform	einfach, elliptisch, rau behaart	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	keine, zieht ein		
Standort	Schatten / frisch	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig · L-tL, basenreich
Boden	humos, basenreich	Lebensbereich	G2
Geselligkeit	IV	Stück je m²	7–9
Ausbreitung	Rhizom	Vorkommen	Süd-/Mittelhessen, Auwald
Status	regional indigen		

Ökologische Funktion: Frühe Hummelweide (Nektarraub durch Erdhummel beobachtbar)

Giftigkeit: Pyrrolizidinalkaloide

Praxis: Regional prüfen. Außerhalb des natürlichen Areals als 'gepflanzt, nicht gebietseigen' führen.

Kriechender Günsel *Ajuga reptans*



VOLL

GEK-135

Höhe	10–25 cm	Wuchsform	Rosette mit oberirdischen Ausläufern
Blütezeit	Apr–Jun	Blütenfarbe	blauviolett, Lippenblüte, Scheinquirle
Blattform	einfach, spatelförmig, glänzend, oft bronzefarben überlaufen	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	teils wintergrün		
Standort	HS / frisch-feucht	Bodenart	sL–L — sandiger bis reiner Lehm · sL–L, nährstoffreich
Boden	lehmig, nährstoffreich	Lebensbereich	G2, GR2
Geselligkeit	V	Stück je m²	8–10
Ausbreitung	oberirdische Ausläufer	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Frühe Hummel- und Wildbienenweide; Nahrungspflanze für Falterarten; sehr schnelle Deckung

Praxis: Deckt binnen einer Saison. Ideal als lebender Mulch zwischen langsamen Gehölzen.

Maiglöckchen *Convallaria majalis*



VOLL

GEK-136

giftig § geschützt

Höhe	15–25 cm	Wuchsform	Rhizom, ausläufertreibend, dichter Teppich
Blütezeit	Apr–Jun	Blütenfarbe	reinweiß, glockig, stark duftend, einseitswendig
Blattform	einfach, breit lanzettlich, Parallelnerven, meist zu zweit	Blattstellung	grundständig, zu zweit
Herbstfärbung	gelb		

Standort	HS-Schatten / frisch	Bodenart	IS — lehmiger Sand · S-IS — sandig · sL-L — sandiger bis reiner Lehm · Hn/Hu — humos bis anmoorig
Boden	humos, sandig-lehmig	Lebensbereich	G2
Geselligkeit	V	Stück je m²	10–12
Ausbreitung	Rhizom, ausläufertreibend	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Dichte Dauerdecke; Beeren für Vögel

Giftigkeit: stark giftig (Herzglykoside)

Schutzstatus: besonders geschützt (BArtSchV)

Praxis: Nur zertifizierte Baumschulware – Entnahme aus der Natur ist verboten. Verwechslung mit Bärlauch (Modul 2) im Kundengespräch aktiv ansprechen.

Milder Mauerpfeffer *Sedum sexangulare*



VOLL

GEK-137

immergrün

Höhe	5–10 cm	Wuchsform	flaches Polster
Blütezeit	Jun–Jul	Blütenfarbe	goldgelb
Blattform	dick fleischig, walzlich, sechszeilig angeordnet, mild	Blattstellung	sechszeilig spiralig
Herbstfärbung	immergrün		

Standort	Sonne / trocken	Bodenart	S-IS — sandig · S-IS, mager
Boden	mager, sandig	Lebensbereich	St1
Geselligkeit	V	Stück je m²	16–20
Ausbreitung	Polster	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Extensivdach; verträgt mehr Hitze als *S. album*

Praxis: —

Pfennigkraut *Lysimachia nummularia*



VOLL

GEK-138

Höhe	5–10 cm	Wuchsform	kriechend, an Knoten wurzelnd
Blütezeit	Jun–Jul	Blütenfarbe	leuchtend goldgelb, schalenförmig
Blattform	einfach, rundlich, klein, paarweise	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	teils wintergrün		

Standort	HS / feucht-nass	Bodenart	sL-L, nährstoffreich
Boden	nährstoffreich	Lebensbereich	WR3
Geselligkeit	V	Stück je m²	8–10
Ausbreitung	kriechend	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Uferzone, Teichrand, Regenmulden-Sohle

Praxis: Bester Bodendecker für die Sohle von Versickerungsmulden (Kategorie Wasser).

Rundblättrige Glockenblume *Campanula rotundifolia*



VOLL

GEK-139

Höhe	15–40 cm	Wuchsform	lockerrasig, feine Triebe
Blütezeit	Jun–Sep	Blütenfarbe	hellblau, nickende Glocken
Blattform	Grundblätter rundlich (früh welk), Stängelblätter schmal linealisch	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	keine		

Standort	Sonne / trocken	Bodenart	S-IS — sandig · L-tL über Kalk · S-IS, mager
Boden	mager, sandig bis kalkig	Lebensbereich	St1, FS1
Geselligkeit	III	Stück je m²	8–10
Ausbreitung	lockerrasig	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Oligolektische Glockenblumen-Wildbienen (Chelostoma, Melitta)

Praxis: Beispiel für die Regel: Spezialisten-Wildbienen brauchen die Gattung, nicht nur 'irgendeine Blüte'. Gehört in jede A-Bewertung.

Ruprechtskraut *Geranium robertianum*



VOLL

GEK-140

Höhe	20–40 cm	Wuchsform	zweijährig, buschig, Selbstausaat
Blütezeit	Mai–Okt	Blütenfarbe	rosa mit hellen Streifen, klein
Blattform	3–5-zählig fiederschnittig, fein, aromatisch	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	rötlich, Stängel rot		

Standort	HS-Schatten / frisch	Bodenart	skelettreich, Grus/Schotter · Hn/Hu — humos bis anmoorig
Boden	humos, steinig	Lebensbereich	G2
Geselligkeit	II	Stück je m²	Selbstausaat
Ausbreitung	Selbstausaat	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Sehr lange Blühdauer; Lückenfüller

Praxis: Zweijährig. Nicht als Planschicht kalkulieren, sondern als geduldete Dynamik – gehört ins Pflegeprotokoll, nicht in die Pflanzliste.

Sand-Thymian *Thymus serpyllum*



VOLL

GEK-141

essbar immergrün

Höhe	3–8 cm	Wuchsform	flaches Polster, kriechend
Blütezeit	Jun–Aug	Blütenfarbe	purpurrosa, Köpfchen
Blattform	einfach, winzig, elliptisch, aromatisch	Blattstellung	gegenständig
Herbstfärbung	immergrün		

Standort	Sonne / trocken	Bodenart	IS — lehmiger Sand · S-IS — sandig · S-IS, mager · sL-L, Auelehm · S-IS, sauer
Boden	sandig, sauer, mager	Lebensbereich	St1, H1
Geselligkeit	V	Stück je m²	12–16
Ausbreitung	Polster, kriechend	Vorkommen	Rhein-Main-Sandgebiete
Status	regional indigen		

Ökologische Funktion: Sandtrockenrasen-Leitart; hochspezialisierte Wildbienen

Essbar: ja

Praxis: Nur auf echten Sandböden. Auf Lehm kurzlebig – häufigster Reklamationsgrund.

Scharfer Mauerpfeffer *Sedum acre*



VOLL

GEK-142

giftig immergrün

Höhe	5–10 cm	Wuchsform	flaches Polster
Blütezeit	Jun–Jul	Blütenfarbe	leuchtend goldgelb, sternförmig
Blattform	dick fleischig, walzlich, sitzend, scharf schmeckend	Blattstellung	wechselständig, dachziegelig
Herbstfärbung	immergrün, im Sommer rötlich		
Standort	Sonne / trocken	Bodenart	skelettreich, Grus/Schotter · S-IS — sandig · S-IS, mager
Boden	mager, sandig, skelettreich	Lebensbereich	St1, FS1
Geselligkeit	V	Stück je m²	16–20
Ausbreitung	Polster, Sprossstücke	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Extensivdach, Fugen, Kiesflächen; Wildbienen

Giftigkeit: schwach giftig

Praxis: Trägt die Kategorie 'Stein & Material': echte Alternative zur Schottervegetation ohne Vlies.

Seegrass-Segge *Carex brizoides*



BEDINGT

GEK-143

Höhe	30–50 cm	Wuchsform	lange Ausläufer, flächig
Blütezeit	Apr–Jun	Blütenfarbe	hellgrün bis strohfarben, überhängende Ähren
Blattform	grasartig, sehr schmal, überhängend, hellgrün	Blattstellung	dreizeilig
Herbstfärbung	teils wintergrün		
Standort	HS-Schatten / feucht	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig · sL-L, Auelehm · S-IS, sauer
Boden	sauer, humos	Lebensbereich	G3
Geselligkeit	V	Stück je m²	7–9
Ausbreitung	lange Ausläufer	Vorkommen	Mittel-/Nordhessen, Auwald
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Flächige Dauerdecke; Deckung für Kleintiere

Praxis: Stark ausläufertreibend. Nur auf großen, abgegrenzten Flächen – im Reihengarten ein Pflegeproblem.

Vielblütige Weißwurz *Polygonatum multiflorum*



VOLL

GEK-144

giftig

Höhe	40–70 cm	Wuchsform	Rhizom, überhängende Triebe
Blütezeit	Mai–Jun	Blütenfarbe	weiß mit grüner Spitze, röhrig, hängend
Blattform	einfach, elliptisch, Bogenerven, zweizeilig am Stängel	Blattstellung	wechselständig, zweizeilig
Herbstfärbung	gelb		
Standort	Schatten / frisch	Bodenart	sL-L — sandiger bis reiner Lehm · Hn/Hu — humos bis anmoorig
Boden	humos, lehmig	Lebensbereich	G2
Geselligkeit	III	Stück je m²	5–7
Ausbreitung	Rhizom	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Hummelblüte (langrüsselig); Beeren für Vögel

Giftigkeit: Beeren giftig

Praxis: Strukturbildend, hohe Deckschicht unter Gehölzen.

Wald-Hainsimse *Luzula sylvatica*

VOLL

GEK-145

immergrün

Höhe	30–50 cm	Wuchsform	Horst mit Kurzausläufern
Blütezeit	Apr–Jun	Blütenfarbe	braun, lockere Spirre
Blattform	grasartig, breit linealisch, am Rand lang weiß bewimpert	Blattstellung	grundständige Rosette
Herbstfärbung	wintergrün		
Standort	HS-Schatten / frisch	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig · sL-L, Auelehm · S-IS, sauer
Boden	sauer bis schwach sauer, humos	Lebensbereich	G2
Geselligkeit	V	Stück je m²	5–7
Ausbreitung	Kurzausläufer, Horste	Vorkommen	Mittelgebirge, ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Wintergrüne Deckung für Laufkäfer und Amphibien; Samen für Ameisen (Myrmekochorie)

Praxis: Der beste heimische Ersatz für *Pachysandra terminalis*. Deckt geschlossen, wintergrün, wurzelkonkurrenzfest unter Buche und Fichte.

Wald-Sauerklee *Oxalis acetosella*

VOLL

GEK-146

essbar

giftig

Höhe	5–15 cm	Wuchsform	Rhizom, lockerer Teppich
Blütezeit	Apr–Mai	Blütenfarbe	weiß mit violetten Adern, einzeln, nickend
Blattform	dreizählig, kleeartig, herzförmige Blättchen, nachts gefaltet	Blattstellung	grundständig
Herbstfärbung	keine		
Standort	Schatten / frisch-feucht	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig · sL-L, Auelehm · S-IS, sauer
Boden	sauer, humos, Rohhumus	Lebensbereich	G1, G2
Geselligkeit	V	Stück je m²	12–16
Ausbreitung	Rhizom	Vorkommen	Mittelgebirge
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Deckt unter Nadelholz, wo fast nichts wächst

Essbar: in Kleinmengen

Giftigkeit: Oxalsäure

Praxis: Einzige verlässliche Lösung unter dichter Fichte/Tanne.

Walderdbeere *Fragaria vesca*

VOLL

GEK-147

essbar

Höhe	10–20 cm	Wuchsform	Rosette mit oberirdischen Ausläufern
Blütezeit	Mai–Jun (Frucht Jun–Sep)	Blütenfarbe	weiß, 5 Kronblätter
Blattform	dreizählig, gesägt, frischgrün	Blattstellung	wechselständig, grundständig
Herbstfärbung	teils wintergrün		
Standort	HS-S / frisch	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig · sL-L, nährstoffreich
Boden	humos, mäßig nährstoffreich	Lebensbereich	GR2
Geselligkeit	V	Stück je m²	8–10
Ausbreitung	oberird. Ausläufer	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Pollen/Nektar früh; Früchte für Vögel und Kleinsäuger; Ernteprodukt

Essbar: ja (Früchte, Blätter)

Praxis: Verkaufsargument: essbarer Bodendecker. Verbindet Modul 2 (essbar) mit Modul 4.

Waldmeister *Galium odoratum*

VOLL

GEK-148

essbar

giftig

Höhe	15–30 cm	Wuchsform	Rhizom, flächig
Blütezeit	Apr–Jun	Blütenfarbe	reinweiß, sternförmig, in Trugdolden
Blattform	schmal lanzettlich, im Quirl zu 6–8	Blattstellung	quirlständig
Herbstfärbung	keine, zieht ein		
Standort	Schatten / frisch	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig · L-tL über Kalk
Boden	humos, kalkhaltig	Lebensbereich	G2
Geselligkeit	V	Stück je m²	9–12
Ausbreitung	Rhizom	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Schnelle Waldbodendecke; kleine Fliegen und Käfer**Essbar:** ja (Kraut, angewelkt)**Giftigkeit:** in Menge (Cumarin)**Praxis:** Wird im Hochsommer lückig. Nicht als alleinige Decke auf Sichtflächen.**Weißer Fetthenne** *Sedum album*

VOLL

GEK-149

immergrün

Höhe	5–15 cm	Wuchsform	flaches Polster
Blütezeit	Jun–Aug	Blütenfarbe	weiß bis rosa überlaufen, Trugdolden
Blattform	dick fleischig, walzlich, stumpf	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	immergrün, im Winter rot		
Standort	Sonne / trocken	Bodenart	skelettreich, Grus/Schotter · S-IS, mager
Boden	mager, skelettreich	Lebensbereich	St1, FS1
Geselligkeit	V	Stück je m²	16–20
Ausbreitung	Polster	Vorkommen	Fels- und Mauerstandorte
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Extensivdach-Standard, Trockenmauerkrone**Praxis:** Kombination mit BD-22 und BD-24 als Dachbegrünungsmodul.**Weißklee** *Trifolium repens*

VOLL

GEK-150

Höhe	5–15 cm	Wuchsform	kriechend, an Knoten wurzelnd
Blütezeit	Mai–Sep	Blütenfarbe	weiß bis rosa, kugelige Köpfchen
Blattform	dreizählig, kleeartig, oft mit hellem Winkelfleck	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	teils wintergrün		
Standort	Sonne / frisch	Bodenart	bodenvag — alle Bodenarten
Boden	alle	Lebensbereich	Fr2
Geselligkeit	V	Stück je m²	Ansaat
Ausbreitung	Ausläufer	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Rasenersatz, N2-Fixierung, Honigbienen und Hummeln**Praxis:** Ansaat statt Pflanzung. Macht Düngung im Rasen überflüssig – Argument für die Kategorie 'Boden'.

Wundklee *Anthyllis vulneraria*

VOLL

GEK-151

Höhe	15–30 cm	Wuchsform	Horst, Pfahlwurzel
Blütezeit	Mai-Aug	Blütenfarbe	goldgelb bis orange, dichte Köpfchen mit Hüllblättern
Blattform	unpaarig gefiedert, Endblättchen deutlich größer, seidig	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	keine		
Standort	Sonne / trocken	Bodenart	skelettreich, Grus/Schotter · L-tL über Kalk · S-IS, mager
Boden	kalkhaltig, mager, skelettreich	Lebensbereich	St1, FS1
Geselligkeit	III	Stück je m²	8–10
Ausbreitung	Pfahlwurzel	Vorkommen	Kalkmagerrasen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Raupenfutter mehrerer Bläulinge; N2-Fixierung

Praxis: Ideal auf Baustellen-Rohboden mit Kalkschotter – kein Oberbodenauftrag nötig.

Frühjahrsgeophyten

7 Arten

Arbeiten vor dem Laubaustrieb und verschwinden ab Juni. Nie als alleinige Flächendeckung planen.

Dolden-Milchstern *Ornithogalum umbellatum*



BEDINGT

GEK-152

giftig

Höhe	15–30 cm	Wuchsform	Zwiebel, Brutzwiebeln
Blütezeit	Apr–Mai	Blütenfarbe	weiß mit grünem Rückenstreifen, sternförmig
Blattform	schmal linealisch mit weißem Mittelstreifen	Blattstellung	grundständig
Herbstfärbung	keine, zieht ein		

Standort	Sonne / trocken-frisch	Bodenart	L–tL über Kalk
Boden	kalkhaltig	Lebensbereich	Fr1
Geselligkeit	V	Stück je m²	20–25
Ausbreitung	Zwiebel	Vorkommen	Süd-/Mittelhessen
Status	Archaeophyt		

Ökologische Funktion: Pollenquelle; verwildert in Wiesen

Giftigkeit: giftig

Praxis: Als Archäophyt kennzeichnen, nicht als indigene Art anrechnen.

Herbstzeitlose *Colchicum autumnale*



BEDINGT

GEK-153

giftig

Höhe	10–25 cm	Wuchsform	Knolle
Blütezeit	Aug–Okt	Blütenfarbe	rosaviolett, krokusähnlich, im Herbst ohne Blätter
Blattform	breit lanzettlich, glänzend, im Frühjahr, Juni einziehend	Blattstellung	grundständig
Herbstfärbung	keine		

Standort	Sonne / frisch-feucht	Bodenart	sL–L — sandiger bis reiner Lehm · L–tL, basenreich
Boden	lehmig, basenreich	Lebensbereich	Fr3
Geselligkeit	IV	Stück je m²	10–12
Ausbreitung	Knolle	Vorkommen	Feucht-/Frischwiesen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Eine der letzten Nektarquellen des Jahres auf Feuchtwiesen

Giftigkeit: STARK GIFTIG (Colchicin, tödlich)

Praxis: Tödliche Verwechslungsgefahr mit Bärlauch (Blätter im Frühjahr). Nicht in Gärten mit Wildkräuternutzung – Querverweis Modul 2 zwingend.

Hohler Lerchensporn *Corydalis cava*



VOLL

GEK-154

giftig

Höhe	15–30 cm	Wuchsform	Hohlknolle, flächig
Blütezeit	Mär–Apr	Blütenfarbe	purpurviolett bis weiß, gespornt, Trauben
Blattform	2–3-fach dreizählig, blaugrün, zart	Blattstellung	wechselständig
Herbstfärbung	keine, zieht im Mai ein		

Standort	Schatten / frisch	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig · L–tL, basenreich
Boden	humos, basenreich	Lebensbereich	G2
Geselligkeit	V	Stück je m²	20–25
Ausbreitung	Knolle, Selbstausaat	Vorkommen	Auwald-/Kalklagen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Erste Hummelköniginnen-Tracht; Ameisenausbreitung

Giftigkeit: giftig

Praxis: Ökologisch die wichtigste Frühjahrsknolle: versorgt Hummelköniginnen genau in der Gründungsphase.

Kleines Schneeglöckchen *Galanthus nivalis*



BEDINGT

GEK-155

giftig § geschützt

Höhe	10–20 cm	Wuchsform	Zwiebel
Blütezeit	Feb–Mär	Blütenfarbe	weiß, drei äußere und drei innere grün gezeichnete Blätter
Blattform	zwei schmal linealische, blaugrüne Blätter	Blattstellung	grundständig, zu zweit
Herbstfärbung	keine, zieht ein		

Standort	HS-Schatten / frisch	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig
Boden	humos	Lebensbereich	G2
Geselligkeit	V	Stück je m²	20–25
Ausbreitung	Zwiebel	Vorkommen	ganz Hessen
Status	Status in HE strittig (teils eingebürgert)		

Ökologische Funktion: Sehr frühe Tracht

Giftigkeit: giftig

Schutzstatus: besonders geschützt (BArtSchV); WA-Anhang B / CITES II

Praxis: Handelsrelevant: CITES-gelistet. Herkunftsnachweis der Zwiebeln beim Lieferanten anfordern und archivieren – Nachweispflicht liegt beim Verwender.

Märzenbecher *Leucojum vernum*



VOLL

GEK-156

giftig § geschützt

Höhe	15–30 cm	Wuchsform	Zwiebel
Blütezeit	Feb–Mär	Blütenfarbe	weiß mit grünen Spitzen, glockig, nickend
Blattform	breit linealisch, glänzend, stumpf	Blattstellung	grundständig
Herbstfärbung	keine, zieht ein		

Standort	HS-Schatten / feucht	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig · L-tL, basenreich
Boden	humos, basenreich	Lebensbereich	WR3, G3
Geselligkeit	V	Stück je m²	15–20
Ausbreitung	Zwiebel	Vorkommen	Auwald, Quellbereiche
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Sehr frühe Tracht; Auwaldaspekt

Giftigkeit: giftig

Schutzstatus: besonders geschützt (BArtSchV)

Praxis: Nur zertifizierte Vermehrungsware. Wildsammlung ist eine Ordnungswidrigkeit nach § 69 BNatSchG.

Wald-Goldstern *Gagea lutea*



VOLL

GEK-157

Höhe	10–30 cm	Wuchsform	Zwiebel
Blütezeit	Mär–Apr	Blütenfarbe	goldgelb, sternförmig, Dolde
Blattform	ein einzelnes breites Grundblatt, gekielt	Blattstellung	grundständig
Herbstfärbung	keine, zieht ein		

Standort	Schatten / frisch	Bodenart	sL–L — sandiger bis reiner Lehm · Hn/Hu — humos bis anmoorig
Boden	lehmig, humos	Lebensbereich	G2
Geselligkeit	V	Stück je m²	20–25
Ausbreitung	Zwiebel	Vorkommen	Auwald, ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Frühe Pollenquelle

Praxis: —

Zweiblättriger Blaustern *Scilla bifolia*

VOLL

GEK-158

giftig § geschützt

Höhe 10–20 cm

Blütezeit Mär–Apr

Blattform zwei rinnige Grundblätter

Herbstfärbung keine, zieht ein

Wuchsform Zwiebel, Selbstausaat

Blütenfarbe himmelblau, sternförmig, wenigblütig

Blattstellung grundständig, zu zweit

Standort HS-Schatten / frisch

Boden humos, basenreich

Geselligkeit V

Ausbreitung Zwiebel, Selbstausaat

Status regional indigen

Bodenart Hn/Hu — humos bis anmoorig · L-tL, basenreich

Lebensbereich G2, GR2

Stück je m² 25–30

Vorkommen Südhessen, Auwälder

Ökologische Funktion: Frühe Bienen-tracht; verwildert flächig**Giftigkeit:** giftig**Schutzstatus:** besonders geschützt (BartSchV)**Praxis:** Nicht mit *Scilla siberica* (Kaukasus) verwechseln – die im Handel übliche Art ist NICHT heimisch.

Gräser, Seggen und Binsen

26 Arten

Die Matrix. Verbindet die Pflanzung optisch und stabilisiert sie gegen Lücken.

Aufrechte Trespe *Bromus erectus*



VOLL

GEK-159

Höhe	40-100 cm	Wuchsform	dichter Horst
Blütezeit	Jun-Jul	Blütenfarbe	aufrechte Rispen, grünlich
Blattform	grasartig, schmal, am Rand bewimpert	Blattstellung	zweizeilig
Herbstfärbung	strohfarben		
Standort	Sonne / trocken	Bodenart	L-tL über Kalk · S-IS, mager
Boden	kalkhaltig, mager	Lebensbereich	St1, Fr1
Geselligkeit	V	Stück je m²	Ansaat
Ausbreitung	horstig	Vorkommen	Kalklagen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Leitgras der Kalkmagerrasen (FFH-LRT 6210)

Praxis: Bestandsbildner – über Regiosaatgut, nicht als Topfware.

Berg-Segge *Carex montana*



VOLL

GEK-177

Höhe	15-30 cm	Wuchsform	lockerer Horst
Blütezeit	Apr-Mai	Blütenfarbe	dunkelbraune Ähren
Blattform	schmal, weich, am Grund rotbraune Scheiden	Blattstellung	dreizeilig
Herbstfärbung	teils wintergrün		
Standort	HS / trocken-frisch	Bodenart	S-IS, mager · L-tL, basenreich
Boden	basenreich, mager	Lebensbereich	GR1, G1
Geselligkeit	IV	Stück je m²	9-12
Ausbreitung	lockere Horste	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Lichter Waldrand, Saum

Praxis: —

Blaugrüne Binse *Juncus inflexus*



VOLL

GEK-183

Höhe	40-80 cm	Wuchsform	dichter Horst
Blütezeit	Jun-Aug	Blütenfarbe	bräunlich, seitenständig
Blattform	blattlos, Stängel blaugrün gerieft, Mark unterbrochen	Blattstellung	stängelbürtig
Herbstfärbung	wintergrün, blaugrün		
Standort	Sonne / feucht-nass	Bodenart	L-tL über Kalk · tL-T, verdichtet
Boden	kalkhaltig, verdichtet	Lebensbereich	WR3
Geselligkeit	III	Stück je m²	4-5
Ausbreitung	Horste	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Kalkreiche Nassstellen

Praxis: —

Blaugrüne Segge *Carex flacca*



VOLL

GEK-160

Höhe	20–40 cm
Blütezeit	Apr–Jun
Blattform	schmal, oberseits blaugrün, derb
Herbstfärbung	wintergrün, blaugrün

Wuchsform	Ausläufer, flächig
Blütenfarbe	schwarzbraune Ähren
Blattstellung	dreizeilig

Standort	Halbschatten / wechselfeucht	Bodenart	L–tL über Kalk
Boden	kalkig	Lebensbereich	St2, WR3
Geselligkeit	V	Stück je m²	9–12 / m²
Ausbreitung	Ausläufer	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Blaugraue Matrix für Kalkstandorte; wechselfeuchtetolerant

Praxis: Eine der wenigen Arten, die sowohl Trockenphasen als auch Staunässe verträgt — ideal für Regenmulden-Böschungen.

Draht-Schmiele *Avenella flexuosa*



VOLL

GEK-161

Höhe	30–70 cm
Blütezeit	Jun–Jul
Blattform	borstenförmig, sehr fein, dunkelgrün
Herbstfärbung	teils wintergrün

Wuchsform	dichter Horst
Blütenfarbe	feine locker überhängende Rispen, glänzend
Blattstellung	zweizeilig

Standort	HS-Schatten / trocken-frisch	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig · sL–L, Auelehm · S–IS, sauer
Boden	sauer, humos	Lebensbereich	G1
Geselligkeit	V	Stück je m²	7–9
Ausbreitung	Horste	Vorkommen	Nordhessen, Spessart, Odenwald
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Matrix unter Kiefer und Eiche auf Sauerboden

Praxis: —

Einblütiges Perlgras *Melica uniflora*



VOLL

GEK-162

Höhe	20–60 cm
Blütezeit	Mai–Jun
Blattform	grasartig, breit, hellgrün, weich
Herbstfärbung	zieht ein

Wuchsform	lange Ausläufer, flächig
Blütenfarbe	einzelne braune Ährchen, sehr locker
Blattstellung	zweizeilig

Standort	Schatten / frisch	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig · L–tL, basenreich
Boden	humos, basenreich	Lebensbereich	G2
Geselligkeit	V	Stück je m²	7–9
Ausbreitung	Ausläufer	Vorkommen	Buchenwaldlagen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Flächige Waldbodendecke im tiefen Schatten

Praxis: Bildet als eines der wenigen Gräser echte Flächen im Vollschatten.

Erd-Segge *Carex humilis*

VOLL

GEK-178

immergrün

Höhe	10–20 cm	Wuchsform	dichtes Polster
Blütezeit	Mär–Apr	Blütenfarbe	kurze Ähren, kaum über dem Laub
Blattform	borstenförmig schmal, überhängend, ledrig	Blattstellung	dreizeilig
Herbstfärbung	wintergrün		
Standort	Sonne / trocken	Bodenart	skelettreich, Grus/Schotter · L–tL über Kalk
Boden	kalkhaltig, skelettreich	Lebensbereich	FS1, St1
Geselligkeit	V	Stück je m²	10–12
Ausbreitung	dichte Polster	Vorkommen	Kalktrockenrasen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Kalkmagerrasen; extrem trockenheitsfest**Praxis:** Wintergrünes Polster für Trockenflächen – heimischer Ersatz für Carex-Ziersorten aus Asien/Neuseeland.**Feld-Hainsimse** *Luzula campestris*

VOLL

GEK-163

Höhe	10–25 cm	Wuchsform	Horst mit kurzen Ausläufern
Blütezeit	Mär–Mai	Blütenfarbe	dunkelbraune Ährchen in Büscheln
Blattform	grasartig, am Rand lang weiß bewimpert	Blattstellung	grundständig
Herbstfärbung	wintergrün		
Standort	Sonne / trocken–frisch	Bodenart	S–IS, mager · sL–L, Auelehm · S–IS, sauer
Boden	mager, sauer	Lebensbereich	Fr1, H1
Geselligkeit	V	Stück je m²	10–12
Ausbreitung	Ausläufer	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Sehr frühe Blüte im Magerrasen**Praxis:** Zeigt magere Rasen an – im Bestandsaufnahme-Protokoll als Positivindikator führen.**Finger-Segge** *Carex digitata*

VOLL

GEK-179

Höhe	10–30 cm	Wuchsform	lockerer Horst
Blütezeit	Apr–Mai	Blütenfarbe	schmale, fingerartig gespreizte Ähren
Blattform	schmal, weich, hellgrün	Blattstellung	dreizeilig
Herbstfärbung	teils wintergrün		
Standort	Schatten / frisch	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig · L–tL über Kalk
Boden	kalkhaltig, humos	Lebensbereich	G2
Geselligkeit	IV	Stück je m²	9–12
Ausbreitung	Horste	Vorkommen	Kalk-Buchenwälder
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Buchenwald-Bodenschicht**Praxis:** —

Flutter-Binse *Juncus effusus*

VOLL

GEK-184

Höhe	50-100 cm	Wuchsform	dichter Horst
Blütezeit	Jun-Aug	Blütenfarbe	grünlich-braun, scheinbar seitenständige Spirre
Blattform	blattlos, Stängel glatt rund, Mark durchgehend	Blattstellung	stängelbürtig
Herbstfärbung	wintergrün		

Standort	Sonne / nass	Bodenart	sL-L, Auelehm · tL-T, verdichtet · S-IS, sauer
Boden	sauer, verdichtet	Lebensbereich	WR3, W3
Geselligkeit	III	Stück je m²	4-5
Ausbreitung	dichte Horste	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Regenmulde, Teichrand; Libellen-Ansitz

Praxis: Zeigt Bodenverdichtung/Staunässe an – im Messprotokoll als Bodenindikator nutzen.

Glatthafer *Arrhenatherum elatius*

VOLL

GEK-164

Höhe	60-150 cm	Wuchsform	lockerer Horst
Blütezeit	Jun-Jul	Blütenfarbe	große lockere Rispen, glänzend
Blattform	grasartig, breit, weich, hellgrün	Blattstellung	zweizeilig
Herbstfärbung	strohfarben		

Standort	Sonne / frisch	Bodenart	sL-L — sandiger bis reiner Lehm · sL-L, nährstoffreich
Boden	nährstoffreich, lehmig	Lebensbereich	Fr2
Geselligkeit	V	Stück je m²	Ansaat
Ausbreitung	Horste	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Leitgras der Glatthaferwiese (FFH-LRT 6510) – für Ausgleichs- und Renaturierungsflächen zentral

Praxis: Nur über Regioaatgut. In kleinen Gärten zu dominant – Einsatz auf Wiesenflächen ab ca. 200 m².

Goldhafer *Trisetum flavescens*

VOLL

GEK-165

Höhe	40-80 cm	Wuchsform	lockerer Horst
Blütezeit	Jun-Jul	Blütenfarbe	goldgelb glänzende Rispen
Blattform	grasartig, weich behaart	Blattstellung	zweizeilig
Herbstfärbung	strohfarben		

Standort	Sonne / frisch	Bodenart	L-tL, basenreich
Boden	basenreich	Lebensbereich	Fr2
Geselligkeit	V	Stück je m²	Ansaat
Ausbreitung	Horste	Vorkommen	Mittelgebirgslagen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Leitgras der Berg-Mähwiese (FFH-LRT 6520)

Praxis: —

Hänge-Segge *Carex pendula*

VOLL

GEK-180

Höhe	80–150 cm	Wuchsform	mächtiger Solitärhorst
Blütezeit	Mai–Jun	Blütenfarbe	sehr lange überhängende walzliche Ähren
Blattform	breit, derb, oberseits blaugrün, gekielt	Blattstellung	dreizeilig
Herbstfärbung	teils wintergrün		
Standort	HS-Schatten / feucht	Bodenart	sL–L — sandiger bis reiner Lehm · sL–L, nährstoffreich
Boden	lehmig, nährstoffreich	Lebensbereich	WR3, G3
Geselligkeit	II	Stück je m²	2–3
Ausbreitung	große Horste	Vorkommen	Quell-/Auwald
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Solitärstruktur an Wasserrändern; Deckung**Praxis:** Starke Selbstausaat – Verblühtes vor Samenreife schneiden, sonst Pflegeaufwand.**Land-Reitgras** *Calamagrostis epigejos*

NEIN

GEK-166

Höhe	80–200 cm	Wuchsform	weite Ausläufer, Dominanzbestände
Blütezeit	Jun–Aug	Blütenfarbe	große silbrig-violette Rispen
Blattform	breit, derb, blaugrün, rau	Blattstellung	zweizeilig
Herbstfärbung	strohfarbene Winterstruktur		
Standort	Sonne / trocken-feucht	Bodenart	bodenvag — alle Bodenarten
Boden	alle, N-tolerant	Lebensbereich	Fr2
Geselligkeit	V	Ausbreitung	weite Ausläufer
Vorkommen	ganz Hessen	Status	indigen

Ökologische Funktion: Pionier auf Störflächen – ökologisch überwiegend problematisch**Praxis:** NEGATIVEINTRAG trotz Heimisckheit: bildet Dominanzbestände und verdrängt Magerrasenarten. Keine Anrechnung; bei Vorkommen im Bestand als Pflegeproblem dokumentieren.**Pfeifengras** *Molinia caerulea*

VOLL

GEK-167

Höhe	40–100 cm	Wuchsform	dichter Horst
Blütezeit	Jul–Sep	Blütenfarbe	schmale violette Rispen
Blattform	grasartig, breit, blaugrün, im Herbst gelb	Blattstellung	zweizeilig
Herbstfärbung	goldgelb, zieht vollständig ein		
Standort	Sonne–HS / wechselfeucht	Bodenart	sL–L, Auelehm · S–IS, sauer
Boden	sauer	Lebensbereich	WR3, H1
Geselligkeit	II	Stück je m²	3–4 / m²
Ausbreitung	dichte Horste	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Herbstfärbung; Winterstruktur; Streuwiesenart**Praxis:** Zieht im Winter vollständig ein, Horst bleibt als Struktur stehen. Erst im März schneiden.

Pillen-Segge *Carex pilulifera*

VOLL

GEK-181

Höhe	10–30 cm
Blütezeit	Apr–Jun
Blattform	schmal, hellgrün, weich
Herbstfärbung	teils wintergrün

Wuchsform	dichter Horst
Blütenfarbe	kugelige Ährchen
Blattstellung	dreizeilig

Standort	HS / frisch	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig · sL–L, Auelehm · S–IS, sauer
Boden	sauer, humos	Lebensbereich	G1, H1
Geselligkeit	IV	Stück je m²	9–12
Ausbreitung	Horste	Vorkommen	Mittelgebirge
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Saurer Wald- und Heideboden**Praxis:** —**Rasenschmiele** *Deschampsia cespitosa*

VOLL

GEK-168

Höhe	40–120 cm
Blütezeit	Jun–Jul
Blattform	grasartig, schmal, oberseits scharf gerieft, schneidend
Herbstfärbung	wintergrüner Horst

Wuchsform	mächtiger dichter Horst
Blütenfarbe	große luftige Rispen, silbrig-violett schimmernd
Blattstellung	zweizeilig

Standort	Halbschatten / feucht	Bodenart	sL–L, Auelehm · S–IS, sauer
Boden	sauer	Lebensbereich	WR3, G3
Geselligkeit	II	Stück je m²	3–4 / m²
Ausbreitung	dichte Horste	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Leuchtende Blütenrispen; Solitärhorst; Deckung für Kleintiere**Praxis:** Zeigt Bodenverdichtung und Staunässe an — im Messprotokoll als Bodenindikator nutzen.**Rot-Schwingel** *Festuca rubra*

VOLL

GEK-169

Höhe	20–60 cm
Blütezeit	Mai–Jul
Blattform	grasartig, sehr fein, Grundblätter eingerollt
Herbstfärbung	wintergrün

Wuchsform	Ausläufer, rasenbildend
Blütenfarbe	Rispen, rötlich überlaufen
Blattstellung	zweizeilig

Standort	Sonne–HS / frisch	Bodenart	bodenvag — alle Bodenarten
Boden	alle	Lebensbereich	Fr2
Geselligkeit	V	Stück je m²	Ansaat
Ausbreitung	Ausläufer	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Basis jeder heimischen Rasen-/Kräuterrasenmischung**Praxis:** Hauptkomponente für den GEK-konformen Gebrauchsrasen.

Ruchgras *Anthoxanthum odoratum*

VOLL

GEK-170

Höhe	20–50 cm	Wuchsform	lockerer Horst
Blütezeit	Apr–Jun	Blütenfarbe	kompakte grünliche Scheinähre, Cumarinduft
Blattform	grasartig, kurz, weich behaart	Blattstellung	zweizeilig
Herbstfärbung	strohfarben		

Standort	Sonne / mager	Bodenart	sL–L, Auelehm · S–IS, sauer
Boden	sauer	Lebensbereich	Fr1, H1
Geselligkeit	V	Stück je m²	Ansaat
Ausbreitung	Horste	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Sehr frühes Wiesengras; Cumarinduft beim Mähen (Heugeruch)

Praxis: Der typische Heuduft stammt von dieser Art — sinnliches Argument für die Blumenwiese.

Schaf-Schwingel *Festuca ovina agg.*

VOLL

GEK-171

Höhe	15–40 cm	Wuchsform	dichter Horst
Blütezeit	Mai–Jun	Blütenfarbe	schmale Rispen, graugrün
Blattform	borstenförmig eingerollt, sehr fein, blaugrün	Blattstellung	zweizeilig
Herbstfärbung	teils wintergrün		

Standort	Sonne / trocken	Bodenart	L–tL über Kalk · S–IS, mager · sL–L, Auelehm · S–IS, sauer
Boden	sauer bis kalkig, mager	Lebensbereich	St1, H1
Geselligkeit	V	Stück je m²	9–12
Ausbreitung	dichte Horste	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Trockenrasen-Matrix; Raupenfutter Bläulinge/Dickkopffalter

Praxis: Matrixgras für Kies- und Schotterflächen ohne Vlies.

Schillergras *Koeleria pyramidata*

VOLL

GEK-172

Höhe	30–60 cm	Wuchsform	dichter Horst
Blütezeit	Mai–Jul	Blütenfarbe	silbrig glänzende Ährenrispen
Blattform	grasartig, schmal, kurz behaart	Blattstellung	zweizeilig
Herbstfärbung	strohfarben		

Standort	Sonne / trocken	Bodenart	L–tL über Kalk · S–IS, mager
Boden	kalkhaltig, mager	Lebensbereich	St1
Geselligkeit	IV	Stück je m²	7–9
Ausbreitung	horstig	Vorkommen	Kalklagen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Kalkmagerrasen; feine Textur

Praxis: —

Silbergras *Corynephorus canescens*

VOLL

GEK-173

Höhe	15–30 cm
Blütezeit	Jun–Jul
Blattform	borstenförmig, stechend, blaugrau
Herbstfärbung	graugrün wintergrün

Wuchsform	dichter Polsterhorst
Blütenfarbe	silbrig-violette Rispen
Blattstellung	zweizeilig

Standort	Sonne / sehr trocken	Bodenart	S — reiner Sand · S-IS, mager · sL-L, Auelehm · S-IS, sauer
Boden	reiner Sand, sauer, mager	Lebensbereich	H1, FS1
Geselligkeit	V	Stück je m²	9–12
Ausbreitung	dichte Horste	Vorkommen	Rhein-Main-Flugsandgebiete
Status	regional indigen		

Ökologische Funktion: Leitart der Sandtrockenrasen; Lebensraum für Sandlaufkäfer, Grabwespen

Praxis: Für Rhein-Main das ökologisch und regional stärkste Gras. Braucht offenen Sand – kein Oberboden, kein Mulch.

Ufersegge *Carex riparia*

BEDINGT

GEK-174

Höhe	60–130 cm
Blütezeit	Mai–Jun
Blattform	sehr breit, derb, scharf gekielt, blaugrün
Herbstfärbung	teils wintergrün

Wuchsform	weite Ausläufer
Blütenfarbe	dicke schwarzbraune Ähren
Blattstellung	dreizeilig

Standort	Sonne / nass-feucht	Bodenart	sL-L, nährstoffreich
Boden	nährstoffreich	Lebensbereich	WR3, W3
Geselligkeit	IV	Stück je m²	3–4 / m²
Ausbreitung	weite Ausläufer	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Uferbefestigung; Deckung für Amphibien und Libellenlarven

Praxis: Stark ausläuferbildend — im Kleingartenteich verdrängt sie alles. Nur mit Wurzelbegrenzung.

Korrektur gegenüber der Ausgangsquelle: Ausbreitungsverhalten in der Quelle nicht vermerkt

Wald-Segge *Carex sylvatica*

VOLL

GEK-175

Höhe	20–50 cm
Blütezeit	Mai–Jun
Blattform	schmal, weich, hellgrün
Herbstfärbung	teils wintergrün

Wuchsform	lockerer Horst
Blütenfarbe	lange hängende schmale Ähren
Blattstellung	dreizeilig

Standort	Schatten / frisch-feucht	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig
Boden	humos	Lebensbereich	G2
Geselligkeit	IV	Stück je m²	7–9 / m²
Ausbreitung	Horste	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Überhängende Ähren; Waldbodenmatrix

Praxis: —

Winkel-Segge *Carex remota*

VOLL

GEK-182

Höhe	30–60 cm
Blütezeit	Mai-Jul
Blattform	schmal, hellgrün, weich, überhängend
Herbstfärbung	teils wintergrün

Wuchsform	lockerer Horst
Blütenfarbe	weit auseinandergerückte kleine Ähren
Blattstellung	dreizeilig

Standort	Schatten / feucht	Bodenart	Hn/Hu — humos bis anmoorig
Boden	humos	Lebensbereich	G3, WR3
Geselligkeit	IV	Stück je m²	7–9
Ausbreitung	Horste	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Schattige Feuchtstellen, Traufbereiche**Praxis:** —**Zittergras** *Briza media*

VOLL

GEK-176

Höhe	30–50 cm
Blütezeit	Mai-Jul
Blattform	grasartig, flach, kurz, hellgrün
Herbstfärbung	strohfarbene Winterstruktur

Wuchsform	lockerer Horst
Blütenfarbe	herzförmige hängende Ährchen, grünlich bis violett
Blattstellung	zweizeilig

Standort	Sonne / trocken-frisch	Bodenart	L-tL über Kalk · S-IS, mager
Boden	kalkhaltig, mager	Lebensbereich	St1, Fr1
Geselligkeit	IV	Stück je m²	7–9
Ausbreitung	horstig	Vorkommen	Kalkmagerrasen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Magerrasen-Zeigerart; hoher Zierwert; Winterstruktur**Praxis:** Das dekorativste heimische Magerrasengras – wichtiges Verkaufsargument gegen Miscanthus/Pennisetum.

Sumpf- und Wasserpflanzen

2 Arten

Kleinste Gruppe, größtes Schadenspotenzial: beide Arten durchstoßen Teichfolie.

Breitblättriger Rohrkolben *Typha latifolia*



BEDINGT

GEK-185

essbar

Höhe	100–200 cm	Wuchsform	starke Rhizome, Röhricht
Blütezeit	Jun–Aug	Blütenfarbe	brauner walzlicher Kolben, oben männlich, unten weiblich
Blattform	sehr lang, breit linealisch, aufrecht, schwammig	Blattstellung	zweizeilig grundständig
Herbstfärbung	strohfarbene Winterstruktur		
Standort	Sonne / nass, Flachwasser	Bodenart	sL–L, nährstoffreich
Boden	nährstoffreich	Lebensbereich	W3
Geselligkeit	IV	Stück je m²	1–2 / m²
Ausbreitung	starke Rhizome	Vorkommen	ganz Hessen
Status	indigen		

Ökologische Funktion: Klärwirkung in der Sumpfzone; Nistplatz für Rohrsänger; Libellen-Ansitz

Essbar: Rhizom, junge Sprosse · historisch Nahrungspflanze

Praxis: Durchstößt Teichfolie mit den Rhizomen. NUR im Pflanzkorb oder in gemauerter Sumpfzone. Häufigster Schadensfall im Teichbau.

Korrektur gegenüber der Ausgangsquelle: Foliendurchstoß in der Quelle nicht vermerkt — häufige Schadensursache

Schilf *Phragmites australis*



NEIN

GEK-186

Höhe	150–300 cm	Wuchsform	sehr starke Rhizome, Röhricht
Blütezeit	Aug–Sep	Blütenfarbe	große silbrig-violette Federrispen
Blattform	breit linealisch, zugespitzt, im Wind drehbar	Blattstellung	zweizeilig
Herbstfärbung	strohfarben, bleibt stehen		
Standort	Sonne / nass	Bodenart	bodenvag — alle Bodenarten
Boden	alle	Lebensbereich	W3, WR3
Geselligkeit	V	Ausbreitung	sehr starke Rhizome
Vorkommen	ganz Hessen	Status	indigen

Ökologische Funktion: Röhrichtbildner; Klärwirkung; Lebensraum für Rohrsänger und Insekten

Praxis: AUSSCHLUSS im Hausgarten: Rhizome wachsen mehrere Meter pro Jahr, durchstoßen Folie und Fugen und sind praktisch nicht rückholbar. Nur in kommunalen Pflanzenkläranlagen und großen Naturteichen mit Betonsohle.

Korrektur gegenüber der Ausgangsquelle: Von 'geeignet' auf 'nein' gesetzt — in der Quelle ohne jede Einschränkung gelistet

Korrekturverzeichnis

24 Einträge

Abweichungen dieser Ausgabe gegenüber den Ausgangsdokumenten. Jede Änderung ist fachlich begründet und beim jeweiligen Arteintrag nochmals vermerkt.

ART	KORREKTUR	EINSTUFUNG
Berberitze <i>Berberis vulgaris</i>	Als 'bedingt' eingestuft — Schwarzrost-Problematik in der Quelle nicht erwähnt	bedingt
Breitblättriger Rohrkolben <i>Typha latifolia</i>	Foliendurchstoß in der Quelle nicht vermerkt — häufige Schadensursache	bedingt
Brombeere <i>Rubus fruticosus agg.</i>	Als Sammelart (agg.) gekennzeichnet — Quelle führte 'Rubus fruticosus' als Einzelart	bedingt
Echter Aronstab <i>Arum maculatum</i>	Giftigkeit in der Quelle nicht vermerkt — schwerwiegende Auslassung	bedingt
Feld-Mannstreu <i>Eryngium campestre</i>	Schutzstatus in der Quelle nicht vermerkt	voll
Feldulme <i>Ulmus minor</i>	Von 'voll' auf 'bedingt' herabgestuft — Ulmensterben in der Quelle nicht erwähnt	bedingt
Färberginster <i>Genista tinctoria</i>	FACHFEHLER korrigiert: Quelle führte <i>Genista tinctoria</i> unter dem Namen 'Besenginster'. Besenginster ist <i>Cytisus scoparius</i> . <i>Genista tinctoria</i> heißt Färberginster.	voll
Gemeine Esche <i>Fraxinus excelsior</i>	Von 'voll' auf 'bedingt' herabgestuft — Eschentriebsterben in der Quelle nicht erwähnt	bedingt
Gewöhnlicher Wacholder <i>Juniperus communis</i>	Schutzstatus in der Quelle nicht vermerkt	voll
Giersch <i>Aegopodium podagraria</i>	Als 'nein' gesetzt — Modul 2 führte ihn ohne Warnung als Nutzpflanze	nein
Grauerle <i>Alnus incana</i>	Schreibweise korrigiert: Quelle führte 'Graucrl'	voll
Großes Windröschen <i>Anemone sylvestris</i>	Schutzstatus und Giftigkeit in der Quelle nicht vermerkt	voll
Kartäuser-Nelke <i>Dianthus carthusianorum</i>	Schutzstatus in der Quelle nicht vermerkt	voll
Löwenzahn <i>Taraxacum sect. Ruderalia</i>	Botanischer Name präzisiert: 'Taraxacum off.' ist eine Sammelgruppe, korrekt <i>Taraxacum sect. Ruderalia</i>	voll
Natternkopf <i>Echium vulgare</i>	Zweijährigkeit in der Quelle nicht vermerkt	voll
Pfaffenhütchen <i>Euonymus europaeus</i>	Giftigkeit in der Quelle nicht vermerkt	bedingt
Sanddorn <i>Hippophae rhamnoides</i>	AUS DER HEIMISCH-LISTE ENTFERNT: Quelle führte Sanddorn als heimisch für 'Sandgebiete'. Das ist floristisch nicht haltbar.	nein
Schilf <i>Phragmites australis</i>	Von 'geeignet' auf 'nein' gesetzt — in der Quelle ohne jede Einschränkung gelistet	nein
Schwarzer Holunder <i>Sambucus nigra</i>	Dublette in der Quelle: <i>Sambucus nigra</i> war zweimal gelistet	voll
Speierling <i>Sorbus domestica</i>	Aus Modul 2 nachgetragen — in Modul 1 nicht enthalten	voll

ART	KORREKTUR	EINSTUFUNG
Sumpfdotterblume <i>Caltha palustris</i>	Schutzstatus und Giftigkeit in der Quelle nicht vermerkt	voll
Ufersegge <i>Carex riparia</i>	Ausbreitungsverhalten in der Quelle nicht vermerkt	bedingt
Weinrose <i>Rosa rubiginosa</i>	Aus Modul 2 nachgetragen — in Modul 1 nicht enthalten	voll
Zitterpappel / Espe <i>Populus tremula</i>	Von 'voll' auf 'bedingt' — Wurzelbrutproblem in der Quelle nicht erwähnt	bedingt

Negativliste

16 Einträge

Arten, die im Garten- und Landschaftsbau regelmäßig als heimisch verkauft werden, es aber nicht sind. Rechts steht der heimische Ersatz aus diesem Werk.

ART	HERKUNFT	HEIMISCHER ERSATZ	BEGRÜNDUNG
Japan-Ysander <i>Pachysandra terminalis</i>	Ostasien	<i>Luzula sylvatica</i> , <i>Asarum europaeum</i> , <i>Carex digitata</i>	Ökologisch nahezu wertlos; Monokultur-Charakter; Pilzanfälligkeit (<i>Volutella</i>)
Golderdbeere <i>Waldsteinia ternata</i> / <i>geoides</i>	Ostasien / SO-Europa	<i>Fragaria vesca</i> , <i>Ajuga reptans</i> , <i>Galium odoratum</i>	Trotz des Namens kein heimisches Waldkraut; kaum faunistischer Wert
Balkan-Storchnabel <i>Geranium macrorrhizum</i>	SO-Europa	<i>Geranium sanguineum</i> (Trockenlagen), <i>Ajuga reptans</i> (frisch)	GaLaBau-Standardbodendecker ohne heimischen Bezug
Teppich-/Fächermispe <i>Cotoneaster dammeri</i> / <i>horizontalis</i>	China	<i>Cotoneaster integerrimus</i> , <i>Sedum</i> -Mischung	Feuerbrand-Wirtspflanze; <i>C. horizontalis</i> verwildert in Trockenrasen
Böschungsmyrte <i>Lonicera nitida</i> / <i>pileata</i>	China	<i>Lonicera xylosteum</i> , <i>Ribes alpinum</i>	Kein Fruchtwerk für heimische Vögel
Kirschlorbeer <i>Prunus laurocerasus</i>	Kleinasien/Balkan	<i>Ilex aquifolium</i> , <i>Taxus baccata</i> , <i>Ligustrum vulgare</i>	Verwildert massiv in Wälder; Blätter blausäurehaltig; ökologisch fast wertlos
Schneeheide <i>Erica carnea</i>	Alpen/Voralpen	<i>Calluna vulgaris</i>	In Hessen NICHT heimisch – wird regelmäßig als 'heimische Heide' verkauft
Kupfer-Felsenbirne <i>Amelanchier lamarckii</i>	Nordamerika	<i>Amelanchier ovalis</i>	Häufigste Verwechslung im Gehölzeinkauf
Schneebeere <i>Symphoricarpos albus</i>	Nordamerika	<i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Ribes alpinum</i>	Etabliert, verdrängend; Früchte kaum genutzt
Mahonie <i>Mahonia aquifolium</i>	Nordamerika	<i>Ilex aquifolium</i> , <i>Berberis vulgaris</i>	Etablierter Neophyt, Ausbreitung in Wälder
Großkelchiges Johanniskraut <i>Hypericum calycinum</i>	Balkan/Türkei	<i>Hypericum perforatum</i> , <i>Sedum</i> -Mischung	Dichte Monokultur ohne Strukturvielfalt
Bergenie <i>Bergenia cordifolia</i>	Sibirien/Altai	<i>Asarum europaeum</i> , <i>Luzula sylvatica</i>	Kein heimischer Bezug
Sibirischer Blaustern <i>Scilla siberica</i>	Kaukasus/Südrussland	<i>Scilla bifolia</i>	Verwechslung mit der heimischen Art im Zwiebelhandel
Irischer Efeu <i>Hedera hibernica</i>	Atlantik-Westeuropa	<i>Hedera helix</i> (echte Art)	Im Handel dominierende Efeu-Sippe – bei strenger Auslegung nicht die heimische Sippe; Herkunft beim Lieferanten erfragen
Götterbaum <i>Allanthus altissima</i>	China	<i>Sorbus aucuparia</i> , <i>Fraxinus excelsior</i>	Auf der EU-Unionsliste (VO (EU) 1143/2014) – Anpflanzung und Inverkehrbringen verboten
Buchsbaum <i>Buxus sempervirens</i>	in Hessen nicht indigen	<i>Teucrium chamaedrys</i> , <i>Taxus baccata</i> , <i>Ilex crenata</i> meiden	Buchsbaumzünsler; <i>Cylindrocladium</i> ; hoher Pflegeaufwand

Rechtsrahmen

§ 40 Abs. 1 BNatSchG – gebietseigenes Pflanz- und Saatgut

Seit dem 2. März 2020 darf Saat- und Pflanzgut in der freien Natur nur innerhalb seines Vorkommensgebiets ausgebracht werden. Hessen liegt überwiegend im Ursprungsgebiet 21 (Hessisches Bergland), Südhessen und der Rhein-Main-Raum greifen in das Ursprungsgebiet 9 (Oberrheingraben mit Saarpfälzer Bergland). Hausgärten sind in der Regel keine freie Natur im Sinne der Norm; kommunale Ausgleichsflächen, Renaturierungen, Böschungen und Flächen im Außenbereich dagegen schon.

§ 44 BNatSchG in Verbindung mit der BArtSchV

Für die in diesem Werk als besonders geschützt gekennzeichneten Arten gilt ein Entnahmeverbot aus der Natur. Zulässig ist ausschließlich künstlich vermehrte Ware. Der Herkunftsnachweis des Lieferanten ist zu archivieren; die Nachweispflicht trifft den Verwender, nicht den Händler.

§ 39 Abs. 5 BNatSchG – Gehölzschnitt

Vom 1. März bis zum 30. September sind Rodung und Auf-den-Stock-Setzen untersagt. Zulässig bleibt der schonende Form- und Pflegeschnitt, sofern keine Nester besetzt sind.

Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 – invasive gebietsfremde Arten

Für Arten der Unionsliste gilt ein Verbot von Haltung, Anpflanzung und Inverkehrbringen. Aus der Negativliste dieses Werks betrifft das den Götterbaum.

Verwendungsbeschränkung

Dieses Werk ist eine interne Fachunterlage für Planung, Aufmaß und Angebot. Bewertungen, Klassen und Punktzahlen des GEK-Systems gehen nicht an Verbraucher, in Exposés, auf die Website oder in Werbung, solange kein geprüftes Zertifizierungssystem und keine eingetragene Marke vorliegen. Grundlage: Drittes UWG-Änderungsgesetz, wirksam 27.09.2026, sowie § 106b MarkenG.

Register botanisch

Abies alba <i>Weißtanne</i>	13	Corylus avellana <i>Hasel</i>	19
Acer campestre <i>Feldahorn</i>	6	Corynephorus canescens <i>Silbergras</i>	69
Acer platanoides <i>Spitzahorn</i>	11	Cotoneaster integerrimus <i>Gewöhnliche Zwergmispel</i>	29
Acer pseudoplatanus <i>Bergahorn</i>	5	Crataegus laevigata <i>Zweiggriffeliger Weißdorn</i>	26
Achillea millefolium <i>Wiesen-Schafgarbe</i>	44	Crataegus monogyna <i>Eingriffeliger Weißdorn</i>	17
Aegopodium podagraria <i>Giersch</i>	37	Cytisus scoparius <i>Besenginster</i>	16
Ajuga reptans <i>Kriechender Günsel</i>	52	Daphne mezereum <i>Seidelbast</i>	34
Allium ursinum <i>Bärlauch</i>	36	Daucus carota <i>Wilde Möhre</i>	45
Alnus glutinosa <i>Schwarzerle</i>	10	Deschampsia cespitosa <i>Rasenschmiele</i>	67
Alnus incana <i>Grauerle</i>	7	Dianthus carthusianorum <i>Kartäuser-Nelke</i>	39
Amelanchier ovalis <i>Gewöhnliche Felsenbirne</i>	28	Dianthus deltoides <i>Heide-Nelke</i>	50
Anemone nemorosa <i>Buschwindröschen</i>	46	Echium vulgare <i>Natternkopf</i>	41
Anemone ranunculoides <i>Gelbes Windröschen</i>	48	Eryngium campestre <i>Feld-Mannstreu</i>	37
Anemone sylvestris <i>Großes Windröschen</i>	38	Euonymus europaeus <i>Pfaffenhütchen</i>	22
Antennaria dioica <i>Gewöhnliches Katzenpfötchen</i>	48	Fagus sylvatica <i>Rotbuche</i>	9
Anthoxanthum odoratum <i>Ruchgras</i>	68	Festuca ovina <i>agg. Schaf-Schwingel</i>	68
Anthyllis vulneraria <i>Wundklee</i>	58	Festuca rubra <i>Rot-Schwingel</i>	67
Arrhenatherum elatius <i>Glatthafer</i>	65	Ficaria verna <i>Scharbockskraut</i>	41
Artemisia campestris <i>Feld-Beifuß</i>	32	Filipendula ulmaria <i>Mädesüß</i>	40
Arum maculatum <i>Echter Aronstab</i>	36	Fragaria vesca <i>Walderdbeere</i>	56
Asarum europaeum <i>Haselwurz</i>	50	Frangula alnus <i>Faulbaum</i>	28
Avenella flexuosa <i>Draht-Schmiele</i>	63	Fraxinus excelsior <i>Gemeine Esche</i>	7
Bellis perennis <i>Gänseblümchen</i>	38	Gagea lutea <i>Wald-Goldstern</i>	60
Berberis vulgaris <i>Berberitze</i>	16	Galanthus nivalis <i>Kleines Schneeglöckchen</i>	60
Betula pendula <i>Hängebirke</i>	8	Galium odoratum <i>Waldmeister</i>	57
Betula pubescens <i>Moorbirke</i>	9	Galium verum <i>Echtes Labkraut</i>	36
Bistorta officinalis <i>Schlangen-Knöterich</i>	42	Genista germanica <i>Deutscher Ginster</i>	32
Briza media <i>Zittergras</i>	70	Genista pilosa <i>Behaarter Ginster</i>	31
Bromus erectus <i>Aufrechte Trespe</i>	62	Genista tinctoria <i>Färberginster</i>	18
Calamagrostis epigejos <i>Land-Reitgras</i>	66	Geranium pratense <i>Wiesen-Storchschnabel</i>	44
Calluna vulgaris <i>Besenheide / Heidekraut</i>	31	Geranium robertianum <i>Ruprechtskraut</i>	54
Caltha palustris <i>Sumpfdotterblume</i>	42	Geranium sanguineum <i>Blut-Storchschnabel</i>	46
Campanula rotundifolia <i>Rundblättrige Glockenblume</i>	54	Glechoma hederacea <i>Gundermann</i>	50
Carex brizoides <i>Seegras-Segge</i>	55	Hedera helix <i>Efeu</i>	47
Carex digitata <i>Finger-Segge</i>	64	Helianthemum nummularium <i>Gewöhnliches Sonnenröschen</i>	33
Carex flacca <i>Blaugrüne Segge</i>	63	Hippocrepis comosa <i>Hufeisenklee</i>	33
Carex humilis <i>Erd-Segge</i>	64	Hippophae rhamnoides <i>Sanddorn</i>	23
Carex montana <i>Berg-Segge</i>	62	Hylotelephium maximum <i>Große Fetthenne</i>	49
Carex pendula <i>Hänge-Segge</i>	66	Ilex aquifolium <i>Stechpalme</i>	30
Carex pilulifera <i>Pillen-Segge</i>	67	Juncus effusus <i>Flatter-Binse</i>	65
Carex remota <i>Winkel-Segge</i>	70	Juncus inflexus <i>Blaugrüne Binse</i>	62
Carex riparia <i>Ufersegge</i>	69	Juniperus communis <i>Gewöhnlicher Wacholder</i>	19
Carex sylvatica <i>Wald-Segge</i>	69	Koeleria pyramidata <i>Schillergras</i>	68
Carpinus betulus <i>Hainbuche</i>	7	Leucanthemum vulgare <i>Wiesen-Margerite</i>	43
Centaurea jacea <i>Wiesen-Flockenblume</i>	43	Leucojum vernum <i>Märzenbecher</i>	60
Centaurea montana <i>Berg-Flockenblume</i>	35	Ligustrum vulgare <i>Liguster</i>	21
Circaea lutetiana <i>Großes Hexenkraut</i>	38	Lonicera xylosteum <i>Rote Heckenkirsche</i>	29
Cirsium oleraceum <i>Kohldistel</i>	39	Lotus corniculatus <i>Gewöhnlicher Hornklee</i>	37
Colchicum autumnale <i>Herbstzeitlose</i>	59	Luzula campestris <i>Feld-Hainsimse</i>	64
Convallaria majalis <i>Maiglöckchen</i>	53	Luzula sylvatica <i>Wald-Hainsimse</i>	56
Cornus mas <i>Kornelkirsche</i>	21	Lysimachia nummularia <i>Pfennigkraut</i>	53
Cornus sanguinea <i>Roter Hartriegel</i>	22	Lythrum salicaria <i>Blutweiderich</i>	35
Corydalis cava <i>Hohler Lerchensporn</i>	59	Malus sylvestris <i>Wildapfel</i>	14

Melica uniflora <i>Einblütiges Perlgras</i>	63	Salix repens <i>Kriech-Weide</i>	34
Molinia caerulea <i>Pfeifengras</i>	66	Salix viminalis <i>Korbweide</i>	8
Origanum vulgare <i>Wilder Majoran / Oregano</i>	45	Salvia pratensis <i>Wiesensalbei</i>	45
Ornithogalum umbellatum <i>Dolden-Milchstern</i>	59	Sambucus nigra <i>Schwarzer Holunder</i>	24
Oxalis acetosella <i>Wald-Sauerklee</i>	56	Sambucus racemosa <i>Roter Holunder</i>	23
Phragmites australis <i>Schilf</i>	71	Sanguisorba minor <i>Kleiner Wiesenknopf</i>	51
Pilosella officinarum <i>Kleines Habichtskraut</i>	51	Scabiosa columbaria <i>Tauben-Skabiose</i>	42
Pinus sylvestris <i>Waldkiefer</i>	13	Scilla bifolia <i>Zweiblättriger Blaustern</i>	61
Polygonatum multiflorum <i>Vielblütige Weißwurz</i>	55	Sedum acre <i>Scharfer Mauerpfeffer</i>	55
Populus nigra <i>Schwarzpappel</i>	10	Sedum album <i>Weißer Fetthenne</i>	57
Populus tremula <i>Zitterpappel / Espe</i>	15	Sedum rupestre <i>Felsen-Fetthenne</i>	47
Potentilla anserina <i>Gänsefingerkraut</i>	39	Sedum sexangulare <i>Milder Mauerpfeffer</i>	53
Potentilla neumanniana <i>Frühlings-Fingerkraut</i>	48	Sorbus aria <i>Mehlbeere</i>	8
Prunella grandiflora <i>Große Braunelle</i>	49	Sorbus aucuparia <i>Eberesche</i>	5
Prunella vulgaris <i>Kleine Braunelle</i>	51	Sorbus domestica <i>Speierling</i>	11
Prunus avium <i>Vogelkirsche</i>	13	Sorbus torminalis <i>Elsbeere</i>	5
Prunus padus <i>Traubenkirsche</i>	12	Stellaria holostea <i>Große Sternmiere</i>	49
Prunus spinosa <i>Schlehe</i>	24	Stellaria media <i>Vogelmiere</i>	43
Pulmonaria officinalis <i>Lungenkraut</i>	40	Symphytum tuberosum <i>Knollen-Beinwell</i>	52
Pyrus pyraeaster <i>Wildbirne</i>	14	Tanacetum vulgare <i>Rainfarn</i>	41
Quercus petraea <i>Traubeneiche</i>	12	Taraxacum sect. Ruderalia <i>Löwenzahn</i>	40
Quercus robur <i>Stieleiche</i>	12	Taxus baccata <i>Eibe</i>	27
Rhamnus cathartica <i>Echter Kreuzdorn</i>	17	Teucrium chamaedrys <i>Edel-Gamander</i>	32
Ribes alpinum <i>Alpen-Johannisbeere</i>	27	Teucrium montanum <i>Berg-Gamander</i>	31
Ribes nigrum <i>Schwarze Johannisbeere</i>	24	Thymus pulegioides <i>Arznei-Thymian</i>	46
Ribes spicatum <i>Rote Johannisbeere</i>	22	Thymus serpyllum <i>Sand-Thymian</i>	54
Ribes uva-crispa <i>Wilde Stachelbeere</i>	25	Tilia cordata <i>Winterlinde</i>	14
Rosa arvensis <i>Feld-Rose</i>	28	Tilia platyphyllos <i>Sommerlinde</i>	11
Rosa canina <i>Hundsrose</i>	20	Trifolium repens <i>Weißklee</i>	57
Rosa corymbifera <i>Heckenrose</i>	20	Trisetum flavescens <i>Goldhafer</i>	65
Rosa rubiginosa <i>Weinrose</i>	25	Typha latifolia <i>Breitblättriger Rohrkolben</i>	71
Rosa spinosissima <i>Bibernell-Rose</i>	27	Ulmus laevis <i>Flatterulme</i>	6
Rosa tomentosa <i>Wollrose</i>	26	Ulmus minor <i>Feldulme</i>	6
Rubus caesius <i>Kratzbeere</i>	21	Urtica dioica <i>Brennnessel</i>	35
Rubus fruticosus agg. <i>Brombeere</i>	17	Vaccinium myrtillus <i>Heidelbeere</i>	33
Rubus idaeus <i>Himbeere</i>	20	Vaccinium vitis-idaea <i>Preiselbeere</i>	34
Rumex acetosa <i>Wiesen-Sauerampfer</i>	44	Veronica officinalis <i>Echter Ehrenpreis</i>	47
Salix alba <i>Silberweide</i>	10	Viburnum lantana <i>Wolliger Schneeball</i>	25
Salix aurita <i>Ohr-Weide</i>	29	Viburnum opulus <i>Gemeiner Schneeball</i>	18
Salix caprea <i>Salweide</i>	9	Vinca minor <i>Kleines Immergrün</i>	52

Register deutsch

Alpen-Johannisbeere <i>Ribes alpinum</i>	27	Gewöhnliche Zwergmispel <i>Cotoneaster integerrimus</i>	29
Arznei-Thymian <i>Thymus pulegioides</i>	46	Gewöhnlicher Hornklee <i>Lotus corniculatus</i>	37
Aufrechte Trespe <i>Bromus erectus</i>	62	Gewöhnlicher Wacholder <i>Juniperus communis</i>	19
Behaarter Ginster <i>Genista pilosa</i>	31	Gewöhnliches Katzenpfötchen <i>Antennaria dioica</i>	48
Berberitze <i>Berberis vulgaris</i>	16	Gewöhnliches Sonnenröschen <i>Helianthemum nummularium</i>	33
Berg-Flockenblume <i>Centaurea montana</i>	35	Giersch <i>Aegopodium podagraria</i>	37
Berg-Gamander <i>Teucrium montanum</i>	31	Glatthafer <i>Arrhenatherum elatius</i>	65
Berg-Segge <i>Carex montana</i>	62	Goldhafer <i>Trisetum flavescens</i>	65
Bergahorn <i>Acer pseudoplatanus</i>	5	Grauerle <i>Alnus incana</i>	7
Besenginster <i>Cytisus scoparius</i>	16	Große Braunelle <i>Prunella grandiflora</i>	49
Besenheide / Heidekraut <i>Calluna vulgaris</i>	31	Große Fetthenne <i>Hylotelephium maximum</i>	49
Bibernell-Rose <i>Rosa spinosissima</i>	27	Große Sternmiere <i>Stellaria holostea</i>	49
Blaugrüne Binse <i>Juncus inflexus</i>	62	Großes Hexenkraut <i>Circaea lutetiana</i>	38
Blaugrüne Segge <i>Carex flacca</i>	63	Großes Windröschen <i>Anemone sylvestris</i>	38
Blut-Storchschnabel <i>Geranium sanguineum</i>	46	Gundermann <i>Glechoma hederacea</i>	50
Blutweiderich <i>Lythrum salicaria</i>	35	Gänseblümchen <i>Bellis perennis</i>	38
Breitblättriger Rohrkolben <i>Typha latifolia</i>	71	Gänsefingerkraut <i>Potentilla anserina</i>	39
Brennnessel <i>Urtica dioica</i>	35	Hainbuche <i>Carpinus betulus</i>	7
Brombeere <i>Rubus fruticosus</i> agg.	17	Hasel <i>Corylus avellana</i>	19
Buschwindröschen <i>Anemone nemorosa</i>	46	Haselwurz <i>Asarum europaeum</i>	50
Bärlauch <i>Allium ursinum</i>	36	Heckenrose <i>Rosa corymbifera</i>	20
Deutscher Ginster <i>Genista germanica</i>	32	Heide-Nelke <i>Dianthus deltoides</i>	50
Dolden-Milchstern <i>Ornithogalum umbellatum</i>	59	Heidelbeere <i>Vaccinium myrtillus</i>	33
Draht-Schmiele <i>Avenella flexuosa</i>	63	Herbstzeitlose <i>Colchicum autumnale</i>	59
Eberesche <i>Sorbus aucuparia</i>	5	Himbeere <i>Rubus idaeus</i>	20
Echter Aronstab <i>Arum maculatum</i>	36	Hohler Lerchensporn <i>Corydalis cava</i>	59
Echter Ehrenpreis <i>Veronica officinalis</i>	47	Hufeisenklee <i>Hippocrepis comosa</i>	33
Echter Kreuzdorn <i>Rhamnus cathartica</i>	17	Hundsrose <i>Rosa canina</i>	20
Echtes Labkraut <i>Galium verum</i>	36	Hänge-Segge <i>Carex pendula</i>	66
Edel-Gamander <i>Teucrium chamaedrys</i>	32	Hängebirke <i>Betula pendula</i>	8
Efeu <i>Hedera helix</i>	47	Kartäuser-Nelke <i>Dianthus carthusianorum</i>	39
Eibe <i>Taxus baccata</i>	27	Kleine Braunelle <i>Prunella vulgaris</i>	51
Einblütiges Perlgras <i>Melica uniflora</i>	63	Kleiner Wiesenknopf <i>Sanguisorba minor</i>	51
Eingriffeliger Weißdorn <i>Crataegus monogyna</i>	17	Kleines Habichtskraut <i>Pilosella officinarum</i>	51
Elsbeere <i>Sorbus torminalis</i>	5	Kleines Immergrün <i>Vinca minor</i>	52
Erd-Segge <i>Carex humilis</i>	64	Kleines Schneeglöckchen <i>Galanthus nivalis</i>	60
Faulbaum <i>Frangula alnus</i>	28	Knollen-Beinwell <i>Symphytum tuberosum</i>	52
Feld-Beifuß <i>Artemisia campestris</i>	32	Kohldistel <i>Cirsium oleraceum</i>	39
Feld-Hainsimse <i>Luzula campestris</i>	64	Korbweide <i>Salix viminalis</i>	8
Feld-Mannstreu <i>Eryngium campestre</i>	37	Kornelkirsche <i>Cornus mas</i>	21
Feld-Rose <i>Rosa arvensis</i>	28	Kratzbeere <i>Rubus caesius</i>	21
Feldahorn <i>Acer campestre</i>	6	Kriech-Weide <i>Salix repens</i>	34
Feldulme <i>Ulmus minor</i>	6	Kriechender Günsel <i>Ajuga reptans</i>	52
Felsen-Fetthenne <i>Sedum rupestre</i>	47	Land-Reitgras <i>Calamagrostis epigejos</i>	66
Finger-Segge <i>Carex digitata</i>	64	Liguster <i>Ligustrum vulgare</i>	21
Flatter-Binse <i>Juncus effusus</i>	65	Lungenkraut <i>Pulmonaria officinalis</i>	40
Flatterulme <i>Ulmus laevis</i>	6	Löwenzahn <i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i>	40
Frühlings-Fingerkraut <i>Potentilla neumanniana</i>	48	Maiglöckchen <i>Convallaria majalis</i>	53
Färberginster <i>Genista tinctoria</i>	18	Mehlbeere <i>Sorbus aria</i>	8
Gelbes Windröschen <i>Anemone ranunculoides</i>	48	Milder Mauerpfeffer <i>Sedum sexangulare</i>	53
Gemeine Esche <i>Fraxinus excelsior</i>	7	Moorbirke <i>Betula pubescens</i>	9
Gemeiner Schneeball <i>Viburnum opulus</i>	18	Mädesüß <i>Filipendula ulmaria</i>	40
Gewöhnliche Felsenbirne <i>Amelanchier ovalis</i>	28	Märzenbecher <i>Leucojum vernum</i>	60

Natternkopf <i>Echium vulgare</i>	41	Stieleiche <i>Quercus robur</i>	12
Ohr-Weide <i>Salix aurita</i>	29	Sumpfdotterblume <i>Caltha palustris</i>	42
Pfaffenhütchen <i>Euonymus europaeus</i>	22	Tauben-Skabiose <i>Scabiosa columbaria</i>	42
Pfeifengras <i>Molinia caerulea</i>	66	Traubeneiche <i>Quercus petraea</i>	12
Pfennigkraut <i>Lysimachia nummularia</i>	53	Traubenkirsche <i>Prunus padus</i>	12
Pillen-Segge <i>Carex pilulifera</i>	67	Ufersegge <i>Carex riparia</i>	69
Preiselbeere <i>Vaccinium vitis-idaea</i>	34	Vielblütige Weißwurz <i>Polygonatum multiflorum</i>	55
Rainfarn <i>Tanacetum vulgare</i>	41	Vogelkirsche <i>Prunus avium</i>	13
Rasenschmiele <i>Deschampsia cespitosa</i>	67	Vogelmiere <i>Stellaria media</i>	43
Rot-Schwingel <i>Festuca rubra</i>	67	Wald-Goldstern <i>Gagea lutea</i>	60
Rotbuche <i>Fagus sylvatica</i>	9	Wald-Hainsimse <i>Luzula sylvatica</i>	56
Rote Heckenkirsche <i>Lonicera xylosteum</i>	29	Wald-Sauerklee <i>Oxalis acetosella</i>	56
Rote Johannisbeere <i>Ribes spicatum</i>	22	Wald-Segge <i>Carex sylvatica</i>	69
Roter Hartriegel <i>Cornus sanguinea</i>	22	Walderdbeere <i>Fragaria vesca</i>	56
Roter Holunder <i>Sambucus racemosa</i>	23	Waldkiefer <i>Pinus sylvestris</i>	13
Ruchgras <i>Anthoxanthum odoratum</i>	68	Waldmeister <i>Galium odoratum</i>	57
Rundblättrige Glockenblume <i>Campanula rotundifolia</i>	54	Weinrose <i>Rosa rubiginosa</i>	25
Ruprechtskraut <i>Geranium robertianum</i>	54	Weißer Fetthenne <i>Sedum album</i>	57
Salweide <i>Salix caprea</i>	9	Weißklee <i>Trifolium repens</i>	57
Sand-Thymian <i>Thymus serpyllum</i>	54	Weißtanne <i>Abies alba</i>	13
Sanddorn <i>Hippophae rhamnoides</i>	23	Wiesen-Flockenblume <i>Centaurea jacea</i>	43
Schaf-Schwingel <i>Festuca ovina</i> agg.	68	Wiesen-Margerite <i>Leucanthemum vulgare</i>	43
Scharbockskraut <i>Ficaria verna</i>	41	Wiesen-Sauerampfer <i>Rumex acetosa</i>	44
Scharfer Mauerpfeffer <i>Sedum acre</i>	55	Wiesen-Schafgarbe <i>Achillea millefolium</i>	44
Schilf <i>Phragmites australis</i>	71	Wiesen-Storchschnabel <i>Geranium pratense</i>	44
Schillergras <i>Koeleria pyramidata</i>	68	Wiesensalbei <i>Salvia pratensis</i>	45
Schlangen-Knöterich <i>Bistorta officinalis</i>	42	Wildapfel <i>Malus sylvestris</i>	14
Schlehe <i>Prunus spinosa</i>	24	Wildbirne <i>Pyrus pyraster</i>	14
Schwarze Johannisbeere <i>Ribes nigrum</i>	24	Wilde Möhre <i>Daucus carota</i>	45
Schwarzer Holunder <i>Sambucus nigra</i>	24	Wilde Stachelbeere <i>Ribes uva-crispa</i>	25
Schwarzerle <i>Alnus glutinosa</i>	10	Wilder Majoran / Oregano <i>Origanum vulgare</i>	45
Schwarzpappel <i>Populus nigra</i>	10	Winkel-Segge <i>Carex remota</i>	70
Seegras-Segge <i>Carex brizoides</i>	55	Winterlinde <i>Tilia cordata</i>	14
Seidelbast <i>Daphne mezereum</i>	34	Wolliger Schneeball <i>Viburnum lantana</i>	25
Silbergras <i>Corynephorus canescens</i>	69	Wollrose <i>Rosa tomentosa</i>	26
Silberweide <i>Salix alba</i>	10	Wundklee <i>Anthyllis vulneraria</i>	58
Sommerlinde <i>Tilia platyphyllos</i>	11	Zittergras <i>Briza media</i>	70
Speierling <i>Sorbus domestica</i>	11	Zitterpappel / Espe <i>Populus tremula</i>	15
Spitzahorn <i>Acer platanoides</i>	11	Zweiblättriger Blaustern <i>Scilla bifolia</i>	61
Stechpalme <i>Ilex aquifolium</i>	30	Zweiggriffeliger Weißdorn <i>Crataegus laevigata</i>	26