

1 Matrice échelonnée, Échelonnée réduite, Opérations élémentaires et Rang d'une matrice:

1.1 Matrice échelonnée:

Définition:

- Une matrice A est dite échelonnée ou sous la forme échelonnée si le nombre de zéro (0) précédent le premier élément non nul d'une ligne augmente de ligne en ligne.
- Le premier élément non nul de chaque ligne dans une matrice échelonnée s'appelle le **pivot**.

Exemples:

1/ La matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{2} & -3 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{7} & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ est échelonnée.

En effet le nombre de 0 précédent le premier élément non nul dans la première ligne est égal à 1, dans la deuxième est égal à 3, dans la troisième est égal à 4 et dans la quatrième est égal à 5. Donc le nombre de 0 augmente de ligne en ligne.

Les pivots sont en gras.

2/ La matrice $B = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 5 & 8 \\ 0 & 0 & 4 & 9 \\ 0 & 2 & 6 & 3 \end{pmatrix}$ n'est pas échelonnée.

1.2 Matrice échelonnée réduite:

Définition:

Une matrice A est dite échelonnée réduite ou sous la forme échelonnée réduite ligne si elle est échelonnée, et le premier élément non nul d'une ligne est égal à 1 et si dans la colonne correspondante (colonne pivot) tous les autres éléments sont nuls. C'est à dire 1 est le seul élément non nul dans sa colonne.

Exemples:

1/ La matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ est échelonnée réduite ligne.

En effet la matrice A est échelonnée et en plus dans chaque ligne le premier élément non nul (le pivot) lorsqu'il existe est égal à 1 et c'est le seul élément non nul dans sa colonne.

2/ La matrice $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 8 \end{pmatrix}$ est échelonnée réduite ligne.

3/ la matrice identité est une matrice échelonnée réduite ligne.

1.3 Opérations élémentaires:

Définition: Soit une matrice A .

On désigne par L_i la $i^{\text{ème}}$ ligne de A .

Faire une opération élémentaire sur les lignes de la matrice A consiste à:

- Permuter 2 lignes (i.e. $L_i \leftrightarrow L_j, i \neq j$).
- Multiplier une ligne par une constante non nulle (i.e. $L_i \leftarrow kL_i, k \in \mathbb{R}^*$).
- Ajouter à une ligne "k" fois une autre ligne (i.e. $L_i \leftarrow L_i + kL_j, k \in \mathbb{R}^*$).

Théorème : On peut transformer toute matrice en une matrice échelonnée (ou échelonnée réduite), en effectuant des opérations élémentaires sur les lignes.

Exemples: A/ Mettre les matrices suivantes sous leurs forme échelonnée

$$1/ A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 & 3 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \\ 3 & -4 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

On désigne par L_1, L_2, L_3 et L_4 la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne et la quatrième ligne respectivement de la matrice A .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 & 3 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \\ 3 & -4 & 4 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1, L_4 \leftarrow L_4 - 3L_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & -4 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[L_3 \leftrightarrow L_4]{L_3 \leftarrow L_3 + 2L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & -4 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
2/ \quad B &= \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & -3 & -2 & 1 \\ 0 & 6 & 6 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1]{L_2 \leftarrow \widetilde{L_2 + L_1}} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & -2 \end{pmatrix} \\
&\xrightarrow{L_3 \leftarrow \widetilde{L_3 + L_2}} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

B/ Mettre les matrices A et B sous leurs forme échelonnée réduite ligne

$$\begin{aligned}
1/ \quad A &= \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 3 & 3 & 7 \\ 4 & 5 & 10 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftarrow \widetilde{\frac{1}{2}L_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 7 \\ 4 & 5 & 10 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow \widetilde{L_2 - 3L_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & -3 & -2 \end{pmatrix} \\
&\xrightarrow{L_1 \leftarrow \widetilde{\frac{1}{3}L_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} \\ 0 & -3 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_3 \leftarrow \widetilde{L_3 + 3L_2}]{L_1 \leftarrow \widetilde{L_1 - 2L_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{5}{3} \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
2/ \quad B &= \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & -4 & 4 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_3 \leftarrow \widetilde{L_3 - L_1}]{L_2 \leftarrow \widetilde{L_2 - 2L_1}} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow \widetilde{\frac{1}{2}L_2}} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 3 \end{pmatrix} \\
&\xrightarrow[L_3 \leftarrow \widetilde{L_3 + 3L_2}]{L_1 \leftarrow \widetilde{L_1 - 2L_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow \widetilde{\frac{1}{3}L_3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftarrow \widetilde{L_1 - 2L_3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

1.4 Rang d'une matrice:

Définition: Soit A une matrice.

- Le rang de A , noté $rg(A)$, est le nombre de lignes non nulles de sa forme échelonnée.
- Ce rang est indépendant de la manière dont on échelonne la matrice A .

Exemples: Calculer le rang des matrices suivantes

$$1/ \quad A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 4 & -8 & 3 \\ -2 & 9 & -4 \end{pmatrix}$$

Pour calculer le rang d'une matrice, il suffit de l'échelonner.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 4 & -8 & 3 \\ -2 & 9 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_3 \leftarrow \widetilde{L_3 + L_1}]{L_2 \leftarrow \widetilde{L_2 - 2L_1}} \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 6 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow \widetilde{L_3 + 3L_2}} \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La matrice échelonnée possède deux lignes non nulles, donc le rang de A est égal à 2. $rg(A) = 2$.

$$2/ \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ 1 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

Echelonnons d'abord la matrice B .

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ 1 & 5 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 0 & 4 & -3 \\ 0 & 8 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 0 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

$rg(B) = 3$, car la matrice échelonnée associée à B a trois lignes non nulles.

Propriétés: Soient A et B deux matrices.

1/ $rg(A) = rg({}^t A)$

2/ Si le produit matriciel AB est défini alors $rg(AB) \leq \min(rg(A), rg(B))$