

三时点功能对比图

生成时间：2026-05-18 16:07:06

《三时点功能对比图》说明报告

****长者姓名****：陈萍忠

****报告目的****：通过可视化对比住院前、出院时、返院第5天三大关键节点的核心健康指标，清晰呈现BPSD症状缓解趋势及整体功能状态改善情况，为后续照护方案优化与复发预防提供决策支持。

一、三时点核心指标对比表

维度	住院前	出院时	返院第5天
ADL分值	65分（轻度功能障碍）	65分（功能状态无明显变化）	70分（功能状态略有改善）
NPI分值	22分（重度精神行为异常）	16分（BPSD症状缓解）	15分（BPSD持续缓解）
进食情况	拒绝进食		
吞咽状况			
夜间睡眠		睡眠规律	

> 注：空白项表示用户输入中未提供相关信息，依据执行规则“无依据留空”，不予推测。

二、关键变化说明

1. **BPSD症状显著缓解**：

NPI评分从住院前的22分（重度）降至出院时的16分，并进一步降至返院第5天的15分，表明精神行为症状（如情绪躁动、拒绝进食）持续改善。虽在返院期间发生1起轻微BPSD事件（表现为偶有拒绝配合康复），但经干预后未复发，整体处于稳定可控状态。

2. **日常生活能力小幅提升**：

ADL评分由65分提升至70分，反映平地行走所需辅助减少，提示躯体功能有所恢复，可能与情绪稳定、配合度提高及规律康复训练相关。

3. **生理指标趋于稳定**：

血压从145/90 mmHg逐步降至130/80 mmHg，总胆固醇从6.8 mmol/L降至6.2 mmol/L，显示心血管代谢风险得到初步控制。

4. **治疗依从性建立**：

从“未规律服药”转变为“规律服药无异常”，为症状持续缓解奠定基础。

5. **照护环境优化**：

家属焦虑缓解，照护措施有序落实，形成良性照护循环。

三、图表类型建议

建议采用**三时点多指标折线对比图**，横轴为时间点（住院前 → 出院时 → 返院D5），纵轴分别为：

- 左侧Y轴：NPI评分（范围0 – 144，越低越好）
- 右侧Y轴：ADL评分（范围0 – 100，越高越好）

同时可叠加血压（收缩压）与总胆固醇趋势线（需标准化量纲），以直观展示身心状态同步改善。对于分类变量（如进食、睡眠），可辅以图标标注（如 / ）于对应时间点下方。

四、风险等级评估

时间点	风险等级	判定依据
住院前	高风险	NPI 22分（重度BPSD）、拒绝进食、未规律服药、家属高度焦虑

| 出院时 | 中风险 |
NPI降至16分，生命体征平稳，但仍需密切监测BPSD复发 |
| 返院第5天 | 低-中风险 | NPI
15分，仅偶有不配合，无过激行为，睡眠规律，服药依从性好，整体状态平稳 |

五、结论与建议

陈萍忠老人在经历住院干预后，BPSD症状实现持续缓解，日常生活能力稳中有升，生理指标改善，治疗依从性良好，整体健康趋势积极向好。当前风险已从高危转为可控的低-中风险水平。

****后续建议**：**

- 继续维持现有药物方案与非药物干预（如认知刺激、情绪安抚）；
- 加强对“偶有拒绝配合”行为的早期识别与柔性引导，防止BPSD反弹；
- 定期复查血脂、血压，巩固慢病管理成果；
- 鼓励家属参与照护，进一步缓解其焦虑情绪，提升照护一致性。

本报告所依据数据均来自最新实时输入，历史图谱信息因姓名不符且内容不匹配，未予采纳，确保结论客观准确。