

C1. Differentiation and Integration 1

$$\begin{aligned} 1a/ \quad f(x) &= \frac{(3-4\sqrt{x})^2}{\sqrt{x}} \\ &= \frac{(3-4x^{1/2})(3-4x^{1/2})}{x^{1/2}} \\ &= \frac{9 - 24x^{1/2} + 16x}{x^{1/2}} \\ &= 9x^{-1/2} - 24 + 16x^{1/2} \quad A=16 \quad B=-24 \end{aligned}$$

$$b/ \quad f'(x) = -\frac{9}{2}x^{-3/2} + 8x^{-1/2}$$

$$\begin{aligned} c/ \quad f'(9) &= -\frac{9}{2}(9)^{-3/2} + 8(9)^{-1/2} \\ &= -\frac{9}{2}\left(\frac{1}{27}\right) + 8\left(\frac{1}{3}\right) \\ &= -\frac{1}{6} + \frac{8}{3} \\ &= \frac{15}{6} = \underline{\underline{5/2}} \end{aligned}$$

$$2/ \quad \int 12x^5 - 8x^3 + 3 \, dx$$

$$\frac{12x^6}{6} - \frac{8x^4}{4} + 3x + C$$

$$2x^6 - 2x^4 + 3x + C$$

$$3a/ \quad y = 2x^3 + 3x^{-2}$$

$$\frac{dy}{dx} = 6x^2 - 6x^{-3}$$

$$b/ \quad \int y \, dx = \frac{2x^4}{4} + \frac{3x^{-1}}{-1} + C$$

$$= \frac{1}{2}x^4 - 3x^{-1} + C$$

$$4/ \quad f'(x) = 3x^2 - 3x^{1/2} - 7 \quad (4, 22)$$

$$f(x) = \frac{3x^3}{3} - \frac{3x^{3/2}}{3/2} - 7x + C$$

$$= x^3 - 2x^{3/2} - 7x + C$$

$$22 = (4)^3 - 2(4)^{3/2} - 7(4) + C$$

$$22 = 64 - 16 - 28 + C$$

$$C = 2$$

$$\therefore f(x) = x^3 - 2x^{3/2} - 7x + 2$$

$$5/ \quad \frac{2x^2 - x^{3/2}}{x^{1/2}}$$

$$2x^{3/2} - x$$

$$p = 3/2 \quad q = 1$$

$$b/ \quad y = 5x^4 - 3 + 2x^{3/2} - x$$

$$\frac{dy}{dx} = 20x^3 + 3x^{1/2} - 1$$

$$6/ \quad \int 3x^2 + 4x^5 - 7 \, dx$$

~~6x~~

$$\frac{3x^3}{3} + \frac{4x^6}{6} - 7x + C$$

$$x^3 + \frac{2}{3}x^6 - 7x + C$$

$$7/ \quad \int 2 + 5x^2 \, dx$$

$$2x + \frac{5x^3}{3} + C$$

$$8/ \quad f(x) = 3x + x^3$$

$$f'(x) = 3 + 3x^2$$

$$b/ \quad 3 + 3x^2 = 15$$

$$3x^2 = 12$$

$$x^2 = 4$$

$$x = 2$$

$$9/ \quad y = 4x^3 - 1 + 2x^{1/2}$$

$$\frac{dy}{dx} = 12x^2 + x^{-1/2}$$

$$10/ \quad \frac{dy}{dx} = \frac{(x^2 + 3)^2}{x^2}$$

$$= \frac{(x^2 + 3)(x^2 + 3)}{x^2}$$

$$= \frac{x^4 + 6x^2 + 9}{x^2}$$

$$= x^2 + 6 + 9x^{-2}$$

$$b/ \quad y = \frac{x^3}{3} + 6x + \frac{9x^{-1}}{-1} + C$$

$$y = \frac{1}{3}x^3 + 6x - 9x^{-1} + C$$

$$(3, 20) \quad 20 = \frac{1}{3}(3)^3 + 6(3) - \frac{9}{3} + C$$

$$20 = 9 + 18 - 3 + C$$

$$C = -4$$

$$y = \frac{1}{3}x^3 + 6x - 9x^{-1} - 4$$

$$11a/ \quad \frac{2x^{1/2} + 3}{x}$$

$$\frac{2x^{-1/2} + 3x^{-1}}{x}$$

$$b) \quad y = 5x - 7 + 2x^{-1/2} + 3x^{-1}$$

$$\frac{dy}{dx} = 5 - x^{-3/2} - 3x^{-2}$$

$$12) \quad y = 3x^2 + 4x^{1/2}$$

$$a) \quad \frac{dy}{dx} = 6x + 2x^{-1/2}$$

$$b) \quad \frac{d^2y}{dx^2} = 6 - x^{-3/2}$$

$$c) \quad \int y \, dx = \frac{3x^3}{3} + \frac{4x^{3/2}}{3/2} + C$$

$$= x^3 + \frac{8}{3}x^{3/2} + C$$

$$13a) \quad (4 + 3x^{1/2})(4 + 3x^{1/2})$$

$$16 + 12x^{1/2} + 12x^{1/2} + 9x$$

$$16 + 24x^{1/2} + 9x$$

$$b) \quad 16x + \frac{24x^{3/2}}{3/2} + \frac{9x^2}{2} + C$$

$$16x + 16x^{3/2} + \frac{9}{2}x^2 + C$$

$$14a) \quad y = x^4 + 6x^{1/2}$$

$$\frac{dy}{dx} = 4x^3 + 3x^{-1/2}$$

$$b) \quad \frac{(x+4)(x+4)}{x} = \frac{x^2 + 8x + 16}{x} = x + 8 + 16x^{-1}$$

$$\frac{dy}{dx} = 1 - 16x^{-2}$$

$$c) \quad \int 1 + 3x^{1/2} - x^{-2} \, dx$$

$$x + \frac{3x^{3/2}}{3/2} - \frac{x^{-1}}{-1} + C$$

$$x + 2x^{3/2} + x^{-1} + C$$

15.

$$y = 5x^3 + 7x + 3$$

$$a) \frac{dy}{dx} = 15x^2 + 7$$

$$b) \frac{d^2y}{dx^2} = 30x$$

$$iv) \int 1 + 3x^{1/2} - x^{-2} dx$$

$$x + \frac{3x^{3/2}}{3/2} - \frac{x^{-1}}{-1} + C$$

$$x + 2x^{3/2} + x^{-1} + C$$

16a)

$$\frac{(3 - x^{1/2})(3 - x^{1/2})}{x^{1/2}}$$

$$\frac{9 - 6x^{1/2} + x}{x^{1/2}}$$

$$9x^{-1/2} - 6 + x^{1/2}$$

b)

$$\frac{dy}{dx} = 9x^{-1/2} - 6 + x^{1/2} \quad (1, 2/3)$$

$$y = \frac{9x^{1/2}}{1/2} - 6x + \frac{x^{3/2}}{3/2} + C \quad y = 18x^{1/2} - 6x + \frac{2}{3}x^{3/2} + C$$

$$2/3 = \frac{9(1)^{1/2}}{1/2} - 6(1) + \frac{(1)^{3/2}}{3/2} + C$$

$$\frac{2}{3} = 18 - 6 + \frac{2}{3} + C$$

$$C = -12$$

$$y = 18x^{1/2} - 6x + \frac{2}{3}x^{3/2} - 12$$

17

$$y = 2x^2 - 6x^{-3}$$

$$\frac{dy}{dx} = 4x + 18x^{-4}$$

$$\int y dx = \frac{2x^3}{3} - \frac{6x^{-2}}{-2} + C = \frac{2}{3}x^3 + 3x^{-2} + C$$

18/

$$f'(x) = 3 + 5x^{3/2} + 2x^{-1/2}$$

(1, 6)

$$f(x) = 3x + \frac{5x^{5/2}}{5/2} + \frac{2x^{1/2}}{1/2} + C$$

$$f(x) = 3x + 2x^{5/2} + 4x^{1/2} + C$$

$$6 = 3(1) + 2(1)^{5/2} + 4(1)^{1/2} + C$$

$$C = -3$$

$$f(x) = 3x + 2x^{5/2} + 4x^{1/2} - 3$$

19/

$$y = 6x - 4x^{-2}$$

$$\frac{dy}{dx} = 6 + 8x^{-3}$$

$$\int y dx = \frac{6x^2}{2} - \frac{4x^{-1}}{-1} + C$$

$$= 3x^2 + 4x^{-1} + C$$

C1 Differentiation and Integration 2

1) $y = kx^3 - x^2 + x - 5$

$$\frac{dy}{dx} = 3kx^2 - 2x + 1$$

b) $2y - 7x + 1 = 0$

$$2y = 7x - 1$$

$$y = \frac{7}{2}x - \frac{1}{2}$$

$$m = 7/2 \therefore \frac{dy}{dx} = 7/2$$

$$3kx^2 - 2x + 1 = \frac{7}{2}$$

$$3k\left(-\frac{1}{2}\right)^2 - 2\left(-\frac{1}{2}\right) + 1 = \frac{7}{2}$$

$$\frac{3k}{4} + 1 + 1 = \frac{7}{2}$$

$$\frac{3k}{4} = \frac{3}{2}$$

$$\underline{k = 2}$$

c) $y = 2x^3 - x^2 + x - 5$

$$y = 2\left(-\frac{1}{2}\right)^3 - \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right) - 5$$

$$y = -\frac{2}{8} - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} - 5$$

$$\underline{y = -6}$$

2) $y = 9 - 4x - 8x^{-1}$

$$\frac{dy}{dx} = -4 + 8x^{-2}$$

when $x = 2$

$$\frac{dy}{dx} = -4 + \frac{8}{2^2}$$

$$= -2$$

$$y = -2x + c$$

$$-3 = -2(2) + c$$

$$-3 = -4 + c$$

$$1 = c$$

$$y = 9 - 4(2) - \frac{8}{22}$$

$$= 9 - 8 - 4$$

$$= -3$$

$$\underline{y = -2x + 1}$$

b/ $(2, -3)$ $m = \frac{1}{2}$

$$y = \frac{1}{2}x + c$$

$$-3 = \frac{1}{2}(2) + c$$

$$-3 = 1 + c$$

$$c = -4$$

$$\underline{y = \frac{1}{2}x - 4}$$

c/ line meets x axis when $y=0$

A: $0 = 1 - 2x$


$$2x = 1$$

$$x = \frac{1}{2}$$

B: $0 = \frac{1}{2}x - 4$

$$4 = \frac{1}{2}x$$

$$x = 8$$



$$\text{Area} = \frac{1}{2} \cdot \text{base} \cdot \text{height}$$


$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{15}{2} \cdot 3$$

$$= \underline{\underline{\frac{45}{4} \text{ units}^2}}$$

3a/ $y = (x+3)(x-1)^2$

when $y=0$ $x=-3$ $x=1$

when $x=0$ $y=3$



b/

$$y = (x+3)(x-1)(x-1)$$

$$y = (x+3)(x^2 - 2x + 1)$$

$$y = x^3 - 2x^2 + x + 3x^2 - 6x + 3$$

$$= x^3 + x^2 - 5x + 3$$

$$\underline{k = 3}$$

c/

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2 + 2x - 5$$

$$3 = 3x^2 + 2x - 5$$

$$0 = 3x^2 + 2x - 8$$

$$0 = (3x - 4)(x + 2)$$

$$\underline{x = 4/3} \quad \underline{x = -2}$$

4

$$f'(x) = 4x - 6x^{1/2} + 8x^{-2} \quad (4, 1)$$

$$f(x) = \frac{4x^2}{2} - \frac{6x^{3/2}}{3/2} + \frac{8x^{-1}}{-1} + C$$

$$f(x) = 2x^2 - 4x^{3/2} - 8x^{-1} + C$$

$$1 = 2(4)^2 - 4(4)^{3/2} - 8(4)^{-1} + C$$

$$1 = 32 - 32 - 2 + C$$

$$C = 3$$

$$f(x) = 2x^2 - 4x^{3/2} - 8x^{-1} + 3$$

b/

$$f'(x) = 4x - 6\sqrt{x} + \frac{8}{x^2}$$

$$f'(4) = 4(4) - 6\sqrt{4} + \frac{8}{4^2}$$

$$= 16 - 12 + \frac{1}{2}$$

$$= \frac{9}{2}$$

gradient of normal = $-\frac{2}{9}$

$$y = -\frac{2}{9}x + C$$

$$1 = -\frac{2}{9}(4) + C$$

$$1 = -\frac{8}{9} + C$$

$$C = \frac{17}{9}$$

$$\underline{y = -\frac{2}{9}x + \frac{17}{9}}$$

5

$$f'(x) = 6x^2 - 10x - 12 \quad (5, 65)$$

$$f(x) = \frac{6x^3}{3} - \frac{10x^2}{2} - 12x + C$$

$$f(x) = 2x^3 - 5x^2 - 12x + C$$

$$65 = 2(5)^3 - 5(5)^2 - 12(5) + C$$

$$65 = 250 - 125 - 60 + C$$

$$65 = 65 + C$$

$$C = 0$$

$$f(x) = 2x^3 - 5x^2 - 12x$$

b/


$$f(x) = x(2x^2 - 5x - 12)$$

$$= x(2x+3)(x-4)$$

c/

$$\text{when } y=0 \quad x=0 \quad x=-\frac{3}{2} \quad x=4$$

$$\text{when } x=0 \quad y=0$$



6

$$y = x^2(x-6) + 4/x$$

$$\text{when } x=1$$


$$y = (1)^2(1-6) + \frac{4}{1}$$

$$= -1$$

$$\text{when } x=2$$

$$y = (2)^2(2-6) + \frac{4}{2}$$

$$= -14$$



$$PQ = \sqrt{1^2 + 13^2}$$

$$PQ = \sqrt{170}$$

$$b/ \quad y = x^2(x-6) + 4x^{-1}$$

$$\frac{dy}{dx} = x^3 - 6x^2 + 4x^{-1}$$

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 12x - 4x^{-2}$$

$$\text{when } x=1$$

$$\frac{dy}{dx} = 3(1)^2 - 12(1) - 4(1)^{-2}$$

$$= 3 - 12 - 4$$

$$= \underline{\underline{-13}}$$

$$\text{when } x=2$$

$$\frac{dy}{dx} = 3(2)^2 - 12(2) - 4(2)^{-2}$$

$$= 12 - 24 - 1$$

$$= \underline{\underline{-13}}$$

$$c/ \text{ gradient of normal} = 1/13 \quad (1, -1)$$

$$y = 1/13 x + c$$

$$-1 = 1/13(1) + c$$

$$c = -14/13$$

$$\therefore y = 1/13 x + -14/13$$

$$13y = x - 14$$

$$\underline{x - 13y - 14 = 0}$$

7

$$f'(x) = 3x^2 - 6 - 8x^{-2}$$

(2, 1)

$$f(x) = \frac{3x^3}{3} - 6x - \frac{8x^{-1}}{-1} + c$$

$$f(x) = x^3 - 6x + 8x^{-1} + c$$

$$1 = (2)^3 - 6(2) + 8(2)^{-1} + c$$

$$1 = 8 - 12 + 4 + c$$

$$c = 1$$

$$f(x) = x^3 - 6x + 8x^{-1} + 1$$

b/

$$f'(2) = 3(2)^2 - 6 - 8(2)^{-2}$$

$$= 12 - 6 - 2$$

$$= 4$$

$$y = 4x + c$$

$$1 = 4(2) + c$$

$$c = -7$$

$$\underline{y = 4x - 7}$$

$$8 \text{ a) } y = 4x + 3x^{3/2} - 2x^2$$

$$\frac{dy}{dx} = 4 + \frac{9}{2}x^{1/2} - 4x$$

$$b) \quad 8 = 4(4) + 3(4)^{3/2} - 2(4)^2$$

$$8 = 16 + 24 - 32$$

$$8 = 40 - 32$$

$$\underline{8 = 8} \quad \text{Shown}$$

$$c) \text{ at } x=4 \quad \frac{dy}{dx} = 4 + \frac{9}{2}(4)^{1/2} - 4(4)$$

$$= 4 + 9 - 16$$

$$= -3$$

gradient of normal = $\frac{1}{3}$

$$y = \frac{1}{3}x + c \quad (4, 8)$$

$$8 = \frac{1}{3}(4) + c$$

$$8 = \frac{4}{3} + c$$

$$c = \frac{20}{3}$$

$$y = \frac{1}{3}x + \frac{20}{3}$$


$$\underline{3y = x + 20}$$

d) cuts x axis when $y=0$

$$0 = x + 20$$

$$x = -20$$

$$(-20, 0) \quad (4, 8)$$



9

$$f'(x) = 2x + 3x^{-2} \quad (3, \frac{15}{2})$$

$$f(x) = \frac{2x^2}{2} + \frac{3x^{-1}}{-1} + C$$

$$f(x) = x^2 - 3x^{-1} + C$$

$$\frac{15}{2} = (3)^2 - 3(3)^{-1} + C$$

$$\frac{15}{2} = 9 - 1 + C$$

$$\frac{15}{2} = 8 + C$$

$$C = -\frac{1}{2}$$

$$f(x) = x^2 - 3x^{-1} - \frac{1}{2}$$

b/

$$f(-2) = (-2)^2 - 3(-2)^{-1} - \frac{1}{2}$$

$$= 4 + \frac{3}{2} - \frac{1}{2}$$

$$= 5$$

c/

$$f'(-2) = 2(-2) + 3(-2)^{-2}$$

$$= -4 + \frac{3}{4}$$

$$= -\frac{15}{4}$$

$$y = \frac{-13}{4}x + C \quad (-2, 5)$$

$$5 = \frac{-13}{4}(-2) + C$$

$$5 = \frac{26}{4} + C$$

$$C = -\frac{3}{2}$$

$$y = \frac{-13}{4}x - \frac{3}{2}$$

$$4y = -13x - 6$$

$$\underline{13x + 4y + 6 = 0}$$

$$10a/ \quad y = 4x^2 + 5x^{-1} - 1$$

$$\frac{dy}{dx} = 8x - 5x^{-2}$$

when $x = 1$

$$\frac{dy}{dx} = 8(1) - 5(1)^{-2}$$

$$= 3$$

b/ $y = 3x + c$

when $x = 1$

$$y = 4(1)^2 + \frac{5-1}{1} = 8$$

$$8 = 3 + c$$

$$c = 5$$

$$\underline{y = 3x + 5}$$

c/ meets x axis when $y = 0$

$$0 = 3x + 5$$

$$-5 = 3x$$

$$x = -5/3$$

11/ $\frac{dy}{dx} = (3x-1)(3x-1)$
 $= 9x^2 - 6x + 1$

a/ when $x = 1$ $\frac{dy}{dx} = 9 - 6 + 1 = \underline{4}$

gradient of normal $= -1/4$

$$y = -1/4 x + c \quad (1, 4)$$

$$4 = -1/4(1) + c$$

$$17/4 = c$$

$$y = -1/4 x + 17/4$$

b/ $y = \frac{9x^3}{3} - \frac{6x^2}{2} + x + c$

$$y = 3x^3 - 3x^2 + x + c$$

$$4 = 3(1)^3 - 3(1)^2 + 1 + c$$

$$c = 3$$

$$y = 3x^3 - 3x^2 + x + 3$$

c/ $\frac{dy}{dx} = (3x-1)^2 \quad m = -2$

$$(3x-1)^2 = -2$$

no solutions as you cannot square root a negative no.

12a/

$$P: x = -2$$

$$y = (x-1)(x+2)(x-2)$$

$$Q: x = 2$$

b/

$$y = (x-1)(x^2-4)$$

$$y = x^3 - x^2 - 4x + 4$$

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 2x - 4$$

c/ $(-1, 6)$

$$\text{when } x = -1 \quad \frac{dy}{dx} = 3(-1)^2 - 2(-1) - 4$$

$$= 3 + 2 - 4$$

$$= 1$$

$$M = 1$$

$$y = x + c$$

$$6 = -1 + c$$

$$c = 7$$

$$\underline{y = x + 7}$$

d/

$$\frac{dy}{dx} = 1$$

$$3x^2 - 2x - 4 = 1$$

$$3x^2 - 2x - 5 = 0$$

$$(3x-5)(x+1) = 0$$

$$x = \frac{5}{3} \quad x = -1$$

$$\text{when } x = \frac{5}{3} \quad y = \left(\frac{5}{3} - 1\right) \left(\left(\frac{5}{3}\right)^2 - 4\right)$$

$$= \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{25}{9} - \frac{36}{9}\right)$$

$$= \left(\frac{2}{3}\right) \left(-\frac{11}{9}\right)$$

$$= -\frac{22}{27}$$

$$\left(\frac{5}{3}, -\frac{22}{27}\right)$$

13a/

$$y = \frac{1}{3}x^3 - 4x^2 + 8x + 3$$

$$0 = \frac{1}{3}(3)^3 - 4(3)^2 + 8(3) + 3$$

$$0 = 9 - 36 + 24 + 3$$

$$0 = 0$$

$$b) \quad y = \frac{1}{3}x^3 - 4x^2 + 8x + 3$$

$$\frac{dy}{dx} = x^2 - 8x + 8$$

when $x=3$

$$\frac{dy}{dx} = (3)^2 - 8(3) + 8$$

$$= 9 - 24 + 8$$

$$= -7$$

$$\therefore m = -7$$

$$y = -7x + c$$

$$0 = -7(3) + c$$

$$c = 21$$

$$\underline{y = -7x + 21}$$

$$c) \quad \frac{dy}{dx} = -7$$

$$x^2 - 8x + 8 = -7$$

$$x^2 - 8x + 15 = 0$$

$$(x-3)(x-5) = 0$$

$$x=3 \quad x=5$$

$$\text{when } x=5 \quad y = \frac{1}{3}(5)^3 - 4(5)^2 + 8(5) + 3$$

$$= \frac{125}{3} - 100 + 40 + 3$$

$$= \frac{125}{3} - \frac{300}{3} + \frac{120}{3} + \frac{9}{3}$$

$$= \frac{-46}{3}$$

$$14) \quad y = x^3 - 2x^2 - x + 9$$

$$7 = (2)^3 - 2(2)^2 - (2) + 9$$

$$7 = 8 - 8 - 2 + 9$$

$$\underline{7 = 7}$$

$$b) \quad \frac{dy}{dx} = 3x^2 - 4x - 1$$

$$\text{when } x=2 \quad \frac{dy}{dx} = 3(2)^2 - 4(2) - 1 = 3$$

$$m = 3 \quad (2, 7)$$

$$y = 3x + c$$

$$7 = 3(2) + c$$

$$c = 1$$

$$\underline{y = 3x + 1}$$

$$c/ \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{1}{3}$$

$$3x^2 - 4x - 1 = -\frac{1}{3}$$

$$3x^2 - 4x - \frac{2}{3} = 0$$

$$9x^2 - 12x - 2 = 0$$

$$a = 9 \quad b = -12 \quad c = -2$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$= \frac{-(-12) \pm \sqrt{(-12)^2 - 4(9)(-2)}}{2(9)}$$

$$= \frac{12 \pm \sqrt{144 + 72}}{18}$$

$$= \frac{12 \pm \sqrt{216}}{18}$$

$$\sqrt{216} = \sqrt{36 \cdot 6}$$

$$= \frac{12 \pm 6\sqrt{6}}{18}$$

$$= \frac{2 \pm \sqrt{6}}{3}$$

$$= \frac{1}{3}(2 \pm \sqrt{6})$$

$$x \text{ is positive} \therefore x = \frac{1}{3}(2 + \sqrt{6})$$