

Variables aléatoires et loi des grands nombres : interrogation

Exercice 1 Un jeu consiste à lancer un dé cubique bien équilibré numéroté de 1 à 6. Si le résultat est :

- ⇒ 1, 2 ou 3, alors on perd 2 points;
- ⇒ 4 ou 5, alors on ne perd ni ne gagne rien;
- ⇒ 6, alors on gagne 3 points.

On note G la variable aléatoire qui, à chaque lancer, associe le gain, positif ou négatif, du joueur.

1. Compléter le tableau qui représente la loi de probabilité de la variable G :

| | | | |
|----------|----|---|---|
| $G =$ | -2 | 0 | 3 |
| $P(G =)$ | | | |

- 2. Calculer $E(G)$.
- 3. Que peut-on remarquer?
- 4. Quel est l'écart moyen entre les gains obtenus et le gain moyen?

Exercice 2 Un joueur lance n fois une pièce de monnaie parfaitement équilibrée.

On note F la variable aléatoire qui, à chaque série de n lancers, associe le nombre de côtés « FACE » obtenus.

On admet que F suit la loi binomiale de paramètres n et $p = 0,5$.

- 1. Interpréter l'événement : $F \geq 2$.
- 2. On suppose que $n = 4$.
 - a. Calculer $P(F = 0)$ puis $P(F = 1)$.
 - b. En déduire la probabilité d'obtenir au moins deux fois le côté « FACE » lors de 4 lancers successifs.
- 3. On suppose désormais que n est un entier naturel non nul quelconque.
 - a. Calculer en fonction de n : $P(F = 0)$ et $P(F = 1)$.
 - b. Démontrer que : $P(F \leq 1) = (1 + n)0,5^n$
- 4. Le joueur souhaite déterminer le nombre minimal n de lancers pour qu'il obtienne au moins deux fois le côté « FACE » avec une probabilité supérieure ou égale à 0,999.
 - a. Montrer que cette condition est équivalente à : $P(F \leq 1) \leq 0,001$.
 - b. Pour déterminer le nombre minimal de lancers, le joueur a réalisé l'algorithme ci-dessous à compléter :

```
N ← 0
While (1 + N)0,5N .....
    N ← ....
Fin du while
Afficher ...
```

5. Calculer l'espérance de F ainsi que son écart-type.
6. Combien de fois faut-il lancer la pièce pour espérer avoir 10 piles ?

Exercice 3 Léna prend le bus chaque matin pour se rendre au lycée. Son bus roule à 40 km/h en moyenne sur un trajet de 4 km. Sur son parcours, il y a 8 arrêts de bus. A chaque fois, la probabilité pour que le bus s'arrête est de 0,75 ce qui lui fait perdre 1 minute. On pose X la variable aléatoire qui, à chaque trajet, associe le nombre de fois que le bus s'arrêtera sur le trajet de Léna. On admet que X suit une loi binomiale.

1. Préciser les paramètres n et p de la loi de X .
2. Calculer la durée du trajet si le bus n'effectue aucun arrêt.
3. Calculer l'espérance de la variable aléatoire X .
4. Calculer le temps de parcours moyen pour que Léna se rende au lycée.
5. Léna n'a que 11 minutes pour effectuer son trajet lorsqu'elle monte dans le bus.
Calculer la probabilité pour qu'elle soit à l'heure.