Récurrences 4

On considère la suite :

$$\begin{cases} u_{n+1} = -\frac{1}{25}u_n^2 + \frac{28}{25}u_n \\ u_0 = 1 \end{cases}$$

1. Donner l'expression de f telle que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$

2. Résoudre l'équation : $f(x) = x$

3. Montrer que f est croissante sur $[0;14]$.

4. Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}:\ 0 \leq u_n \leq 3$.

5. Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}:\ u_n \leq u_{n+1}$.

6. En déduire que la suite est convergente et donner sa limite.

1. On remplace tous les u_n par des x et on obtient :

$$f(x) = -\frac{1}{25}x^2 + \frac{28}{25}x$$

2. Résoudre l'équation : $f(x) = x$

$$\begin{aligned}
& f(x) = x \\
\Leftrightarrow & -\frac{1}{25}x^2 + \frac{28}{25}x = x \\
\Leftrightarrow & -\frac{1}{25}x^2 + \frac{28}{25}x - x = 0 \\
\Leftrightarrow & x\left(-\frac{1}{25}x + \frac{3}{25}\right) = 0 \\
\Leftrightarrow & x = 0 \text{ ou } -\frac{1}{25}x = -\frac{3}{25} \\
\Leftrightarrow & x = 0 \text{ ou } x = \frac{-\frac{3}{25}}{-\frac{1}{25}} \\
\Leftrightarrow & x = 0 \text{ ou } x = 3
\end{aligned}$$

3. Pour montrer que f est croissante, on doit calculer sa dérivée et ensuite déterminer son signe :

$$f'(x) = -\frac{2}{25}x + \frac{28}{25}$$

4. On doit maintenant résoudre l'inéquation suivante :

$$\begin{aligned}
& f'(x) \geq 0 \\
\Leftrightarrow & -\frac{2}{25}x + \frac{28}{25} \geq 0 \\
\Leftrightarrow & -\frac{2}{25}x \geq \frac{28}{25} \\
\Leftrightarrow & x \leq \frac{-\frac{28}{25}}{-\frac{2}{25}} \\
\Leftrightarrow & x \leq 14
\end{aligned}$$

Par conséquent sur l'intervalle $[0;14]$, la fonction f est croissante.

5. Initialisation :
On a :

$$0 \leq u_0 = 1 \leq 3$$

L'initialisation est établie.
Hérédité :

On suppose que la propriété est vraie pour un certain rang $n \geq 0$:

$$0 \leq u_n \leq 3 \text{ c'est l'hypothèse de récurrence}$$

On part de l'hypothèse de récurrence :

$$\begin{aligned}
& 0 \leq u_n \leq 3 \\
\Rightarrow & 0 \leq f(u_n) \leq f(3) \text{ car f est croissante} \\
\Rightarrow & 0 \leq u_{n+1} \leq 3 \text{ d'après les questions précédentes}
\end{aligned}$$

L'hérédité est établie.
Donc $\forall n \in \mathbb{N} :\ 0 \leq u_n \leq 3$

6. **Initialisation** :
On a :

$$u_1 = f(u_0) = f(1) = 1.08 > 1 = u_0$$

L'initialisation est établie.

7. **Hérédité** :
On suppose que la propriété est vraie pour un certain rang $n \geq 0$:

$$0 \leq u_n \leq u_{n+1} \text{ c'est l'hypothèse de récurrence}$$

On part de l'hypothèse de récurrence :

$$\begin{aligned} &0 \leq u_n \leq u_{n+1} \\ \Rightarrow &0 \leq f(u_n) \leq f(u_{n+1}) \text{ car f est croissante} \\ \Rightarrow &0 \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \end{aligned}$$

L'hérédité est établie.
Donc $\forall n \in \mathbb{N} : \ u_n \leq u_{n+1}$

8. En déduire que la suite est convergente et donner sa limite.
Comme la suite est croissante et majorée, d'après le théorème de convergence monotone, la suite converge vers un nombre réel l qui vérifie :

$$\begin{aligned} &f(l) = l \\ \Leftrightarrow &l = 0 \text{ ou } l = 3 \end{aligned}$$

Comme la suite est croissante et que $u_0 > 0$, alors l ne peut pas être nul donc $l = 3$