

☞ Fonction logarithme 2

On considère la fonction suivante définie sur $]0; +\infty[$:

$$f(x) = 2x^2 + 10x + 2 - 13x^2 \ln(x)$$

1. Calculer la limite de f en 0^+
2. Calculer la limite de f en $+\infty$
3. Calculer la dérivée de f .
4. Calculer la dérivée seconde de f .
5. Déterminer le signe de $f''(x)$.
6. En déduire le tableau de variation de $f'(x)$.
7. Déterminer le nombre de solutions de $f'(x) = 0$ et en donner un encadrement d'amplitude 10^{-2} .
8. En déduire le tableau de variation de $f(x)$.
9. Déterminer le nombre de solutions de $f(x) = 0$.

Correction :

1. On sait que :

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} 2x^2 + 10x + 2 &= 2 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} 13x^2 \ln(x) &= 0 \text{ par propriété du cours} \\ \text{donc } \lim_{x \rightarrow 0^+} 2x^2 + 10x + 2 - 13x^2 \ln(x) &= 2\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^2 + 10x + 2 &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} -13x^2 \ln(x) &= -\infty \text{ par propriété du cours} \\ \text{donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^2 + 10x + 2 - 13x^2 \ln(x) &= -\infty \text{ par prédominance de } x^2 \ln(x)\end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}f'(x) &= 4x + 10 - 13(x^2 \ln(x))' \\ &= 4x + 10 - 13((x^2)' \ln(x) + x^2 \times (\ln(x))') \\ &= 4x + 10 - 13\left(2x \ln(x) + x^2 \times \frac{1}{x}\right) \\ &= 4x + 10 - 13(2x \ln(x) + x) \\ &= -9x + 10 - 26 \ln(x)\end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}f''(x) &= -9 - 26(x \ln(x))' \\ &= -9 - 26(x' \ln(x) + x \times (\ln(x))') \\ &= -9 - 26\left(\ln(x) + x \times \frac{1}{x}\right) \\ &= -9 - 26(\ln(x) + 1) \\ &= -35 - 26 \ln(x)\end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned}f'(x) &\geq 0 \\ -35 - 26 \ln(x) &\geq 0 \\ -26 \ln(x) &\geq 35 \\ \ln(x) &\leq \frac{35}{-26} \\ x &\leq e^{\frac{35}{-26}}\end{aligned}$$

6. On a :

x	0	$e^{\frac{35}{-26}}$	$+\infty$
$f''(x)$	+	0	-
$f'(x)$	10	$10 + 26e^{\frac{35}{-26}}$	$-\infty$

7. D'après le tableau de variation, comme $10 > 0$, la fonction f' ne peut pas s'annuler sur l'intervalle $]0; e^{\frac{35}{-26}}]$.

Pour $x > e^{\frac{35}{-26}}$, la fonction est décroissante de $10 + 26e^{\frac{35}{-26}} > 0$ vers $-\infty$, donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe une unique valeur $\alpha > e^{\frac{35}{-26}}$ telle que $f'(\alpha) = 0$.

En utilisant la calculatrice, on trouve :

$$f'(0.26) > 0$$

$$f'(0.27) < 0$$

$$0.26 < \alpha < 0.27$$

8. On a :

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	2	$f(\alpha)$	$-\infty$

9. D'après le tableau de variation, comme $2 > 0$, la fonction f ne peut pas s'annuler sur l'intervalle $]0; \alpha]$.

Pour $x > \alpha$, la fonction est décroissante de $f(\alpha) > 0$ vers $-\infty$, donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe une unique valeur $\beta > \alpha$ telle que $f(\beta) = 0$.

$$f(1.85) < 0$$

$$f(1.84) > 0$$

$$\text{donc } 1.84 < \beta < 1.85$$