


FIGURE 1

A



B





FIGURE 2

A

Comorbidities in Alcohol Screening Groups



B

Helmet Use: OR (95% CI, p-value)

Age (years)	–	0.98 (0.98–0.98, p<0.001)
Sex	Male	0.87 (0.84–0.89, p<0.001)
Race	White	–
	Black	4.63 (4.39–4.89, p<0.001)
	Asian	0.98 (0.92–1.04, p=0.467)
	Native American	2.74 (2.31–3.26, p<0.001)
	Pacific Islander	1.39 (1.12–1.75, p=0.003)
	Other	1.22 (1.16–1.28, p<0.001)
Ethnicity	Hispanic	2.64 (2.53–2.76, p<0.001)
Alcohol	Not Screened	–
	Sober	0.87 (0.85–0.90, p<0.001)
	Impaired	2.21 (1.94–2.53, p<0.001)
	Intoxicated	4.46 (4.13–4.83, p<0.001)
	Multi-Drug	5.49 (4.79–6.31, p<0.001)
Alcohol Use Disorder	Positive	2.38 (2.18–2.60, p<0.001)
Tobacco Use Disorder	Positive	4.72 (4.50–4.95, p<0.001)
Substance Use Disorder	Positive	2.84 (2.62–3.10, p<0.001)

