

Bitte lesen Sie diese Seite am OP-Tag einmal vollständig durch. Sie ersetzt nicht die persönliche Anweisung nach dem Eingriff, fasst aber die wichtigsten Verhaltensregeln, Medikamente und Warnzeichen zusammen.

1 · DIE ERSTEN STUNDEN

Ruhe und Lagerung

Gönnen Sie sich heute absolute Ruhe. Legen Sie sich hin, aber mit erhöhtem Oberkörper, zum Beispiel mit zwei Kissen. Vermeiden Sie körperliche Belastung, Bücken, schweres Heben und alles, was den Kreislauf stark anregt.

Kühlen: feucht, mild, in Intervallen

Kühlen Sie die Wangen von außen mit einem feuchten, kühlen Tuch oder Verband. Ideal ist kühles Wasser um etwa 17 °C, aber kein Eis. Kühlen Sie jeweils etwa 10 Minuten, dann 10 Minuten Pause.

Warum kein Eispack? Zu starke Kälte kann das Gewebe unterkühlen. Nach dem Wegnehmen versucht der Körper, die Stelle rasch wieder aufzuwärmen. Dadurch kann die Durchblutung steigen, was Schwellung, blaue Flecken, Schmerzen und Nachblutung fördern kann.

Tupfer und Blutung

Wenn ein Tupfer eingelegt wurde, beißen Sie konstant mit Druck darauf, meist 30 bis 60 Minuten. Bitte nicht zwischendurch ständig kontrollieren, weil die Blutstillung sonst immer wieder unterbrochen wird.

Normal: Rosa verfärbter Speichel oder leichter Blutgeschmack am OP-Tag ist häufig. Entscheidend ist, ob frisches Blut dauerhaft nachläuft.

2 · HEIMWEG, VERKEHR UND ABHOLUNG

Nach Lokalanästhesie

Auch nach einer Behandlung in Lokalanästhesie können Kreislaufprobleme auftreten. Fahren Sie nicht selbst Auto oder Fahrrad, wenn Sie sich unsicher, wackelig oder belastet fühlen. Ein Heimweg zu Fuß, mit Taxi oder als Mitfahrer ist sicherer.

Nach Sedierung oder Narkose

Nach oraler Sedierung per Tablette, Dämmer Schlaf oder Vollnarkose sind Sie nicht verkehrsfähig. Sie dürfen nicht selbst Auto oder Fahrrad fahren und die Praxis nicht alleine verlassen.

■ **Abholung aus der Praxis verpflichtend:** Die Begleitperson holt Sie in der Praxis ab. Am einfachsten ist das Parken im Parkhaus Carree mit anschließendem Weg per Aufzug zum Auto. Wenn kein Auto möglich ist, empfehlen wir die Heimfahrt mit Taxi und Begleitperson. Öffentliche Verkehrsmittel sind nach Sedierung oder Narkose nicht geeignet.

Für 24 Stunden nach Sedierung oder Narkose bitte keine Maschinen bedienen, keinen Alkohol trinken und keine wichtigen rechtlichen oder finanziellen Entscheidungen treffen.

3 · ESSEN UND TRINKEN

Heute

- Erst essen, wenn die Betäubung vollständig abgeklungen ist.
- Kühle oder lauwarme, weiche Kost: Joghurt, Pudding, kalte Suppe, Apfelmus, Smoothie.
- Keine heißen, harten oder krümeligen Speisen, zum Beispiel Brötchen, Chips, Nüsse.
- Ausreichend trinken, aber nur kalt oder lauwarm.
- Nicht durch einen Strohhalm oder eine Sportflasche mit Sog trinken.

Tage 1 bis 7

- Weiche Kost: Kartoffelbrei, Suppen, weiche Nudeln, Rührei, Smoothies.
- Nichts Scharfes, kein Chili, kein Pfeffer.
- Nichts Hartes oder Knuspriges, damit die Wunde nicht gereizt oder geöffnet wird.
- Ausreichend Energie und Flüssigkeit einplanen.

Wichtig: Zu wenig Essen und Trinken erhöht das Risiko für Kreislaufprobleme, Übelkeit, Erbrechen, schlechtere Schmerzmittelverträglichkeit, stärkere Schmerzen und Wundheilungsstörungen.

Bei Übelkeit: Nehmen Sie zunächst kleine Schlucke Wasser und etwas weiche Kost zu sich. Schmerzmittel bitte nicht nüchtern einnehmen. Wenn Sie wiederholt erbrechen oder Flüssigkeit und Medikamente nicht bei sich behalten können, melden Sie sich bitte.

4 · GENUSSMITTEL UND MUNDHYGIENE

Klare Pause

Für mindestens 3 bis 5 Tage gilt: kein Alkohol, kein Nikotin, kein Kaffee, keine Energydrinks. Diese Stoffe können Nachblutungen fördern und die Wundheilung verzögern. Rauchverzicht ist besonders wichtig, weil Rauchen das Risiko für eine trockene Alveole deutlich erhöht.

Zähneputzen und Blutpfropf schützen

Putzen Sie alle anderen Zähne vorsichtig weiter, aber sparen Sie das Operationsgebiet aus. Heute bitte nicht kräftig ausspülen, nicht gurgeln, nicht an der Wunde saugen und Speichel nicht kräftig ausspucken. Lassen Sie Flüssigkeit beim Ausspülen nur aus dem Mund laufen.

Ab morgen können Sie eine alkoholfreie Mundspülung oder, falls empfohlen, Chlorhexidin 0,2 % zweimal täglich nach dem Zähneputzen für etwa 1 Minute sanft im Mund bewegen und anschließend aus dem Mund laufen lassen.

Salzwasser-Mundbad ab dem Folgetag: Als Alternative oder Ergänzung können Sie nach dem Essen lauwarmes Salzwasser kurz im Mund stehen lassen oder nur sanft bewegen. Nicht gurgeln und nicht mit Druck spülen.

Keine Munddusche: Verwenden Sie keine Munddusche und keine Spülspritze, außer wir haben Ihnen das ausdrücklich gezeigt oder mitgegeben.

5 · MEDIKAMENTE

Schmerzmittel

Nehmen Sie das verordnete Schmerzmittel so ein, wie es mit Ihnen besprochen wurde. Wenn Sie bereits ein Rezept erhalten haben, kann die erste Tablette idealerweise etwa 1 Stunde vor dem Eingriff eingenommen werden; sonst nehmen Sie nach dem Eingriff frühzeitig eine Tablette, auch wenn die Betäubung noch wirkt.

Am OP-Tag nehmen Sie die Schmerzmittel nach Bedarf und oft auch abends vor dem Schlafengehen. Ab dem nächsten Tag nach Bedarf nach Plan. Schmerzmittel bitte nicht nüchtern einnehmen. Die Schmerzen können in den ersten 2 bis 3 Tagen zunehmen, das ist häufig normal.

Antibiotikum und Mundspülung

Falls ein Antibiotikum verordnet wurde, nehmen Sie es nach unserer Empfehlung ein und setzen Sie es nicht eigenständig ab.

Eine Mundspüllösung kann die Mundhygiene unterstützen. Start in der Regel ab dem Tag nach dem Eingriff, zweimal täglich nach dem Zähneputzen, jeweils etwa 1 Minute sanft bewegen und anschließend aus dem Mund laufen lassen.

Kein Aspirin / ASS: Bitte meiden, weil es blutverdünnend wirkt und Nachblutungen fördern kann.

6 · WAS IST NORMAL?

2-3

TAGE

Schwellung und Schmerzen können am 2. oder 3. Tag am stärksten sein und danach langsam abklingen.

3-6

STUNDEN

Die Betäubung klingt meist innerhalb weniger Stunden ab. Solange Lippen, Wange oder Zunge taub sind, bitte nicht kauen.

1-2

WOCHEN

Die Mundöffnung kann eingeschränkt sein. Das bessert sich meistens schrittweise.

38,5

GRAD

Leichtes Fieber bis 38,5 °C in den ersten 2 Tagen kann als Immunreaktion vorkommen.

Blau

FLECK

Ein blauer Fleck am Kiefer oder Hals kann auffällig aussehen, ist aber meist harmlos und verschwindet von selbst.

Naht

KONTROLLE

Fäden werden meist nach etwa 1 Woche entfernt, sofern keine selbstauflösenden Fäden verwendet wurden.

7 · WARNZEICHEN

Bitte zeitnah melden bei

- starker Blutung, die trotz 30 Minuten Druck auf Tupfer oder Stofftaschentuch nicht nachlässt
- Schmerzen, die nach anfänglicher Besserung ab Tag 3 bis 4 wieder deutlich zunehmen
- tief sitzendem oder zum Ohr ausstrahlendem Schmerz, schlechtem Geschmack oder Geruch trotz Schmerzmitteln
- Fieber über 38,5 °C oder Fieber länger als 2 Tage
- Eiter, stark üblem Geschmack oder stark fauligem Geruch
- Taubheit an Lippe, Kinn oder Zunge, die am nächsten Tag noch besteht

Starke Blutung: Sofortmaßnahme

Beißen Sie für 30 Minuten konstant mit Druck auf ein sauberes Stofftaschentuch oder eine Mullbinde. Kopf hoch lagern. Nicht ständig nachsehen, sonst beginnt die Blutung immer wieder neu.

Außerhalb der Praxisprechzeiten stehen wir für Notfälle unter der Telefonnummer +49 151 10437450 zur Verfügung.

Bei Problemen nach dem Eingriff zuerst diese Notfallnummer nutzen. Wenn wir nicht erreichbar sind: zahnärztlicher Notdienst 01805 60 70 11. Nur bei lebensbedrohlicher Notlage, Atemnot, starker Schluckbehinderung oder raschem Anschwellen von Mundboden, Hals oder Zunge: sofort 112 rufen.

8 · SONDERREGELN BEI OBERKIEFER UND KIEFERHÖHLE

Nur wenn wir es Ihnen gesagt haben

Wenn ein Oberkiefer-Weisheitszahn sehr nahe an der Kieferhöhle lag oder wir Ihnen nach dem Eingriff Kieferhöhlenregeln mitgegeben haben, gelten für 10 bis 14 Tage zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen.

Druck vermeiden

- Nicht die Nase schnäuzen, nur vorsichtig abwischen.
- Beim Niesen den Mund offen lassen.
- Keinen Druckausgleich, kein Tauchen und keine starke Pressatmung.
- Wenn Flüssigkeit beim Trinken aus der Nase kommt: bitte melden.

9 · ARBEIT, SPORT UND SCHONUNG

Arbeitsunfähigkeit

Die Dauer richtet sich nach Eingriffsumfang und Beruf. Bei Büroarbeit reichen häufig 2 bis 3 Tage, bei körperlicher Arbeit eher 5 bis 7 Tage.

Sport und Belastung

Für 10 bis 14 Tage kein Sport, keine Sauna, kein Schwimmbad und kein schweres Heben. Belastung erhöht den Blutdruck und kann Nachblutungen auslösen.

Allgemeine Schonung

Vermeiden Sie alles, was Sie ins Schwitzen bringt oder den Kreislauf stark belastet. Planen Sie die ersten Tage bewusst ruhig.

10 · KONTAKT UND VERSTÄNDNIS

So erreichen Sie uns

Praxis: **06151 786540**.

Außerhalb der Praxissprechzeiten stehen wir für Notfälle unter der Telefonnummer +49 151 10437450 zur Verfügung.

Wenn wir nicht erreichbar sind: zahnärztlicher Notdienst **01805 60 70 11**. Nur bei lebensbedrohlicher Notlage, Atemnot, starker Schluckbehinderung oder rascher Schwellung gilt: **112**.

Merksatz für zu Hause

Ruhe, feuchte milde Kühlung, Tupferdruck nicht ständig unterbrechen, ausreichend essen und trinken, kein Sog an der Wunde, Medikamente wie besprochen und bei Warnzeichen sofort melden.