

Lippen- und Zungenbändchen

Kurzmerkblatt zur operativen Korrektur · üblicherweise V-Y-Plastik

Warum behandeln?

Ein Bändchen ist eine normale Schleimhautfalte. Ein Eingriff kommt bei störendem Zug oder nachgewiesener Bewegungseinschränkung infrage. Lippenbändchen: etwa Zug am Zahnfleisch oder ein abgestimmter kieferorthopädischer Behandlungsplan. Zungenbändchen: eingeschränkte Zungenfunktion mit passenden Beschwerden. Aussehen allein ist kein Operationsgrund.

Ablauf und Alternativen

Nach wirksamer Betäubung lösen und verlagern wir das einschränkende Gewebe. Bei der V-Y-Plastik wird ein V-förmig angelegter Bereich Y-förmig vernäht, um Bewegungsfreiheit zu gewinnen. Beobachtung, Logopädie, Kieferorthopädie oder eine andere Schnittführung können Alternativen sein. Eine Zahnlücke schließt sich nicht automatisch; ein bestimmter Sprach- oder Funktionserfolg ist nicht garantiert.

Vorbereitung und Nachsorge

- Medikamente, Allergien, Gerinnungsprobleme und Voroperationen angeben. Blutverdünner nicht selbst absetzen.
- Betäubung und gegebenenfalls Nüchternheit individuell vereinbaren. Bei Sedierung/Narkose: Abholung aus der Praxis verpflichtend, 24 Stunden nicht verkehrsfähig. Kinder nach persönlichem Plan versorgen.
- Bis zum Ende der Betäubung nichts kauen und nichts Heißes trinken. Danach weiche, lauwarme Kost; ausreichend trinken. Vorsichtig putzen, nicht rauchen, zunächst körperlich schonen.
- Wunde nicht auseinanderziehen. Übungen nur nach Anleitung und Freigabe; kein gewaltsames Dehnen. Fäden werden je nach Material nach 1–2 Wochen entfernt oder lösen sich selbst auf.

Risiken und Kosten

Schmerzen, Schwellung, Nachblutung, Infektion, Nahtöffnung, Narbenzug und Wiederanheftung sind möglich. Am Zungenbändchen können Speicheldrüsgänge, Gefäße oder Nerven verletzt werden; selten bleiben Funktions- oder Gefühlsstörungen. Am Lippenbändchen sind Zahnfleischschäden möglich. Kostenübernahme und mögliche Eigenleistungen werden vorab individuell geklärt.

Bei Warnzeichen melden: Blutung, zunehmende Schmerzen/Schwellung, Fieber, Eiter oder unzureichendes Trinken: 06151 786540. Außerhalb der Praxissprechzeiten nach OP: **+49 151 10437450**; falls nicht erreichbar: **01805 60 70 11**. Bei Atemnot, starker Schluckbehinderung, rascher Mundboden-/Hals-/Zungenschwellung oder lebensbedrohlicher Notlage: **112**.



Online lesen oder weitergeben
patienteninfo.mkg-im-carree.de/baendchen/
QR-Code mit dem Smartphone scannen.

Bitte die ausführliche Information lesen. Dieses Merkblatt ersetzt nicht die persönliche Aufklärung. Für Säuglinge sind Indikation, Verfahren und Nachsorge gesondert festzulegen.