

Knochenaufbau

Ein tragfähiges Knochenlager ermöglicht eine sinnvolle Implantatposition. Methode, Material und Zeitpunkt richten sich nach Ihrem Befund und dem geplanten Zahnersatz. Diese Kurzinformation ergänzt die ausführliche Beratung und das persönliche Gespräch.

Die Methoden im Überblick

- **Kleine Restdefekte: Sticky Bone.** Ein formbarer Verbund aus Aufbaumaterial und körpereigenem Fibrin ergänzt begrenzte Defekte. Bei ausreichender Implantatstabilität oft gleichzeitig möglich.
- **Mittlere Defekte: Semilunartechnik oder PTFE-Membran.** Eine gebogene Eigenknochenschale oder eine titanverstärkte Barriere schützt den mit Spänen aufgefüllten Raum. PTFE wird später entfernt.
- **Größere vertikale Defekte: Schalenteknik.** Fixierte Schalen halten den Raum für Knochenspäne. In unserer Praxis in der Regel zuerst Aufbau, nach Einheilung Implantation.

Die Defektgröße allein entscheidet nicht: Form, Weichgewebe, Durchblutung und Verankerungsmöglichkeiten zählen ebenfalls. Ein Sinuslift ist eine besondere Aufbauform im hinteren Oberkiefer.

Planung, Heilzeit und Alternativen

Geeignete Röntgenbilder, bei Bedarf DVT, unterstützen die Planung. Ein getrennter größerer Aufbau heilt häufig etwa vier bis sechs Monate vor erneuter Beurteilung; die Implantateinheilung folgt zusätzlich. Andere Implantatkonzepte, Brücke oder Prothese können Alternativen sein. Kosten werden individuell vorab vereinbart.

Risiken und Betäubung

Schwellung, Schmerzen, Nachblutung, Infektion, Wundöffnung und teilweiser oder vollständiger Verlust des Aufbaus sind möglich. Je nach Lage bestehen Risiken für Nachbarzähne, Nerven oder Kieferhöhle; Eigenknochenentnahme schafft eine weitere Wundstelle. Zusätzliche Behandlung kann nötig werden. Örtliche Betäubung ist Standard; Komfortoptionen werden individuell besprochen. Bei Sedierung/Narkose sind Abholung und die vereinbarten Verhaltensregeln erforderlich.

Den Aufbau schützen

Nicht auf den frisch operierten Kieferkamm beißen. Weiche Nahrung, kein Druck durch Prothesen, sorgfältige Mundhygiene nach Anweisung, nicht rauchen und Kontrollen einhalten. Medikamente nicht selbst absetzen. Bei zunehmenden Beschwerden, Fieber, Eiter, anhaltender Blutung oder sichtbarer Membran zeitnah Kontakt aufnehmen.



Ausführliche Beratung mit Bildern
patienteninfo.mkg-im-carree.de
Praxis: 06151 786540