

Implantat-Recall: langfristig gut betreut

Nach der Implantation und der Versorgung mit Zahnersatz geht die Betreuung weiter. Durch regelmäßige Kontrollen möchten wir Veränderungen früh erkennen, Schäden möglichst abwenden und den langfristigen Erhalt Ihrer Implantate unterstützen.

Chirurgie und Hauszahnarzt arbeiten zusammen

Wir kontrollieren die Implantate, die in unserer Praxis chirurgisch eingesetzt und anschließend von Ihrer Hauszahnarztpraxis prothetisch versorgt wurden. Dabei betrachten wir Knochen, Schleimhaut und die gesamte Implantatkonstruktion. Die Hauszahnarztpraxis betreut den Zahnersatz sowie die laufende zahnärztliche Vorsorge und Reinigung.

Unser Zeitplan für die Kontrollen

Erste zwei Jahre: jährlich

In den ersten zwei Jahren führen wir jährlich eine chirurgische Implantatkontrolle durch. Wir stimmen die Termine unter Berücksichtigung von Implantation und Eingliederung des Zahnersatzes ab.

Danach: nach stabilem Verlauf

Sind die Verhältnisse über zwei Jahre stabil geblieben, können wir auf längere chirurgische Kontrollabstände umstellen. Den nächsten Termin vereinbaren wir individuell.

Auch nach zwei Jahren bleibt regelmäßige Betreuung notwendig. Die unterstützende Pflege und Kontrolle beim Hauszahnarzt wird dauerhaft fortgesetzt. Ihre Abstände richten sich nach Entzündungsrisiko, Reinigung und Befund; bei erhöhtem Risiko sind kürzere Abstände sinnvoll.

Warum kontrollieren, wenn nichts weh tut?

Entzündungen und technische Veränderungen können anfangs unauffällig sein. Eine Entzündung der Schleimhaut um ein Implantat heißt **periimplantäre Mukositis**. Geht zusätzlich stützender Knochen verloren, spricht man von **Periimplantitis**. Früh erkannt lässt sich eine Schleimhautentzündung häufig gut behandeln. Ein fortgeschrittener Befund erfordert eine weitergehende Therapie.

Auch eine Schraubverbindung kann sich lockern, bevor deutliche Beschwerden entstehen. Regelmäßige Termine helfen, solche Veränderungen rechtzeitig zu bemerken; sie können einen dauerhaft störungsfreien Verlauf nicht garantieren.

Vor dem Termin

Bitte bringen Sie Implantatpass, aktuelle Medikamentenliste und gegebenenfalls Ihre Knirscherschiene mit. Vorhandene Röntgenbilder und Angaben zur prothetischen Versorgung können wir über die Hauszahnarztpraxis anfordern. Neue Erkrankungen, Rauchen, Diabetes, frühere Parodontitis und Schwierigkeiten beim Reinigen sind für die Planung wichtig.

Ihre Checkliste

Implantatpass und Medikamente aktuell? Pflegehilfsmittel passend? Beschwerden angesprochen? Nächster chirurgischer Termin und laufende Betreuung beim Hauszahnarzt vereinbart?

Was wir beim Implantat-Recall beurteilen

Hartgewebe und Verlauf

Knochenverhältnisse und Veränderungen gegenüber früheren Befunden. Geeignete Röntgenaufnahmen ergänzen die Untersuchung, wenn eine konkrete Frage zu klären ist.

Weichgewebe und Narben

Farbe, Schwellung, Blutung, Eiter, Schleimhautbeschaffenheit und Zahnfleischrückgang. Wir achten auf reizlose Narben und Zug- oder Druckstellen.

Hygiene und Pflegbarkeit

Beläge und Speiseeinlagerungen sowie die Zugänglichkeit unter Kronen, Brücken und Prothesen. Wir prüfen, ob die empfohlenen Hilfsmittel tatsächlich passen.

Konstruktion und Funktion

Sicherer Sitz der Versorgung, Zustand ihrer Verbindungsteile, sichtbare Schäden und Verschleiß. Auch Bisskontakte, Knirschen und mögliche Zementreste werden berücksichtigt.

Messwerte machen Veränderungen sichtbar

Mit einer feinen Sonde untersuchen wir vorsichtig das Gewebe rund um jedes Implantat, möglichst an sechs Stellen. Wir erfassen Taschentiefen, Blutung und gegebenenfalls Eiter. Aussagekräftig ist vor allem der Vergleich mit früheren Werten: Eine einzelne tiefe Messung beweist für sich allein keine Erkrankung.

Ein Ausgangsbefund nach Fertigstellung des Zahnersatzes hilft bei späteren Kontrollen. Fehlen frühere Messwerte oder Bilder, versuchen wir sie zu beschaffen und legen einen nachvollziehbaren aktuellen Befund an.

Wann wird geröntgt?

Eine geeignete Referenzaufnahme dokumentiert den Knochenstand. Neue Aufnahmen werden individuell begründet, beispielsweise bei zunehmenden Taschentiefen zusammen mit Blutung oder Eiter. Oft genügt eine gezielte zweidimensionale Aufnahme. **Ein DVT gehört nicht routinemäßig zu jedem Recall.**

Was bedeutet eine Lockerung?

Eine bewegliche Krone oder Brücke kann auf eine gelockerte Prothetik- oder Aufbauschraube hinweisen. Das ist von einem im Knochen beweglichen Implantat zu unterscheiden. Wir klären, welcher Teil betroffen ist, und stimmen eine notwendige Versorgung mit Ihrer Hauszahnarztpraxis ab.

- Wird eine lockere Verbindung weiter belastet, können wiederholte Bewegungen zu Verschleiß beziehungsweise Abrieb und Schäden an Schraube oder Verbindung führen. Dadurch sind auch Bruch und spätere Passungsprobleme möglich. **Klicken oder Wackeln bitte zeitnah abklären lassen.**

Eine unauffällige Versorgung wird nicht automatisch abgeschraubt oder routinemäßig nachgezogen. Ein fester Sitz allein schließt eine Entzündung nicht aus.

Welche Kosten entstehen?

Der Umfang von Kontrolle, Reinigung, Bildgebung oder Reparatur richtet sich nach dem Befund. Wir erläutern notwendige Leistungen, mögliche Eigenleistungen und Erstattungsfragen vorab. Es gibt hier keine pauschale Kosten- oder Erstattungszusage.

Was folgt aus der Kontrolle?

- **Stabile Verhältnisse:** Pflege besprechen und den nächsten chirurgischen sowie zahnärztlichen Termin festlegen.
- **Schleimhautentzündung:** Beläge professionell entfernen lassen, häusliche Reinigung verbessern und den Verlauf kontrollieren. Schlecht erreichbare Bereiche können eine Anpassung der Prothetik erfordern.
- **Verdacht auf Periimplantitis:** Befund gezielt ergänzen und einen gesonderten Behandlungsplan besprechen.
- **Lockerung oder Schaden:** Die Ursache klären und die technische beziehungsweise chirurgische Behandlung mit der zuständigen Praxis abstimmen.

Was Sie selbst beitragen können

Reinigen Sie Zähne und Implantate täglich sowie die Zwischenräume und Bereiche unter der Versorgung mit den für Sie angepassten Hilfsmitteln. Lassen Sie sich die Anwendung zeigen. Achten Sie auf eine gute Diabeteseinstellung und vermeiden Sie Rauchen. Bei Knirschen kann eine individuell angefertigte Schiene sinnvoll sein. Spüllösungen ersetzen die mechanische Reinigung nicht.

Häufige Fragen

Tut die Untersuchung weh und brauche ich eine Betäubung?

Die normale Kontrolle benötigt keine Betäubung. Die vorsichtige Sondierung kann kurz unangenehm sein oder an entzündeten Stellen bluten. Falls weitere Behandlung nötig wird, besprechen wir deren Ablauf und gegebenenfalls Betäubung gesondert.

Ist der Recall dasselbe wie eine professionelle Reinigung?

Nein. Der Recall beurteilt den Zustand und legt weitere Schritte fest. Die regelmäßige unterstützende Reinigung ist ein eigener Bestandteil Ihrer Betreuung und wird mit der Hauszahnarztpraxis abgestimmt.

Warnzeichen und Kontakt

Bei Blutung beim Reinigen, Eiter, neuem schlechten Geschmack, Schwellung, Schmerzen oder einem veränderten Biss bitte einen zeitnahen Termin vereinbaren. Wenn etwas wackelt: möglichst nicht darauf kauen, nichts selbst festdrehen oder ankleben und nicht bis zum nächsten Recall warten.

Praxis: **06151 786540**. Nach einem Eingriff außerhalb der Praxissprechzeiten: **+49 151 10437450**. Falls nicht erreichbar: zahnärztlicher Notdienst **01805 60 70 11**.

Bei lebensbedrohlicher Notlage, Atemnot, starker Schluckbehinderung oder rascher Schwellung von Mundboden, Hals oder Zunge: **112**.

Fachliche Grundlagen: Praxisablauf MKG im Carree; [EFP S3-Leitlinie / clinical practice guideline, 2023](#); [World Workshop: peri-implant diseases and conditions, 2018](#); [ITI: implant-supported fixed prostheses, technical complications and maintenance](#). Abruf 09.09.2026. Diese Information ergänzt Ihre individuelle Beratung.