

Mini-Pins für die Kieferorthopädie

Kleine, vorübergehend im Knochen befestigte Schrauben geben Halt für gezielte Zahnbewegungen. Sie werden nach Erfüllung ihrer Aufgabe wieder entfernt.

Wozu dienen Mini-Pins?

Die Verankerung kann direkt am zu bewegenden Zahn oder indirekt über eine stabilisierte Zahngruppe beziehungsweise Apparatur wirken. Einsatzorte sind beispielsweise der Gaumen oder geeignete Bereiche im Ober- und Unterkiefer. Ziel können Lückenschluss, Aufrichtung oder die Unterstützung der Einordnung retinierter und verlagter Zähne sein.

Planung und Einsetzen

Wir planen diese Behandlung üblicherweise dreidimensional mit **DVT und individueller Bohrschablone**, besonders bei knappen Abständen zwischen Wurzeln. Ob die Röntgenaufnahme erforderlich ist, wird für jeden Fall geprüft – bei Kindern besonders sorgfältig. Unter örtlicher Betäubung werden die Pins eingesetzt und ihr Halt kontrolliert. Die Kieferorthopädie steuert Verbindung, Kräfte und Bewegungsablauf.

Wichtige Risiken

Schmerzen, Schwellung, Blutung, Infektion oder Schleimhautreizungen sind möglich. Pins können sich lockern, brechen oder ersetzt werden müssen. Je nach Lage können Wurzeln, Zahnanlagen, Nerven, Nasenboden oder Kieferhöhle verletzt werden. Selten werden gelöste Teile verschluckt oder eingeatmet. Auch eine Schablone schließt Risiken nicht aus; der Erfolg der Zahnbewegung ist nicht garantiert.

Danach zu Hause

- Erst nach Abklingen der Betäubung essen; zunächst weich und lauwarm. Am Behandlungstag schonen, bei Bedarf von außen mit Pausen kühlen.
- Mit weicher Bürste nach Anleitung reinigen. Nicht am Pin drehen oder mit der Zunge daran spielen; keine Zugkräfte selbst verändern.
- Schmerzmittel nur nach persönlicher Anweisung; Kinder erhalten einen Plan nach Alter und Gewicht. Verordnete Medikamente nicht selbst absetzen.
- Kontrolle und KFO-Anschlussstermin einhalten; bei Naht werden Fäden nach 1–2 Wochen entfernt. Die spätere Pinentfernung wird gesondert vereinbart.

■ **Lockerung, Druckstelle oder abgegangenes Teil:** Nicht selbst befestigen; zeitnah unsere Praxis und die Kieferorthopädie kontaktieren.

Sofort melden bei anhaltender Blutung, Fieber, Eiter oder zunehmender Schwellung: **06151 786540**. Postoperativ außerhalb der Praxissprechzeiten: **+49 151 10437450**; falls nicht erreichbar **01805 60 70 11**. Bei lebensbedrohlicher Notlage, Atemnot, starker Schluckbehinderung oder rascher Mundboden-/Hals-/Zungenschwellung: **112**.

Alternativen, Betäubung und Kosten einschließlich DVT, Schablone und Entfernung werden vorab individuell besprochen. Die ausführliche Information ergänzt diese Kurzfassung.