

Ästhetische Behandlung mit Botulinumtoxin

Die Behandlung kann die Ausprägung bewegungsabhängiger Gesichtsfalten vorübergehend vermindern. Im Mittelpunkt stehen Ihre individuelle Mimik, die anatomischen Voraussetzungen und ein gemeinsam vereinbartes, realistisches Ziel.

Wie wirkt Botulinumtoxin?

Botulinumtoxin Typ A vermindert zeitweise die Aktivierung ausgewählter mimischer Muskeln. Die Haut wird an diesen Stellen weniger stark zusammengezogen. Der Wirkstoff füllt kein Gewebe auf und verändert nicht die Grundstruktur der Haut.

Welche Bereiche typischerweise besprochen werden

Zornesfalte

Die senkrechten Linien zwischen den Augenbrauen können bei konzentrierter oder angespannter Mimik stärker hervortreten.

Stirn

Horizontale Falten entstehen beim Anheben der Augenbrauen. Brauenposition und Funktion müssen bei der Planung mitberücksichtigt werden.

Seitliche Augenfältchen

Feine Linien außen am Auge werden beim Lächeln sichtbar. Augenfunktion und Lidschluss bleiben bei der Abwägung wesentlich.

Andere Regionen

Anwendungen außerhalb der jeweiligen Zulassung werden gesondert geprüft und gegebenenfalls als Off-Label-Use aufgeklärt.

Ob eine Behandlung zugelassen ist, hängt vom ausgewählten Präparat, der Region, dem Alter und weiteren Voraussetzungen ab. Nicht jede unter „Botox“ angebotene Anwendung hat dieselbe Zulassung.

Was sich damit nicht zuverlässig verändern lässt

Ausgeprägter Hautüberschuss, Volumenverlust und tief eingeprägte Ruhefalten können verbleiben. Mehr Wirkstoff bedeutet nicht automatisch ein besseres Ergebnis. Vollständige Symmetrie oder Faltenfreiheit lassen sich nicht garantieren.

Die Behandlung ist freiwillig. Wir besprechen Ihren Wunsch ohne Zeitdruck. Ein natürlicher Gesichtsausdruck und das Belassen einzelner Linien können Teil des vereinbarten Ziels sein.

Beratung und Vorbereitung

Wir betrachten Ihr Gesicht in Ruhe und bei Bewegung, vorhandene Asymmetrien, Lid- und Brauenposition sowie frühere Behandlungen. Bitte nennen Sie Medikamente, Allergien, neuromuskuläre Erkrankungen, Schluck- oder Atemprobleme und frühere Botulinumtoxin-Injektionen einschließlich Zeitpunkt und Präparat.

Bestimmte Antibiotika und muskelwirksame Medikamente können Wechselwirkungen verursachen. Gerinnungshemmer nicht selbst absetzen. Bei aktiver Entzündung im Gebiet oder fehlender Eignung wird nicht behandelt. Eine elektive ästhetische Behandlung wird in Schwangerschaft und Stillzeit verschoben; diese Information richtet sich an Erwachsene.

Behandlungsablauf und Betäubung

1. **Ziel und Regionen festlegen.** Wir vereinbaren, welche Veränderung sinnvoll und erreichbar erscheint.
2. **Gezielt injizieren.** Nach Desinfektion werden kleine Mengen mit feinen Nadeln in die vorgesehenen Muskeln gegeben. Menge und Verteilung werden individuell gewählt.
3. **Verlauf beurteilen.** Die Wirkung entsteht nicht sofort. Wir vereinbaren eine Kontrolle und entscheiden bei Bedarf über weitere Schritte.

Die Einstiche können kurz schmerzen oder brennen. Eine Sedierung oder Vollnarkose ist normalerweise nicht nötig. Bei Bedarf besprechen wir Kühlung oder geeignete lokale Maßnahmen. Sie bleiben während der Behandlung wach.

Mögliche Risiken

- Rötung, Schwellung, Bluterguss, Einstichschmerz, Kopfschmerz, Infektion oder allergische Reaktion.
- Ungewollt stärkere oder ungleichmäßige Muskelentspannung mit Asymmetrie, schwerem Stirngefühl, abgesenkter Braue oder hängendem Oberlid.
- Je nach Region trockene Augen, gestörter Lidschluss, Doppelbilder oder ein verändertes Lächeln. Auffällige Augenbeschwerden müssen zeitnah ärztlich beurteilt werden.
- Selten ausgeprägte allgemeine Muskelschwäche und Sprech-, Schluck- oder Atemprobleme durch Wirkung außerhalb der Zielregion. Schwere Allergien sind selten, aber möglich.
- Unzureichende oder kürzer als gewünschte Wirkung; bei häufigen Behandlungen kann Antikörperbildung die Wirkung beeinträchtigen.

■ Botulinumtoxin lässt sich nach der Injektion nicht einfach sofort auflösen. Unerwünschte Wirkungen müssen
■ gegebenenfalls ärztlich behandelt werden und bilden sich häufig mit dem Nachlassen der Muskelwirkung
■ zurück.

Wann beginnt die Wirkung und wie lange hält sie an?

Erste Veränderungen zeigen sich meist nach einigen Tagen. Die Wirkung entwickelt sich über die folgenden Wochen. Eine Kontrolle findet häufig nach etwa zwei Wochen statt; je nach Präparat und Region kann das Wirkmaximum später erreicht werden.

Häufig hält die Wirkung ungefähr drei bis vier Monate. Dauer und Ausprägung können abweichen. Eine erneute Behandlung richtet sich nach dem Verlauf und den präparatspezifischen Mindestabständen; sie erfolgt nicht automatisch.

Nach der Behandlung

Am Behandlungstag die Einstichstellen nicht kräftig reiben oder massieren. Intensiven Sport, starke Wärme und Alkohol zunächst vermeiden. Bei Rötung oder Schwellung nach persönlicher Anweisung schonen. Bei relevanten Seh- oder Funktionsstörungen nicht selbst fahren.

Bei zunehmender Entzündung, auffälliger Asymmetrie oder Lid- und Augenbeschwerden bitte Kontakt aufnehmen. Nicht eigenständig „nachbehandeln“ oder in kurzem Abstand bei mehreren Stellen injizieren lassen.

Neue Sprech-, Schluck- oder Atemstörungen sowie ausgeprägte allgemeine Muskelschwäche müssen sofort ärztlich abgeklärt werden.

Praxis **06151 786540**. Nach der Behandlung außerhalb der Praxissprechzeiten: **+49 151 10437450**. Falls nicht erreichbar: zahnärztlicher Notdienst **01805 60 70 11**.

Bei lebensbedrohlicher Notlage, Atemnot, starker Schluckbehinderung oder rascher Schwellung von Mundboden, Hals oder Zunge: **112**.

Alternativen und Kosten

Nichtbehandlung ist immer eine Möglichkeit. Je nach Ursache kommen Hautpflege und UV-Schutz, hauterneuernde Verfahren, eine gesondert geplante Hyaluronbehandlung oder operative Verfahren infrage. Es gibt keine für alle Gesichter passende Kombination.

Die Behandlung erfolgt als **individuell vereinbarte Eigenleistung**. Regionen, Umfang, Nachkontrolle und mögliche weitere Sitzungen werden vorab besprochen. Eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse wird nicht zugesagt.

Häufige Fragen

Ist Botulinumtoxin dasselbe wie Hyaluron?

Nein. Botulinumtoxin wirkt auf Muskelaktivität. Hyaluron dient je nach Produkt der Hautqualität, dem Volumen oder der Kontur. Die Verfahren haben unterschiedliche Risiken.

Kann ich mich erst später entscheiden?

Ja. Nehmen Sie sich Zeit für die Entscheidung. Eine Beratung verpflichtet nicht zur Behandlung.

Ihre Checkliste

Ziel und Grenzen klar? Vorbehandlungen vollständig angegeben? Zulassung beziehungsweise Off-Label-Use besprochen? Risiken, Eigenleistung und Kontrolltermin geklärt?

Fachliche Grundlagen

Fachinformation Botulinumtoxin Typ A; [Herstellerinformation zu zugelassenen Gesichtsregionen](#). Abruf 13.09.2026. Die konkrete Anwendung richtet sich nach Ihrem Befund und den Angaben zum ausgewählten Präparat.