

Mitschrift der Vorlesung "Theoretische Physik  
3: Quantenmechanik" im SS14 an der  
FAU-Erlangen

Benjamin Lotter

# Contents

# Chapter 1

## Einführung

### 1.1 Wiederholung klassische Mechanik

Massepunkt in 1D:  $x(t)$

$m \cdot x(t) = F = -\frac{dU}{dx}$  Impuls  $p(t) = m\dot{x}(t)$

$x(0), p(0)$  bekannt  $\rightarrow x(t), p(t)$  bestimmt für alle  $t > 0$ .

Klassische Mechanik: kausal, deterministisch

Quantenmechanik: kausal, nicht deterministisch **Lagrange-Formalismus**

$$L = T - v = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - V(x)$$

Euler-Lagrange-Gleichung:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} &= 0 \\ \frac{d}{dt} m\dot{x} - \frac{\partial V}{\partial x} &= 0 \Rightarrow m\ddot{x} = -\frac{\partial V}{\partial x}\end{aligned}$$

**Hamilton-Formalismus**

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}$$

Hamilton-Funktion:

$$\begin{aligned}H(x, p) &= \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \dot{x} - L = p \frac{p}{m} - \left[ \underbrace{\frac{1}{2}m\dot{x}^2}_{\frac{p^2}{2m}} - V(x) \right] \\ &= \frac{1}{2m}p^2 + V(x) = T + V = E_{tot}\end{aligned}$$

Bewegungsgleichung:

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m}$$
$$\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -\frac{\partial V}{\partial x}$$

## 1.2 Grenzen der klassischen Physik - Quantenphänomene

### Eigenschaften elektromagnetischer Strahlung

1. Hohlraumstrahlung Frequenzverteilung nicht klassisch erklärbar
2. Photoeffekt

Erklärung: Planck(1900), Einstein (1905)

Lichtquanten (Photonen) mit Energie  $E = h\nu$  ( $h = 6.626 \cdot 10^{-34} Js$  plancksches Wirkungsquantum).

### Eigenschaften von Materie

1. direkte Linien in der Spektroskopie Atommodelle: Rutherford, Bohr
2. Bewegung von Teilchen zeigt Welleneigenschaften Postulat de Broglie (1923) Materieteilchen lassen sich wie Wellen beschreiben  $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$

### Beispiele:

1. Ball ( $m = 1kg$ ) mit Geschwindigkeit  $v = 10 \frac{m}{s}$

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{6.626 \cdot 10^{-34} Js}{10kg \frac{m}{s}} = 6.6 \cdot 10^{-35} m$$

2. Elektron mit Energie  $100eV (\simeq 1.6 \cdot 10^{-17} J)$

$$\lambda = 1.2 \cdot 10^{-10} m = 1.2 \text{\AA}$$

Experimente: Davison / Germer (1927): Beugung von Elektronen an Kristallen.

## Chapter 2

# Grundprinzipien der Quantenmechanik und erste Anwendungen

### 2.1 Wellenfunktion, Schrödingergleichung und die Postulate der Quantenmechanik

#### 2.1.1 1. Postulat (Wellenfunktion, Zustand)

Der Zustand eines quantenmechanischen Systems wird durch eine Wellenfunktion (Zustandsfunktion/Zustand)  $\Psi$  beschrieben, die i.A. von den Koordinaten aller Teilchen und der Zeit abhängt.

Z.B. ein Teilchen  $\vec{r} = (x, y, z)$   $\Psi(x, y, z, t) = \Psi(\vec{r}, t)$

Die Wahrscheinlichkeit das Teilchen (zur Zeit  $t$ ) im Bereich  $V \in \mathbb{R}^3$  zu finden ist gegeben durch

$$\int_V d^3r |\Psi(\vec{r}, t)|^2$$

Für infinitesimale Volumen  $dV$  ist  $|\Psi(\vec{r}, t)|^2 dV$  die Wahrscheinlichkeit das Teilchen in  $dV$  um  $\vec{r}$  zu finden.

$\varphi(\vec{r}, t) = |\Psi(\vec{r}, t)|^2$  ist die Wahrscheinlichkeitsdichte.

Es gilt die Normierungsbedingung

$$\int_{\mathbb{R}^3} d^3r |\Psi(\vec{r}, t)|^2 = 1$$

falls  $\Psi$  quadratintegrabel. **Bemerkungen:**

1. Systeme mit  $n$  Teilchen  $\vec{r}_j = (x_j, y_j, z_j)$   $j = 1 \dots n \rightarrow \Psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_n, t)$   
 $H_2$  Molekül (2 Elektronen, 2 Protonen):  $\Psi(r_1, r_2, r_3, r_4, t)$

2. i.A  $\Psi(\vec{r}, t) \in \mathbb{C}$

3.  $\Psi$  ist bis auf globalen Phasenfaktor eindeutig

$$\begin{aligned}\tilde{\Psi}(\vec{r}, t) &= e^{ia} \Psi(\vec{r}, t) \\ \tilde{\varphi} = |\tilde{\Psi}|^2 &= |\Psi|^2 = \varphi\end{aligned}$$

4. Mathe:  $\Psi \in W$ ,  $W$  Vektorraum (Hilbertraum)

Es gilt Superpositionsprinzip:  $\Psi_1, \Psi_2 \in W$  mögliche Systemzustände, dann auch  $c_1 \Psi_1 + c_2 \Psi_2 \in W$ ,  $c_1, c_2 \in \mathbb{C}$ .

Betrachte Teilchen mit Masse  $m$ , Geschwindigkeit  $v$ :

Mit  $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ ,  $\lambda = \frac{h}{mv}$ ,  $k = \frac{mv}{\frac{h}{2\pi}}$  folgt

$$e^{ikz} = e^{\frac{i}{\hbar}mvz}$$

Rechts:

$$\begin{aligned}\Psi(x) &= \Psi_1(x) + \Psi_2(x) \\ \Psi_{1/2}(x) &= ne^{\frac{imv}{2\hbar L}(x \pm \frac{d}{2})^2} \\ &= ne^{\frac{imv}{2\hbar L}(x^2 + \frac{d}{r})} e^{\pm \frac{imvxd}{2\hbar L}}\end{aligned}$$

Intensität am Schirm  $\sim \varphi(x)$ :

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= |\Psi(x)|^2 = |\Psi_1(x) + \Psi_2(x)|^2 \\ &= |\Psi_1(x)|^2 + |\Psi_2(x)|^2 + 2 \operatorname{Re}(\Psi_1(x) \Psi_2^*(x)) \\ &= |n|^2 \left( 1 + 1 + 2 \operatorname{Re} \left( e^{-2i \frac{mvxd}{2\hbar L}} \right) \right) \\ &= 2|m|^2 \left( 1 + \cos \left( \frac{mvd}{\hbar L} x \right) \right)\end{aligned}$$

5. quantenmechanische Wahrscheinlichkeitsbeschreibung

$$\varphi(\vec{r}, t) = |\Psi(\vec{r}, t)|^2$$

Aussage über eine Vielzahl von Messungen an identischen Systemen.

—> Indeterminisms

Messbare Größen in der klassischen Mechanik: Funktion auf dem Phasenraum:

**Funktion**  $A(x, p)$

**Energie**  $E_{kin} = \frac{p^2}{2m} \rightarrow E = H(x, p)$

**Drehimpuls**  $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$

### 2.1.2 2. Postulat

Jeder messbaren Größe (Observable)  $A$  ist ein (linear, hermitescher) Operator  $\hat{A}$  zugeordnet. Man erhält  $\hat{A}$  indem man im klassischen Ausdruck  $A(x, p)$  die Ersetzung durchführt.

$$p_x \rightarrow \hat{p}_x = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \quad \quad \quad x \rightarrow \hat{x} := x$$

*Impulsoperator* *Ortsoperator*

Analog 3D

$$p_y \rightarrow \hat{p}_y = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial y} \quad \quad \quad y \rightarrow \hat{y} := y$$

$$p_z \rightarrow \hat{p}_z = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial z} \quad \quad \quad z \rightarrow \hat{z} := z$$

#### Bemerkungen:

1. hermitesche Operatoren: Mathe lineare Abbildungen  $l: W \rightarrow W$ .

Notation in der Quantenmechanik :

$$\hat{A}: W \rightarrow W$$

$$\hat{A}\Psi(\vec{r}, t) = \varphi(\vec{r}, t)$$

#### Beispiele:

(a) Ortsoperator

$$\hat{x}\Psi(x, y, z) = x\Psi(x, y, z)$$

$$\hat{y}\Psi(x, y, z) = y\Psi(x, y, z)$$

(b) Impulsoperator

$$\hat{p}_x\Psi(x, y, z) = \frac{\hbar}{-i} \frac{\partial}{\partial x} \Psi(x, y, z) \quad \quad \quad (\text{Differentialoperator})$$

(c) kinetische Energie:

$$\text{Klassisch: } T = \frac{p^2}{2m}$$

$$\text{Quantenmechanik: } \hat{T} = T(\hat{x}, \hat{p}) = \frac{1}{2m} \hat{p}^2 = \frac{1}{2m} \frac{\hbar^2}{i^2} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

$$\hat{T}\Psi(x) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \Psi$$

$$\begin{aligned}
3D: T &= \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) \\
\hat{T} &= \frac{1}{2m} (\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2) \\
&= -\frac{\hbar^2}{2m} \left( \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) = \frac{\hbar^2}{2m} \Delta
\end{aligned}$$

(d) Energie: Hamiltonoperator

$$\text{klassisch: Hamiltonfunktion: } H(r, p) = \frac{p^2}{m} + V(x)$$

$$\begin{aligned}
\text{Quantenmechanik: } \hat{H} &= H(\hat{x}, \hat{p}_1) = \frac{1}{2m} \hat{p}_x^2 + V(\hat{x}) \\
&= -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)
\end{aligned}$$

$$\hat{H}\Psi(x) = \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \Psi(x) + V(x)\Psi(x)$$

$$3D: \frac{1}{2m} (\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2) + V(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}) = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + V(x, y, z)$$

### 2.1.3 3. Postulat (Mittelwert, Erwartungswert)

Der Mittelwert (Erwartungswert) einer physikalischen Observablen  $A$  für ein System im Zustand  $\Psi$  ist

$$\langle \hat{A} \rangle(t) = \int d^3r \Psi^*(\vec{r}, t) \hat{A} \Psi(\vec{r}, t)$$

**Bemerkungen:**

$$1. \text{ Beispiel: } \Psi(x) = \frac{1}{\sigma^2 \pi}^{\frac{1}{4}} e^{-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\text{Normierung: } \int_{-\infty}^{\infty} dx |\Psi(x)|^2 = 1$$

**Mittelwert der Ortsmessung:**

$$\begin{aligned}
\langle \hat{x} \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \Psi^*(x) \underbrace{\hat{x} \Psi(x)}_{x \Psi(x)} = \int_{-\infty}^{\infty} dx \overbrace{|\Psi(x)|^2}^{\varphi(x)} x \\
\langle \hat{x} \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \underbrace{x}_{x=x-x_0} \frac{1}{(\sigma \pi)^{\frac{1}{4}}} e^{-\frac{(x-x_0)^2}{\sigma^2}} = x_0
\end{aligned}$$

**Mittelwert bei Impulsmessung**

$$\begin{aligned}
\langle \hat{p} \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \Psi^*(x) \hat{p}(x) \Psi(x) \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \Psi(x)
\end{aligned}$$



und mit

$$\frac{\partial}{\partial x} \Psi(x) = \frac{1}{(\sigma^2 \pi)^{\frac{1}{4}}} \left( -\frac{(x - x_0)}{\sigma^2} \right) e^{-\frac{(x - x_0)^2}{2\sigma^2}}$$

folgt

$$\langle \hat{p} \rangle = \frac{\hbar}{i} \frac{1}{(\sigma^2 \pi)^{\frac{1}{2}}} \left( -\frac{1}{\sigma^2} \right) \int_{-\infty}^{\infty} dx (x - x_0) e^{-\frac{(x - x_0)^2}{2\sigma^2}} = 0$$

2.  $\langle \hat{A} \rangle \in \mathbb{R} \rightarrow$  Operator  $\hat{A}$  hermitisch.

#### 2.1.4 4. Postulat (Messwert, Wahrscheinlichkeit)

Jede einzelne Messung der Observablen  $A$  kann nur einen der Eigenwerte  $a_n$  des Operators  $\hat{A}$  liefern, definiert durch

$$\hat{A} \varphi_n(\vec{r}) = a_n \varphi_n(\vec{r}) \quad (\text{Eigenwertgleichung})$$

$\varphi_n$  Eigenfunktion von  $\hat{A}$  zum Eigenwert  $a_n$ .

Die Wahrscheinlichkeit  $W_n$  bei einer Messung der Observablen  $A$  an einem System im Zustand  $\Psi$  den Eigenwert  $a_n$  zu finden, ist gegeben durch

$$W_n = \left| \int d^3r \varphi_n^*(\vec{r}) \Psi(\vec{r}, t) \right|^2$$

Nach der Messung ist das System in dem Eigenzustand  $\varphi_n$ , der dem gemessenen Eigenwert entspricht. **Bemerkungen:**

1. Annahme  $\varphi_n$  normiert ( $\int d^3r |\varphi_n(\vec{r})|^2 = 1$ )
2. In vielen Fällen: Eigenwert  $a_n$  diskret  $\rightarrow$  Messgröße  $A$  quantisiert  
Beispiel: mögliche Energien des  $H$ -Atoms

$$E_n = -\frac{R}{n^2} \quad R \approx 13.6 \text{ eV}, n \in \mathbb{N}$$

3. Reduktion der Wellenfunktion Quantenmechanik : System wird i.A durch Messung verändert

$$\Psi \xrightarrow[\text{Messung von } A \text{ mit Ergebnis } a_n]{} \varphi_n$$

$\rightarrow$  sofortige weitere Messung von  $A$  liefert wieder  $a_n$ .

Zustand des Systems nach Messung  $\varphi_n$ :

$$W_n = \left| \int d^3r \varphi_n^*(\vec{r}) \Psi(\vec{r}) \right|^2 = \underbrace{\left| \int d^3r \varphi_n^*(\vec{r}) \varphi_n(\vec{r}) \right|^2}_{\int d^3r |\varphi_n(\vec{r})|^2 = 1} = 1$$

4.  $|\Psi(x)|^2$  Wahrscheinlichkeitsdichte für Messung des Ortes  $x$ .

**Verallgemeinerte Eigenfunktion des Operators:**

$$\begin{aligned}\hat{x}\varphi(x) &= x\varphi(x) \\ x\varphi(x) &= \xi\varphi(x) \quad (x - \xi)f(x) = 0 \quad \forall x \\ \varphi_\xi(x) &= \delta(x - \xi)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}W_\xi &= \left| \int dx \varphi_\xi^*(x) \Psi(x) \right|^2 \\ &= \left| \int dx \delta(x - \xi) \Psi(x) \right|^2 = |\Psi(\xi)|^2\end{aligned}$$

5. Postulate 3 und 4 sind nicht unabhängig ( $P4 \rightarrow P3$ )

$$\begin{aligned}\langle \hat{x} \rangle &= \int dx \varphi(x) x = \int dx |\Psi(x)|^2 x \\ &= \int dx \Psi^*(x) x \Psi(x) = \int dx \Psi^*(x) \hat{x} \Psi(x) \\ &= \langle \hat{x} \rangle\end{aligned}$$

### 2.1.5 5. Postulat (Schrödingergleichung)

Die Zeitentwicklung der Zustände in der Quantenmechanik wird durch die (zeitabhängige) Schrödingergleichung bestimmt

$$\boxed{i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = \hat{H} \Psi(\vec{r}, t)}$$

Dabei ist  $\hat{H}$  der Hamiltonoperator des Systems **Bemerkungen:**

1. hier: nichtrelativistische Quantenmechanik ( $v \ll c$ )
- 2.

$$\begin{aligned}\hat{H} &= \left( -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right) \Psi(x, t) \\ i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t) &= -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V(x) \Psi(x, t)\end{aligned}$$

Partielle DGL:

$$\Psi(x, t_0) \xrightarrow[Lss]{ber???} \Psi(x, t)$$

3. Plausibilität der Schrödinger Gleichung Exp: Materie hat Welleneigenschaften  $\rightarrow$  Wellengleichung

Elektrodynamik:

$$\begin{array}{ll} \text{ebene Welle:} & \Psi(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)} \\ \text{Dispersionsrelation} & \omega = kc \end{array}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} \Psi = -\omega^2 \Psi = -c^2 k^2 \Psi = c^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \Psi$$

Wellengleichung in Quantenmechanik ?

$$\begin{array}{l} \Psi(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)} \\ \text{de Broglie:} \quad \lambda = \frac{k}{p} \rightarrow k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{p}{\frac{h}{2\pi}} = \frac{p}{\hbar} \\ \rightarrow p = \hbar k \end{array}$$

$$E = \hbar\omega \text{ freies Teilchen } E = \frac{p^2}{2m}$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{E}{\hbar} = \frac{1}{2m} \frac{p^2}{\hbar} = \boxed{\frac{\hbar k^2}{2m} = \omega(k)}$$

$$\begin{array}{l} \frac{d^2}{dt^2} \Psi = -k^2 \Psi = \frac{2m\omega}{\hbar} \Psi = -\frac{2m}{\hbar} \frac{1}{-i} \frac{d}{dt} \Psi \\ \Rightarrow i\hbar \frac{d\Psi}{dt} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = \underbrace{\hat{H}}_{\hat{H}=T} \Psi \end{array}$$

## 2.2 Impulsoperator, Impulseigenfunktion, Impulsraumdarstellung

$$\begin{array}{l} \hat{p}_x = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \\ \hat{\vec{p}} = \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla} \end{array}$$

### 2.2.1 Konsistenz der Definition

klassische Mechanik  $p = mv = m \frac{dv}{dt}$  Betrachte Bewegungsgleichung für Mittelwert

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{x} \rangle(t) = \frac{d}{dt}$$

### 2.2.2 Wahrscheinlichkeitsstromdichte mit Kontinuitätsgleichung

$$\begin{aligned}
\varphi &= |\Psi(r, t)|^2 \\
\frac{\partial}{\partial t} \varphi(\vec{r}, t) &= \frac{\partial}{\partial t} \Psi^*(\vec{r}, t) \Psi(r, t) = \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \Psi + \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} \\
i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} &= -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \Psi + \nabla \Psi \\
-i\hbar \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} &= -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \Psi^* + \nabla \Psi^* \\
\frac{\partial}{\partial t} \varphi &= \frac{1}{-i\hbar} \left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \Psi^* + \nabla \Psi^* \right] \Psi + \Psi^* \frac{1}{i\hbar} \left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \Psi + \nabla \Psi \right] \\
&= \frac{\hbar}{2m} [(\Delta \Psi^*) \Psi - \Psi^* (\Delta \Psi)] \\
&= \frac{\hbar}{2m} \vec{\nabla} \cdot [(\vec{\nabla} \Psi^*) \Psi - \Psi^* \vec{\nabla} \Psi] \\
\frac{\partial}{\partial t} \varphi(\vec{r}, t) + \vec{\nabla} \cdot \underbrace{\frac{\hbar}{2m} [\Psi^* (\vec{\nabla} \Psi) - \Psi (\vec{\nabla} \Psi^*)]}_{\vec{j}(\vec{r}, t) \text{ Wahrscheinlichkeitsstrom}} &= 0 \\
\frac{d}{dt} \varphi(\vec{r}, t) + \vec{\nabla} \cdot \vec{j}(\vec{r}, t) &= 0
\end{aligned}$$

Betrachte Bewegungsgleichung für Mittelwert:

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt} \langle \hat{x} \rangle(t) &= \frac{d}{dt} \int dx \Psi^*(x, t) \hat{x} \Psi(x, t) = \frac{d}{dt} \int dx \Psi^*(x, t) x \Psi(x, t) \\
&= \int dx \left( \underbrace{\frac{\partial \Psi^*}{\partial t} x \Psi}_{\frac{1}{(-i\hbar)} \left( -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial \Psi^*}{\partial x^2} + \nabla \Psi^* \right)} + \underbrace{\Psi^* x \frac{\partial \Psi}{\partial t}}_{\frac{1}{(i\hbar)} \left( -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \nabla \Psi \right)} \right) \\
&= \frac{\hbar}{2im} \int dx \left( \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} x \Psi - \Psi^* x \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} \right)
\end{aligned}$$

---

**NR:**

$$\int dx \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} x \Psi \stackrel{PI}{=} \int dx \Psi^* \underbrace{\frac{\partial^2}{\partial x^2} (x \Psi)}_{\frac{\partial}{\partial x} \left( -\Psi + x \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} \right) = 2 \frac{\partial \Psi}{\partial x} + x \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}}$$

Randenterme verschwinden:  $\Psi(x) \xrightarrow{x \pm \infty} 0$ . \_\_\_\_\_

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\hbar}{2im} \int dx \left( 2\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} + \Psi^* x \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \Psi^* x \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} \right) \\
 &= \frac{1}{m} \int dx \Psi^*(x, t) \underbrace{\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x}}_{=\hat{p}_x} \Psi(x, t) \\
 &= \frac{1}{m} \int dx \Psi^* \hat{p}_x \Psi \\
 &= \frac{1}{m} \langle \hat{p}_x \rangle (t) = \frac{d}{dt} \langle \hat{x} \rangle (t) \rightarrow \text{genau wie klassische Mechanik}
 \end{aligned}$$

### 2.2.3 Impulsoperator: Generator für Translation

$$\begin{aligned}
 e^{a \frac{\partial}{\partial x}} \Psi(x) &= \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!} \frac{\partial^n}{\partial x^n} \Psi}_{\text{Taylorentwicklung}} \quad a \in \mathbb{R} \\
 &= \Psi(x + a)
 \end{aligned}$$

Impulsoperator  $\hat{p}_x = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x}$ :

$$e^{\frac{i}{\hbar} a \hat{p}_x} \Psi(x) = e^{a \frac{\partial}{\partial x}} \Psi(x) = \Psi(x + a)$$

### 2.2.4 Impulseigenschaften

$$\begin{aligned}
 \hat{p} \varphi(x) &= p' \varphi(x) \quad a \in \mathbb{R} \\
 \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx} \varphi(x) &= p' \varphi(x)
 \end{aligned}$$

$$\rightarrow \boxed{\varphi_{p'}(x) = c e^{\frac{i}{\hbar} p' x}} \quad p' \in \mathbb{R} \quad (\text{verallgemeinerte Eigenfunktion})$$

$\varphi_{p'}(x)$  nicht normierbar:  $\int_{-\infty}^{\infty} |\varphi_{p'}|^2 = \infty$ .

Konvention zur Festsetzung von  $c$ :

$$\begin{aligned}
 \delta(p_1 - p_2) &\stackrel{!}{=} \int dx \varphi_{p_1}^*(x) \varphi_{p_2}(x) = \underbrace{|c|^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{i}{\hbar} p_1 x} e^{\frac{i}{\hbar} p_2 x}}_{= \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{\frac{i}{\hbar} x (p_2 - p_1)} = 2\pi \hbar \delta(p_1 - p_2)} \\
 &= |c|^2 2\pi \hbar \delta(p_1 - p_2) \\
 \rightarrow c &= \frac{1}{\sqrt{2\pi \hbar}}
 \end{aligned}$$

$$\varphi_{p_1}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{i}{\hbar} p'_x x}$$

System im Zustand  $\Psi$ : Wahrscheinlichkeit den Impuls  $p'$  zu messen:

$$\begin{aligned} W(p') &= \left| \int_{-\infty}^{\infty} dx \Psi_{p'}^*(x) \Psi(x) \right|^2 \\ &= \underbrace{\left| \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-\frac{i}{\hbar} p'_x x} \Psi(x) \right|^2}_{\text{Fouriertransformierte}=\tilde{\Psi}(p')} \\ &= \underbrace{|\tilde{\Psi}(p')|^2}_{\text{Wahrscheinlichkeitsdichte}} \end{aligned}$$

denn

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} dp' W(p') &= \int_{-\infty}^{\infty} dp' \tilde{\Psi}^*(p') \tilde{\Psi}(p') \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dp' \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int dx' e^{\frac{i}{\hbar} p'_x x'} \Psi^*(x') \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-\frac{i}{\hbar} p'_x x} \Psi(x) \\ &= \int dx \int dx' \Psi^*(x) \Psi(x) \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} dp' \frac{1}{2\pi\hbar} e^{\frac{i}{\hbar} p'_x (x'-x)}}_{=\delta(x-x')} \\ &= \int dx \Psi^*(x) \Psi(x) = \int dx |\Psi(x)|^2 = 1 \end{aligned}$$

---

**Mathematisch:**

$$\int dx |\Psi(x)|^2 = \int dp |\tilde{\Psi}(p)|^2$$

gilt generell für Fouriertransformationen  $\rightarrow$  Parsevalsches Theorem \_\_\_\_\_

### 2.2.5 Impulsraumdarstellung der Wellenfunktion

$\Psi(x, t)$  Wellenfunktion im Ortsraum.

$$\tilde{\Psi}(p, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int dx e^{-\frac{i}{\hbar} p x} \Psi(x, t) \quad (\text{Wellenfunktion im Impulsraum})$$

### 2.2.6 Impulsraumdarstellung von Operatoren

$\Psi(x, t)$  Wellenfunktion im Ortsraum.

$$\hat{x}\Psi(x) = x\Psi(x) \quad \hat{p}\Psi(x) = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial \Psi}{\partial x}$$

$$A(x, p) \rightarrow \hat{A} = A(x, \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x})$$

$$\text{konsistent mit} \quad \langle \hat{A} \rangle = \int dx \Psi^*(x) \hat{A} \Psi(x)$$

$$\text{Berechnung von Erwartungswert:} \quad \langle \hat{x} \rangle = \int dx |\Psi(x)|^2 x$$

Wirkung von Operatoren direkt im Impulsraum  $\tilde{\Psi}(p, t)$ :

$$\begin{aligned} \langle \hat{p} \rangle &= \int dp |\tilde{\Psi}(p)|^2 p = \int dp \tilde{\Psi}^*(p) \underbrace{p \tilde{\Psi}(p)}_{\hat{p} \tilde{\Psi}} \\ &= \int dp \tilde{\Psi}^*(p) \hat{p} \tilde{\Psi}(p) \\ \hat{p} \tilde{\Psi}(p) &= p \tilde{\Psi}(p) \end{aligned}$$

---

#### Fourier-Rücktransformation

$$\Psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int dp e^{\frac{i}{\hbar} p x} \tilde{\Psi}(p)$$


---

$$\begin{aligned} |\hat{x}| &= \int dx \Psi^*(x) x \Psi(x) \\ &= \int dx \int dp \int dp' \frac{1}{2\pi\hbar} e^{-\frac{i}{\hbar} x p'} \tilde{\Psi}^*(p') x e^{\frac{i}{\hbar} p x} \tilde{\Psi}(p) \end{aligned}$$


---

$$x e^{\frac{i}{\hbar} p x} \tilde{\Psi}(p) = \tilde{\Psi}(p) \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial p} e^{\frac{i}{\hbar} p x}$$

---


$$\begin{aligned}
&= \int dp \int dp' \tilde{\Psi}^*(p') \tilde{\Psi}(p) \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial p} \underbrace{\int dx \frac{1}{2\pi\hbar} e^{\frac{i}{\hbar} x(p-p')}}_{\delta(p-p')} \\
&= \int dp \int dp' \tilde{\Psi}^*(p') \tilde{\Psi}(p) \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial p} \delta(p-p') \\
&= \int dp \int dp' \tilde{\Psi}^*(p') \left( -\frac{\hbar}{i} \frac{\partial \tilde{\Psi}}{\partial p} \right) \delta(p-p') \\
&= \int dp \tilde{\Psi}^*(p') \left( -\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial p} \right) \tilde{\Psi}(p) = \langle \hat{x} \rangle
\end{aligned}$$

Im Impulsraum  $\tilde{\Psi}(p)$ :

$$\begin{aligned}
\hat{p}\tilde{\Psi}(p) &= p\tilde{\Psi}(p) \\
\hat{x}\tilde{\Psi}(p) &= i\hbar \frac{\partial}{\partial p} \tilde{\Psi}(p) \\
A(x, p) &\rightarrow \hat{A}\tilde{\Psi}(p) = A(i\hbar \frac{\partial}{\partial p}, p) \tilde{\Psi}(p)
\end{aligned}$$

### 2.2.7 Verallgemeinerung in 3D

$$\begin{aligned}
\hat{p}\tilde{\Psi}(\vec{r}) &= \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla} \tilde{\Psi}(\vec{r}) \\
i = x, y, z \quad \hat{p}_i \varphi_{\vec{p}'}(\vec{r}) &= p'_i \varphi_{\vec{p}'}(\vec{r}) \\
\varphi_{\vec{p}'}(\vec{r}) &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{\frac{3}{2}}} e^{\frac{i}{\hbar} \vec{p}' \cdot \vec{r}} \\
W(\vec{r}') &= \left| \int d^3r \varphi_{\vec{p}'}^*(\vec{r}) \Psi(\vec{r}) \right|^2 = \underbrace{\left| \frac{1}{(2\pi\hbar)^{\frac{3}{2}}} \int d^3r e^{-\frac{i}{\hbar} \vec{p}' \cdot \vec{r}} \Psi(\vec{r}) \right|^2}_{\tilde{\Psi}(\vec{p}')}
\end{aligned}$$

## 2.3 Das freie Teilchen - Wellenpakete

Teilchen mit Masse  $m$ , eindimensional ohne Kräfte. **Hamiltonoperator:**

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}) \underset{=0}{=} \frac{\hat{p}^2}{2m} = -\frac{\hbar}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

**Schrödingergleichung**

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t) = \hat{H} \Psi(x, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}$$



Separationsansatz  $\Psi(x, t) = \varphi(x)\chi(t)$

$$\begin{aligned} i\hbar\varphi \frac{d\chi}{dt} &= -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\varphi}{dx^2} \\ &= i\hbar \underbrace{\frac{1}{\chi} \frac{dx}{dt}}_t = -\frac{\hbar^2}{2m} \underbrace{\frac{1}{\varphi} \frac{d^2\varphi}{dx^2}}_x = \text{const} = E \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d\chi}{dt} &= -\frac{i}{\hbar} E\chi \rightarrow \chi(t) = ce^{-\frac{i}{\hbar}Et} \\ \underbrace{-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2}}_{\hat{H}} \varphi(x) &= E\varphi(x) \end{aligned}$$

$$\hat{H}\varphi(x) = E\varphi(x) \quad (\text{stationäre Schrödingergleichung})$$

→ Eigenwertgleichung für  $\hat{H}$ ;  $E$  mögliche Energien.

Lösung:  $\varphi(x) = ae^{\pm ikx}$

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \varphi(x) &= \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \varphi = E\varphi \rightarrow \frac{\hbar k^2}{2m} = E \quad E \geq 0 \\ k &= \frac{1}{\hbar} \sqrt{2mE} \geq 0 \end{aligned}$$

→ Energie nicht quantisiert.

Zurück zur Separation:

$$\Psi(x, t) = ce^{\pm ikx - \frac{i}{\hbar}Et}$$

$$\omega = \frac{E}{\hbar} = \frac{\hbar k^2}{2m} = \omega(k)$$

$$\pm ikx - i\omega(k)t = ce \quad (\text{Dispersionsrelation})$$

1. Analogie: el/magn Welle

$$\left( \Delta - \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t^2} \right) \vec{E} = 0 \quad \vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(ks - \omega t)} \quad \omega = ck$$

el/magn Felder sind reell

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(kx - \omega t)$$

Lösung der Schrödingergleichung: i.A komplex

2. Lösung durch Separationsansatz:  $\rightarrow \Psi_t(x, t) = ce^{\pm ikx - i\omega t} \rightarrow$  spezielle Lösung der SG. SG ist linear  $\rightarrow$  Linearkombination von Lösungen der SG sind auch Lösungen der SG.

$$\Psi(x, t) = c_1 e^{i(k_1 x - \omega(k)t)} + c_2 e^{i(k_2 x - \omega(k)t)}$$

Allgemeine Lösung:

$$\Psi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} dk \quad c(k) e^{i(kx - \omega(k)t)} \quad (\text{Wellenpaket})$$

3.  $\Psi_{\pm}$  sind Eigenfunktionen des Impulsoperators:

$$\hat{p}\Psi_{\pm} = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} c e^{\pm i k x - i \omega t} = \pm \hbar k c e^{\pm i k x - i \omega t} = (\pm \hbar k) \Psi_{\pm} = p \Psi_{\pm}$$

$$p = \pm \hbar k$$

$\Psi_{\pm}$  beschreibt ein freies Teilchen mit Impuls  $p = \pm \hbar k$ .

**de Broglie-Relation**

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{\frac{|p|}{\hbar}} = \frac{h}{|p|}$$

$\Psi_{\pm}$ : Eigenfunktionen von  $\hat{H}$ :

$$\hat{H}\Psi_{\pm} = E\Psi_{\pm} \quad E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

$\Psi_{\pm}$  sind keine Eigenfunktionen des Ortsoperators:

$$\hat{x}\Psi_{\pm}(x, t) = x\Psi_{\pm}(x, t) = x c e^{\pm i k x - i \omega t} \stackrel{!}{=} x c e^{\pm i k x - i \omega t}$$

→ Fehler! Keine Eigenfunktion.

Impuls fest → Ort vollständig unbestimmt

$$\rho(x, t) = |\Psi_{\pm}(x, t)|^2 = |c e^{\pm i k x - i \omega t}|^2 = |c|^2$$