

量子化学

Ira N. Levine

第七版

目录

1 薛定谔方程	1
1.1 量子化学	1
1.2 量子力学的历史背景	2
1.3 不确定性原理	5
1.4 含时薛定谔方程	6
1.5 定态薛定谔方程	9
1.6 概率	11
1.7 复数	12
1.8 单位	14
1.9 微积分学	14
2 箱中粒子	17
2.1 微分方程	17
2.2 一维盒子中的粒子	18
2.3 一维自由粒子	23
2.4 矩形势阱中的粒子	24
2.5 隧穿	25
3 算符	27
3.1 算符	27
3.2 本征函数和本征值	30
3.3 算符和量子力学	32
3.4 三维多粒子的薛定谔方程	36
3.5 三维盒子中的粒子	38
3.6 简并	41
3.7 平均值	42
3.8 波函数的约束条件	45
4 谐振子	47
4.1 微分方程的幂级数解	47
4.2 一维谐振子	49
4.3 双原子分子的振动	57
4.4 一维定态薛定谔方程的数值解法	60

5	角动量	65
5.1	同时确定多个属性	65
5.2	矢量	68
5.3	单粒子系统的角动量	72
5.4	角动量阶梯算符法	83
6	氢原子	87
6.1	单粒子中心力问题	87
6.2	非相互作用粒子和变量分离	89
6.3	将双粒子问题简化为两个单粒子问题	90
6.4	双粒子的刚性转子模型	92
6.5	氢原子	96
6.6	束缚态氢原子波函数	102
6.7	类氢轨道	110
6.8	塞曼效应	113
6.9	径向薛定谔方程的数值解法	114
7	量子力学理论	117
7.1	符号	117
7.2	厄米算符	118
7.3	用本征函数展开	122
7.4	对易算符的本征函数	127
7.5	宇称	129
7.6	测量和态叠加	132
7.7	位置本征函数	136
7.8	量子力学的基本假设	138
7.9	测量和量子力学解释	142
7.10	矩阵	144
8	变分法	149
8.1	变分理论	149
8.2	变分法的推广	153
8.3	行列式	154
8.4	联立线性方程组	156
8.5	线性变分函数	159
8.6	矩阵、本征值和本征向量	165
9	微扰理论	173
9.1	微扰理论	173
9.2	非简并微扰理论	174
9.3	微扰理论求解基态氦原子	179
9.4	变分法求解基态氦	182
9.5	简并能级的微扰理论	184
9.6	久期方程的简化	188

9.7 微扰理论处理氦原子第一激发态	189
9.8 含时微扰理论	194
9.9 辐射和物质的相互作用	196
10 电子自旋和自旋-统计定理	199
10.1 电子自旋	199
10.2 自旋和氢原子	201
10.3 自旋-统计定理	202
10.4 氦原子	204
10.5 泡利不相容原理	206
10.6 斯莱特行列式	209
10.7 微扰理论处理基态锂原子	210
10.8 变分法处理基态锂原子	211
10.9 自旋磁矩	212
10.10 电子自旋的梯度算符	214
11 多电子原子	217
11.1 Hartree-Fock 自洽场方法	217
11.2 轨道和元素周期表	221
11.3 电子相关	225
11.4 角动量的叠加	227
11.5 多电子原子的角动量	231
11.6 自旋-轨道耦合	240
11.7 原子哈密顿算符	242
11.8 康顿-斯莱特规则	244
12 分子对称性	249
12.1 对称元素和对称操作	249
12.2 对称点群	256
13 双原子分子的电子结构	263
13.1 玻恩-奥本海默近似	263
13.2 双原子分子中的核运动	266
13.3 原子单位制	270
13.4 氢分子离子	271
13.5 H_2^+ 离子基态的近似处理	274
13.6 H_2^+ 离子激发态的分子轨道	281
13.7 同核双原子分子的分子轨道构型	285
13.8 双原子分子的电子谱项	290
13.9 氢分子	294
13.10 价键理论处理 H_2	296
13.11 分子轨道理论和价键理论比较	298
13.12 同核双原子分子的分子轨道理论和价键理论波函数	300
13.13 H_2 分子的激发态	302

13.14双原子分子的自洽场波函数	303
13.15分子轨道理论处理异核双原子分子	305
13.16价键理论处理异核双原子分子	308
13.17价电子近似	309
14 分子量子力学理论	311
14.1 电子概率密度	311
14.2 偶极矩	313
14.3 分子哈特里-福克方法	315
14.4 位力定理	324
14.5 位力定理和化学键	329
14.6 赫尔曼-费恩曼定理	332
14.7 静电力定理	332
15 分子的电子结构	333
15.1 从头计算、密度泛函、半经验和分子力学方法	334
15.2 多原子分子的分子光谱项	334
15.3 自洽场方法、分子轨道理论求解多原子分子	334
15.4 基函数	334
15.5 自洽场方法、分子轨道理论求解H ₂ O 分子	334
15.6 布居分析和键级	334
15.7 分子静电势、分子表面和原子电荷	334
15.8 定域分子轨道	334
15.9 自洽场方法、分子轨道理论求解甲烷、乙烷和乙烯	334
15.10分子结构学	334
15.11构象搜寻	334
15.12分子振动频率	334
15.13热力学定律	334
15.14从头计算方法的量子化学程序	334
15.15进行从头计算	334
15.16快速 Hartree-Fock 计算方法	334
15.17溶剂效应	334
16 电子关联方法	335
16.1 关联能	336
16.2 组态相互作用	336
16.3 多体微扰理论	336
16.4 耦合簇方法	336
16.5 密度泛函理论	336
16.6 能量计算的复合方法	336
16.7 扩散量子 Monte Carlo 法	336
16.8 非共价相互作用	336
16.9 NMR 屏蔽常数	336
16.10碎裂法	336

16.11 相对论效应	336
16.12 价键理论求解多原子分子	336
16.13 GVB (广义价键波函数)、VBSCF (价键自洽场)、BOVB (呼吸轨道价键) 方法 . .	336
16.14 化学反应	336
17 半经验和分子力学方法求解分子	337
17.1 半经验分子轨道求解平面共轭分子	337
17.2 Hückel 分子轨道理论	337
17.3 PPP 方法	337
17.4 一般的半经验分子轨道和密度泛函方法	337
17.5 分子力学方法	337
17.6 经验和半经验方法处理溶剂效应	337
17.7 化学反应	337
17.8 量子化学的未来	337
A 附录	339
A.1 Complex Numbers	339
A.2 Calculus Formulas	339
B 参考文献	341
C 部分习题答案	345
D 索引	347

Chapter 1

薛定谔方程

1.1 量子化学

十七世纪末，艾萨克·牛顿（Isaac Newton）创立了**经典力学**，即宏观物体的运动规律。二十世纪初，物理学家发现经典力学无法正确描述原子和分子的电子和原子核等极小粒子的行为。这类粒子的行为由一组称为**量子力学**的定律来描述。

量子化学将量子力学应用于化学问题。量子化学的影响在化学的各个分支中都很明显。物理化学家利用量子力学（借助统计力学）计算气体的热力学性质（如熵、热容量）；解释分子光谱，从而通过实验确定分子性质（如分子几何形状、偶极矩、内旋转能垒、同分异构体之间的能量差异）；从理论上计算分子性质；计算化学反应中过渡态的性质，从而估算速率常数；理解分子间作用力；以及处理固体中的成键问题。

有机化学家利用量子力学估算分子的相对稳定性，计算反应中间产物的性质，研究化学反应的机理，以及分析和预测核磁共振谱。

分析化学家广泛使用光谱法。只有利用量子力学，才能正确理解和解释光谱中的谱线频率和强度。

无机化学家使用配体场理论（一种近似量子力学的方法）来预测和解释过渡金属络离子的性质。

虽然重要生物分子的巨大尺寸使得对它们进行量子力学计算极其困难，但生物化学家们正开始从对生物分子构象、酶与底物结合以及生物分子溶解的量子力学研究中获益。

量子力学决定了纳米材料（至少有一个维度在 1 nm 到 100 nm 之间的物体）的特性，目前正在开发处理纳米材料的计算方法。当材料的一个或多个尺寸小于 100 nm（尤其是小于 20 nm）时，其光学、电子、化学和其它特性就会发生与宏观材料显著不同的巨大变化。一个维度在 1 nm 到 100 nm 之间的半导体或金属物体称为量子阱；两个维度在此范围内的称为量子线；三个维度都在此范围内的称为量子点。这些名称中的“量子”一词表明量子力学在决定此类材料特性方面发挥了关键作用。许多人猜测，纳米科学和纳米技术将带来“下一次工业革命”。

计算机计算速度的迅速提高和分子计算新方法（如密度泛函理论-参见第 16.4 节）的发展，使量子化学成为化学各个领域的实用工具。现在，有几家公司出售用于分子量子化学计算的量子化学软件。这些软件不仅适用于量子化学家，也适用于其他各类化学家。由于量子化学及相关理论和计算方法的作用日益显著，美国化学学会于 2005 年开始出版新的期刊《化学理论与计算杂志》（Journal of Chemical Theory and Computation）。

“量子力学……几乎是所有现代科学技术的基础。它支配着晶体管和集成电路的行为……并且是……现代化学和生物学的基础。”【Stephen Hawking, *A Brief History of Time*, 1988, Bantam,

chap. 4.】

1.2 量子力学的历史背景

量子力学的发展起源于 1900 年普朗克 (Planck) 对加热固体发出的光的研究, 因此我们首先要讨论光的本质。

1803 年, 托马斯·杨 (Thomas Young) 通过观察光穿过两个相邻针孔时的衍射和干涉, 为光的波动性提供了令人信服的证据。(衍射是波绕障碍物弯曲。干涉是将两个频率相同的波结合在一起, 产生一个波, 该波在空间每一点的扰动是每个干涉波在该点产生的扰动的代数和或矢量和。参见任何一年级物理课本。)

1864 年, 詹姆斯·克拉克·麦克斯韦 (James Clerk Maxwell) 建立了四个方程, 即麦克斯韦方程组 (Maxwell's equations), 统一了电学和磁学定律。麦克斯韦方程预言: 加速的电荷会以电磁波的形式辐射能量, 电磁波由振荡的电场和磁场组成。麦克斯韦方程预测的这些波的速度与实验测得的光速相同。

1888 年, 海因里希·赫兹 (Heinrich Hertz) 根据麦克斯韦方程组的预测, 探测到了电火花中加速电荷产生的无线电波。这使物理学家确信, 光确实是一种电磁波。

所有电磁波在真空中都以 $c = 2.998 \times 10^8$ m/s 的速度传播。电磁波的频率 ν 和波长 λ 的关系是

$$\lambda\nu = c \quad (1.1)$$

(方框内的等式应牢记; 附录中给出了希腊字母表)。根据电磁波的频率, 人们给电磁波进行了分类。按照频率递增的顺序依次为无线电波、微波、红外线辐射、可见光、紫外线辐射、X 射线和 γ 射线。我们用光来表示任何一种电磁辐射。可见光和紫外线辐射的波长以前用埃 (Å) 来表示, 现在用纳米 (nm) 来表示:

$$1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}, \quad 1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m} = 0.1 \text{ nm} \quad (1.2)$$

19 世纪 90 年代, 物理学家测量了在固定温度下加热黑体发出的各种频率的光强度, 并在多个温度下进行了这些测量。黑体是一种能吸收落在其上的所有光线的物体。一种对黑体对良好近似是一个带有小孔的空腔。1896 年, 物理学家维恩 (Wien) 提出了黑体辐射与光频和黑体温度的关系式: $I = a\nu^3/e^{b\nu/T}$, 其中 a 与 b 是经验常数, $I d\nu$ 是黑体在单位时间和单位表面积内辐射的频率在 ν 到 $\nu + d\nu$ 范围内的能量, 其中 $d\nu$ 是一个无穷小的频率范围。维恩的公式很好地拟合了 1896 年的黑体辐射数据, 但他对该公式的理论论证却不令人满意。

1899-1900 年, 对黑体辐射的测量扩展到了比以前更低的频率, 维恩公式在低频下显示出较大的偏差。这些偏差促使物理学家马克斯·普朗克 (Max Planck) 于 1900 年 10 月提出了以下公式 $I = a\nu^3 / (e^{b\nu/T} - 1)$, 并发现该公式适用于所有频率的数据。

提出这个公式后, 普朗克一直在寻找理论依据。1900 年 12 月, 他向德国物理学会提交了他的公式的理论推导。普朗克假定黑体中的辐射发射器和吸收器是与空腔中的电磁辐射处于平衡状态的谐振电荷 (谐振子)。他假设频率为 ν 的谐振子的总能量由 N 个不可分割的“能量元素”组成, 每个能量元素的大小为 $h\nu$, 其中 N 为整数, h (普朗克常数) 是物理学中的一个新常数。普朗克将这些能量元素分布在谐振子中。实际上, 每个谐振子的能量必须是 $h\nu$ 的整数倍 (尽管普朗克没有明说)。因此, 每个谐振子的能量都被量子化了, 这意味着谐振子的能量只允许是某些分立的值。普朗克的理论导出了 $a = 2\pi h/c^2$ 和 $b = h/k$, 其中 k 是玻尔兹曼 (Boltzmann) 常量。通过拟合实验中得到的黑体辐射曲线, 普朗克常数为 $h = 6.6 \times 10^{-34}$ J·s。

普朗克的工作通常被认为是量子力学的开端。然而,物理学史学家们一直在争论:1900年的普朗克究竟是将能量量子化视为对物理事实的描述,还是仅仅将其视为一种数学近似,从而使他能够获得正确的黑体辐射公式。【见 O. Darrigol, *Centaurus*, **43**, 219 (2001); C. A. Gearhart, *Phys. Perspect.*, **4**, 170 (2002) (可在线查阅: employees.csbsju.edu/cgearhart/Planck/PQH.pdf; S. G. Brush, *Am. J. Phys.*, **70**, 119 (2002) (www.punsterproductions.com/~sciencehistory/cautious.htm).】。物理历史学家克拉格 (Kragh) 指出:“如果说 1900 年 12 月物理学发生了一场革命,似乎没有人注意到它。普朗克也不例外,赋予他的工作的重要性在很大程度上是一种历史重构。”(H. Kragh, *Physics World*, Dec. 2000, p. 31)

能量量子化的概念与以往物理学的所有理念直接相悖。经典力学认为:物质体的能量可以连续变化。然而,只有在能量量子化的假设下,才能得到正确的黑体辐射曲线。

能量量子化的第二个应用是光电效应。在光电效应中,光照射到金属上会导致电子被激发。波的能量与其强度成正比,而与其频率无关。因此光的电磁波图象会让人想到:发射的光电子的动能会随着光强度的增加而增加,但不会随着光频率的变化而变化。

1905 年,爱因斯坦 (Einstein) 指出:将光视为由粒子状实体 (称为光子) 组成的集合体,每个光子都具有能量

$$E = h\nu \quad (1.3)$$

就可以解释这些观测结果。当金属中的电子吸收光子时,所吸收的光子能量的一部分被用来克服将电子固定在金属中的力,剩余的能量则转化为电子逸出后的动能。由能量守恒,有 $h\nu = \phi + T$, 其中 ϕ 是电子逸出金属表面所需的最小能量 (金属的功函数), T 是被激发电子的最大动能。提高光的频率 ν 会增加光子能量,从而增加被激发电子的动能。增加固定频率下的光强度会增加光子撞击金属的速度,从而增加电子的发射速度,但不会改变每个发射电子的动能。(克拉格认为:“可以有力地证明,是爱因斯坦首先认识到了量子理论的本质。”; (H. Kragh, *Physics World*, Dec. 2000, p. 31.)

光电效应表明:除了在衍射实验中表现出波动性外,光还可以表现出粒子性。

1907 年,爱因斯坦将能量量子化应用于固体元素中原子的振动。假设原子在每个方向 (x, y, z) 上的振动能量被限制为 $h\nu_{vib}$ 的整数倍,其中振动频率 ν_{vib} 是元素的性质。爱因斯坦利用统计力学推导出固体恒容热容 C_V 的表达式。他的公式与已知的钻石 C_V 与温度的关系数据相当吻合。

现在我们来考虑物质的结构。

19 世纪末,对放电管和自然放射性的研究表明:原子和分子是由带电粒子组成的。电子带有负电荷,而质子带有与电子电荷大小相等但符号相反的正电荷,其质量是电子的 1836 倍。原子的第三种成分——中子 (发现于 1932 年) 不带电荷,比质子稍重。

从 1909 年开始,卢瑟福 (Rutherford)、盖革 (Geiger) 和马斯登 (Marsden) 反复将一束 α 粒子穿过薄金属箔,并让它们落在荧光屏上,从而观察到粒子的偏转。 α 粒子是从天然放射性衰变中获得的带正电荷的氦核。大多数 α 粒子通过金属箔时基本上没有发生偏转,但令人惊讶的是,少数粒子发生了很大的偏转,有些粒子向后偏转。如果正电荷遍布整个原子【正如 J. J. 汤姆逊 (J. J. Thomson) 在 1904 年提出的那样】,那么一旦高能 α 粒子穿透原子,斥力就会减弱,根据经典静力学,在原子中心的斥力为零。因此,卢瑟福得出结论:只有当正电荷集中在一个微小而沉重的原子核中时,才会发生如此大的偏转。

原子包含一个极小 (半径为 10^{-13} 到 10^{-12} cm) 的重核,该核由中子和 Z 个质子组成,其中 Z 是原子序数,原子核外有 Z 个电子,带电粒子的相互作用遵循库仑定律。(核子在原子核内通过强相互作用结合在一起,这与我们无关) 原子的半径约为 $1 \text{ \AA}$, 气体动力学理论的结果就表明了这一点。

原子和分子的化学性质是由其电子结构决定的,因此就产生了电子运动和能量的性质问题。由

于原子核的质量远大于电子，我们认为原子核的运动与电子的运动相比是微小的。

1911 年，卢瑟福提出了原子的行星模型，其中电子以不同的轨道围绕原子核旋转，就像行星围绕太阳旋转一样。然而，这一模型存在一个根本性的难题。根据经典电磁理论，加速的带电粒子会以电磁波（光波）的形式辐射能量。以恒定速度围绕原子核旋转的电子正在被加速，因为其速度矢量的方向在不断变化。因此，卢瑟福模型中的电子应该不断地通过辐射损失能量，从而向原子核螺旋运动。因此，根据经典（19 世纪）的物理学，卢瑟福的原子结构是不稳定的，会发生坍缩。

1913 年，尼尔斯·玻尔（Niels Bohr）将能量量子化的概念应用于氢原子，提出了解决这一难题的可行方法。玻尔假定氢原子中电子的能量是量子化的，电子只能在一系列允许的轨道中的一个轨道上运动。当电子从一个玻尔轨道过渡到另一个玻尔轨道时，一个频率 ν 满足

$$E_{upper} - E_{lower} = h\nu \quad (1.4)$$

的光子被吸收或激发。其中 E_{upper} 和 E_{lower} 是高低两个状态的能量（能量守恒）。玻尔假定电子从自由（电离）态过渡到束缚轨道时会发射出一个光子，其频率是电子在束缚轨道中经典旋转频率的二分之一的整数倍，他利用经典力学推导出了氢原子能级的计算公式。利用 (1.4)，他得到了与观测到的氢谱一致的结果。然而，用玻尔理论拟合氦光谱的尝试却失败了。此外，该理论无法解释分子中的化学键。

玻尔模型的失败源于使用经典力学来描述原子中的电子运动。原子光谱显示出离散的频率，这表明只有某些能量的运动是允许的；以及电子能量是量子化的。然而，经典力学允许连续的能量范围。因此，路易斯·德布罗意（Louis de Broglie）在 1923 年提出：电子的运动可能具有波的一面。质量为 m 、速度为 v 的电子将具有波长

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{p} \quad (1.5)$$

其中 p 是线动量。德布罗意通过与光子的类比推理得出公式 (1.5)。根据爱因斯坦的狭义相对论，光子的能量可以用 $E = pc$ 表示，其中 c 是光速， p 是光子的动量。利用 $E_{photon} = h\nu$ 可以得到光子以 c 的速度运动时的 $pc = h\nu = hc/\lambda$ 和 $\lambda = h/p$ 。方程式 (1.5) 是电子相应的方程式。

1927 年，戴维森（Davisson）和格尔默（Germer）通过实验证实了德布罗意的假设，他们从金属中反射电子并观察到衍射效应。1932 年，斯特恩（Stern）在氦原子和氢分子中观察到了同样的效应，从而验证了波效应并非电子所特有，而是微观粒子运动的某种普遍规律的结果。通过衍射光栅可以观察到大至 $C_{48}H_{26}F_{24}N_8O_8$ 的分子的衍射和干涉现象。【T. Juffmann et al, *Nat. Nanotechnol.*, **7**,297 (2012)】。有关分子干涉图案形成的影片，请访问 www.youtube.com/watch?v=vCiOMQIRU7I。

因此，电子的行为在某些方面像粒子，而在另一些方面则像波。我们面临着物质（以及光）表面上自相矛盾的“波粒二象性”。电子怎么可能既是粒子（局部实体），又是波（非局部实体）呢？答案是电子既不是波也不是粒子，而是另一种东西。用经典物理学的波或粒子概念来准确描述电子的行为是不可能的。经典物理学的概念是根据宏观世界的经验发展而来的，并不能正确描述微观世界。进化塑造了人类大脑，使其能够理解并有效处理宏观现象。人类神经系统的发展并不是为了处理原子和分子层面的现象，因此我们无法完全理解这些现象也就不足为奇了。

虽然光子和电子都表现出明显的二元性，但它们并不是同一类实体。光子在真空中以 c 的速度运动，其静止质量为零；而电子始终具有 $v < c$ 和非零静止质量。光子必须始终按相对论处理，但速度远小于 c 的电子可以按非相对论处理。

1.3 不确定性原理

让我们来看看波粒二象性对同时测量微观粒子的 x 坐标和线动量 x 分量的尝试有什么影响。我们从一束动量为 p 、沿 y 方向运动的粒子束开始，让粒子束落在一个窄缝上。狭缝后面是一块照相板。见图1.1。

粒子通过宽度为 w 的狭缝时，其 x 坐标的不确定性为 w 。我们将这种 x 值的分布称为 Δx ，即有 $\Delta x = w$ 。

由于微观粒子具有波的特性，它们会被狭缝衍射，在平板上产生衍射图样（就像光束一样）。图1.1中图形的高度表示到达给定点的粒子数量。衍射图样显示：当粒子被狭缝衍射时，它们的运动方向发生了改变，因此部分动量被转移到了 x 方向。动量在 x 方向上的分量 p_x 等于动量矢量 $\vec{p}$ 在 x 方向上的投影。向上偏转 α 角的粒子的动量满足 $p_x = p \sin \alpha$ ；向下偏转 α 角的粒子的动量满足 $p_x = -p \sin \alpha$ 。由于大多数粒子的偏转范围在 $-\alpha$ 到 α 之间，其中 α 是与衍射图样中第一个最小值的夹角，因此我们将以中心衍射峰中动量值的一般作为动量 x 分量不确定性 Δp_x 的量度： $\Delta p_x = p \sin \alpha$ 。

因此，在狭缝处进行测量，有

$$\Delta x \Delta p_x = pw \sin \alpha \quad (1.6)$$




图 1.1: 狭缝的电子衍射

第一个衍射最小值出现的角度 α 很容易计算。出现第一个最小值的条件是：通过狭缝上边缘的粒子和通过狭缝中心的粒子所经过的距离之差应等于 $\frac{1}{2}\lambda$ ，其中 λ 是相关波的波长。这样，从狭缝顶部发出的波与从狭缝中心发出的波正好相位相反，它们相互抵消。从狭缝中点以下距离 d 处发出的波与从狭缝顶部以下距离 d 处发出的波相互抵消。在图1.2中画出 AC ，使 $AD = CD$ ，则路径长度之差为 BC 。狭缝到屏幕的距离比狭缝宽度大。因此，由于 AD 和 BD 几乎平行，则 $\angle ACB$ 基本上是直角，因此 $\angle BAC = \alpha$ ，路径差 BC 就是 $\frac{1}{2}w \sin \alpha$ 。设 BC 等于 $\frac{1}{2}\lambda$ ，我们就得到了 $w \sin \alpha = \lambda$ ，公式 (1.6) 就变成了 $\Delta x \Delta p_x = p\lambda$ ，其中波长 λ 由德布罗意关系式 $\lambda = h/p$ 给出，因此 $\Delta x \Delta p_x = h$ 。由于不确定度尚未精确定义，因此使用等号并不合适。我们可以用

$$\Delta x \Delta p_x \approx h \quad (1.7)$$




图 1.2: 计算一级衍射的最小值

来表示 x 方向上的不确定性, 同时 p_x 具有与普朗克常数相当的数量级。

尽管我们只用一种特例证明了 (1.7), 但其有效性是普遍的。无论如何尝试, 微观“粒子”的波粒二象性都限制了我们同时测量这种粒子的位置和动量的能力。我们对位置的测定越精确, 对动量的测定就越不准确。(在图 1.1 中, $\sin \alpha = \lambda/w$, 因此缩小狭缝会增加衍射图样的扩散) 这种限制就是沃纳·海森堡 (Werner Heisenberg) 于 1927 年发现的**不确定性原理** (uncertainty principle)。

由于波粒二象性, 测量行为会给被测系统带来不可控制的干扰。我们从粒子具有精确的 p_x 值 (零) 开始。通过施加狭缝, 我们测量了粒子的 x 坐标, 精确度为 w , 但这次测量给粒子的 p_x 值带来了不确定性。测量改变了系统的状态。

1.4 含时薛定谔方程

经典力学只适用于宏观粒子。对于微观“粒子”, 我们需要一种新的力学形式, 即**量子力学**。为简单起见, 我们将讨论一个单粒子的一维系统。

在经典力学中, 粒子的运动遵循牛顿第二定律:

$$F = ma = m \frac{d^2x}{dt^2} \quad (1.8)$$

其中 F 是作用在粒子上的合外力, m 是粒子的质量, t 是时间; a 是加速度, 由 $a = dv/dt = (d/dt)(dx/dt) = d^2x/dt^2$ 给出, 其中 v 是速度。方程 (1.8) 包含坐标 x 对时间的二阶导数。为了解这个方程, 我们必须进行两次积分。这就引入了两个积分常量 c_1 和 c_2 , 有

$$x = g(t, c_1, c_2) \quad (1.9)$$

其中 g 是时间的某个函数。我们现在要问: 在某一特定时间 t_0 , 我们必须掌握哪些信息才能预测粒子未来的运动? 如果我们知道在 t_0 时刻, 粒子位于 x_0 处, 则有

$$x_0 = g(t_0, c_1, c_2) \quad (1.10)$$

由于我们需要确定两个常数, 因此需要更多信息。将 (1.9) 左右两边对时间求导, 有

$$\frac{dx}{dt} = v = \frac{d}{dt}g(t, c_1, c_2)$$

如果我们也知道在 t_0 时刻, 粒子具有速度 v_0 , 那么有进一步的关系

$$v_0 = \left. \frac{d}{dt}g(t, c_1, c_2) \right|_{t=t_0} \quad (1.11)$$

知道 x_0 和 v_0 后，我们可以用方程 (1.10) 和 (1.11) 求出 c_1 和 c_2 。知道 c_1 和 c_2 后，就可以用方程 (1.9) 来精确预测粒子在未来的运动。

作为式 (1.8) 至 (1.11) 的例子，考虑一个粒子在地球重力场中的运动。取垂直向上为 x 轴正方向，则作用在粒子上的合外力方向垂直向下，大小为 $-mg$ ，其中 g 是重力加速度。则牛顿第二定律 (1.8) 形式为 $-mg = m d^2x/dt^2$ ，所以 $d^2x/dt^2 = -g$ 。积分一次，有 $dx/dt = -gt + c_1$ 。如果我们知道粒子在 t_0 时刻的速度为 v_0 ，就可以求出积分常量 c_1 。又由于 $v = dx/dt$ ，将 $v_0 = -gt_0 + c_1$ 即 $c_1 = v_0 + gt_0$ 代入，有 $dx/dt = -gt + gt_0 + v_0$ 。再次积分，我们引入了另一个积分常量 c_2 。如果我们知道粒子在 t_0 时刻的位置为 x_0 ，则可以求出 c_2 。因此，我们有 $x = x_0 - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2 + v_0(t - t_0)$ 。知道了在 t_0 时刻粒子的 x_0 和 v_0 ，我们就能预测粒子未来的运动轨迹。

在一维范围内运动的粒子的经典力学势能 V 的定义为满足

$$\boxed{\frac{\partial V(x, t)}{\partial x} = -F(x, t)} \quad (1.12)$$

例如，对于一个在地球重力场中运动的粒子，有 $\partial V/\partial x = -F = mg$ ，积分一次，有 $V = mgx + c$ ，其中 c 为积分常量。我们可以任意选择我们想要的零势能面。令 $c = 0$ ，我们有势能函数 $V = mgx$ 。

经典力学中的“状态”一词是指系统中每个粒子在某一时刻的位置和速度，以及作用在粒子上的力。根据牛顿第二定律，给定一个系统在任何时候的状态，它的未来状态和未来运动都是完全确定的，如式 (1.9)-(1.11) 所示。牛顿定律在解释行星运动方面取得的巨大成功让许多哲学家将牛顿定律作为哲学决定论的论据。数学家和天文学家拉普拉斯 (Laplace) (1749-1827) 假定宇宙是由服从牛顿定律的粒子组成的。因此，给定宇宙在某一时刻的状态，宇宙万物未来的运动是完全确定的。原则上，一个能知道宇宙任何瞬间状态的超级星体可以计算出所有未来的运动。

尽管经典力学是确定性的，但许多经典力学系统（例如，在重力、摩擦力和周期性变化的驱动力影响下摆动的摆）在系统参数的一定范围内表现出混沌行为。在混沌系统中，运动对粒子位置和速度的初始值以及作用力异常敏感，两个初始状态相差一个实验无法检测的量，最终会导致系统的未来行为大相径庭。因此，由于测量初始状态的精度有限，即使系统服从确定性方程，实际上也不可能预测混沌经典力学系统的长期行为。对太阳系行星数千万年轨道的计算机计算表明，行星的运动是混沌的。【I. Peterson, *Newton's Clock: Chaos in the Solar System*, Freeman, 1993; J. J. Lissauer, *Rev. Mod. Phys.*, **71**, 835 (1999).】

只要精确了解经典力学系统的当前状态，我们就能预测其未来状态。然而，海森堡不确定性原理表明：我们无法同时确定微观粒子的精确位置和速度，因此无法获得经典力学所需的数据来预测系统的未来运动。在量子力学中，我们必须满足于对未来精确运动的不完全预测。

我们研究量子力学的方法是假设基本原理，然后利用这些假设推导出实验可检验的结果，例如原子的能级。为了描述量子力学中一个系统的状态，我们假设存在一个粒子坐标的函数 Ψ ，称为**状态函数** (state function) 或**波函数** (wave function) 【通常写作**波函数** (wavefunction)】。由于状态一般会随时间变化，因此 Ψ 也是时间的函数。对于一个单粒子的一维系统，我们有 $\Psi = \Psi(x, t)$ 。波函数包含了一个系统所有可能的信息，因此我们不说“波函数 Ψ 所描述的状态”，而只说“状态 Ψ ”。牛顿第二定律告诉我们，如何通过对经典力学系统当前状态的了解来找到它的未来状态。而要根据量子力学系统当前的状态找到它未来的状态，我们需要一个方程来告诉我们波函数是如何随时间变化的。对于单粒子的一维系统，将这个方程假定为

$$-\frac{\hbar}{i} \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2} + V(x, t) \Psi(x, t) \quad (1.13)$$

其中常数 $\hbar$ (约化普朗克常数) 定义为

$$\boxed{\hbar \equiv \frac{h}{2\pi}} \quad (1.14)$$

1926 年, 奥地利物理学家埃尔温·薛定谔 (Erwin Schrödinger) (1887-1961) 建立了波函数的概念及其随时间变化的方程。这个被称为**含时薛定谔方程** (或**薛定谔波方程**) (time-dependent Schrödinger Equation) 中, i 是虚数单位, m 是粒子的质量, $V(x, t)$ 是系统的势能函数。(量子力学中许多具有重要历史意义的论文可在 dieumsnh.qfb.umich.mx/archivoshistoricosmq 网站上查阅。)

含时薛定谔方程包含波函数对时间的一阶导数, 如果我们知道 t_0 时刻的波函数, 就可以计算出未来任意时刻的波函数 (状态)。

波函数包含了我们可能知道的关于它所描述的系统的所有信息。关于粒子 x 坐标的测量结果, Ψ 给了我们什么信息? 我们不能指望 Ψ 会像经典力学系统的状态那样具有涉及位置的明确说明。这个问题的正确答案是在薛定谔发现薛定谔方程后不久, 由马克斯·玻恩 (Max Born) 给出的。玻恩推测: 对于单粒子的一维系统,

$$\boxed{|\Psi(x, t)|^2 dx} \quad (1.15)$$

给出了在 t 时刻, 在 x 到 $x+dx$ 范围内找到该粒子的概率。在 (1.15) 中, 两条竖线表示绝对值, dx 表示 x 轴上一个无限小的长度。函数 $|\Psi(x, t)|^2$ 是在 x 轴上不同位置找到粒子的**概率密度** (probability density)。(第 1.6 节回顾了概率) 例如, 假设在某个特定时间 t_0 , 粒子处于由波函数 $a^2 e^{-2bx^2}$ 描述的特征状态, 其中 a 和 b 是实常数。如果我们在 t_0 时刻观测该粒子的位置, 会得到任意的 x 值, 因为概率密度 $a^2 e^{-2bx^2}$ 处处非零。由于 $|\Psi|^2$ 在原点取到最大值, 因此在 $x=0$ 附近的 x 值比其他地方的更有可能被观测到。

为了将 Ψ 与实验测量联系起来, 我们需要许多完全相同的非相互作用系统, 每个系统都处于相同的状态 Ψ 。如果我们对 n 个系统进行了 n 次测量, 令 dn_x 表示在 x 和 $x+dx$ 之间找到粒子的测量次数, 那么 dn_x/n 就是在 x 和 $x+dx$ 之间找到粒子的概率。因此, 有

$$\frac{dn_x}{n} = |\Psi|^2 dx$$

而 $(1/n) dn_x/dx$ 与 x 的关系图则给出了概率密度 $|\Psi|^2$ 与 x 的函数关系。也许有人认为, 我们可以通过一个处于 Ψ 状态的系统, 反复测量粒子的位置来找到概率密度函数。这种方法是错误的, 因为测量过程通常会改变系统的状态。我们在讨论不确定性原理 (第 1.3 节) 时看到过一个这方面的例子。

量子力学是统计性质的。在知道状态的情况下, 我们无法准确预测位置测量的结果; 我们只能预测各种可能结果的概率。氢原子的玻尔理论规定了电子的精确路径, 因此不是正确的量子力学图景。

量子力学并没有说电子像波一样分布在空间的很大区域。相反, 用于描述电子运动的概率模式 (波函数) 表现得像波, 并满足波方程。

波函数如何为我们提供位置以外的其他属性信息, 将在后面的章节中讨论。

热力学公设 (热力学第一、第二和第三定律) 是由宏观经验提出的, 因此相当容易理解。量子力学的公设是从微观世界的角度阐述的, 显得相当抽象。不要指望第一次接触就能完全理解量子力学公设。随着我们对各种实例的处理, 对这些公设的理解会加深。

我们引入了薛定谔方程, 却没有试图证明它的合理性, 这可能会让读者感到困惑。通过几何光学和经典力学之间的类比, 以及波光学和量子力学之间的类比, 我们可以证明薛定谔方程的合理性。几何光学是波光学的近似, 在光的波长远小于仪器尺寸时有效。(回忆一下它在处理镜片和镜子时的用途)。同样地, 经典力学是波动力学的近似, 当粒子的波长远小于仪器的尺寸时有效。我们可以根据已知的几何光学方程和波光学方程之间的关系, 猜测如何从经典力学中得到量子力学的正确方程。由于许多化学家对光学并不特别熟悉, 因此省略了这些论证。无论如何, 这些类比只能使薛定谔方程看起来可信。它们不能用来推导或证明这个方程。薛定谔方程是理论的一个假设, 要通过其预测

与实验的一致性来检验。（关于薛定谔得出方程的推理细节，请参阅 *Jammer*, Section 5.3。参考文献中的作者姓名用斜体标出）

量子力学为微观粒子提供了运动规律。从实验上看，宏观物体遵从经典力学。因此，要使量子力学成为有效的理论，当我们从微观粒子过渡到宏观粒子时，量子力学应还原为经典力学。量子效应与德布罗意波长 $\lambda = h/mv$ 有关。由于 h 非常小，宏观物体的德布罗意波长近似为零。因此，在极限 $\lambda \rightarrow 0$ 中，我们期望含时薛定谔方程能够还原为牛顿第二定律。我们可以证明这一点（见问题 7.59）。

狭义相对论与经典力学的关系也存在类似的情况。在以 c 为光速的极限 $v/c \rightarrow 0$ 中，狭义相对论可退化为经典力学。我们将要发展的量子力学形式将是非相对论的。相对论与量子力学的完全融合尚未实现。

从历史上看，量子力学是由海森堡、玻恩和乔丹 (Jordan) 于 1925 年首次使用矩阵提出的，比薛定谔于 1926 年使用微分方程提出的量子力学早几个月。薛定谔证明：海森堡公式（称为**矩阵力学**）等同于薛定谔公式（称为**波动力学**）。1926 年，狄拉克和乔丹分别独立地用一种称为变换理论的抽象版本提出了量子力学，它是矩阵力学和波动力学的概括（见 *Dirac*）。1948 年，费曼 (Feynman) 设计出了量子力学的路径积分公式【R. P. Feynman, *Rev. Mod. Phys.*, **20**, 367 (1948); R. P. Feynman and A. R. Hibbs, *Quantum Mechanics and Path Integrals*, McGraw-Hill, 1965】。

1.5 定态薛定谔方程

含时薛定谔方程 (1.13) 看上去很可怕。幸运的是，量子力学在化学中的许多应用都不使用这个方程。取而代之的是更简单的定态薛定谔方程。现在，我们从一维单粒子的含时薛定谔方程导出定态薛定谔方程。

首先，我们只讨论一种特殊情况，即势能 V 不是时间的函数，而只取决于 x 。系统没有受到与时间相关的外力作用时会出现此情况。此时，含时薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar}{i} \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2} + V(x, t) \Psi(x, t) \quad (1.16)$$

将式 (1.16) 的解假设为时间函数和坐标 x 函数的乘积：

$$\boxed{\Psi(x, t) = f(t) \psi(x)} \quad (1.17)$$

大写的 Ψ 用来表示含时的波函数，而小写的 ψ 表示只与 x 坐标有关的因子。与 (1.17) 形式的波函数相对应的状态具有某些特性（稍后讨论），这些特性使它们极具吸引力。【并非 (1.16) 的所有解都具有 (1.17) 的形式；见问题 3.51。】取 (1.17) 的偏导数，我们有

$$\frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} = \frac{df(t)}{dt} \psi(x), \quad \frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2} = f(t) \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2}$$

代入 (1.16)，有

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar}{i} \frac{df(t)}{dt} \psi(x) &= -\frac{\hbar^2}{2m} f(t) \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + V(x) f(t) \psi(x) \\ -\frac{\hbar}{i} \frac{1}{f(t)} \frac{df(t)}{dt} &= -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{\psi(x)} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + V(x) \end{aligned} \quad (1.18)$$

其中方程左右两边同除 $f\psi$ 。一般来说，我们希望 (1.18) 两边各相等的量是 x 和 t 的某个函数。然而，(1.18) 的右边不依赖于 t ，所以 (1.18) 两边相等的函数必须与 t 无关。我们称这个常数为 E 。

令式 (1.18) 的左边等于 E ，我们有

$$\frac{df(t)}{dt} = -\frac{iE}{\hbar} f(t)$$

左右对时间求积分，有

$$\ln f(t) = -iEt/\hbar + C$$

其中 C 是任意常数。因此，

$$f(t) = e^C e^{-iEt/\hbar} = A e^{-iEt/\hbar}$$

其中 A 是代替了 e^C 的任意常数。由于 A 可以作为因子包含在与 $f(t)$ 相乘的函数 $\psi(x)$ 中，因此 A 可以从 $f(t)$ 中略去。所以，

$$f(t) = e^{-iEt/\hbar}$$

令 (1.18) 的右边等于 E ，我们有

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x)} \quad (1.19)$$

方程 (1.19) 就是质量为 m 的单粒子一维运动的**定态薛定谔方程** (time-independent Schrödinger Equation)。常数 E 有什么意义？由于 E 在 (1.19) 中作为 $[E - V(x)]$ 出现， E 的量纲与 V 相同，因此 E 具有能量的量纲。事实上，我们假设 E 就是系统的能量。（这是后一章将讨论的一个更普遍假设的特例）因此，在势能仅是 x 的函数的情况下，存在如下形式的波函数

$$\Psi(x, t) = e^{-iEt/\hbar} \psi(x) \quad (1.20)$$

这些波函数对应于恒定能量 E 的状态。在接下来的几章中，我们将主要关注如何找到各种系统的方程 (1.19) 的解。

式 (1.20) 中的波函数是复函数，但在实验中可观测到的量是概率密度 $|\Psi(x, t)|^2$ 。复数绝对值的平方由复数与其复共轭的乘积给出，复共轭则是在出现 i 的地方用 $-i$ 代替 i （见第 1.7 节）。因此，

$$\boxed{|\Psi|^2 = \Psi^* \Psi} \quad (1.21)$$

其中， $*$ 号表示复共轭。对于波函数 (1.20)，有

$$\begin{aligned} |\Psi(x, t)|^2 &= [e^{-iEt/\hbar} \psi(x)]^* e^{-iEt/\hbar} \psi(x) \\ &= e^{iEt/\hbar} \psi^*(x) e^{-iEt/\hbar} \psi(x) \\ &= \psi^*(x) \psi(x) = \psi^*(x) \psi(x) \\ |\Psi(x, t)|^2 &= |\psi(x)|^2 \end{aligned} \quad (1.22)$$

在推导 (1.22) 时，我们假设 E 是实数，即 $E = E^*$ 。这将会在第 7.2 节给出证明。

因此，对于 (1.20) 形式的状态，概率密度由 $|\Psi(x)|^2$ 给出，且不随时间变化。这种状态称为**定态** (stationary states)。由于具有物理意义的量是 $|\Psi(x, t)|^2$ ，而且对于定态有 $|\Psi(x, t)|^2 = |\psi(x)|^2$ ，函数 $\psi(x)$ 通常被称为**波函数**，尽管定态的完整波函数是 $\psi(x)$ 与 $e^{-iEt/\hbar}$ 的乘积。定态一词不应误导读者，让他们以为处于定态的粒子就是静止的。确定的是概率密度 $|\Psi|^2$ ，而不是粒子本身。

我们将主要关注能量恒定的状态（定态），因此通常会处理定态薛定谔方程 (1.19)。为简单起见，我们将此方程称为“薛定谔方程”。请注意，薛定谔方程包含两个未知数：允许的能量 E 和允许的波函数 ψ 。为了求解这两个未知数，我们除了要求它满足 (1.19) 以外，还需要有额外的条件（称为边界条件或定解条件）。边界条件决定了允许的能量，因为只有特定的 E 值才能满足边界条件。这一点在后面章节讨论具体例子时会更加清楚。

1.6 概率

概率在量子力学中起着基础性的作用。本节主要回顾数学中的概率。

关于概率的正确定义一直存在很多争议。其中一个定义如下：如果一个实验有 n 个同样可能的结果，其中 m 个结果有利于某个事件 A 的发生，那么 A 发生的概率就是 m/n 。请注意：这个定义是循环论证，因为它指定了同样可能的结果，而概率才是我们要定义的。它只是假设我们能够识别同样可能发生的结果。另一个定义是基于多次实际操作实验：假设我们进行了 N 次实验，在其中的 M 次实验中，事件 A 发生了。那么将 A 发生的概率定义为

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{M}{N}$$

因此，如果我们重复抛一枚硬币，随着次数的增加，正面的比例会逐渐接近 $1/2$ 。

例如，假设我们想知道从一副包含 13 张红心的 52 张标准牌中随机抽取一张牌时，抽到红心的概率。有 52 张牌，因此有 52 种同样可能的结果。有 13 张红心，因此抽出红心有 13 种可能的结果。所以， $m/n = 13/52 = 1/4$ 。即抽到红心的概率为 $1/4$ 。

有时我们会关心两个相关事件同时发生的概率。例如，我们可能会问从一副 52 张牌中抽出两张红心的概率，假设抽出第一张牌后我们不放回去。第一次抽牌有 52 种可能的结果，而每一种可能都对应 51 种可能的第二次抽牌。我们有 $52 \cdot 51$ 种可能的结果。因为有 13 张红心，所以有 $13 \cdot 12$ 种不同的方法抽出两张红心。期望概率为 $(13 \cdot 12) / (52 \cdot 51) = 1/17$ 。这个计算说明了定理：两个事件 A 和 B 同时发生的概率是 A 发生的概率乘以 B 随后发生的条件概率（计算时假设 A 发生）。因此，如果 A 是第一次抽中红心的概率，那么 A 的概率就是 $13/52$ 。如果第一次抽到红心，那么第二次抽到红心的概率是 $12/51$ ，因为牌中还有 12 张红心。那么抽到两张红心的概率是 $(13/52)(12/51) = 1/17$ ，如前所述。

在量子力学中，我们必须处理涉及连续变量（例如 x 坐标）的概率。谈论在 $x = 0.5000 \dots$ 这样一个特定点上发现粒子的概率是没有多大意义的，因为 x 轴上有无数个点，而对于我们进行的任何有限次数的测量来说，精确得到 $0.5000 \dots$ 的概率都是微乎其微的。相反，我们谈论的是在 x 轴上位于 x 和 $x + dx$ 之间的微小区间内找到粒子的概率， dx 是长度的一个无穷小量。这个概率自然与区间的长度 dx 成正比，并且会随着 x 轴的不同区域而变化。因此，粒子在 x 和 $x + dx$ 之间被发现的概率等于 $g(x) dx$ ，其中 $g(x)$ 是某个函数，表示概率在 x 轴上的变化情况。函数 $g(x)$ 称为**概率密度** (probability density)，因为它是单位长度上的概率。由于概率是实数、非负数，因此 $g(x)$ 必须是一个处处非负的实函数。波函数 Ψ 可以取负值和复值，不是概率密度。因此，量子力学假设概率密度为 $|\Psi|^2$ 【公式 (1.15)】。

粒子位于空间的某个有限区域 $a \leq x \leq b$ 的概率是多少？为了求出这个概率，我们将在位于 a 和 b 之间的所有无限小区域中找到粒子的概率 $|\Psi|^2 dx$ 相加，这就是如下定积分的定义：

$$\int_a^b |\Psi|^2 dx = \text{Pr}(a \leq x \leq b) \quad (1.23)$$

其中， Pr 表示概率。概率为 1 则代表必然性。由于粒子肯定位于 x 轴上的某处，因此我们要求

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi|^2 dx = 1 \quad (1.24)$$

若波函数 Ψ 满足式 (1.24)，则我们说 Ψ 是**归一化的** (normalized)。对于定态波函数，有 $|\Psi|^2 = |\psi|^2$ 且 $\int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 dx = 1$ 。

例题：一个单粒子一维系统在 $t = 0$ 时刻满足 $\Psi = a^{-1/2}e^{-|x|/a}$ ，其中 $a = 1.0000 \text{ nm}$ 。在 $t = 0$ 时对粒子的位置进行一次测量。

- (a) 求测量值介于 $x = 1.5000 \text{ nm}$ 和 $x = 1.5001 \text{ nm}$ 之间的概率；
 (b) 求测量值介于 $x = 0 \text{ nm}$ 和 $x = 2 \text{ nm}$ 之间的概率；
 (c) 求证： Ψ 是归一化的。

(a) 在这个极小的区间内， x 只变化了 0.0001 nm ，而 Ψ 从 $e^{-1.5000} \text{ nm}^{-1/2} = 0.22313 \text{ nm}^{-1/2}$ 到 $e^{-1.5001} \text{ nm}^{-1/2} = 0.22311 \text{ nm}^{-1/2}$ ，所以 Ψ 在这个区间可以近似为常数，将这一区间视为无穷小区间是一个很好的近似方法。带入 (1.15) 给出的期望概率公式，有

$$\begin{aligned} |\Psi|^2 dx &= a^{-1/2}e^{-2|x|/a} dx = (1 \text{ nm})^{-1} e^{-2(1.5 \text{ nm})/(1 \text{ nm})} (0.0001 \text{ nm}) \\ &= 4.979 \times 10^{-6} \end{aligned}$$

(也可见证明 1.14)

(b) 使用式 (1.23) 以及 $x \geq 0$ 时 $|x| = x$ ，有

$$\begin{aligned} \text{Pr}(0 \leq x \leq 2 \text{ nm}) &= \int_0^{2 \text{ nm}} |\Psi|^2 dx = a^{-1} \int_0^{2 \text{ nm}} e^{-2x/a} dx \\ &= -\frac{1}{2} e^{-2x/a} \Big|_0^{2 \text{ nm}} = -\frac{1}{2} (e^{-4} - 1) = 0.4908 \end{aligned}$$

(c) 使用 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^{\infty} f(x) dx$ ，以及 $x \geq 0$ 时 $|x| = x$ 和 $x < 0$ 时 $|x| = -x$ ，有

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi|^2 dx &= a^{-1} \int_{-\infty}^0 e^{2x/a} dx + a^{-1} \int_0^{\infty} e^{-2x/a} dx \\ &= a^{-1} \left(\frac{1}{2} a e^{2x/a} \Big|_{-\infty}^0 \right) + a^{-1} \left(-\frac{1}{2} a e^{-2x/a} \Big|_0^{\infty} \right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \end{aligned}$$

得证。

练习：对于一个测量时态函数为 $\Psi = (32a^3/\pi)^{1/4} x e^{-ax^2}$ 的系统（其中 $a = 1.0000 \text{ nm}^{-2}$ ），求测量值在 $x = 1.2000 \text{ nm}$ 和 1.2001 nm 之间的概率。将区间视为无穷小区间。（答案：0.0000258。）

1.7 复数

我们已经知道波函数可以是复函数，所以我们来回顾一下复数的一些性质。

复数 (complex number) z 具有如下的形式：

$$z = x + iy, \quad \text{其中 } i \equiv \sqrt{-1} \quad (1.25)$$

且 x 和 y 是**实数** (real number) (不涉及负数平方根的数)，如果在 (1.25) 中 $y = 0$ ，则 z 是实数。如果 $y \neq 0$ ，则 z 是**虚数** (imaginary number)。如果 $x = 0$ 且 $y \neq 0$ ，则 z 是**纯虚数** (pure imaginary number)。例如：6.83 是实数， $5.4 - 3i$ 是虚数，而 $0.60i$ 是纯虚数。实数和纯虚数是复数的特例，在 (1.25) 中， x 和 y 分别是 z 的实部和虚部，即 $x = \text{Re}(z)$ ； $y = \text{Im}(z)$ 。

复数可以代表**复平面** (complex plane) (图 1.3) 上的一个点，其中， z 的实部绘制在横轴上，虚部绘制在纵轴上。这幅图显然提示我们定义两个表征复数 z 的量：点 z 与原点的距离 r 称为 z 的**绝**

对值 (absolute value) 或模; 点 z 的半径矢量与正横轴所成的角度 θ 则称为 z 的**相位** (phase) 或辐角。我们有

$$|z| = r = (x^2 + y^2)^{1/2}, \quad \tan \theta = y/x \quad (1.26)$$

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

所以我们可以把 $z = x + iy$ 写作

$$z = r \cos \theta + i \sin \theta = r e^{i\theta} \quad (1.27)$$

由欧拉公式带入。(见问题 4.3)

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \quad (1.28)$$

以上方程中的 θ 角均采用弧度制。

如果 $z = x + iy$, 则它的**复共轭** (complex conjugate) z^* 定义为

$$z^* \equiv x - iy = r e^{-i\theta} \quad (1.29)$$




图 1.3: (a)复数 $z = x + iy$ 的图象; (b)复数 $-2 + i$ 的图象

如果 z 是实数, 那么它的虚部为 0。因此, 当且仅当 $z = z^*$ 时有 z 是实数。对复数 z 作两次复共轭, 我们再次得到了 z , 所以 $(z^*)^* = z$ 。将 z 与其复共轭 z^* 作乘积, 我们有

$$zz^* = (x + iy)(x - iy) = x^2 + i y x + i x y - i^2 y^2$$

$$zz^* = x^2 + y^2 = r^2 = |z|^2 \quad (1.30)$$

对于两个复数 $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ 与 $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$ 的积和商, 我们有

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}, \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)} \quad (1.31)$$

根据复共轭的定义或 (1.31), 我们很容易证明

$$(z_1 z_2)^* = z_1^* z_2^* \quad (1.32)$$

同样地,

$$(z_1 / z_2)^* = z_1^* / z_2^*, \quad (z_1 + z_2)^* = z_1^* + z_2^*, \quad (z_1 - z_2)^* = z_1^* - z_2^* \quad (1.33)$$

对于积和商的绝对值, 由 (1.31) 可知

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|, \quad \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad (1.34)$$

因此, 如果 ψ 是复波函数, 我们有

$$|\psi^2| = |\psi|^2 = \psi^* \psi \quad (1.35)$$

现在我们得到了数字 1 的 n 次根式。我们可以将数字 1 的相位取为 0 或 2π 或 4π , 以此类推。因此 $1 = e^{i2\pi k}$, 其中 k 是任何整数, 0、负数或正数。现在考虑数字 ω , 其中 $\omega \equiv e^{i2\pi k/n}$, n 为正整数。使用式 (1.31) n 次, 我们有 $\omega^n = e^{i2\pi k} = 1$ 。因此, ω 是 n 次单位根。有 n 个不同的复数 n 次单位根, 连续取 n 个整数 k 的值, 就可以得到所有这些根:

$$\omega = e^{i2\pi k/n}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1 \quad (1.36)$$

除了 (1.36) 中的 k 值之外, 任何其他 k 值所得到的数的相位都与 (1.36) 中的一个数相差 2 的整数倍, 因此不是不同的根。对于 (1.36) 中的 $n = 2$, 我们得到 1 的两个平方根; 对于 $n = 3$, 得到 1 的三个立方根; 以此类推。

1.8 单位

本书使用国际单位制。在国际单位制 (SI) 中, 长度、质量、时间的单位分别是米 (m)、千克 (kg) 和秒 (s)。力的单位是牛顿 (N), 能量的单位是焦耳 (J)。描述真空中相距 r 的两个电荷 Q_1 和 Q_2 之间作用力大小的库仑定律, 用国际单位制单位表示为

$$F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (1.37)$$

其中电荷量 Q_1 和 Q_2 的单位是库仑 (C), ϵ_0 是常数 (真空介电常数), 其值为 $8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2\text{N}^{-1}\text{m}^{-2}$ 。(物理常数的精确值见附录。)

1.9 微积分学

量子化学中大量使用微积分, 因此应牢记以下公式。其中 c 、 n 和 b 为常数, f 和 g 为 x 的函数。

$$\frac{dc}{dx} = 0, \quad \frac{d(cf)}{dx} = c \frac{df}{dx}, \quad \frac{dx^n}{dx} = nx^{n-1}, \quad \frac{de^{cx}}{dx} = ce^{cx}$$

$$\frac{d(\sin cx)}{dx} = c \cos cx, \quad \frac{d(\cos cx)}{dx} = -c \sin cx, \quad \frac{d \ln cx}{dx} = \frac{1}{x}$$

$$\frac{d(f+g)}{dx} = \frac{df}{dx} + \frac{dg}{dx}, \quad \frac{d(fg)}{dx} = f \frac{dg}{dx} + g \frac{df}{dx}$$

$$\frac{d(f/g)}{dx} = \frac{d(fg^{-1})}{dx} = -fg^{-2} \frac{dg}{dx} + g^{-1} \frac{df}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} f(g(x)) = \frac{df}{dg} \frac{dg}{dx}$$

最后一个公式有一个例子: $d[\sin(cx^2)]/dx = 2cx \cos(cx^2)$ 。这里 $g(x) = cx^2$ 而 $f = \sin$ 。

$$\int cf(x) dx = c \int f(x) dx, \quad \int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

$$\int dx = x, \quad \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \text{ 其中 } n \neq -1, \quad \int \frac{1}{x} dx = \ln x$$

$$\int e^{cx} dx = \frac{e^{cx}}{c}, \quad \int \sin cx dx = -\frac{\cos cx}{c}, \quad \int \cos cx dx = \frac{\sin cx}{c}$$

总结

习题

Chapter 2

箱中粒子

单粒子一维系统的定态波函数和能级是通过求解定态薛定谔方程 (1.19) 得到的。在本章中，我们将求解一个简单系统的定态薛定谔方程，即一维盒子中的粒子（第 2.2 节）。由于薛定谔方程是微分方程，我们首先讨论微分方程。

2.1 微分方程

本节只讨论常微分方程，即只有一个自变量的方程。[偏微分方程有不只一个自变量。含时薛定谔方程 (1.16) 就是一个例子，其中 t 和 x 都是自变量。] 常微分方程是自变量 x 、因变量 $y(x)$ 和 y 的 1、2、...、 n 阶导数 $y(y', y'', \dots, y^{(n)})$ 之间的关系式。例如

$$y''' + 2x(y')^2 + y^2 \sin x = 3e^x \quad (2.1)$$

微分方程的阶数与方程中最高阶导数的阶数相同。因此，方程 (2.1) 为三阶微分方程。

线性微分方程是一种特殊的微分方程，其形式为

$$A_n(x)y^{(n)} + A_{n-1}(x)y^{(n-1)} + A_{n-2}(x)y^{(n-2)} + \dots + A_1(x)y' + A_0(x)y = g(x) \quad (2.2)$$

其中所有的 A_i 和 g （有些可能为零）只是 x 的函数。在 n 阶线性微分方程 (2.2) 中， y 及其各阶导数的次幂均为一次。不满足式 (2.2) 的微分方程为**非线性**微分方程。如果 (2.2) 中的 $g(x) = 0$ ，则线性微分方程是**齐次**的，否则是**非齐次**的。一维定态薛定谔方程 (1.19) 就是二阶线性齐次微分方程。

通过除以 y'' 的系数，我们可以将每一个二阶线性齐次微分方程化为以下形式

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0 \quad (2.3)$$

设 y_1 和 y_2 是两个满足方程 (2.3) 的独立函数。“独立”的意思是 y_2 并不是 y_1 的简单倍数。因此，线性齐次微分方程 (2.3) 的通解为

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2 \quad (2.4)$$

其中 c_1 和 c_2 是任意常数。将式 (2.4) 代入 (2.3) 的左边即可轻松证明：

$$\begin{aligned} & c_1 y_1'' + c_2 y_2'' + P(x)c_1 y_1' + P(x)c_2 y_2' + Q(x)c_1 y_1 + Q(x)c_2 y_2 \\ &= c_1 [y_1'' + P(x)y_1' + Q(x)y_1] + c_2 [y_2'' + P(x)y_2' + Q(x)y_2] \\ &= c_1 \cdot 0 + c_2 \cdot 0 = 0 \end{aligned} \quad (2.5)$$

其中我们用到了 y_1 和 y_2 是方程 (2.3) 的解。

n 次微分方程的通解通常有 n 个任意常数。为了确定这些常数，我们可能需要**定解条件**，即规定 y 或其各阶导数在某一点或多点的值的条件。例如：如果 y 是固定在两点上的振动弦的位移，我们就知道 y 在这两点上必须为零。

一个重要的特例是二阶**常系数**线性齐次微分方程：

$$y'' + py' + qy = 0 \quad (2.6)$$

其中 p 与 q 是常数。为了解这个方程 (2.6)，我们暂且假定解的形式是 $y = e^{sx}$ 。我们正在寻找一个导数与常数相乘会与原函数相互抵消的函数。指数函数在微分时会重复，因此是正确的选择。将其代入 (2.6) 即可得出

$$s^2 e^{sx} + p s e^{sx} + q e^{sx} = 0$$

$$\boxed{s^2 + ps + q = 0} \quad (2.7)$$

方程 (2.7) 称为**特征方程**。它是一个有两个根 s_1 和 s_2 的一元二次方程，只要 s_1 和 s_2 不相等，就能给出 (2.6) 的两个独立解。因此，(2.6) 的通解为

$$\boxed{y = c_1 e^{s_1 x} + c_2 e^{s_2 x}} \quad (2.8)$$

例如，对于方程 $y'' + 6y' - 7y = 0$ ，其特征方程为 $s^2 + 6s - 7 = 0$ 。解这个特征方程，有 $s_1 = 1$ ， $s_2 = -7$ ，所以通解为 $y = c_1 e^x + c_2 e^{-7x}$ 。

2.2 一维盒子中的粒子

本节求解一维盒子中粒子的定态薛定谔方程。我们所说的粒子是指受到特定势能函数作用的粒子，该势能函数沿 x 轴的任何位置都为无穷大，只有长度为 l 的线段除外，在该线段上势能为零。这样的系统在物理上似乎是不真实的，但这种模型可以成功地应用于某些共轭分子；见问题 2.17。我们把原点放在线段的左端（图 2.1）。




图 2.1: 一维盒子中粒子的势函数 $V(x)$

我们需要考虑三个区域。在区域 I 和 III 中，势能 V 为无穷大，此处的定态薛定谔方程 (1.19) 为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} = (E - \infty) \psi$$

与 ∞ 相比， E 的大小可以忽略不计。我们略去 E ，有

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} = \infty \psi, \quad \psi = \frac{1}{\infty} \frac{d^2 \psi}{dx^2}$$

因此，在盒子的外侧， ψ 为零：

$$\psi_I = 0, \quad \psi_{II} = 0 \quad (2.9)$$

对于区域 II， x 在 0 和 l 之间时，势能 V 为零，定态薛定谔方程 (1.19) 为

$$\frac{d^2\psi_{II}}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E \psi_{II} = 0 \quad (2.10)$$

其中 m 是粒子的质量， E 是能量。我们将方程 (2.10) 视为一个二阶常系数线性齐次微分方程。其特征方程由 (2.7) 给出：

$$s^2 + 2mE\hbar^{-2} = 0$$

$$s = \pm (-2mE)^{1/2} \hbar^{-1} \quad (2.11)$$

$$s = \pm i (2mE)^{1/2} \hbar^{-1} \quad (2.12)$$

其中 i 是虚数单位。使用 (2.8)，我们有

$$\psi_{II} = c_1 e^{i(2mE)^{1/2} x/\hbar} + c_2 e^{-i(2mE)^{1/2} x/\hbar} \quad (2.13)$$

我们姑且令

$$\theta \equiv (2mE)^{1/2} x/\hbar$$

$$\psi_{II} = c_1 e^{i\theta} + c_2 e^{-i\theta}$$

由 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ [1.28] 以及

$$\boxed{\cos(-\theta) = \cos \theta \text{ and } \sin(-\theta) = -\sin \theta} \quad (2.14)$$

我们有 $e^{-i\theta} = \cos(-\theta) + i \sin(-\theta) = \cos \theta - i \sin \theta$ 。因此，

$$\begin{aligned} \psi_{II} &= c_1 \cos \theta + i c_1 \sin \theta + c_2 \cos \theta - i c_2 \sin \theta \\ &= (c_1 + c_2) \cos \theta + (i c_1 - i c_2) \sin \theta \\ &= A \cos \theta + B \sin \theta \end{aligned}$$

其中， A 和 B 是新的任意常数。则

$$\psi_{II} = A \cos \left[\hbar^{-1} (2mE)^{1/2} x \right] + B \sin \left[\hbar^{-1} (2mE)^{1/2} x \right] \quad (2.15)$$

现在通过定解条件，我们来求出 A 和 B 。假设波函数是连续的，也就是说，它的值不会突然跳变，这似乎是合理的（见图 3.4）。如果 ψ 在 $x = 0$ 处连续，那么有 ψ_I 和 ψ_{II} 在 $x = 0$ 处的极限相同：

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \psi_I &= \lim_{x \rightarrow 0} \psi_{II} \\ 0 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ A \cos \left[\hbar^{-1} (2mE)^{1/2} x \right] + B \sin \left[\hbar^{-1} (2mE)^{1/2} x \right] \right\} \\ 0 &= A \end{aligned}$$

由于

$$\boxed{\sin 0 = 0, \quad \cos 0 = 1} \quad (2.16)$$

将 $A = 0$ 带入 (2.15)，有

$$\psi_{II} = B \sin \left[(2\pi/\hbar) (2mE)^{1/2} x \right] \quad (2.17)$$

又由函数在 $x = l$ 处连续，我们有

$$B \sin \left[(2\pi/\hbar) (2mE)^{1/2} l \right] = 0 \quad (2.18)$$

因为我们不能令波函数处处为零-得到一个空箱子, 所以 B 不能为零。有

$$\sin \left[(2\pi/h) (2mE)^{1/2} l \right] = 0$$

$\sin$ 函数的零点位于 $0, \pm\pi, \pm2\pi, \dots, \pm n\pi$ 。则

$$(2\pi/h) (2mE)^{1/2} l = \pm n\pi \quad (2.19)$$

$n = 0$ 是一种特殊情况。由 (2.19), $n = 0$ 意味着 $E = 0$ 。若 $E = 0$ 则特征方程 (2.12) 有两个相等的根, 且式 (2.13) 不是薛定谔方程的完全解。为了找到完全解, 我们回到 (2.10), 其中 $E = 0$ 有 $\frac{d^2\psi_{II}}{dx^2} = 0$ 。积分一次, 有 $d\psi_{II}/dx = c$; 再积分一次, 有 $\psi_{II} = cx + d$, 其中 c 和 d 都是常数。由于 $x = 0$ 时有 $\psi_{II} = 0$, 所以 $d = 0$; 又由于 $x = l$ 时也有 $\psi_{II} = 0$, 所以 $c = 0$ 。因此, $\psi_{II} = 0$ 推出 $E = 0$, 则 $E = 0$ 不是允许的能量值。即 $n = 0$ 是不允许的。

从方程 (2.19) 中解出 E , 我们有

$$E = \frac{n^2 h^2}{8ml^2}, \quad n = 1, 2, 3 \dots \quad (2.20)$$

只有能量值满足式 (2.20) 的波函数 ψ , 才能符合在 $x = l$ 处连续的定解条件。定解条件的应用迫使我们得出能量值是量子化的结论 (图 2.2)。这与经典结果形成了鲜明对比, 经典结果认为盒子中的粒子可以具有任何非负能量。请注意: 粒子的能量有一个大于零的最小值。能量最小的状态称为**基态**。能量高于基态能量的状态为**激发态**。(在经典力学中, 粒子在盒子中的最低能量为零。经典粒子在盒内静止不动时, 动能为零, 势能为零)。




图 2.2: 一维盒子中粒子能量最低四个能级

例题:

有一质量为 2.00×10^{-26} g 的粒子在长度 4.00 nm 的势箱中运动。求该粒子从 $n = 3$ 能级进入 $n = 2$ 能级时发射光子的频率和波长。

根据能量守恒, 发射光子的能量等于两个定态之间的能量差 [公式 (1.4); 另见第 9.9 节]:

$$h\nu = E_{upper} - E_{lower} = \frac{n_u^2 h^2}{8ml^2} - \frac{n_l^2 h^2}{8ml^2}$$

$$\nu = \frac{(n_u^2 - n_l^2) h}{8ml^2} = \frac{(3^2 - 2^2) (6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})}{8 (2.00 \times 10^{-29} \text{ kg}) (4.00 \times 10^{-9} \text{ m})^2} = 1.29 \times 10^{12} \text{ s}^{-1}$$

其中 u 和 l 分别代表高能级和低能级。由 $\lambda\nu = c$, 有 $\lambda = 2.32 \times 10^{-4} \text{ m}$ 。(学生常见的错误是将 $h\nu$ 设为其中一个状态的能量, 而不是状态间的能量差)

练习:

对于某个在一维盒子中运动的电子, 其能级跃迁的最长波长为 400 nm。求盒子的长度。

答案: 0.603 nm

将 (2.19) 带入 (2.17), 解出波函数为

$$\psi_{II} = B \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right), \quad n = 1, 2, 3 \dots \quad (2.21)$$

在 $n\pi$ 前面使用负号并不能得到另一个独立的解。因为 $\sin(-\theta) = -\sin\theta$, 我们只会得到一个常数 -1, 乘以带正号的解。

公式 (2.21) 中的常数 B 仍然是任意的。为了将其确定下来, 我们使用公式 (1.24) 和 (1.22) 对 ψ_{II} 进行归一化:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi|^2 dx &= \int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 dx = 1 \\ \int_{-\infty}^0 |\psi_I|^2 dx + \int_0^l |\psi_{II}|^2 dx + \int_l^{\infty} |\psi_{III}|^2 dx &= 1 \\ |B|^2 \int_0^l \sin^2\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx &= 1 = |B|^2 \frac{l}{2} \end{aligned} \quad (2.22)$$

其中的积分是用附录中的公式 (A.2) 求得的。我们有

$$|B|^2 = (2/l)^{1/2}$$

注意我们只求出了 B 的绝对值, 但 B 可以取 $\pm(2/l)^{1/2}$ 。此外, B 也不必是实数, 我们可以取任何模为 $(2/l)^{1/2}$ 的复数。所以, 我们可以说 $B = (2/l)^{1/2} e^{i\alpha}$, 其中 α 是 B 的辐角, 可以取 0 到 2π 之间的任何值 (第 1.7 节)。取辐角为 0, 则箱中粒子的定态波函数为



$$\psi_{II} = \left(\frac{2}{l}\right)^{1/2} \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right), \quad n = 1, 2, 3 \dots \quad (2.23)$$

波函数和概率密度的图如图 2.3 和 2.4 所示。

能量 (2.20) 和波函数 (2.23) 中的数字 n 称为**量子数**。量子数 n 的每个不同值都会产生不同的波函数和不同的状态。

波函数在某些点为零, 这些点被称为**节点**。量子数 n 每增加 1, 波函数 ψ 就多一个节点。 ψ 和 $|\psi|^2$ 中节点的存在似乎令人惊讶。因此, 图 (2.4) 表明: 对于 $n = 2$, 在箱的中点 $x = 2/l$ 处找到粒子的概率为零。粒子怎么可能从盒子的一侧运动到另一侧, 而在任何时候都不会出现在盒子的中心呢? 这个明显的悖论产生于我们试图用宏观粒子运动的日常经验来理解微观粒子的运动。然而, 正如第 1 章所指出的: 电子和其他微观“粒子”无法用宏观世界的经典物理学概念来完整、正确地描述。

图 2.4 显示, 在盒子的不同位置找到粒子的概率与经典结果截然不同。从经典角度看, 一个固定能量的粒子在盒子中以恒定的速度在两壁之间弹性地来回弹跳。因此, 在盒子中的任何一点发现它的可能性都是相同的; 从量子力学角度看, 我们会发现在盒子中心的最低能级出现概率最大。随着能级越来越高, 节点越来越多, 概率的最大值和最小值就会越来越接近, 而沿着盒子长度方向的概率变化最终会变得难以察觉。当量子数非常大时, 我们就获得了接近于经典的均匀概率密度结果。

图 2.3: 三种能量最低的箱中粒子状态的 ψ 曲线图图 2.4: 三种能量最低的箱中粒子状态的 $|\psi|^2$ 曲线图

这一结果，即在大量子数极限下量子力学与经典力学的关系，被称为玻尔对应原理。由于牛顿力学适用于宏观物体（运动速度远小于光速），我们期望非相对论量子力学能给出与经典力学对宏观物体相同的答案。由于普朗克常数极其微小，能量的量子化对于宏观物体来说是不可观测的。由于粒子的质量和盒子长度的平方出现在式 (2.20) 的分母中，因此在宏观盒子中具有宏观运动能量的宏观物体将具有巨大的 n 值，那么根据对应原理，宏观物体将显示出经典行为。

现在，我们有了一整套波函数，每个波函数对应不同的能量，并以量子数 n （正整数）为特征。让下标 i 表示量子数为 n_i 的特定波函数：

$$\psi_i = \left(\frac{2}{l}\right)^{1/2} \sin\left(\frac{n_i \pi x}{l}\right), \quad 0 < x < l$$

$$\psi_i = 0, \quad \text{其他区域}$$

由于波函数已归一化，我们有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_i^* \psi_j dx = 1, \quad \text{若 } i = j \quad (2.24)$$

现在我们想知道，当我们使用对应于不同能级的波函数时，这个积分的值是多少：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_i^* \psi_j dx = \int_0^l \left(\frac{2}{l}\right)^{1/2} \sin\left(\frac{n_i \pi x}{l}\right) \left(\frac{2}{l}\right)^{1/2} \sin\left(\frac{n_j \pi x}{l}\right) dx, \quad n_i \neq n_j$$

使用附录中的公式 (A.5)，我们有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_i^* \psi_j dx = \frac{2}{l} \left[\frac{\sin[(n_i - n_j)\pi]}{2(n_i - n_j)\pi/l} - \frac{\sin[(n_i + n_j)\pi]}{2(n_i + n_j)\pi/l} \right] = 0 \quad (2.25)$$

由于当 m 是整数时有 $\sin m\pi = 0$ ，则

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_i^* \psi_j dx = 0, \quad i \neq j \quad (2.26)$$

当 (2.26) 成立时，我们说对 $i \neq j$ 的波函数 ψ_i 和 ψ_j 是互相**正交**的。将 (2.24) 与 (2.26) 相结合，我们有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_i^* \psi_j dx = \delta_{ij} \quad (2.27)$$

其中 δ_{ij} 是 **Kronecker 符号** (由数学家的名字命名)。当 i 和 j 相等时, 它等于 1; 当 i 和 j 不相等时, 它等于 0:

$$\delta_{ij} \equiv \begin{cases} 0, & i \neq j; \\ 1, & i = j. \end{cases} \quad (2.28)$$

波函数的特性 (2.27)) 称为**正交归一性**。我们只证明了粒子盒内波函数的正交归一性。我们将在第 7.2 节更广泛地证明它。

您可能会对式 (2.26) 感到困惑, 不明白为什么我们要将一个状态的波函数乘以另一个状态的波函数。我们稍后会看到 (例如第 7.3 节), 使用包含一个系统所有波函数之和的方程通常很有帮助, 而这样的方程会导致像 (2.26) 这样的积分。

研究无限深势阱中粒子的一个更严谨的方法是: 首先处理粒子在壁箱中的势能有限跃迁, 然后当 V 的跃迁变得无限大时求取极限。取极限时的结果与 (2.20) 和 (2.23) 相同 (见问题 2.22)。

我们只考虑了粒子在一维盒子中的定态。该系统的非稳态示例, 请参见第 7.8 节末尾的示例。

关于粒子在盒子中的在线计算机模拟, 请访问 www.chem.uci.edu/undergraduate/applets/dwell/dwell.htm (显示了在盒子中间引入高度和宽度可变的屏障时对波函数和能级的影响); web.williams.edu/wpetc/chemistry/dbingemann/Chem153/particle.html (通过绘制薛定谔方程在能量变化和盒子长度变化时的解来显示量子化); 以及 falstad.com/qm1d/ (同时显示含时薛定谔方程和定态薛定谔方程; 见 7.47)。

2.3 一维自由粒子

我们所说的自由粒子是指不受任何力作用的粒子。对于自由粒子, 对 (1.12) 的积分表明, 无论 x 的值是多少, 势能都保持不变。由于基态能量的选择是任意的, 我们可以设定 $V(x) = 0$ 。则薛定谔方程 (1.19) 变为

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar} E\psi = 0 \quad (2.29)$$

式 (2.29) 与式 (2.10) 相同 (定解条件除外)。因此, (2.29) 的通解为 (2.13):

$$\psi = c_1 e^{i(2mE)^{1/2}x/\hbar} + c_2 e^{-i(2mE)^{1/2}x/\hbar} \quad (2.30)$$

我们可以使用什么边界条件呢? 似乎可以合理地假设 (因为 $\psi^*\psi dx$ 代表一种概率), 当 x 趋于 $\pm\infty$ 时, ψ 将保持有限值。那么如果能量 E 小于零, 那么就违反了边界条件, 因为对于 $E < 0$, 我们有

$$i(2mE)^{1/2} = i(-2m|E|)^{1/2} = i \cdot i \cdot (2m|E|)^{1/2} = -(2m|E|)^{1/2}$$

因此, 当 x 接近负无穷大时, (2.30) 中的第一项将变为无穷大。同样, 如果 E 为负值, 当 x 接近正无穷大时, (2.30) 中的第二项也将变为无穷大。因此, 对于一维自由粒子, 定解条件要求

$$E \geq 0 \quad (2.31)$$

波函数是振荡的, 是一个正弦项和一个余弦项的线性组合 [公式 (2.15)]。对于自由粒子, 能量没有量子化, 所有非负能量都是允许的。在这种情况下, 由于我们规定 $V = 0$, 能量 E 全为动能。如果我们想通过归一化的方式求出常数 c_1 和 c_2 , 会发现积分 $\int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x)\psi(x) dx$ 的值为无穷大。换句话说, 自由粒子的波函数在通常意义上是不可归一化的。这在物理上是意料之中的, 因为当 x 变为 $\pm\infty$ 时, 找到自由粒子的概率没有理由趋近于零。

自由粒子问题是一种不真实的情况, 因为我们实际上不可能有一种粒子与宇宙中的任何其他粒子没有相互作用。

2.4 矩形势阱中的粒子

考虑在一个具有有限势垒的一维盒子中的粒子（图 2.5 a）。势能函数为当 $x < 0$ 和 $x > l$ 时 $V = V_0$ ，而 $0 \leq x \leq l$ 时有 $V_0 = 0$ 。需要考虑两种情况，即粒子的能量高于或低于 V_0 。




图 2.5: (a) 一维矩形势阱中粒子的势能。(b) 该势能的基态波函数。(c) 第一激发态的波函数。

我们首先考虑 $E < V_0$ 的情况。区域 I 和区域 III 的薛定谔方程为 $d^2\psi/dx^2 + (2m/\hbar^2)(E - V_0)\psi = 0$ 。这是一个常系数齐次线性微分方程，其特征方程 (2.7) 为 $s^2 + (2m/\hbar^2)(E - V_0) = 0$ ，特征根为 $s = \pm (2m/\hbar^2)^{1/2}(V_0 - E)^{1/2}$ 。因此，

$$\begin{aligned}\psi_I &= C \exp \left[(2m/\hbar^2)^{1/2} (V_0 - E)^{1/2} x \right] + D \exp \left[- (2m/\hbar^2)^{1/2} (V_0 - E)^{1/2} x \right] \\ \psi_{III} &= F \exp \left[(2m/\hbar^2)^{1/2} (V_0 - E)^{1/2} x \right] + G \exp \left[- (2m/\hbar^2)^{1/2} (V_0 - E)^{1/2} x \right]\end{aligned}$$

其中 C 、 D 、 F 和 G 都是常数。

如第 2.3 节所述，当 $x \rightarrow -\infty$ 时，我们必须阻止 ψ_I 趋于无穷。由于我们假设 $E < V_0$ ，则 $(V_0 - E)^{1/2}$ 是正实数，当 $x \rightarrow -\infty$ 时，为了满足 ψ_I 的值为有限值，我们必须有 $D = 0$ 。同样地，当 $x \rightarrow +\infty$ 时，为了满足 ψ_{III} 的值为有限值，我们有 $F = 0$ 。因此，

$$\psi_I = C \exp \left[(2m/\hbar^2)^{1/2} (V_0 - E)^{1/2} x \right], \quad \psi_{III} = G \exp \left[- (2m/\hbar^2)^{1/2} (V_0 - E)^{1/2} x \right]$$

在区域 II 中， $V = 0$ ，薛定谔方程与 (2.10) 一致，其通解为 (2.15)

$$\psi_{II} = A \cos \left[(2m\hbar^2)^{1/2} E^{1/2} x \right] + B \sin \left[(2m\hbar^2)^{1/2} E^{1/2} x \right] \quad (2.32)$$

为了完整解决这个问题，我们需要用到定解条件。与无限深势阱中粒子的情况类似，我们需要波函数在 $x = 0$ 和 $x = l$ 处连续，则 $\psi_I(0) = \psi_{II}(0)$ ， $\psi_{II}(l) = \psi_{III}(l)$ 。波函数有四个任意常数，因此需要的定解条件不止这两个。除了需要 ψ 连续以外，我们还需要其一阶导数 $d\psi/dx$ 处处连续。为了证明这一要求的合理性，我们假设如果 $d\psi/dx$ 在某点处不连续，则其导数（ ψ 的二阶导数的瞬时变化率）在该点处会趋于无穷。然而，对于矩形势阱中的粒子，其薛定谔方程 $d^2\psi/dx^2 = (2m/\hbar^2)(V - E)\psi$ 的右侧不包含任何趋于无穷的因子。所以 $d^2\psi/dx^2$ 不可能趋于无穷 [更严谨的论证，见 D. Branson, Am. J. Phys., 47, 1000 (1979)]。因此，我们在 $x = 0$ 时有 $d\psi_I/dx = d\psi_{II}/dx$ ，在 $x = l$ 时有 $d\psi_{II}/dx = d\psi_{III}/dx$ 。

由 $\psi_I(0) = \psi_{II}(0)$ ，我们有 $C = A$ 。由 $\psi'_I(0) = \psi'_{II}(0)$ ，我们有 $B = (V_0 - E)^{1/2} A / E^{1/2}$ 。由 $\psi_{II}(l) = \psi_{III}(l)$ ，我们得到了一个复杂的等式，可以根据 A 求出 G 。常数 A 由归一化计算求出。

用 $\psi'_{II}(l) = \psi'_{III}(l)$ 除以 $\psi_{II}(l) = \psi_{III}(l)$ ，再用 A 表示 B ，就得到下面的能级方程（问题 2.21b）：

$$(2E - V_0) \sin \left[(2mE)^{1/2} l / \hbar \right] = 2(V_0 E - E^2)^{1/2} \cos \left[(2mE)^{1/2} l / \hbar \right] \quad (2.33)$$

[虽然 $E = 0$ 也满足 (2.33), 但会导致 $\psi = 0$, 所以它不是允许的能量。(见问题 2.21 b) 定义无量纲的常数 ε 和 b 满足

$$\varepsilon \equiv E/V_0, \quad b \equiv (2mV_0)^{1/2} l/\hbar \quad (2.34)$$

用 V_0 除以 (2.33), 我们有

$$(2\varepsilon - 1) \sin(b\varepsilon^{1/2}) - 2(\varepsilon - \varepsilon^2)^{1/2} \cos(b\varepsilon^{1/2}) = 0 \quad (2.35)$$

只有满足 (2.33) 的粒子的能量才有连续和连续导数的波函数, 所以能级量子化的条件为 $E < V_0$, 为了找到允许的能级, 我们可以在 $0 < \varepsilon < 1$ 的条件下绘制 (2.35) 左侧表达式与 ε 的关系图, 并找出曲线与横轴交叉的点 (另见问题 4.31c)。详细研究 (Merzbacher, 第 6.8 节) 表明: $E < V_0$ 的允许能级数为 N , 其中 N 满足以下条件

$$N - 1 < b/\pi \leq N, \quad \text{其中 } b \equiv (2mV_0)^{1/2} l/\hbar \quad (2.36)$$

例如, 如果 $V_0 = \hbar^2/ml^2$, 那么 $b/\pi = 2(2^{1/2}) = 2.83$, 即 $N = 3$ 。图 (2.5) 显示了最低两个能级的 ψ 。波函数在盒内是振荡的, 而在盒外则呈指数衰减。事实证明: 每提高一个能级, 节点数就增加一个。

到目前为止, 我们只考虑了 $E < V_0$ 的状态。对于 $V_0 < E$, $(V_0 - E)^{1/2}$ 是虚数, 并且波函数 ψ_I 和 ψ_{III} 在 $x \rightarrow \pm\infty$ 时不会趋于零, 而是会振荡 (类似于自由粒子)。我们也再也没有理由将 ψ_I 中的 D 和 ψ_{III} 中的 F 设为零了, 这些额外的常数可以满足 ψ 和 ψ' 的定解条件, 我们会发现不需要限制 E 就可以得到符合条件的波函数。因此, 上述所有能量都是允许的。

$x \rightarrow \pm\infty$ 时 $\psi \rightarrow 0$ 的状态称为**束缚态**。对于束缚态, 只有在有限的空间区域内才有可能找到粒子。对于**非束缚态**, 当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时 ψ 不会趋于零, 且无法归一化。对于在有限深矩形势阱中的粒子, $E < V_0$ 的状态是束缚态, 而 $E > V_0$ 的状态是非束缚态。而在无限深势阱中的粒子则所有的状态都为束缚态, 自由粒子则全为非束缚态。

要在线模拟粒子在势阱中的情况, 请访问 www.falstad.com/qm1d, 并在“设置”框中选择“有限势阱”。您可以改变势阱的宽度和深度, 查看对能级和波函数的影响。

2.5 隧穿

对于有限深矩形势阱中的粒子 (第 2.4 节) 图 (2.5), 波函数 ψ_I 和 ψ_{III} 表明: 就束缚态而言, 在粒子总能量 E 小于其势能 $V = V_0$ 的区域 I 和 III 中找到粒子的概率不为零。经典上, 这是不允许的。经典方程 $E = T + V$ 且 $T \geq 0$, 其中 T 是动能, 则经典力学中 E 是不可能比 V 小的。

考虑一个在有限宽度和深度盒子中作一维运动的粒子, 从经典角度看, 除非粒子的能量大于势能势垒 V_0 , 否则粒子无法逸出。然而, 量子力学的处理方法 (此处省略) 表明, 在盒子外发现总能量小于 V 的粒子的概率是不为零的。

隧穿 (tunneling) 一词表示粒子穿透经典禁区 (如图 2.5 所示), 或粒子穿过高度超过粒子能量的能垒。由于隧穿是一种量子效应, 因此粒子的行为越背离经典力学, 其发生的概率就越大。因此, 质量小的粒子最容易发生隧穿现象 (注意: 质量 m 越大, 第 2.4 节中的 ψ_I 和 ψ_{II} 函数趋于零的速度就越快)。电子很容易发生隧穿。氢原子和离子比更重的原子更容易发生隧穿。放射性原子核发射 α 粒子时, α 粒子要通过子核与 α 粒子之间的短程核吸引力和库仑斥力所产生的势能势垒才能发生隧穿。 NH_3 是金字塔形分子, 分子反转存在势能障碍, 平面构型时势能最大。氢原子可以穿透这个势垒, 从而使分子倒转。在乙烷分子中, 内旋转存在障碍, 在氢的黯淡位置存在势能最大值。氢原子可以从一个交错位置隧穿到下一个位置。电子的隧穿在氧化还原反应和电极过程中非常重要。隧穿通

常对涉及氢原子转移的化学反应的速率有很大贡献。参见 R. P. Bell, *The Tunnel Effect in Chemistry*, Chapman & Hall, 1980。




图 2.6: 有限高度和宽度的一维盒子中粒子的势能函数

某些酶催化反应中会出现 H 原子的隧穿现象；见《酶催化反应中的量子隧穿》，R. Allemann 和 N. Scrutton（编），RSCP Publishing 出版社，2009 年。

扫描隧穿显微镜发明于 1981 年，它利用电子在极细的金属丝尖端与导电固体表面之间的空间隧穿，生成固体表面单个原子的图像。在固体和金属丝之间施加一个微小的电压，当针尖以几 Å 的高度在表面上移动时，针尖的高度会进行调整，以保持电流恒定。根据针尖高度与位置的关系绘制出表面图像。

总结

习题

Chapter 3

算符

3.1 算符

现在，我们以一种比以前更一般的方式来发展量子力学理论。首先，我们将单粒子一维定态薛定谔方程 (1.19) 写成以下形式

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x) \right] \psi(x) = E\psi(x) \quad (3.1)$$

(3.1) 中括号内的实体是一个算符 (operator)。方程 (3.1) 表明我们有一个能量算符，它对波函数起作用后，波函数又回来了，不过是乘以一个允许的能量值。因此，接下来我们讨论算符。

算符是一种将给定函数转换为另一个函数的规则。例如，让 $\hat{D}$ 算符来表示对关于 x 的函数求导。我们用一个小尖号来表示算符。给定一个可导函数 $f(x)$ ，则将 $\hat{D}$ 作用到 $f(x)$ 上即可表示为 $\hat{D}f(x) = f'(x)$ 。例如， $\hat{D}(x^2 + 3e^{2x}) = 2x + 6e^{2x}$ 。如果 $\hat{3}$ 是将函数乘以 3 的算符，那么 $\hat{3}(x^2 + 3e^x) = 3x^2 + 9e^x$ 。如果 $\tan$ 是取函数正切值的算符，那么将 $\tan$ 应用于函数 $x^2 + 1$ ，我们得到了 $\tan(x^2 + 1)$ 。如果算符 $\hat{A}$ 将函数 $f(x)$ 转换为另一个函数 $g(x)$ ，我们将其写作 $\hat{A}f(x) = g(x)$ 。

我们将两个算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 的**和**与**差**定义为

$$\begin{aligned} (\hat{A} + \hat{B})f(x) &\equiv \hat{A}f(x) + \hat{B}f(x) \\ (\hat{A} - \hat{B})f(x) &\equiv \hat{A}f(x) - \hat{B}f(x) \end{aligned} \quad (3.2)$$

例如，若 $\hat{D} \equiv d/dx$ ，那么

$$(\hat{D} + \hat{3})(x^3 - 5) = \hat{D}(x^3 - 5) + \hat{3}(x^3 - 5) = 3x^2 + (3x^3 - 15) = 3x^3 + 3x^2 - 15$$

一个算符也可以涉及多个变量。例如，算符 $\partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2$ 具有如下性质：

$$(\partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2)g(x, y) = \partial^2 g/\partial x^2 + \partial^2 g/\partial y^2$$

两个算符的**积**定义为

$$\hat{A}\hat{B}f(x) = \hat{A}[\hat{B}f(x)] \quad (3.3)$$

换句话说，我们先将乘积右边的算符作用到函数 $f(x)$ 上，然后将左边的算符作用到得到的函数上。例如， $\hat{3}\hat{D}f(x) = \hat{3}[\hat{D}f(x)] = \hat{3}f'(x) = 3f'(x)$

算符 $\hat{A}\hat{B}$ 和 $\hat{B}\hat{A}$ 可能不会有同样的效果。例如，考虑算符 d/dx 和 $\hat{x}$ ($\hat{x}$ 表示将函数乘以 x)：

$$\hat{x}\hat{D}f(x) = \frac{d}{dx}[xf(x)] = f(x) + f'(x) = (\hat{1} + \hat{x}\hat{D})f(x) \quad (3.4)$$

$$\hat{x}\hat{D}f(x) = \hat{x}\left[\frac{d}{dx}f(x)\right] = xf'(x)$$

在这个例子中, $\hat{A}\hat{B}$ 和 $\hat{B}\hat{A}$ 是不同的算符。

我们可以建立如下的**算符代数**。若对任意的函数 f , 有 $\hat{A}f = \hat{B}f$, 则我们说算符 $\hat{A}$ 和算符 $\hat{B}$ 是**相等的**。相等的算符作用到给定的函数上时, 会有相同的结果。例如, 式 (3.4) 表明

$$\hat{D}\hat{x} = 1 + \hat{x}\hat{D} \quad (3.5)$$

算符 $\hat{1}$ (乘以 1) 称作**单位算符**。算符 $\hat{0}$ (乘以 0) 称作**空算符**。我们通常省略简单常数算符顶上的小尖号。我们还可以将算符从算符方程的一边转移到另一边 (问题 3.7)。因此, 式 (3.5) 与 $\hat{D}\hat{x} - \hat{x}\hat{D} - 1 = 0$ 等价, 其中省略了空算符和单位算符上的小尖号。

算符运算遵循结合律:

$$\hat{A}(\hat{B}\hat{C}) = (\hat{A}\hat{B})\hat{C} \quad (3.6)$$

式 (3.6) 的证明见问题 3.10。例如, 令 $\hat{A} = d/dx$, $\hat{B} = \hat{x}$, 而 $\hat{C} = 3$ 。使用式 (3.5), 我们有

$$\begin{aligned} (\hat{A}\hat{B}) &= \hat{D}\hat{x} = 1 + \hat{x}\hat{D}, & [(\hat{A}\hat{B})\hat{C}]f &= (1 + \hat{x}\hat{D})3f = 3f + 3xf' \\ (\hat{B}\hat{C}) &= 3\hat{x}, & [\hat{A}(\hat{B}\hat{C})]f &= \hat{D}(3xf) = 3f + 3xf' \end{aligned}$$

算符代数与普通代数的一个主要区别是: 数的运算遵守乘法的交换律, 但算符不一定。例如: 若 a 和 b 都是数, 那么有 $ab = ba$; 但是 $\hat{A}\hat{B}$ 和 $\hat{B}\hat{A}$ 不一定相等。我们定义算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 的**交换子** (commutator) $[\hat{A}, \hat{B}]$ 为 $\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$:

$$[\hat{A}, \hat{B}] \equiv \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} \quad (3.7)$$

如果有 $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$, 那么 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, 则我们说算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 是**可对易的**。如果 $\hat{A}\hat{B} \neq \hat{B}\hat{A}$, 那么 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 是**不可对易的**。注意 $[\hat{A}, \hat{B}]f = \hat{A}\hat{B}f - \hat{B}\hat{A}f$ 。由于我们作用算符 3 和 d/dx 的顺序没有区别, 因此我们有

$$\left[\hat{3}, \frac{d}{dx}\right] = \hat{3}\frac{d}{dx} - \frac{d}{dx}\hat{3} = 0$$

从式 (3.5), 我们有

$$\left[\frac{d}{dx}, \hat{x}\right] = \hat{D}\hat{x} - \hat{x}\hat{D} = 1 \quad (3.8)$$

那么算符 d/dx 和 $\hat{x}$ 是**不可对易的**。

例题: 求 $[z^3, d/dz]$ 。

为了求出 $[z^3, d/dz]$, 我们需要将其作用到任意一个函数 $g(x)$ 上。由式 (3.7) 交换子的定义及算符差和乘积的定义, 我们有

$$\begin{aligned} [z^3, d/dz]g &= [z^3(d/dz) - (d/dz)z^3]g = z^3(d/dz)g - (d/dz)(z^3g) \\ &= z^3g' - 3z^2g - z^3g' = -3z^2g \end{aligned}$$

删去任意的函数 g , 我们有算符方程 $[z^3, d/dz] = -3z^2$ 。

练习:

求 $[d/dx, 5x^2 + 3x + 4]$ 。(答案: $10x + 3$)

算符的**平方**定义为算符和它本身的乘积： $\hat{B}^2 = \hat{B}\hat{B}$ 。我们来求求导算符的平方：

$$\begin{aligned}\hat{D}^2 f(x) &= \hat{D}(\hat{D}f) = \hat{D}f' = f'' \\ \hat{D}^2 &= d^2/dx^2\end{aligned}$$

再比如：取函数复共轭的算符的平方等于单位算符，因为取两次复共轭可以得到原始函数。算符 $\hat{B}^n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) 定义为连续应用 n 次算符 $\hat{B}$ 。

事实表明，量子力学中出现的算符都是线性的。当且仅当算符 $\hat{A}$ 具有以下两个性质时，它是**线性算符**：

$$\hat{A}[f(x) + g(x)] = \hat{A}f(x) + \hat{A}g(x) \quad (3.9)$$

$$\hat{A}[cf(x)] = c\hat{A}f(x) \quad (3.10)$$

其中 f 和 g 是任意函数， c 是任意常数（可以不必是实数）。线性算符的例子有 $\hat{x}^2$ 、 d/dx 和 d^2/dx^2 。非线性算符有 $\cos$ 和 $(\)^2$ ，其中 $(\)^2$ 是对作用的函数求平方。

例题：

d/dx 是线性算符吗？ $\sqrt{\ }$ 是线性算符吗？

我们有

$$(d/dx)[f(x) + g(x)] = df/dx + dg/dx = (d/dx)f(x) + (d/dx)g(x)$$

$$(d/dx)[cf(x)] = c(df/dx)$$

d/dx 符合式 (3.9) 和 (3.10)，是线性算符。然而，

$$\sqrt{f(x) + g(x)} \neq \sqrt{f(x)} + \sqrt{g(x)}$$

所以 $\sqrt{\ }$ 不是线性算符。

练习：算符 $x^2 \times$ （乘以 x^2 ）是线性算符吗？（答案：是）

线性算符运算中有用的算符有

$$(\hat{A} + \hat{B})\hat{C} = \hat{A}\hat{C} + \hat{B}\hat{C} \quad (3.11)$$

$$\hat{A}(\hat{B} + \hat{C}) = \hat{A}\hat{B} + \hat{A}\hat{C} \quad (3.12)$$

例题：证明线性算符满足分配律 (3.11)。

开始证明的好方法是先写下给出的内容和要证明的内容。已知 $\hat{A}$ 、 $\hat{B}$ 和 $\hat{C}$ 是线性算符，求证 $(\hat{A} + \hat{B})\hat{C} = \hat{A}\hat{C} + \hat{B}\hat{C}$ 。

为了证明算符 $(\hat{A} + \hat{B})\hat{C}$ 等于算符 $\hat{A}\hat{C} + \hat{B}\hat{C}$ ，我们必须证明这两个算符作用到任意函数 f 上的结果是相等的。即

$$[(\hat{A} + \hat{B})\hat{C}]f = (\hat{A}\hat{C} + \hat{B}\hat{C})f$$

我们从左边 $[(\hat{A} + \hat{B})\hat{C}]f$ 开始。这个表达式包含了算符 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 的乘积及算符 $\hat{C}$ 。将算符乘积的定义 (3.3) 中的 $\hat{A}$ 用 $\hat{A} + \hat{B}$ 替代， $\hat{B}$ 用 $\hat{C}$ 替代，得出 $[(\hat{A} + \hat{B})\hat{C}]f = (\hat{A} + \hat{B})(\hat{C}f)$ 。

将 $\hat{C}f$ 整体视为一个函数，使用式 (3.2) 关于两个算符 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 的和 $\hat{A} + \hat{B}$ 的定义，得出 $(\hat{A} + \hat{B})(\hat{C}f) = \hat{A}(\hat{C}f) + \hat{B}(\hat{C}f)$ 。因此，

$$[(\hat{A} + \hat{B})\hat{C}]f = (\hat{A} + \hat{B})(\hat{C}f) = \hat{A}(\hat{C}f) + \hat{B}(\hat{C}f)$$

使用式 (3.3) 给出的算符积的定义，有 $\hat{A}(\hat{C}f) = \hat{A}\hat{C}f$ 及 $\hat{B}(\hat{C}f) = \hat{B}\hat{C}f$ 。则

$$[(\hat{A} + \hat{B})\hat{C}]f = \hat{A}\hat{C}f + \hat{B}\hat{C}f \quad (3.13)$$

将算符和的定义 (3.2) 中的 $\hat{A}$ 用 $\hat{A}\hat{C}$ 替代， $\hat{B}$ 用 $\hat{B}\hat{C}$ 替代，得出 $(\hat{A}\hat{C} + \hat{B}\hat{C})f = \hat{A}\hat{C}f + \hat{B}\hat{C}f$ ，则式 (3.13) 变成了

$$[(\hat{A} + \hat{B})\hat{C}]f = (\hat{A}\hat{C} + \hat{B}\hat{C})f$$

这就是我们要证明的。因此， $(\hat{A} + \hat{B})\hat{C} = \hat{A}\hat{C} + \hat{B}\hat{C}$ 。

注意我们没有用到 $\hat{A}$ 、 $\hat{B}$ 和 $\hat{C}$ 是线性算符这一条件，事实上，式 (3.11) 对任意算符都成立。但式 (3.12) 只在 $\hat{A}$ 是线性算符时成立。(问题 3.17)

例题：求算符 $d/dx + \hat{x}$ 的平方。

为了求 $(d/dx + \hat{x})^2$ ，我们将其作用到任意一个函数 $f(x)$ 上。令 $\hat{D} \equiv d/dx$ ，我们有

$$\begin{aligned} (\hat{D} + \hat{x})^2 f(x) &= (\hat{D} + \hat{x}) [(\hat{D} + \hat{x})f] = (\hat{D} + \hat{x})(f' + xf) \\ &= f'' + f + xf' + xf' + x^2 f = (\hat{D}^2 + 2\hat{x}\hat{D} + \hat{x}^2 + 1)f(x) \\ (\hat{D} + \hat{x})^2 &= \hat{D}^2 + 2\hat{x}\hat{D} + \hat{x}^2 + 1 \end{aligned}$$

让我们只使用算符方程重复这一计算：

$$\begin{aligned} (\hat{D} + \hat{x})^2 &= (\hat{D} + \hat{x})(\hat{D} + \hat{x}) = \hat{D}(\hat{D} + \hat{x}) + \hat{x}(\hat{D} + \hat{x}) \\ &= \hat{D}^2 + \hat{D}\hat{x} + \hat{x}\hat{D} + \hat{x}^2 = \hat{D}^2 + \hat{x}\hat{D} + 1 + \hat{x}\hat{D} + \hat{x}^2 \\ &= \hat{D}^2 + 2\hat{x}\hat{D} + \hat{x}^2 + 1 \end{aligned}$$

其中用到了式 (3.11)、(3.12) 和 (3.5)，并省略了“乘以 x ”算符上的小尖号。在彻底掌握算符之前，最安全的做法是在进行算符操作时，始终保持算符对任意函数 f 进行操作，然后在最后删除 f 。

练习：

求 $(d^2/dx^2)^2$ 。(答案： $d^4/dx^4 + 2xd^2/dx^2 + 2d/dx + x^2$)

3.2 本征函数和本征值

假设某线性算符 $\hat{A}$ 作用在某个函数 $f(x)$ 上的结果是对 $f(x)$ 乘上一个常数 k 。我们说 $f(x)$ 是 $\hat{A}$ 的一个**本征函数** (eigenfunction)， k 是**本征值** (eigenvalue)。作为定义的一部分，我们将要求本征函数 $f(x)$ 不等于零。我们的意思是说，尽管 $f(x)$ 可能在不同点上消失，但它并非处处为零。我

们有

$$\hat{A}f(x) = kf(x) \quad (3.14)$$

例如, 函数 e^{2x} 是算符 d/dx 的一个本征函数, 其本征值为 2:

$$(d/dx)e^{2x} = 2e^{2x}$$

然而 $\sin 2x$ 不是 d/dx 的本征函数, 因为 $(d/dx)(\sin 2x) = 2 \cos 2x$, 不等于一个常数乘以 $\sin 2x$ 。

例题: 如果函数 $f(x)$ 是线性算符 $\hat{A}$ 的一个本征函数, c 是任意常数。求证: $cf(x)$ 也是算符 $\hat{A}$ 的本征函数, 并与 $f(x)$ 有相同的本征值。

了解如何进行证明的一个好方法是按以下步骤进行:

1. 写下给定的信息, 并将这些信息从文字转化为等式。
2. 用一个或多个方程的形式写下要证明的内容。
3. (a) 处理步骤 1 中的给定方程, 将其转化为步骤 2 中的所需方程。(b) 或者, 从我们要证明的方程的一边开始, 使用步骤 1 中的给定方程来处理这一边, 直到它转化为要证明的方程的另一边。

我们三个条件: $f(x)$ 是算符 $\hat{A}$ 的本征函数; $\hat{A}$ 是线性算符; c 是常数。将这些表述转化为方程 [见方程 (3.14)、(3.9) 和 (3.10)], 我们有

$$\hat{A}f = kf \quad (3.15)$$

$$\hat{A}(f + g) = \hat{A}f + \hat{A}g, \quad \text{及} \quad \hat{A}(bf) = b\hat{A}f \quad (3.16)$$

$$c = a \text{ (常数)}$$

其中 k 和 b 是常数, f 和 g 是函数。

我们想要证明 $cf(x)$ 也是算符 $\hat{A}$ 的本征函数且有相同的本征值, 将其写成方程, 即

$$\hat{A}(cf) = k(cf)$$

使用策略 (3) 的 (b), 我们从待证明方程的左侧 $\hat{A}(cf)$ 出发, 尝试证明它等于 $k(cf)$ 。由线性算符定义 (3.16) 的第二个方程, 我们有 $\hat{A}(cf) = c\hat{A}f$ 。使用本征方程 (3.15), 有 $c\hat{A}f = ckf$ 。因此,

$$\hat{A}(cf) = c\hat{A}f = ckf = k(cf)$$

得证。

例题: (a) 求算符 d/dx 的本征函数及对应的本征值; (b) 如果我们假设定解条件为本征函数在 $x \rightarrow \pm\infty$ 时为有限值, 求对应的本征值。

(a) 将算符 $\hat{A} = d/dx$ 带入方程 (3.14), 有

$$\frac{df(x)}{dx} = kf(x) \quad (3.17)$$

$$\frac{1}{f}df = kdx$$

求积分, 有

$$\begin{aligned}\ln f &= kx + \text{常数} \\ f &= e^{\text{常数}} e^{kx} \\ f &= ce^{kx}\end{aligned}\tag{3.18}$$

算符 d/dx 的本征函数由 (3.18), 本征值为 k , 它可以是任何数字, 而 (3.17) 仍然成立。本征函数包含一个任意的常数 c 。这对每个线性算符的特征函数都是正确的, 正如前面的例子所证明的。(3.18) 中 k 的每个不同值都会产生不同的特征函数。然而, k 值相同而 c 值不同的特征函数并不是相互独立的。

(b) 由于 k 可以是复数, 我们可以写作 $k = a + ib$, 其中 a 和 b 是实数。我们有 $f(x) = ce^{ax}e^{ibx}$ 。若 $a > 0$, 则当 x 趋于无穷时因子 e^{ax} 也趋于无穷。若 $a < 0$, 则 $x \rightarrow -\infty$ 时 $e^{ax} \rightarrow \infty$ 。因此, 这两个定解条件要求 $a = 0$, 所以本征值 $k = ib$, 其中 b 是实数。

在第 3.1 节的第一个例题中, 我们知道对任意的函数 g , 有 $[z^3, d/dz]g(z) = -3z^2g(z)$, 所以 $[z^3, d/dz] = -3z^2$ 。相反地, 本征方程 $\hat{A}f(x) = kf(x)$ [式 (3.14)] 却不一定对任意函数 $f(x)$ 成立, 从这个方程中我们并不能得出 $\hat{A} = k$ 。因此, 结论 $(d/dx)e^{2x} = 2e^{2x}$ 并不意味着 d/dx 与乘以 2 相等。

3.3 算符和量子力学

我们现在考虑算符和量子力学之间的关系。将式 (3.1) 与 (3.14) 比较, 我们可以发现薛定谔方程是一个本征值问题。能量 E 的值就是本征值。本征函数就是定态薛定谔方程 ψ 。所需的本征函数和本征值的算符是 $-(\hbar^2/2m)d^2/dx^2 + V(x)$ 。这个算符称为系统的**哈密顿算符** (Hamiltonian operator)。

威廉·罗文·哈密顿爵士 (Sir William Rowan Hamilton) (1805-1865) 设计了牛顿运动方程的另一种形式, 其中涉及一个函数 H , 即系统的**哈密顿函数** (Hamiltonian function)。对于势能仅是坐标函数的系统, 总能量随时间保持不变; 也就是说, E 是守恒的。我们将只讨论这种保守系统。对于保守系统, 经典力学哈密顿函数可以简单地用坐标和共轭动量来表示总能量。对于笛卡尔坐标 x 、 y 、 z , **共轭动量**是线动量在 x 、 y 、 z 方向上的分量 p_x 、 p_y 、 p_z :

$$p_x \equiv mv_x, \quad p_y \equiv mv_y, \quad p_z \equiv mv_z\tag{3.19}$$

其中 v_x 、 v_y 、 v_z 分别是粒子的速度矢量在 x 、 y 、 z 方向上的分量。

让我们找出质量为 m 的粒子在一维中运动并受到势能 $V(x)$ 作用的经典力学哈密顿函数。哈密顿函数等于系统的能量, 而能量包括动能和势能。然而, 我们熟悉的动能形式 $\frac{1}{2}mv_x^2$ 并不适用, 因为我们必须将哈密顿表示为坐标和动量的函数, 而不是速度的函数。由于 $v_x = p_x/m$, 我们想要的动能表示形式为 $p_x^2/2m$ 。那么哈密顿函数为

$$H = \frac{p_x^2}{2m} + V(x)\tag{3.20}$$

定态薛定谔方程 (3.1) 表明: 与哈密顿函数 (3.20) 相对应, 我们有一个量子力学算符

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x)$$

其本征值为系统能量的允许值。经典力学中的物理量与量子力学中的算符之间的这种对应关系是普遍的。量子力学的一个基本假设是, 每一个物理量 (例如能量、 x 坐标、动量) 都有一个对应的量子

力学算符。我们进一步假设，将 B 的经典力学表达式写成笛卡尔坐标和相应动量的函数，然后进行如下替换，就能找到与属性 B 相对应的算符。每个笛卡尔坐标 q 都用与该坐标相乘的算符来代替：

$$\hat{q} = q \times$$

线动量 p_q 的每个笛卡尔分量都由以下算符代替：

$$\hat{p}_q = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial q} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial q}$$

其中 i 是虚数单位， $\partial/\partial q$ 是 p 对坐标 q 的偏导数算符。

考虑几个例子。与 x 坐标相对应的算符是 x 的乘法运算：

$$\hat{x} = x \times \quad (3.21)$$

同样地，

$$\hat{y} = y \times, \quad \hat{z} = z \times \quad (3.22)$$

线动量各分量的算符为

$$\hat{p}_x = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x}, \quad \hat{p}_y = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial y}, \quad \hat{p}_z = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial z} \quad (3.23)$$

与 p_x^2 相对应的算符为

$$\hat{p}_x^2 = \left(\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \right)^2 = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} = -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \quad (3.24)$$

p_y 与 p_z 的表示类似。

一维的势能算符和动能算符是什么？设一个系统的势能函数为 $V(x) = ax^2$ ，其中 a 是常数。将 x 用 $x \times$ 替代，我们可以看到，势能算符只是乘以 ax^2 。即， $\hat{V}(x) = ax^2 \times$ 。一般来说，对于任何势能函数

$$\hat{V}(x) = V(x) \times \quad (3.25)$$

经典力学中动能 T 的表达式 (3.20) 为

$$T = p_x^2/2m \quad (3.26)$$

将 p_x 用对应的算符 (3.23) 代替，我们有

$$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \quad (3.27)$$

其中用到了式 (3.24)，偏导数就变成了单变量的常导数。经典力学的哈密顿量 (3.20) 为

$$H = T + V = p_x^2/2m + V(x) \quad (3.28)$$

相应的量子力学哈密顿（或能量）算符为

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \quad (3.29)$$

与薛定谔方程 (3.1) 中的算符一致。请注意，所有这些算符都是线性的。

量子力学算符如何与系统对应的属性相关联？每个这样的算符都有自己的一组本征函数和本征值。令 $\hat{B}$ 是与物理量 B 相对应的量子力学算符，令 f_i 和 b_i 分别代表算符 $\hat{B}$ 的本征函数和本征值。带入式 (3.14)，我们有

$$\hat{B}f_i = b_i f_i, \quad i = 1, 2, 3 \dots \quad (3.30)$$

算符 $\hat{B}$ 有许多本征函数和本征值，用下标 i 相区分。 $\hat{B}$ 通常是线性算符，且式 (3.30) 是微分方程，对应的解可以给出本征函数和本征值。量子力学假设（无论系统的状态函数是什么）对属性 B 的测量必须得到算符 $\hat{B}$ 的一个本征值 b_i 。例如，一个系统的能量只能通过能量（哈密顿）算符 $\hat{H}$ 的本征值求出。使用 ψ_i 来表示 $\hat{H}$ 的本征函数，我们有本征方程 (3.30)

$$\hat{H}\psi_i = E_i\psi_i \quad (3.31)$$

将式 (3.29) 带入式 (3.31)，我们可以得到：对于单粒子的一维系统，有

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi_i = E_i\psi_i \quad (3.32)$$

就是式 (3.1) 的定态薛定谔方程。因此，我们关于算符的假设与我们之前的工作是一致的。稍后，我们将进一步证明动量算符 (3.23) 的选择是正确的，因为在向经典力学的极限过渡中，这一选择会导出 $p_x = m(dx/dt)$ ，这是理所应当的。（见问题 7.59）

在第一章中，我们假设量子力学系统的状态是由一个状态函数 $\Psi(x, t)$ 指定的，这个状态函数包含了我们可能知道的系统所有的信息。 Ψ 是如何告诉我们关于性质 B 的信息的？我们假设：若 Ψ 是 $\hat{B}$ 的本征函数，本征值为 b_k ，则对性质 B 的测量可得到值为 b_k 的结果。例如，考虑系统的能量。能量算符的本征函数为定态薛定谔方程 (3.32) 的解 $\psi(x)$ 。假设系统处于定态，有态函数 (1.20)

$$\Psi(x, t) = e^{-iEt/\hbar} \psi(x) \quad (3.33)$$

$\Psi(x, t)$ 是能量算符 $\hat{H}$ 的本征函数吗？我们有

$$\hat{H}\Psi(x, t) = \hat{H}e^{-iEt/\hbar} \psi(x)$$

$\hat{H}$ 不包含对时间的导数，因此不会影响指数因子 $e^{-iEt/\hbar}$ ，我们有

$$\begin{aligned} \hat{H}\Psi(x, t) &= e^{-iEt/\hbar} \hat{H}\psi(x) = Ee^{-iEt/\hbar} \psi(x) = E\Psi(x, t) \\ \hat{H}\Psi &= E\Psi \end{aligned} \quad (3.34)$$

其中，我们用到了式 (3.31)。因此，对于定态系统， $\Psi(x, t)$ 是 $\hat{H}$ 的本征函数，我们在测量能量时肯定会得到值为 E 的结果。

考虑另一个动量的例子。算符 $\hat{p}_x$ 的本征函数 g 由以下方程求出：

$$\begin{aligned} \hat{p}_x g &= \hbar \frac{dg}{dx} = kg \end{aligned} \quad (3.35)$$

我们有（问题 3.29）

$$g = Ae^{ikx/\hbar} \quad (3.36)$$

其中 A 是任意常数。当 $|x|$ 充分大时，为了确保 g 不趋于无穷，本征值 k 必须是实数。因此， $\hat{p}_x$ 算符的本征值一定为实数

$$-\infty < k < \infty \quad (3.37)$$

这是很合理的。任何对 p_x 的测量都会有符合式 (3.37) 的 $\hat{p}_x$ 的本征值。(3.36) 中每一个不同的 k 值都给出了不同的本征函数 g 。物理量动量的算符涉及虚数 i ，这似乎令人惊讶。事实上， i 的出现确保了本征值 k 一定为实数。回忆算符 d/dx 的本征值为虚数（第 3.2 节）。比较自由粒子波函数 (2.30) 和 $\hat{p}_x$ 的本征函数 (3.36)，我们注意到以下物理解释：(2.30) 中的第一项相当于正动量，代表 $+x$ 方向的运动；(2.30) 中的第二项相当于负动量，代表 $-x$ 方向的运动。

现在来考虑一个盒子中粒子的动量。在一维盒子中处于静止状态的粒子的状态函数为 [式 (3.33), (2.20), 和 (2.23)]。

$$\Psi(x, t) = e^{-iEt/\hbar} \left(\frac{2}{l}\right)^{1/2} \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \quad (3.38)$$

其中 $E = n^2\hbar^2/8ml^2$ 。粒子的 p_x 值是确定的吗? 即 $\Psi(x, t)$ 是算符 $\hat{p}_x$ 的本征函数吗? 注意 $\hat{p}_x$ 的本征函数, 我们可以看到: 没有任何实常数 k 的数值可以使 (3.36) 中的指数函数变成正弦函数, 如 (3.38) 中的正弦函数。因此 Ψ 不是 $\hat{p}_x$ 的本征函数。我们可以直接验证这一点; 我们有

$$\hat{p}_x \Psi = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} e^{-iEt/\hbar} \left(\frac{2}{l}\right)^{1/2} \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) = \frac{n\pi\hbar}{il} e^{-iEt/\hbar} \left(\frac{2}{l}\right)^{1/2} \cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right)$$

由于 $\hat{p}_x \Psi \neq \text{常数} \cdot \Psi$, 态函数 Ψ 不是算符 $\hat{p}_x$ 的本征函数。

注意: 系统的态函数 Ψ 不一定是与系统物理量 B 相对应的算符 $\hat{B}$ 的本征函数 f_i 。因此, 箱中粒子定态波函数不是 $\hat{p}_x$ 的本征函数。尽管如此, 当我们对箱中粒子定态的动量值进行观测时, 我们也必须得到 $\hat{p}_x$ 的一个本征值 (3.37)。

箱中粒子定态波函数是 $\hat{p}_x$ 的本征函数吗? 由 (3.24), 我们有

$$\begin{aligned} \hat{p}_x^2 \Psi &= -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} e^{-iEt/\hbar} \left(\frac{2}{l}\right)^{1/2} \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{l^2} e^{-iEt/\hbar} \left(\frac{2}{l}\right)^{1/2} \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \\ \hat{p}_x^2 \Psi &= \frac{n^2\hbar^2}{4l^2} \Psi \end{aligned} \quad (3.39)$$

因此, 对处于量子数为 n 的定态粒子, 对 $\hat{p}_x^2$ 的观测始终得到值为 $n^2\hbar^2/4l^2$ 的结果。这一点不足为奇: 盒子中的势能为零, 哈密顿算符为

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V} = \hat{T} = \hat{p}_x^2/2m$$

则有式 (3.34):

$$\begin{aligned} \hat{H} \Psi &= E \Psi = \frac{\hat{p}_x^2}{2m} \Psi \\ \hat{p}_x^2 \Psi &= 2mE \Psi = 2m \frac{n^2\hbar^2}{8ml^2} \Psi = \frac{n^2\hbar^2}{4l^2} \Psi \end{aligned} \quad (3.40)$$

与 (3.39) 一致。 p_x 的唯一可能取值是

$$p_x^2 = n^2\hbar^2/4l^2 \quad (3.41)$$

等式 (3.41) 表明, 测量 p_x 必然会得到以下两个值中的一个, 即 $p_x = \pm \frac{1}{2}nh/l$, 对应于粒子在盒中向右或向左移动。这种似是而非的说法并不准确。使用第 7 章的方法进行的分析表明: 测量值很有可能接近以下两个值之一: $p_x = \pm \frac{1}{2}nh/l$ 。但任何符合 (3.37) 的值都可以通过测量盒子中粒子的 p_x 得出; 见问题 7.41。

我们假设对性质 B 的观测一定会给出 $\hat{B}$ 的其中一个本征值。如果态函数 Ψ 恰好是 B 的本征函数, 本征值为 b , 当我们观测 B 时就一定会得到 b 。然而, 假设 Ψ 不是 $\hat{B}$ 的本征函数, 会发生什么呢? 我们仍然断言: 当我们测量 B 时, 会得到 $\hat{B}$ 的一个本征值, 但我们无法预测会得到哪个本征值。我们将在第 7 章中看到, 得到 $\hat{B}$ 的各种本征值的概率是可以预测的。

例题: 测量长度为 l 的一维盒子中质量为 m 的粒子的能量。

如果开始测量时, 粒子的状态函数为

$$(a)\Psi = (30/l^5)^{1/2} x(l-x), \quad 0 \leq x \leq l;$$

$$(b) \Psi = (2/l)^{1/2} \sin(3\pi x/l), \quad 0 \leq x \leq l;$$

测量结果可能是哪些值?

(a) 对性质 E 进行测量的可能结果是系统能量 (哈密顿) 算符 $\hat{H}$ 的本征值。因此, 测量值一定是 $n^2 h^2 / 8ml^2$, $n = 1, 2, 3 \dots$ 中的一个值。由于 Ψ 不是 $\hat{H}$ 的本征函数 $[(2/l)^{1/2} \sin(n\pi x/l)]$ 式 (2.23), 我们无法预测这个非稳态会得到其中哪一个本征值。(获得这些本征值的概率可在第 7.6 节的最后一个例子中找到)

(b) 由于 Ψ 是 $\hat{H}$ 的本征函数, 本征值为 $3^2 h^2 / 8ml^2$, 测量值为 $9^2 h^2 / 8ml^2$ 。

3.4 三维多粒子的薛定谔方程

到目前为止, 我们的研究仅限于一维单粒子系统。上一节中发展的算符形式主义允许我们将工作扩展到三维多粒子系统。含时薛定谔方程的状态函数的时间发展假定为公式 (1.13) 的形式:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi \quad (3.42)$$

能量本征函数和本征值的定态薛定谔方程为

$$\hat{H} \psi = E \psi \quad (3.43)$$

将势能视为与时间无关, 并应用从 (1.13) 得出 (1.19) 所用的变量分离方法, 即可从 (3.42) 导出该式。

对于单粒子三维系统, 经典力学下的哈密顿量为

$$H = T + V = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + V(x, y, z) \quad (3.44)$$

引入量子力学算符, 我们有哈密顿算符

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) + V(x, y, z) \quad (3.45)$$

(3.45) 中括号内的算符称为**拉普拉斯算符** (Laplacian operator, ∇^2):

$$\nabla^2 \equiv \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (3.46)$$

则单粒子三维系统的定态薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V \psi = E \psi \quad (3.47)$$

现在考虑一个有 n 个粒子的三维系统。设粒子 i 具有质量 m_i , 坐标 (x_i, y_i, z_i) , 其中 $i = 1, 2, 3, \dots, n$ 。系统的总动能为动能是各个粒子动能的总和:

$$T = \frac{1}{2m_1} (p_{x_1}^2 + p_{y_1}^2 + p_{z_1}^2) + \frac{1}{2m_2} (p_{x_2}^2 + p_{y_2}^2 + p_{z_2}^2) + \dots + \frac{1}{2m_n} (p_{x_n}^2 + p_{y_n}^2 + p_{z_n}^2)$$

其中 p_{x_i} 是第 i 个粒子动量在 x 方向上的分量。动能算符则为

$$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m_1} \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_1^2} \right) - \dots - \frac{\hbar^2}{2m_n} \left(\frac{\partial^2}{\partial x_n^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_n^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_n^2} \right)$$

$$\hat{T} = - \sum_{i=1}^n \frac{\hbar^2}{2m} \nabla_i^2 \quad (3.48)$$

$$\nabla_i^2 \equiv \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_i^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_i^2} \quad (3.49)$$

我们通常只讨论势能只取决于 n 个粒子的 $3n$ 个坐标的情况：

$$V = V(x_1, y_1, z_1, \dots, x_n, y_n, z_n)$$

则有 n 粒子的三维系统的哈密顿算符为

$$\hat{H} = - \sum_{i=1}^n \frac{\hbar^2}{2m} \nabla_i^2 + V(x_1, \dots, z_n) \quad (3.50)$$

，对应的定态薛定谔方程为

$$\left[- \sum_{i=1}^n \frac{\hbar^2}{2m} \nabla_i^2 + V(x_1, \dots, z_n) \right] \psi = E\psi \quad (3.51)$$

其中定态波函数是 n 个粒子的 $3n$ 个坐标的函数：

$$\psi = \psi(x_1, y_1, z_1, \dots, x_n, y_n, z_n) \quad (3.52)$$

薛定谔方程 (3.51) 是一个线性偏微分方程。

例如，考虑一个由两个相互作用的粒子组成的系统，其势能与它们之间的距离成反比， c 为比例常数。薛定谔方程 (3.51) 变为

$$\left[- \frac{\hbar^2}{2m_1} \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_1^2} \right) - \frac{\hbar^2}{2m_2} \left(\frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_2^2} \right) + \frac{c}{[(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2]^{1/2}} \right] \psi = E\psi \quad (3.53)$$

虽然 (3.53) 看起来很困难，但我们将在第 6 章中解决它。




图 3.1: 位于 x', y', z' 的一个无穷小箱形区域

对于单粒子一维系统, 玻恩假设 [式 (1.15)] 表明: $|\Psi(x', t)|^2 dx$ 是在 t 时刻在 x' 到 $x' + dx$ 区域内找到粒子的概率, 其中 x' 是 x 的一个特定值。我们对这一假设作如下扩展: 对于三维单粒子系统, 表达式

$$|\Psi(x', y', z', t)|^2 dx dy dz \quad (3.54)$$

是在 x' 到 $x' + dx$ 、 y' 到 $y' + dy$ 、 z' 到 $z' + dz$ 这一无限小空间内找到粒子的概率。由于找到粒子的总概率为 1, 因此归一化条件为

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x', y', z', t)|^2 dx dy dz = 1 \quad (3.55)$$

对于 n 粒子的三维系统, 我们假设

$$|\Psi(x'_1, y'_1, z'_1, x'_2, y'_2, z'_2, \dots, x'_n, y'_n, z'_n, t)|^2 dx_1 dy_1 dz_1 dx_2 dy_2 dz_2 \dots dx_n dy_n dz_n \quad (3.56)$$

是在 (x'_1, y'_1, z'_1) 处带边 dx_1, dy_1, dz_1 的无限小矩形盒状区域内发现粒子 1, 在 (x'_2, y'_2, z'_2) 处带边 dx_2, dy_2, dz_2 的无限小矩形盒状区域内发现粒子 2, $\dots$, 在 (x'_n, y'_n, z'_n) 处带边 dx_n, dy_n, dz_n 的无限小矩形盒状区域内发现粒子 n 的概率。由于找到粒子的总概率为 1, 因此归一化条件为

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi|^2 dx_1 dy_1 dz_1 \dots dx_n dy_n dz_n = 1 \quad (3.57)$$

在量子力学中, 对一个系统的全空间进行积分的习惯做法是 $\int d\tau$ 。简写式 (3.55) 和 (3.57), 有

$$\int |\Psi|^2 d\tau = 1 \quad (3.58)$$

虽然 (3.58) 看起来像是一个不定积分, 但我们可以理解为一个定积分。根据上下文可以理解积分变量及其范围。

对于定态系统, $|\Psi|^2 = |\psi|^2$, 及

$$\int |\psi|^2 d\tau = 1 \quad (3.59)$$

3.5 三维盒子中的粒子

目前, 我们只讨论单粒子问题。在本节中, 我们将考虑第 2.2 节中解决的问题的三维情况, 即粒子在盒子中的情况。


三维盒子有多种可能的形状。我们选择的坐标系使盒子的一个角位于原点, 盒子位于空间的第一卦限 (图 3.2)。在盒子内, 势能为零; 而在盒子外, 势能为无穷大:

$$V(x, y, z) = 0, \quad \text{其中} \begin{cases} 0 < x < a \\ 0 < y < b \\ 0 < z < c \end{cases} \quad (3.60)$$

$$V = \infty, \quad \text{elsewhere}$$

由于粒子具有无限能量的概率为零, 因此在盒子外波函数一定为零。在盒内, 势能算符为零, 薛定谔方程 (3.47) 为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \right) = E\psi \quad (3.61)$$

图 3.2: 在这个箱形区域内, $V = 0$ 。

为了求解 (3.61), 我们假设解可以写成三个分别只与 x 、 y 和 z 有关的单独函数的乘积:

$$\psi(x, y, z) = f(x)g(y)h(z) \quad (3.62)$$

我们可能会认为, 这一假设抛弃了不满足 (3.62) 形式的解。然而, 可以证明的是: 如果我们能找到满足边界条件的 (3.62) 形式的解, 那么就不存在满足边界条件的薛定谔方程的其他解了 (证明见 G. F. D. Duff 和 D. Naylor, *Differential Equations of Applied Mathematics*, Wiley, 1966, 第 257-258 页)。我们用来求解 (3.62) 的方法称为**变量分离** (separation of variables)。

由 (3.62), 我们有

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = f''(x)g(y)h(z), \quad \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} = f(x)g''(y)h(z) \quad (3.63)$$

将 (3.63) 和 (3.62) 代入式 (3.61), 有

$$-(\hbar^2/2m)f''gh - (\hbar^2/2m)fg''h - (\hbar^2/2m)fgh'' - Efgh = 0 \quad (3.64)$$

将上式左右两边同除以 fgh , 有

$$-\frac{\hbar^2 f''}{2mf} - \frac{\hbar^2 g''}{2mg} - \frac{\hbar^2 h''}{2mh} - E = 0 \quad (3.65)$$

$$-\frac{\hbar^2 f''(x)}{2mf(x)} = \frac{\hbar^2 g''(y)}{2mg(y)} + \frac{\hbar^2 h''(z)}{2mh(z)} + E \quad (3.66)$$

令 E_x 与上式的左边相等, 有

$$E_x \equiv -\hbar^2 f''(x)/2mf(x) \quad (3.67)$$

定义 (3.67) 表明 E_x 与 y 和 z 无关, 方程 (3.66) 表明 E_x 等于 $\hbar^2 g''(y)/2mg(y) + \hbar^2 h''(z)/2mh(z) + E$; 因此, E_x 也与 x 无关。综上所述, E_x 一定是与 x 、 y 和 z 都无关的常数。

与 (3.67) 类似, 我们定义 E_y 与 E_z :

$$E_y \equiv -\hbar^2 g''(y)/2mg(y), \quad E_z \equiv -\hbar^2 h''(z)/2mh(z) \quad (3.68)$$

由于 x 、 y 、 z 在 (3.65) 中对称出现, 因此与证明 E_x 是常数的推理相同, E_y 和 E_z 也是常数。将定义 (3.67) 和 (3.68) 代入 (3.65) 可得

$$E_x + E_y + E_z = E \quad (3.69)$$

方程 (3.67) 和 (3.68) 为

$$\frac{d^2 f(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E_x f(x) = 0 \quad (3.70)$$

$$\frac{d^2 g(y)}{dy^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E_y g(y) = 0, \quad \frac{d^2 h(z)}{dz^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E_z h(z) = 0 \quad (3.71)$$

我们已将三变量的偏微分方程转换为三个常微分方程。(3.70) 的边界条件是什么? 由于波函数在盒外消失, 因此连续性要求波函数 ψ 在盒壁处消失。特别是, 在 yOz 平面上的盒壁上必须为零, 此处 $x = 0$; 此外, 在箱体的平行壁上必须为零, 其中 $x = a$ 。因此, $f(0) = f(a) = 0$ 。

现在将公式 (3.70) 与一维盒子中粒子的薛定谔方程 [公式 (2.10)] 进行比较。方程的形式相同, (3.70) 中的 E_x 与 (2.10) 中的 E 相对应。边界条件是否相同? 是的, 只是自变量消失的第二点是 $x = a$, 而不是 $x = l$ 。因此, 我们可以利用第 2.2 节中的工作来写出解 [见式 (2.23) 和 (2.20)]。

$$f(x) = \left(\frac{2}{a}\right)^{1/2} \sin\left(\frac{n_x \pi x}{a}\right)$$

$$E_x = \frac{n_x^2 \hbar^2}{8ma^2}, \quad n_x = 1, 2, 3 \dots$$

将同样的推理应用于 y 和 z 方程, 可以得出

$$g(y) = \left(\frac{2}{b}\right)^{1/2} \sin\left(\frac{n_y \pi y}{b}\right), \quad h(z) = \left(\frac{2}{c}\right)^{1/2} \sin\left(\frac{n_z \pi z}{c}\right)$$

$$E_y = \frac{n_y^2 \hbar^2}{8mb^2}, \quad n_y = 1, 2, 3 \dots, \quad E_z = \frac{n_z^2 \hbar^2}{8mc^2}, \quad n_z = 1, 2, 3 \dots$$

由 (3.69), 能量为

$$E = \frac{\hbar^2}{8m} \left(\frac{n_x^2}{a^2} + \frac{n_y^2}{b^2} + \frac{n_z^2}{c^2} \right) \quad (3.72)$$

与一维盒子中的粒子一样, 基态能量大于经典力学的最低能量值 0。

由式 (3.62), 箱中粒子的波函数为

$$\psi(x, y, z) = \left(\frac{8}{abc}\right)^{1/2} \sin\left(\frac{n_x \pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n_y \pi y}{b}\right) \sin\left(\frac{n_z \pi z}{c}\right) \quad (3.73)$$

波函数有三个量子数 n_x 、 n_y 和 n_z , 我们将其归因于问题的三维性质。三个量子数彼此独立变化。

在一维单粒子问题中, 节点满足 $\psi(x) = 0$, 解这个方程, 我们就得到了 $\psi = 0$ 的 x 值。而在三维单粒子问题中, 节点满足 $\psi(x, y, z) = 0$, 从方程中解出 z , 我们有 $z = f(x, y)$, 每个这样的解都是三维空间中一个**节面** (nodal surface) 的方程。例如, 对于 $n_x = 1$ 、 $n_y = 1$ 、 $n_z = 2$ 的定态, 令波函数 (3.73) 为 0, 解得节面为 $z = c/2$, 这是一个平面的方程, 该平面平行于盒子的顶面和底面, 并且位于这两个面的中间。同样地, 对于状态 $n_x = 2$ 、 $n_y = 1$ 、 $n_z = 1$, 节面为 $x = a/2$ 的平面。

由于波函数中的 x 、 y 和 z 因子可以独立归一化, 将波函数归一化, 有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 dx dy dz = \int_0^a |f(x)|^2 dx \int_0^b |g(y)|^2 dy \int_0^c |h(z)|^2 dz = 1$$

其中我们用到了

$$\boxed{\int \int \int F(x) G(y) H(z) dx dy dz = \int F(x) dx \int G(y) dy \int H(z) dz} \quad (3.74)$$

式 (3.73) 中 $\psi(x, y, z)$ 的量纲是什么? 对于单粒子三维系统, $|\psi|^2 dx dy dz$ 是概率, 概率是没有量纲的。由于 $dx dy dz$ 的量纲为长度³, 则为了使 $|\psi|^2 dx dy dz$ 无量纲, $\psi(x, y, z)$ 一定具有长度^{-3/2} 的量纲。

假设 $a = b = c$, 则我们得到了一个立方体。能级为

$$E = (h^2/8ma^2)(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \quad (3.75)$$

让我们用表格列出被限制在立方体势箱中粒子的一些允许能量:

$n_x n_y n_z$	111	211	121	112	122	212	221	113	131	311	222
$E(8ma^2/h^2)$	3	6	6	6	9	9	9	11	11	11	12




图 3.3: 立方体盒子中粒子最低几个状态的能量。

请注意: 量子数不同的状态可能具有相同的能量 (图3.3)。例如, 状态 ψ_{211} 、 ψ_{121} 和 ψ_{112} (下标表示量子数) 都具有相同的能量。然而, 公式 (3.73) 表明这三组量子数给出了三个不同的独立波函数, 因此确实代表了系统的不同状态。当两个或两个以上的独立波函数对应于具有相同能量本征值的状态时, 该本征值是**简并** (degenerate) 的。一个能级的**简并度** (degree of degeneracy or simply degeneracy) 就是具有该能量的状态的数量。因此, 立方体中粒子的次低能级是三重简并的。当我们令盒子的边长相等时, 就得到了简并的现象。简并度通常与系统的对称性有关。注意波函数态 ψ_{211} 、 ψ_{121} 和 ψ_{112} 可以通过旋转立方体盒相互转化。通常, 一维问题中的束缚态能级是非简并的。

在对理想气体的分子分配函数进行统计力学评估时, 将每个气体分子的平移能级视为三维矩形盒子 (盒子是容纳气体的容器) 中的粒子能级; 见 Levine, 《物理化学》, 第 21.6 和 21.7 节。

在金属的自由电子理论中, 非过渡金属的价电子被视为一个盒子中的非相互作用粒子, 盒子的两侧是金属的表面。这种近似方法虽然粗糙, 但对金属的某些性质给出了相当不错的结果。

3.6 简并

对于一个 n 重简并的能级, 有 n 个独立的波函数 $\psi_1, \psi_2, \psi_3, \dots, \psi_n$ 每个波函数均有本征值 w :

$$\hat{H}\psi_1 = w\psi_1, \quad \hat{H}\psi_2 = w\psi_2, \dots, \quad \hat{H}\psi_n = w\psi_n \quad (3.76)$$

我们想要证明以下重要理论: 具有能量本征值 w 的简并波函数的每一个线性组合

$$\phi \equiv c_1\psi_1 + c_2\psi_2 + c_3\psi_3 + \dots + c_n\psi_n \quad (3.77)$$

也是能量本征函数, 且具有相同的能量本征值 w 。[式 (3.77) 是函数 $\psi_1, \psi_2, \psi_3, \dots, \psi_n$ 线性组合的定义。其中 c 是常数, 有些可能为零。] 为了证明这个理论, 我们必须指明 $\hat{H}\phi = w\phi$, 或者

$$\hat{H}(c_1\psi_1 + c_2\psi_2 + \dots + c_n\psi_n) = w(c_1\psi_1 + c_2\psi_2 + \dots + c_n\psi_n) \quad (3.78)$$

由于 $\hat{H}$ 是线性算符, 我们可以对式 (3.78) 的左边应用式 (3.9) $n-1$ 次, 有

$$\hat{H}(c_1\psi_1 + c_2\psi_2 + \dots + c_n\psi_n) = \hat{H}(c_1\psi_1) + \hat{H}(c_2\psi_2) + \dots + \hat{H}(c_n\psi_n)$$

再使用式 (3.10), 则 (3.79) 变为

$$\begin{aligned} \hat{H}(c_1\psi_1 + c_2\psi_2 + \dots + c_n\psi_n) &= c_1\hat{H}\psi_1 + c_2\hat{H}\psi_2 + \dots + c_n\hat{H}\psi_n \\ &= c_1w\psi_1 + c_2w\psi_2 + \dots + c_nw\psi_n \\ \hat{H}(c_1\psi_1 + c_2\psi_2 + \dots + c_n\psi_n) &= w(c_1\psi_1 + c_2\psi_2 + \dots + c_n\psi_n) \end{aligned}$$

这就证明了我们的理论。

例如, 在立方势箱中粒子的定态波函数 ψ_{211}, ψ_{121} 和 ψ_{112} 是简并的, 则它们的线性组合 $c_1\psi_{211} + c_2\psi_{121} + c_3\psi_{112}$ 立方势箱中粒子哈密顿算符的本征函数, 且具有相同的能量本征值 $6h^2/8ma^2$, 与 ψ_{211}, ψ_{121} 和 ψ_{112} 相同。

注意: 若 ψ_1 和 ψ_2 对应于不同的能量本征值 ($\hat{H}\psi_1 = E_1\psi_1, \hat{H}\psi_2 = E_2\psi_2$, 且 $E_1 \neq E_2$), 则它们的线性组合 $c_1\psi_1 + c_2\psi_2$ 不是能量算符 $\hat{H}$ 的本征函数。

由于与简并能级相对应的波函数的任何线性组合都是具有相同本征值的 $\hat{H}$ 的本征函数, 因此我们可以为任何简并能级构造出无数个不同的波函数。事实上, 我们只对线性无关的本征函数感兴趣。若 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 当且仅当所有常数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 都为零时, 满足关系式 $c_1f_1 + c_2f_2 + \dots + c_nf_n = 0$, 则称 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 是**线性无关**的。这就意味着在一组线性独立函数中, 没有一个函数可以用其余函数的线性组合来表示。例如, 函数 $f_1 = 3x, f_2 = 5x^2 - x, f_3 = x^2$ 不是线性无关的, 因为 $f_2 = 5f_3 - \frac{1}{3}f_1$ 。而函数 $g_1 = 1, g_2 = x, g_3 = x^2$ 是线性无关的, 因为没有一个函数可以用其余函数的线性组合来表示。

一个能级的**简并度**等于与该能值相对应的线性独立波函数的数目。一维自由粒子波函数 (2.30) 是两个线性独立函数的线性组合, 这两个函数分别是具有相同能量本征值 E 的本征函数。因此每个这样的能级 (除了 $E = 0$) 都是二重简并的 (简并度为 2)。

3.7 平均值

第 3.3 节指出: 若态函数 Ψ 不是算符 $\hat{B}$ 的本征函数, 则对 B 的观测将得到一组可能值 ($\hat{B}$ 的本征值的其中一个)。我们现在考虑具有状态 Ψ 的系统的性质 B 的平均值。为了在实验中找到 B 的平均值, 我们需要许多相同的、不相互影响的系统 Ψ , 每个系统都处于相同的状态, 然后测量每个系统中的 B 。 B 的**平均值** (average value), 记作 $\langle B \rangle$, 定义为所有测量值 $b_1, b_2, \dots, b_N$ 的算术平均:

$$\langle B \rangle = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N B_j \quad (3.79)$$

其中系统的数目 N 是很大的一个数。

我们可以对 B 的所有可能值求和, 而不是对 B 的观测值求和, 将每个可能值乘以观测到的次数, 得到等价表达式

$$\langle B \rangle = \frac{1}{N} \sum_b n_b b \quad (3.80)$$

其中 n_b 是观测到的值 b 的次数。举一个例子就会很清楚。假设一个班级的五名学生进行了五道题的测试，取得的分数为：0, 20, 20, 60, 60, 80, 80, 80, 100。则用式 (3.79) 计算平均分，我们有

$$\frac{1}{N} \sum_{j=2}^N B_j = \frac{0 + 20 + 20 + 60 + 60 + 80 + 80 + 80 + 100}{9} = \frac{500}{9} = 56$$

用式 (3.80) 计算平均分，对所有可能的分数：0, 20, 40, 60, 80, 100 求和，我们有

$$\frac{1}{N} \sum_b n_b b = \frac{1(0) + 2(20) + 0(40) + 2(60) + 3(80) + 1(100)}{9} = \frac{500}{9} = 56$$

方程 (3.80) 可以写作

$$\langle B \rangle = \sum_b \left(\frac{n_b}{N} \right) b$$

由于 N 很大， n_b/N 是观测到值 b 的概率 P_b ，因此

$$\langle B \rangle = \sum_b P_b b \quad (3.81)$$

现在考虑态函数为 $\Psi(x, t)$ 的一维单粒子系统中 x 坐标的平均值。 x 坐标的取值范围是连续的，在 x 到 $x + dx$ 的无限小区间内找到粒子的概率为 $|\Psi|^2 dx$ 。对无限小区间的求和等同于对整个 x 范围的积分，因此 (3.81) 变为

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x |\Psi(x, t)|^2 dx \quad (3.82)$$

对于单粒子三维系统，在位于 (x, y, z) ，具有边长 dx, dy, dz 的体积微元内找到粒子的概率为

$$|\Psi(x, y, z, t)|^2 dx dy dz \quad (3.83)$$

如果我们想知道在 x 到 $x + dx$ 的范围内找到粒子的概率，我们必须用 y 和 z 的所有可能取值对式 (3.83) 进行积分，由于当 x 在 $x + dx$ 范围内时，粒子的 y 和 z 坐标可以任意取值。因此，对于三维的例子，式 (3.82) 变为

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, y, z, t)|^2 dy dz \right] x dx \quad (3.84)$$

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x |\Psi(x, y, z, t)|^2 dx dy dz$$

现在，我们来看看某种物理特性 $B(x, y, z)$ 的平均值，它是粒子坐标的函数。一个例子就是势能函数 $V(x, y, z)$ 。根据式 (3.84) 的相同推理，可以得出

$$\langle B(x, y, z) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, y, z, t)|^2 B(x, y, z) dx dy dz \quad (3.85)$$

$$\langle B(x, y, z) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* B \Psi dx dy dz \quad (3.86)$$

式 (3.86) 的形式似乎有点异想天开，因为它与 (3.85) 没有什么不同。但稍后我们将看到它的重要意义。

一般来说，对于单粒子三维系统，属性 B 既取决于坐标，也取决于动量：

$$B = B(x, y, z, p_x, p_y, p_z)$$

我们如何找到 B 的平均值? 我们假设处于 Ψ 状态的系统的 $\langle B \rangle$ 为

$$\begin{aligned}\langle B \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* B \left(x, y, z, \frac{\hbar^2}{i} \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\hbar^2}{i} \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\hbar^2}{i} \frac{\partial}{\partial z} \right) \Psi dx dy dz \\ \langle B \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \hat{B} \Psi dx dy dz\end{aligned}\quad (3.87)$$

其中 $\hat{B}$ 是性质 B 的量子力学算符。[稍后, 我们将利用 (3.87) 来证明含时薛定谔方程在从量子力学到经典力学的转变过程中还原为牛顿第二定律, 从而为这一假设提供一些理由; 见问题 7.59。], 对于 n 粒子体系, 我们假设

$$\boxed{\langle B \rangle = \int \Psi^* \hat{B} \Psi d\tau} \quad (3.88)$$

其中 $\int d\tau$ 表示对全空间的 $3n$ 坐标的积分。由于我们将 $\Psi^* \Psi$ 视为概率密度, 式 (3.88) 中的态函数必须先归一化。重要的是, 要将算符放在在 Ψ^* 和 Ψ 中间。表达式 $\hat{B} \Psi^* \Psi$ 、 $\Psi^* \Psi \hat{B}$ 和 $\Psi^* \hat{B} \Psi$ 的含义是不同的, 除非 B 只是坐标的函数。在 $\int \Psi^* \hat{B} \Psi d\tau$ 中, 第一个操作是将算符 $\hat{B}$ 应用于态函数 Ψ , 然后将结果与 Ψ^* 相乘并对全空间进行积分, 就得到了 $\langle B \rangle$ 。

对于定态, 我们有 [式 1.20]

$$\Psi^* \hat{B} \Psi = e^{iEt/\hbar} \psi^* \hat{B} e^{-iEt/\hbar} \psi = e^0 \psi^* \hat{B} \psi = \psi^* \hat{B} \psi$$

由于 $\hat{B}$ 不包含对时间的导数, 也不会影响 Ψ 中的时间因子, 因此, 对于定态, 有

$$\langle B \rangle = \int \psi^* \hat{B} \psi d\tau \quad (3.89)$$

因此, 在定态系统中, 若 $\hat{B}$ 与时间无关, 则 $\langle B \rangle$ 也是与时间无关的。

考虑一个特殊的例子, 若 Ψ 是 $\hat{B}$ 的本征函数。当 $\hat{B} \Psi = k \Psi$ 时, 式 (3.88) 变为

$$\langle B \rangle = \int \Psi^* \hat{B} \Psi d\tau = \int \Psi^* k \Psi d\tau = k \int \Psi^* \Psi d\tau = k$$

其中 Ψ 已归一化。由于当 $\hat{B} \Psi = k \Psi$ 时, k 是我们在测量时能找到的唯一可能的 B 值, 因此这个结果是合理的 (第 3.3 节)。

由式 (3.88) 很容易证明以下关于平均值的性质 (见问题 3.49):

$$\boxed{\langle A + B \rangle = \langle A \rangle + \langle B \rangle} \quad \boxed{\langle cB \rangle = c \langle B \rangle} \quad (3.90)$$

其中 A 和 B 是系统的物理量, c 是常数。但是, 平均值的乘积不一定等于乘积的平均值: $\langle AB \rangle \neq \langle A \rangle \langle B \rangle$ 。

通常使用**期望值** (expectation value) 一词来代替平均值。期望值并不一定是我们观察到的可能值之一。

例题: 对于处于基态的三维单粒子系统, 求 $\langle x \rangle$ 和 $\langle p_x \rangle$ 的值。

将基态波函数 $\psi = f(x)g(y)h(z)$ [式 (3.62)] 代入式 (3.89), 有

$$\langle x \rangle = \int \psi^* \hat{x} \psi d\tau = \int_0^c \int_0^b \int_0^a f^* g^* h^* x f g h dx dy dz$$

而在势箱外有 $\psi = 0$ 。由于 $g(y)$ 和 $h(z)$ 已归一化，使用式 (3.74)，我们有

$$\langle x \rangle = \int_0^a x |f(x)|^2 dx \int_0^b |g(y)|^2 dy \int_0^c |h(z)|^2 dz = \int_0^a x |f(x)|^2 dx$$

由于系统处于基态，有 $n_x = 1$ ，则 $f(x) = (2/a)^{1/2} \sin(\pi x/a)$ ，因此

$$\langle x \rangle = \frac{2}{a} \int_0^a x \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) dx = \frac{a}{2} \quad (3.91)$$

其中我们用到了附录中的 (A.3)。根据图 2.4，这个结果是合理的。

同样地，

$$\begin{aligned} \langle p_x \rangle &= \int \psi^* \hat{p}_x \psi d\tau = \int_0^c \int_0^b \int_0^a f^* g^* h^* \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} [f(x) g(y) h(z)] dx dy dz \\ \langle p_x \rangle &= \frac{\hbar}{i} \int_0^a f^*(x) f'(x) dx \int_0^b |g(y)|^2 dy \int_0^c |h(z)|^2 dz \\ \langle p_x \rangle &= \frac{\hbar}{i} \int_0^a f(x) f'(x) dx = \frac{\hbar}{2i} f^2(x) \Big|_0^a = 0 \end{aligned} \quad (3.92)$$

其中，我们用到了定解条件 $f(0) = f(a) = 0$ 。由于粒子向 $+x$ 和 $-x$ 方向的移动是等概率的，因此这个结果是合理的。

练习：求处于基态的三维单粒子系统的 $\langle p_x^2 \rangle$ 的值。

(答案： $\hbar^2/4l^2$ 。)

3.8 波函数的约束条件

在求解箱中粒子的问题时，我们要求 ψ 是连续的。我们现在讨论波函数需要满足的其他约束条件。

由于 $|\psi|^2 d\tau$ 是概率，我们希望通过选择一个合适的**归一化常数** (normalization constant) 与波函数相乘，使得波函数可以归一化。若 ψ 未归一化而 $N\psi$ 已归一化，则根据归一化条件，有


$$1 = \int |N\psi|^2 d\tau = N^2 \int |\psi|^2 d\tau \quad (3.93)$$

$$N = \left(\int |\psi|^2 d\tau \right)^{-1/2}$$

只有当 ψ 处处为零时，定积分 $\int |\psi|^2 d\tau$ 才为零。然而， ψ 不可能处处为零（这意味着没有粒子存在）。因此，这个积分一定不会为零。若 $\int |\psi|^2 d\tau$ 为无穷大，则 $|N|$ 为零， ψ 就无法归一化。当且仅当 $\int |\psi|^2 d\tau$ 具有有限而非无限值时，我们才能对 ψ 进行归一化。如果对全空间的积分 $\int |\psi|^2 d\tau$ 为有限值，我们说 ψ 是**平方可积的** (quadratically integrable)。因此，我们一般要求 ψ 是平方可积的。一个最重要的例外不处于束缚态的粒子。因此，粒子在势阱中（第 2.4 节）的非束缚态和自由粒子的波函数都不是平方可积的。

由于 $\psi^*\psi$ 是概率密度，因此波函数一定是单值的。如果我们的理论对在某一点发现粒子的概率给出了两个不同的值，那就太尴尬了。如果我们要求 ψ 是单值的，那么显然 $\psi^*\psi$ 也是单值的。 ψ 可能会有多个值 [例如， $\psi(q) = -1, 1, i$]，但 $\psi^*\psi$ 只能有一个值。然而，我们仍要求 ψ 是单值的。

除了要求 ψ 是连续，我们也通常要求其偏导数 $\partial\psi/\partial x$ ， $\partial\psi/\partial y$ 等也是连续的 (见图 3.4a)。不过，回过头来看第 2.2 节，我们会发现：对于箱中粒子 $\partial\psi/\partial x$ 在箱壁上不连续，以及 $\partial\psi/\partial x$ 在箱



函数 (a) 是连续函数，其一阶导数也连续；函数 (b) 是连续函数，但其一阶导数不连续；函数 (c) 不是连续函数。

外为零，但是由方程 (2.23) 可知， $\partial\psi/\partial x$ 在箱壁上又不为零。 ψ' 的不连续性是由在箱壁处势能突然变为无穷大造成的。对于具有有限高度的势垒来说， ψ' 在箱壁处是连续的。

与平方可积的要求一致，有时也会说波函数必须在任何地方都是有限的，包括无穷大。然而，这通常是比平方可积性更强的要求。事实上，氢原子的一些相对论波函数在原点处是无限的，但却是平方可积的。偶尔，我们也会遇到在原点处无限大的非相对论波函数 [L. D. D. 兰道和 E. M. 利夫希茨，《量子力学》，第三版（1977 年），第 35 节]。因此，基本要求是平方可积性，而不是有限性。

我们要求任何代表物理量的算符的本征函数都满足上述要求。符合这些要求的函数被称为**品优函数**（well-behaved function）。

总结

习题

Chapter 4

谐振子

我们将在第 13.2 节中看到，气相分子的能量可以近似为平动、转动、振动和电子能量之和。电子能量的计算将在第 13 章至第 17 章中讨论。平动能是分子作为一个整体在容纳物质的容器空间中的运动动能。平动能级可视为三维空间中粒子的能级（第 3.5 节）。二原子（双原子）分子的转动能级可以用刚性转子的转动能级来近似表示，第 6.4 节将对此进行讨论。双原子分子的最低几个振动能级可以用谐振子的能级来近似表示（第 4.3 节），多原子分子的振动能可以用线性谐振子振动能之和来近似表示（第 15.12 节）。本章第 4.2 节将求解谐振子的薛定谔方程。作为初步介绍，第 4.1 节讨论了求解微分方程的幂级数解法，该方法用于求解谐振子的薛定谔方程。第 4.3 节讨论分子振动。第 4.4 节介绍了求一维薛定谔方程特征值和特征函数的数值方法。

4.1 微分方程的幂级数解

到目前为止，我们只考虑了势能 $V(x)$ 是常数的情况。这使得薛定谔方程成为一个具有常数系数的二阶线性齐次微分方程，我们知道如何求解这个方程。对于 V 随 x 变化的情况，一种有用的方法是尝试薛定谔方程的幂级数解法。

为了说明这种方法，考虑微分方程

$$y''(x) + c^2 y(x) = 0 \quad (4.1)$$

其中 $c^2 > 0$ 。当然，这个微分方程有常数系数，但我们可以用幂级数法求解。让我们先用特征方程 $s^2 + c^2 = 0$ 来求解这个方程。特征方程的根是 $s = \pm ic$ 。回忆第 2.2 节中的工作 [公式 (2.10) 和 (4.1) 是相同的]，当特征方程的根是纯虚数时，我们会得到三角函数形式的通解：

$$y(x) = A \cos cx + B \sin cx \quad (4.2)$$

其中 A 和 B 是积分常量。式 (4.2) 的另一种形式是

$$y = D \sin(cx + e) \quad (4.3)$$

其中 D 和 e 是任意常数。利用两角之和的正弦公式，我们可以证明 (4.3) 等价于 (4.2)。

现在让我们用幂级数法来求解 (4.1)。我们假设方程的解可以在 $x = 0$ 处展开成 Taylor 级数的形式 (见问题：4.1)，也就是说，我们假设

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots \quad (4.4)$$

其中 a 为常数系数, 有待确定, 以使式 (4.1) 成立。对式 (4.4) 求导, 有

$$y'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} na_nx^{n-1} \quad (4.5)$$

其中, 我们假设该数列可以逐项求导 (对于无穷级数来说, 这并不总是正确的)。对于 y'' , 我们有

$$y''(x) = 2a_2 + 3(2)a_3x + \cdots = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_nx^{n-2} \quad (4.6)$$

将 (4.6) 和 (4.4) 代入 (4.1), 得到

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_nx^{n-2} + c^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n = 0 \quad (4.7)$$

我们想把 (4.7) 中的两个和合并起来。只要满足一定条件, 我们就可以将两个无穷级数逐项相加, 得到它们的和:

$$\sum_{j=0}^{\infty} b_jx^j + \sum_{j=0}^{\infty} c_jx^j = \sum_{j=0}^{\infty} (b_j + c_j)x^j \quad (4.8)$$

要将 (4.8) 应用于 (4.7) 中的两个和, 我们希望每个和的极限相同, x 的幂相同。因此, 我们改变了 (4.7) 中第一个和的下标, 定义 $k \equiv n-2$ 。极限 $n=2$ 到无穷大与 $k=0$ 到无穷大相对应, 将 $n = k+2$ 代入第一个和, 有

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_nx^{n-2} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1)a_{k+2}x^k = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2}x^n \quad (4.9)$$

(4.9) 中的最后一个等式是有效的, 因为求和指数是一个**虚拟变量** (dummy variable); 我们用什么字母来表示这个变量没有区别。例如, 求和 $\sum_{i=1}^3 c_ix^i$ 和 $\sum_{m=1}^3 c_mx^m$ 是相等的, 因为它们只有求和指数不同。如果我们将这个求和展开就会更好理解:

$$\sum_{i=1}^3 c_ix^i = c_1x^1 + c_2x^2 + c_3x^3, \quad \sum_{m=1}^3 c_mx^m = c_1x^1 + c_2x^2 + c_3x^3$$

在 (4.9) 的最后一个等式中, 我们只是将表示求和指数的符号从 k 改为 n 。定积分中的积分变量也是一个虚拟变量, 因为定积分的值不受变量字母的影响:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt \quad (4.10)$$

将式 (4.9) 代入 (4.7), 我们得到

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1)a_{n+2} + c^2a_n]x^n = 0 \quad (4.11)$$

如果 (4.11) 对所有 x 值都成立, 那么 x 的每个幂的系数都必须为零。为了说明这一点, 请看方程

$$\sum_{j=0}^{\infty} b_jx^j = 0 \quad (4.12)$$

在式 (4.12), 令 $x=0$, 我们有 $b_0=0$ 。将式 (4.12) 左右两侧对 x 求导, 则 $b_1=0$ 。求 n 阶导数, 令 $x=0$, 我们得到 $b_n=0$ 。因此, 从式 (4.11) 中, 我们有:

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} + c^2a_n = 0 \quad (4.13)$$

$$a_{n+2} = -\frac{c^2}{(n+1)(n+2)}a_n \quad (4.14)$$

方程 (4.14) 是一个**递推关系式** (recursion relation), 如果我们知道 a_0 的值, 就能用式 (4.14) 计算出 a_2 、 a_4 、 a_6 等的值。如果我们知道 a_1 的值, 就能用式 (4.14) 计算出 a_3 、 a_5 、 a_7 等的值。由于对 a_0 和 a_1 的选择没有限制, 它们是任意常数, 我们分别用 A 和 Bc 来表示:

$$a_0 = A, \quad a_1 = Bc \quad (4.15)$$

则利用式 (4.14), 我们可以计算系数:

$$a_0 = A, \quad a_2 = -\frac{c^2}{1 \cdot 2}A, \quad a_4 = \frac{c^4}{1 \cdot 2 \cdot 3}A, \quad a_6 = -\frac{c^6}{6!}A, \quad \dots$$

$$a_{2k} = (-1)^k \frac{c^{2k}}{(2k)!}A, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (4.16)$$

$$a_1 = Bc, \quad a_3 = -\frac{c^3}{2 \cdot 3}Bc, \quad a_5 = \frac{c^5}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}Bc, \quad a_7 = -\frac{c^7}{7!}Bc, \quad \dots$$

$$a_{2k+1} = (-1)^k \frac{c^{2k+1}}{(2k+1)!}B, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (4.17)$$

根据式 (4.4)、(4.16) 和 (4.17) 我们有

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0,2,4,\dots}^{\infty} a_n x^n + \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} a_n x^n \quad (4.18)$$

$$y = A \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{c^{2k} x^{2k}}{(2k)!} + B \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{c^{2k+1} x^{2k+1}}{(2k+1)!} \quad (4.19)$$

(4.19) 中的两个级数是 $\cos cx$ 和 $\sin cx$ 的 Taylor 级数 (问题: 4.2)。因此, 与式 (4.2) 相同, 我们有 $y = \cos cx + \sin cx$ 。

4.2 一维谐振子

在本节中, 我们将通过求解一维谐振子的薛定谔方程来增加我们的量子力学知识。该系统是分子振动的重要模型。

经典力学的处理

在研究谐振子的波动力学之前, 我们先回顾一下经典的处理方法。我们有一个质量为 m 的粒子, 它被一个与粒子离原点的位移成正比的力吸引向原点:

$$F_x = -kx \quad (4.20)$$

比例常数 k 称为**力常数** (force constant)。 F_x 是作用在粒子上的力在 x 方向上的分量。这也是这个一维问题中的总力。附着在弹簧上的质点遵守公式 (4.20), 前提是弹簧没有从平衡位置大幅拉伸。

由牛顿第二定律 $F = ma$, 我们有

$$-kx = m \frac{d^2 x}{dt^2} \quad (4.21)$$

其中 t 是时间。若令 $c^2 = k/m$, 则式 (4.21) 与式 (4.1) 相同。因此, 其解为 [将 $c = (k/m)^{1/2}$ 代入式 (4.3)], 有

$$x = A \sin(2\pi\nu t + b) \quad (4.22)$$

其中 A 是**振幅** (the amplitude of vibration), b 是积分常数, **振动频率** (vibration frequency) ν 是

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{k}{m} \right)^{1/2} \quad (4.23)$$

由于正弦函数的最大最小值分别为 1 和 -1, 相应地, 满足式 (4.22) 的 x 值在 A 和 $-A$ 之间振荡。正弦函数的最小正周期为 2π , 则完成一次完整振荡所需的时间 (称为**周期** (period)) 为正弦函数参数增加 2π 的时间。在 $t + 1/\nu$ 时刻, 正弦函数的参数为 $2\pi\nu(t + 1/\nu) + b = 2\pi\nu t + 2\pi + b$, 比 t 时刻的参数多了 2π 。因此, 周期为 $1/\nu$ 。周期的倒数就是单位时间内的振动次数 (振动频率), 因此频率为 ν 。

现在我们来考虑能量。在三维系统中, 势能 V 与力的分量的关系为

$$F_x = -\frac{dV}{dx}, \quad F_y = -\frac{dV}{dy}, \quad F_z = -\frac{dV}{dz} \quad (4.24)$$

方程 (4.24) 是势能的定义。由于这是一个一维系统, 我们有 [式 (1.12)]

$$F_x = -\frac{dV}{dx} = -kx \quad (4.25)$$

对 (4.25) 两边积分, 我们得到 $V = \int kx dx = \frac{1}{2}kx^2 + C$, 其中 C 是积分常数。势能总是有一个任意的附加常数。我们令 $C = 0$, 则

$$V = \frac{1}{2}kx^2 \quad (4.26)$$

将式 (4.23) 代入, 有

$$V = 2\pi^2\nu^2mx^2 \quad (4.27)$$

势能 V 的图象是一个抛物线。动能 T 可以由式 (4.22) 对时间 t 求导得到:

$$T = \frac{1}{2}m \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 \quad (4.28)$$

将 T 和 V 相加, 我们得到了总能量:

$$E = T + V = \frac{1}{2}kA^2 = 2\pi^2\nu^2mA^2 \quad (4.29)$$

其中我们用到了 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ 。

根据式 (4.22), 经典力学中的谐振子在 $x = A$ 和 $x = -A$ 之间振荡运动。这两点是运动的转折点。在这两点, 粒子的速度为零, 而在 $x = 0$ 处速度达到最大值, 同时势能为零而动能最大。经典的谐振子在 $x = A$ 和 $x = -A$ 附近的运动会比在 $x = 0$ 附近花费更多的时间 (速度最慢)。问题 4.18 计算了在不同位置找到经典谐振子的概率密度。(有趣的是, 这个概率密度在转折点处变得无限大)

量子力学的处理

由式 (3.27) 和 (4.27), 谐振子的哈密顿算符为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + 2\pi^2\nu^2mx^2 = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{d^2}{dx^2} - \alpha^2x^2 \right) \quad (4.30)$$

其中, 为了书写方便, 我们定义了 α 为

$$\alpha \equiv 2\pi\nu m/\hbar \quad (4.31)$$

乘上 $2m/\hbar^2$ 后, 薛定谔方程 $\hat{H}\psi = E\psi$ 变为

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + (2mE\hbar^{-2} - \alpha^2 x^2)\psi = 0 \quad (4.32)$$

现在我们可以尝试求得 (4.32) 的幂级数解。如果我们现在考虑具有式 (4.4) 形式的 ψ 幂级数, 我们会发现它推出了一个三项递推关系, 这比式 (4.14) 这样的两项递推关系更难处理。因此, 我们修改 (4.32) 的形式, 以便在尝试幂级数解时能得到两项的递推关系。能实现这一目的的替代方法 (见问题 4.22) 是 $f(x) \equiv e^{\alpha x^2/2}\psi(x)$ 。因此,

$$\psi = e^{-\alpha x^2/2} f(x) \quad (4.33)$$

这个方程只是定义了一个新函数 $f(x)$, 取代 $\psi(x)$ 作为未知函数来求解。(我们可以在微分方程中进行任何替换) 对式 (4.33) 两边求导两次, 得到

$$\psi'' = e^{-\alpha x^2/2} (f'' - 2\alpha x f' - \alpha f + \alpha^2 x^2 f) \quad (4.34)$$

将 (4.34) 和 (4.33) 代入 (4.32), 我们得到

$$f''(x) - 2\alpha x f'(x) + (2mE\hbar^{-2} - \alpha) f(x) = 0 \quad (4.35)$$

现在我们可以尝试幂级数解。假设

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \quad (4.36)$$

假设可以对式 (4.36) 逐项求导, 我们有

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} n c_n x^{n-1} \quad (4.37)$$

[式 (4.37) 中第二个加和的第一项为零]。同样地,

$$f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2} = \sum_{j=0}^{\infty} (j+2)(j+1) c_{j+2} x^j = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) c_{n+2} x^n$$

其中, 我们令 $j = n - 2$, 然后将求和指数从 j 改为 n [见公式 (4.9)]。代入 (4.35), 我们得到

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) c_{n+2} x^n - 2\alpha \sum_{n=0}^{\infty} n c_n x^n + (2mE\hbar^{-2} - \alpha) \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n &= 0 \\ \sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1) c_{n+2} - 2\alpha n c_n + (2mE\hbar^{-2} - \alpha) c_n] x^n &= 0 \end{aligned} \quad (4.38)$$

令 x^n 的系数为零 [与式 (4.11) 一致], 我们得到

$$c_{n+2} = \frac{\alpha + 2\alpha n - 2mE\hbar^{-2}}{(n+1)(n+2)} c_n \quad (4.39)$$

这正是我们想要的两项递推关系。式 (4.39) 与式 (4.14) 类似, 知道了 c_n 的值, 就可以计算出 c_{n+2} 的值。因此, 我们有了两个任意常数 c_0 和 c_1 。如果我们令 $c_1 = 0$, 那么我们将得到一个只包含 x 的偶数次幂乘以指数因子的幂级数作为解:

$$\psi = e^{-\alpha x^2/2} f(x) = e^{-\alpha x^2/2} \sum_{n=0,2,4,\dots}^{\infty} c_n x^n = e^{-\alpha x^2/2} \sum_{l=0}^{\infty} c_{2l} x^{2l} \quad (4.40)$$

如果我们令 $c_0 = 0$, 那么我们将得到另一个独立的解:

$$\psi = e^{-\alpha x^2/2} f(x) = e^{-\alpha x^2/2} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} c_n x^n = e^{-\alpha x^2/2} \sum_{l=0}^{\infty} c_{2l+1} x^{2l+1} \quad (4.41)$$

薛定谔方程的通解为上述两个独立解的线性组合:

$$\psi = A e^{-\alpha x^2/2} \sum_{l=0}^{\infty} c_{2l+1} x^{2l+1} + B e^{-\alpha x^2/2} \sum_{l=0}^{\infty} c_{2l} x^{2l} \quad (4.42)$$

其中 A 和 B 是任意常数。

现在我们必须看看波函数的边界条件是否会对解法产生任何限制。为了了解这两个无穷级数在 x 充分大时的表现, 我们要考察每个级数中连续系数的比值。在第二个级数中, x^{2l+2} 与 x^{2l} 的比值为 [在 (4.39) 中令 $n = 2l$]:

$$\frac{c_{2l+2}}{c_{2l}} = \frac{\alpha + 4\alpha l - 2mE\hbar^2}{(2l+1)(2l+2)}$$

假设对于较大的 x 值, 级数中的后项是主要项, 那么我们就来看看对于较大的 l 值, 这一比值是多少:

$$\frac{c_{2l+2}}{c_{2l}} \sim \frac{4\alpha l}{4l^2} = \frac{\alpha}{l} \quad \text{当 } l \text{ 很大时} \quad (4.43)$$

在 (4.39) 中令 $n = 2l + 1$, 我们发现, 当 l 较大时, 第一个序列中连续系数的比值也是 α/l 。现在考虑函数 $e^{\alpha x^2}$ 的幂级数展开。(问题 4.3)

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \dots \quad (4.44)$$

我们有

$$e^{\alpha x^2} = 1 + \alpha x^2 + \dots + \frac{\alpha^l x^{2l}}{l!} + \frac{\alpha^{l+1} x^{2l+2}}{(l+1)!} + \dots$$

在该级数中, x^{2l+2} 和 x^{2l} 的系数比为

$$\frac{\alpha^{l+1}}{(l+1)!} \div \frac{\alpha^l}{l!} = \frac{\alpha}{l+1} \sim \frac{\alpha}{l} \quad \text{当 } l \text{ 很大时}$$

因此, 解 (4.42) 中每个无穷级数的连续系数比与 l 很大时的级数 $e^{\alpha x^2}$ 相同。因此, 我们可以得出结论: 当 x 很大时, 每个级数的行为都与 $e^{\alpha x^2}$ 相同。[这不是一个严格的证明。H. A. Buchdahl, Am. J. Phys. J. Phys., 42, 47 (1974); see also M. Bowen and J. Coster, Am. J. Phys., 48, 307 (1980)]

如果每个级数的行为都与 $e^{\alpha x^2}$ 相同, 那么当 x 很大时, ψ 的行为也将与 $e^{\alpha x^2}$ 相同。当 x 趋于无穷时, 波函数的值将趋于无穷大, 就不满足波函数平方可积的要求。如果我们可以将级数在某一项打断, 使得级数的后续项为零, 那么因子 $e^{\alpha x^2}$ 就能保证在 x 趋于无穷时, ψ 的值趋于零。(使用 L' Hopital 法则, 显然当 $x \rightarrow \infty$ 时, 有 $x^p e^{-\alpha x^2} \rightarrow 0$, p 为任意有限次幂) 若想让级数在某一项后被打断, 则当 n 为某个值时必须要有递推公式 (4.39) 中 c_n 的系数为零, 记 $n = v$ 。这就使得 $c_{v+2}, c_{v+4}, \dots$ 等全为零。而式 (4.42) 中的一个级数将具有有限项。在递推关系 (4.39) 中, 有一个量的值尚未确定, 但可以通过调整, 使 c_v 消失。这个量就是能量 E 。在 (4.39) 中令 c_v 的系数为零, 对 α 使用式 (4.31), 我们有

$$\begin{aligned} \alpha + 2\alpha v - 2mE\hbar^{-2} &= 0 \\ 2mE\hbar^{-2} &= (2v+1) 2\pi\nu m/\hbar^{-1} \\ \boxed{E = \left(v + \frac{1}{2}\right) h\nu, \quad v = 0, 1, 2, \dots} \end{aligned} \quad (4.45)$$




图 4.1: 一维谐振子最低五个能级图

谐振子定态能级 (4.45) 间距相等 (图4.1)。不要混淆量子数 v (vee) 和振动频率 ν (nu)。

将 (4.45) 代入 (4.39)，我们得到

$$c_{n+2} = \frac{2\alpha(n-v)}{(n+1)(n+2)} c_n \quad (4.46)$$

根据 (4.45) 对能量进行量子化，我们已经使其中一个级数在有限项后被打断。为了消除 (4.42) 中的另一个无穷级数，我们必须将与之相乘的任意常数设为零。这样，根据 v 是偶数还是奇数，波函数就是只包含 x 的偶次或奇次幂的有限幂级数的 $e^{-\alpha x^2/2}$ 倍。在该级数中，由于我们选择的能量 E 使得 c_{v+2} 、 c_{v+4} 、 $\dots$ 全消失，则 x 的最高次幂为 v 。因此，波函数 (4.42) 的形式为

$$\psi_v = \begin{cases} e^{-\alpha x^2/2} (c_0 + c_2 x^2 + \dots + c_v x^v), & \text{当 } v \text{ 为偶数时} \\ e^{-\alpha x^2/2} (c_1 x + c_3 x^3 + \dots + c_v x^v), & \text{当 } v \text{ 为奇数时} \end{cases} \quad (4.47)$$

其中任意常数 A 与 B 可被包含在 c_0 和 c_1 中，因此可以略去。 c_0 和 c_1 之后的系数可以通过递推关系式 (4.46) 计算得到。由于量子数 v 出现在了递推关系中，对于不同的 v 值，我们可以得到一组不同的系数 c_i 。例如， ψ_4 中的 c_2 与 ψ_2 中的 c_2 是不同的。

与盒中粒子一样，波函数必须是品优波函数的要求迫使我们能量量子化。对于不满足式 (4.45) 的能量， ψ 不是平方可积的。例如，图4.2显示了能量分别满足 $E = 0.499h\nu$ 、 $E = 0.500h\nu$ 和 $E = 0.501h\nu$ 。当 $E = 0.500h\nu$ 时，式 (4.40) 中的 ψ ，其中我们用到了递推关系 (4.39) 来计算系数 c_n (另见问题 4.23)。图4.2显示了这些曲线在 $\alpha^{1/2}x$ 附近区域的放大图。

谐振子的基态能量不为零。这个能量 $\frac{1}{2}h\nu$ 被称为**零点能量** (zero-point energy)。这是在绝对零度的温度下，谐振子集合中谐振子的振动能量。零点能可以由不确定性原理来理解。如果最低态的能量为零，那么它的势能和动能（均为非负值）都必须为零。动能为零则意味着动量也为零，那么 $\Delta p_x = 0$ 。势能为零则意味着粒子始终处于原点，则 $\Delta x = 0$ 。但我们不能同时让 $\Delta p_x = 0$ 和 $\Delta x = 0$ ，因此，基态能量必须大于零。零点能 (ZPE) 的定义为 $E_{ZPE} = E_{gs} - V_{min}$ ，其中 E_{gs} 是基态能量， V_{min} 是势能的最小值。

偶函数和奇函数

在详细考察波函数之前，我们先定义奇函数和偶函数。如果函数 $f(x)$

$$f(-x) = f(x) \quad (4.48)$$




图 4.2: 当 $E = 0.499h\nu$ 、 $E = 0.500h\nu$ 和 $E = 0.501h\nu$ 时, 谐振子薛定谔方程的解只包含 x 的偶次幂。在 $x = 0$ 附近的区域, 三条曲线几乎重合。当 $|\alpha^{1/2}x| > 3$ 时, $E = 0.500h\nu$ 的曲线几乎与 x 轴重合。

则称 $f(x)$ 为**偶函数** (even function)。因为 $(-x)^2 = x^2$ 和 $e^{-b(x^2)} = e^{-b(-x^2)}$, 所以 x^2 和 e^{bx^2} 均是偶函数。偶函数的图象关于 y 轴对称 (例如, 见图4.4a)。因此, 对于偶函数, 有

$$\int_{-a}^{+a} f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx \quad (4.49)$$

如果 $g(x)$ 满足

$$g(-x) = -g(x) \quad (4.50)$$


则称 $g(x)$ 为**奇函数** (odd function)。例如 x 、 $1/x$ 和 $x^3e^{x^2}$ 。在式 (4.50) 中, 令 $x = 0$, 若 $g(0)$ 存在且为单值, 则 $g(0) = 0$ 。奇函数的图形大致如图4.4 b 所示。由于 y 轴一侧的正贡献会被另一侧相应的负贡献抵消, 我们可以得出: 对于奇函数, 有

$$\int_{-a}^{+a} g(x) dx = 0 \quad (4.51)$$

很容易证明, 两个偶函数或两个奇函数的乘积是偶函数, 而一个偶函数和一个奇函数的乘积是奇函数。

谐振子波函数

式 (4.47) 中的指数部分 $e^{-\alpha x^2/2}$ 是偶函数。若 v 是偶数, 则多项式因子只包含 x 的偶次幂, 使得 ψ_v 是偶函数。若 v 是奇数, 则多项式因子只包含 x 的奇次幂, 使得 ψ_v 是一个奇函数和一个偶函数的乘积, 为奇函数。每一个谐振子状态方程 ψ 都是一个奇函数或偶函数, 取决于 v 的奇偶性。在第7.5节中, 我们将看到: 当势能函数 V 是偶函数时, 非简并能级的波函数一定是奇函数或偶函数。

图 4.3: 图4.2在 $\alpha^{1/2}x$ 附近区域的放大图。

现在，我们找到了最低三个能级波函数的显式。对于 $v = 0$ 的基态，式 (4.47) 给出

$$\psi_0 = c_0 e^{-\alpha x^2/2} \quad (4.52)$$

其中 ψ 的下标表示量子数 v 。通过归一化，我们可以求出 c_0 ：

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} |c_0| e^{-\alpha x^2} dx = 2 |c_0|^2 \int_0^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx$$

其中，我们用到了式 (4.49)。使用附录中的积分 (A.9)，我们有 $|c_0| = (\alpha/\pi)^{1/4}$ 。因此，如果我们选择令归一化常数的相位为零，则基态波函数为

$$\psi_0 = (\alpha/\pi)^{1/4} e^{-\alpha x^2/2} \quad (4.53)$$

波函数 (4.53) 是一个高斯函数 (图4.4a)。

对于状态 $v = 1$ ，式 (4.47) 给出

$$\psi_1 = c_1 x e^{-\alpha x^2/2} \quad (4.54)$$

使用 (A.10) 进行归一化，我们有

$$\psi_1 = (4\alpha^3/\pi)^{1/4} x e^{-\alpha x^2/2} \quad (4.55)$$

图4.4b 显示了 ψ_1 的图象。

对于状态 $v = 2$ ，式 (4.47) 给出

$$\psi_2 = (c_0 + c_2 x^2) e^{-\alpha x^2/2}$$

将 $v = 2$ 代入 (4.46)，我们有

$$c_2 = \frac{2\alpha(-2)}{1 \cdot 2} c_0 = -2\alpha c_0$$

因此，

$$\psi_2 = c_0 (1 - 2\alpha x^2) e^{-\alpha x^2/2} \quad (4.56)$$

使用归一化解出 c_0 ，我们有 (问题 4.10)

$$\psi_2 = (4\alpha^3/\pi)^{1/4} (2\alpha x^2 - 1) e^{-\alpha x^2/2} \quad (4.57)$$

注意： ψ_2 中的 c_0 和 ψ_0 中的 c_0 是不同的。




图 4.4: 谐振子波函数。所有图形使用相同的比例尺。 x 轴上标记的点为 $\alpha^{1/2}x = \pm 2$ 。

波函数节点的个数与量子数 v 相同。可以证明（见《Messiah》，第 109-110 页）：对于一维定态束缚态问题，若 ψ 处于基态，则边界点内部的节点数为零；而对于每一个连续的激发态，节点数都会增加一个。

谐振子波函数中的多项式因子在数学中是众所周知的，被称为厄米多项式（Hermite polynomials），是以一位法国数学家的名字命名的。（见问题 4.21）

根据量子力学解法，在 x 轴上的任何一点（节点除外）都有一定概率找到粒子。从经典角度讲， $E = T + V$ ，动能 T 不能为负： $T \geq 0$ 。因此， $E - V = T \geq 0$ 则 $V \leq E$ 。势能 V 是位置的函数，经典粒子被限制在 $V < E$ 的空间区域内。也就是说，势能不超过总能量。在图 (4.5) 中，标有 E 的水平线表示谐振子的能量，抛物线表示势能 $\frac{1}{2}kx^2$ 。对于区域 $x < -a$ 和 $x > a$ ，我们有 $V > E$ ，这些区域是**经典禁阻**（classical forbidden）的。**经典允许的区域**（classical allowed region） $-a \leq x \leq a$ 在图 (4.5) 中满足 $V \leq E$ 。

在量子力学中，定态波函数不是算符 $\hat{T}$ 或 $\hat{V}$ 的本征函数，因此我们无法确定定态系统的动能或势能值。与经典力学的方程 $E = T + V$ 和 $T \geq 0$ 不同，在量子力学中我们有 $\langle E \rangle = \langle T \rangle + \langle V \rangle$ （问题 6.35）和 $\langle T \rangle \geq 0$ （问题 7.7），所以量子力学中满足 $\langle V \rangle \leq E$ ，但是我们不能写作 $V \leq E$ ，因此，粒子有一定概率在经典禁区（ $V > E$ 的区域）中被发现。

如果说粒子可以在经典允许的区域之外被发现，我们似乎就允许它具有负动能。实际上，量子力学的观点并不存在悖论。为了验证粒子是否处于经典禁止区域，我们必须测量它的位置。这种测量会改变系统的状态（第 1.3 和 1.4 节）。振子与测量仪器的相互作用会将足够的能量传递给振子，使其处于经典禁区。对 x 的精确测量会给动量带来很大的不确定性，因此也会给动能带来很大的不确定性。2.4 节和 2.5 节讨论了经典禁区的穿透问题。

一个定态谐振子满足 $E = (v + \frac{1}{2})h\nu$ 和 $V = \frac{1}{2}kx^2 = 2\pi^2\nu^2mx^2$ 。因此，在经典允许的区域（ $V \leq E$ ）有 $2\pi^2\nu^2mx^2 \leq (v + \frac{1}{2})h\nu$ ，即 $x^2 \leq (v + \frac{1}{2})h/2\pi^2\nu^2m = (2v + 1)\alpha$ ，其中 $\alpha \equiv 2\pi\nu m/\hbar$ [式 (4.31)]。因此，谐振子的经典允许区域为 $-(2v + 1)^{1/2}\alpha^{1/2} \leq \alpha^{1/2}x \leq (2v + 1)^{1/2}\alpha^{1/2}$ 。




图 4.5: 谐振子的经典允许区域 $-a \leq x \leq a$ 和禁阻区域 $x > a, x < -a$

从图 (4.4) 中可以看出: ψ 在经典允许区域中振荡, 而在经典禁止区域则以指数形式下降到零。我们之前在矩形势阱中看到过粒子的这种行为 (第 2.4 节)。

图 (4.4) 显示, 当谐振子的能量逐渐升高时, ψ 和 $|\psi|^2$ 的最大值往往离原点越来越远。由于离原点越远, 势能 $V = \frac{1}{2}kx^2$ 越大, 平均势能 $\langle V \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 V dx$ 也会随着量子数的增加而增大。平均动能由 $\langle T \rangle = -(\hbar^2/2m) \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \psi'' dx$ 给出。应用分部积分 (问题 7.7b), 有 $\langle T \rangle = (\hbar^2/2m) \int_{-\infty}^{\infty} |d\psi/dx|^2 dx$ 。量子数越大的状态中节点的数量越多, ψ 的变化速度就越快, 因此随着量子数的增加, $\langle T \rangle$ 也会增加。

经典谐振子最有可能出现在运动转折点附近的区域, 即振子运动速度最慢、 V 值较大的区域。相反, 对于量子谐振子的基态, 最有可能出现的区域是原点附近的区域。对于高振动量子数, 人们会发现的外峰值大于原点附近的峰值, 最可能的区域变成了经典转折点附近的区域, 此时 V 很大 (见问题 4.18)。这是对应原理 (第 2.2 节) 的一个例子。

量子谐振子的一些在线模拟可从以下网站获得: www.phy.davidson.edu/StuHome/cabell_f/energy.html (显示能级和波函数, 并显示当能量从允许值改变时波函数如何发散); www.falstad.com/qm1d/ (从顶部的下拉菜单中选择谐振子; 双击底部的小圆圈以显示静止状态; 显示能量、波函数、概率密度; m 和 k 可以改变); demonstrations.wolfram.com/HarmonicOscillatorEigenfunctions (展示了 $|\psi|^2$)。

4.3 双原子分子的振动

我们将在第 13.1 节中看到, 在极好的近似条件下, 我们可以分别处理分子中电子的运动和原子核的运动 (这是由于原子核的质量要大得多)。首先想象原子核静止不动, 然后求解电子能量 U 的薛定谔方程 (U 还包括核排斥能量)。对于二原子 (双原子) 分子, 电子能量 U 取决于原子核之间的距离 R , $U = U(R)$, 而 U 与 R 的关系曲线则如图 13.1 所示。

找到 $U(R)$ 后, 可以先解决核运动的薛定谔方程, 使用 $U(R)$ 作为核运动的势能函数。对于双原子分子, 核薛定谔方程是一个双粒子方程。我们将在第 6.3 节中看到, 当双粒子系统的势能只取决于粒子之间的距离时, 系统的能量是 (a) 整个系统在空间平动的动能和 (b) 粒子相对于彼此的内部运动能量之和。双粒子内部运动能量的经典表达式是粒子间相互作用的势能与假设粒子的动能之和, 其中假设粒子的质量为 $m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ (m_1 和 m_2 分别是两个原子的质量), 该粒子的坐标

为一个粒子相对于另一个粒子的坐标。 $m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ 称为**约化质量** (reduced mass) μ 。

二原子分子的内部运动包括**振动**和**转动**，前者与两个原子核之间距离 R 的变化相对应，后者与原子核连接线空间方向的变化相对应。通常可以近似地将振动和转动分开处理。转动能级见第 6.4 节。此处我们考虑振动能级。

双原子分子振动的薛定谔方程有一个质量为 $m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ 假设粒子的动能算符和一个由 $U(R)$ 给出的势能项。如果我们将原点与图 13.1 中 U 曲线的最低点重合，并将该最低点的能量取为势能的零点，那么 $U(R)$ 曲线的下半部分将与具有适当力常数 k 的谐振子的势能曲线几乎重合（见图 4.6 和问题 4.28）。 $U(R)$ 曲线的最小值出现在**平衡核间距** (equilibrium distance) R_e 的位置。在图 4.6 中， x 是核间距与平衡核间距的偏差： $x \equiv R - R_e$ 。




图 4.6: 双原子分子振动的势能(实线)和谐振子的势能(虚线)。图中还显示了二原子分子的束缚态振动能级。与谐振子相比，二原子分子只有有限数量的束缚振动能级。

谐振子的力常数 k 在式 (4.26) 中可以由 $k = d^2V/dx^2$ 计算得到，在 $R = R_e$ 处，谐振子曲线与 $U(R)$ 曲线的下半部分几乎重合，所以分子的力常数 $k = d^2U/dR^2|_{R=R_e}$ 。(另见问题 4.28)。核质量的差异对电子能量曲线 $U(R)$ 几乎没有影响，因此同一分子但由不同同位素取代的种类具有基本相同的力常数 k 。

因此，我们预计二原子分子振动能级 E_{vib} 的一个合理近似是谐振子振动能级；由式 (4.45) 和式 (4.23)，有

$$E_{vib} \approx \left(v + \frac{1}{2}\right) h\nu_e, \quad v = 0, 1, 2, \dots \quad (4.58)$$

$$\nu_e = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{k}{\mu}\right)^{1/2}, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}, \quad k = \left.\frac{d^2U}{dR^2}\right|_{R=R_e} \quad (4.59)$$

其中 ν_e 称为**简谐振动频率** (equilibrium or harmonic vibrational frequency)。这种近似方法最适用于较低的振动能级。随着 v 的增加，原子核位于远离其平衡间隔区域的时间更长。对于这些区域，势能大大偏离谐振子的势能，谐振子近似效果不佳。我们会发现：随着 v 的增大，双原子分子的振动能级不是等距排列，而是越靠越近（图 4.6）。最终，振动能量大到足以将双原子分子解离成互不结

合的原子。与谐振子不同，双原子分子只有有限数量的束缚态振动能级。考虑到振动的非谐性，分子振动能的更精确表达式是

$$E_{vib} = \left(v + \frac{1}{2}\right) h\nu_e - \left(v + \frac{1}{2}\right)^2 h\nu_e \chi_e \quad (4.60)$$

其中非谐性常数 (anharmonicity constant) $\nu_e \chi_e$ 几乎在所有情况下都大于零。(译者注：一般认定 χ_e 为非谐性常数?)

使用含时薛定谔方程，我们可以发现 (见第9.9节)：当双原子分子暴露在电磁辐射下时，最有可能发生的振动跃迁是那些 v 变化了 ± 1 的跃迁。此外，要吸收或发射电磁辐射，振动必须改变分子的偶极矩。因此，同核双原子分子 (例如 H_2 、 N_2) 不能通过吸收或发射辐射实现振动能级之间的转换 (这种转变可以发生在分子间碰撞中)。关系 $E_{upper} - E_{lower} = h\nu$ (其中 ν 为辐射频率)、近似方程 (4.58)、吸收和发射辐射的**选律** (selection rule) $\Delta v = \pm 1$ 表明：一个振动频率为 ν_e 的异核双原子分子将对近似为下式给出频率的辐射 ν_{light} 有强烈吸收：

$$\nu_{light} = (E_2 - E_1)/h \approx \left[\left(v_2 + \frac{1}{2}\right) h\nu_e - \left(v_1 + \frac{1}{2}\right) h\nu_e\right]/h = (v_2 - v_1)\nu_e = \nu_e \quad (4.61)$$

双原子分子 k 和 μ 值的特性使得 ν_{light} 通常位于光谱的红外区域。 $\Delta v = 2, 3, \dots$ 的跃迁也会发生，但这些 (称为泛频 (overtones)) 的吸收要比 $\Delta v = 1$ 的跃迁弱得多。

使用更准确的方程 (4.60)，有 (问题 4.27)

$$\nu_{light} = \nu_e - 2\nu_e \chi_e (v_1 + 1) \quad (4.62)$$

其中 v_1 是较低能级的振动量子数，选律为 $\Delta v = \pm 1$ 。

热平衡系统中分子两个能级的布居数由**玻尔兹曼分布律** (Boltzmann distribution law) 给出 (见物理化学教材)：

$$\frac{N_i}{N_j} = \frac{g_i}{g_j} e^{-(E_i - E_j)/kT} \quad (4.63)$$

其中能级 i 和 j 的能量分别为 E_i 和 E_j ， g_i 和 g_j 是对应能级的简并度， k 是玻尔兹曼常数， T 是热力学温度。对于非简并能级，有 $g_i = 1$ 。

$\nu = (1/2\pi)(k/\mu)^{1/2}$ 的数量级使得在室温下，对于轻分子 (例如 H_2 、 HCl 、 CO)，只有 $v = 0$ 的振动能级是被显著占据的。对于重分子 (例如 I_2)，在室温下有一个或多个激发态振动能级被显著占据。

极性双原子分子的振动吸收光谱包含 $v = 0 \rightarrow 1$ 吸收带，很弱的泛频吸收带 ($v = 0 \rightarrow 2, 0 \rightarrow 3, \dots$)，以及若 $v > 0$ 的能级也被显著占据，也有热带 (hot bands)，例如 $v = 1 \rightarrow 2$ 、 $v = 1 \rightarrow 3$ 等。与特定振动跃迁相对应的每个波段都由几条紧密相连的线组成。每一条这样的线都对应于与振动状态变化同时发生的不同的转动状态变化。每一条线都是振动-转动跃迁的结果。

光谱频率的国际单位为**赫兹** (hertz, Hz)，定义为 $1\text{Hz} \equiv 1\text{s}^{-1}$ 。通常使用的倍数有等于 10^6 赫兹的兆赫兹 (MHz) 和等于 10^9 赫兹的千兆赫兹 (GHz)。红外 (IR) 吸收峰通常由**波数** (wavenumber) $\tilde{\nu}$ 给出，定义为

$$\tilde{\nu} \equiv \frac{\nu}{c} = \frac{1}{\lambda} \quad (4.64)$$

其中 λ 是真空中辐射的波长。

在谐振子近似中，多原子分子的量子力学能级为 $E_{vib} = \sum_i \left(v_i + \frac{1}{2}\right) h\nu_i$ ，其中 ν_i 是分子每个正则振动模式的频率， v_i 是对应第 i 个正则振动的量子数。每个振动量子数 v_i 的取值 $0, 1, 2, \dots$ 都与其他振动量子数的取值无关。一个具有 n 个原子的线性分子具有 $3n - 6$ 个正则振动模式，而一个具有 n 个原子的非线性分子具有 $3n - 5$ 个正则振动模式。

为了由式 (4.59) 计算折合质量 μ ，我们需要知道每种同位素的质量。附录表 A.3 列出了一些常见同位素的相对原子质量。

例题： $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$ 分子的最强红外吸收峰位于 $\tilde{\nu} = 2140 \text{ cm}^{-1}$ 。计算该分子的力常数 k 。请说明所做的近似计算。

最强的红外吸收峰对应于 $v = 0 \rightarrow 1$ 的跃迁。我们将分子振动近似为谐振子模型。由式 (4.61)，分子的平衡振动频率近似为

$$\nu_e \approx \nu_{\text{light}} = \tilde{\nu}c = (2140 \text{ cm}^{-1})(2.9979 \times 10^{10} \text{ cm/s}) = 6.424 \times 10^{13} \text{ s}^{-1}$$

使用式 (4.59)，将 k 与 ν_e 联系起来，我们需要折合质量 $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ 。 $1 \text{ mol } ^{12}\text{C}$ 的质量为 12 g ，包含阿伏伽德罗常数 (N_A) 个分子，则一个 ^{12}C 原子的质量为 $(12 \text{ g}) / (6.02214 \times 10^{23})$ 。折合质量和力常数分别为

$$\mu = \frac{12(15.9949) \text{ g}}{27.9949} \frac{1}{6.02214 \times 10^{23}} = 1.1385 \times 10^{-23} \text{ g}$$

$$k = 4\pi^2 \nu_e^2 \mu = 4\pi^2 (6.424 \times 10^{13} \text{ s}^{-1})^2 (1.1385 \times 10^{-23} \text{ g}) = 1855 \text{ N/m}$$

练习： (a) 求分子 $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$ 零点能的近似值；(答案： $2.1 \times 10^{-20} \text{ J}$)；(b) 求分子 $^{13}\text{C}^{16}\text{O}$ 的 ν_e 。(答案： $6.28 \times 10^{13} \text{ s}^{-1}$)

4.4 一维定态薛定谔方程的数值解法

Numerov 方法

我们已经精确求解了箱中粒子和谐振子的薛定谔方程。对于许多势能函数 $V(x)$ ，单粒子一维薛定谔方程是无法精确求解的。本节将介绍一种用于计算机求解单粒子一维薛定谔方程的数值方法 (**Numerov 方法**)，该方法可以精确求出任意势能函数 $V(x)$ 的薛定谔方程的束缚态本征值和本征函数。


为了使用数值法求解薛定谔方程，我们需要处理 x 轴的一部分，其中包括经典允许区域，以及在经典允许区域两端延伸到经典禁止区域的部分。我们将 x 轴的这一部分划分为若干小区间，每个区间的长度为 s (图 4.7)。点 x_0 和 x_{max} 是这一部分的边界点，而 x_n 是第 n 个区间的右端点。令 ψ_{n-1} 、 ψ_n 和 ψ_{n+1} 分别为点 x_{n-s} 、 x_n 和 x_{n+s} 处波函数 ψ 的值，分别地 (这些点是相邻区间的端点)：

$$\psi_{n-1} \equiv \psi(x_n - s), \quad \psi_n \equiv \psi(x_n), \quad \psi_{n+1} \equiv \psi(x_n + s) \quad (4.65)$$

不要被这些符号迷惑了。下标 $n-1$ 、 n 和 $n+1$ 并代表不同的状态，而是表示 x 轴上以 s 为间隔的各点上一个特定波函数 ψ 的值。下标 n 表示 ψ 在 x_n 点求值。我们将薛定谔方程 $-(\hbar^2/m)\psi'' + V\psi = E\psi$ 写成

$$\psi'' = G\psi, \quad \text{其中} \quad G \equiv m\hbar^{-2} [2V(x) - 2E] \quad (4.66)$$

用涉及 s 的幂的 Taylor 级数展开 $\psi(x_n + s)$ 和 $\psi(x_n - s)$ ，将两式相加即可消去 s 的奇次幂项，并用薛定谔方程来表示 ψ'' 和 $\psi^{(\text{iv})}$ ，以 ψ 表示，并忽略 s^6 和 s 的高次幂项 (如果 s 较小，近


图 4.7: 一维单粒子系统的 V 关于 x 的图象

似值将是准确的), 我们会发现 (问题 4.43)

$$\psi_{n+1} \equiv \frac{2\psi_n - \psi_{n-1} + 5G_n\psi_n s^2/6 + G_{n-1}\psi_{n-1}s^2/12}{1 - G_{n+1}s^2/12} \quad (4.67)$$

其中 $G_n \equiv G(x_n) \equiv m\hbar^{-2}[2V(x_n) - 2E]$ [式 (4.66) 和 4.65]。如果知道 ψ_n 和 ψ_{n-1} , 即 ψ 在 x_n 和 $x_n - s$ 处的值, 方程 (4.67) 允许我们计算 ψ_{n+1} , 即 ψ 在点 x_{n+s} 处的值。

我们如何使用式 (4.67) 来求解薛定谔方程? 我们首先猜测一个能量本征值 E_{guess} 。我们从左侧经典禁区 (图 4.7) 中的一点 x_0 开始, 此处 ψ 的值很小, 我们假设 ψ 在该点处的值为零: $\psi_0 \equiv \psi(x_0) = 0$ 。同样地, 我们也在经典禁区 (此处 ψ 的值也很小) 的右侧点 x_{max} 处假设 $\psi(x_{max})$ 的值为零。我们为连续点之间的间隔 s 选取一个较小的数值, 在 $x_0 + s$ 处, 我们将 ψ 的值设为一个较小的数值, 例如 0.0001: $\psi_1 \equiv \psi(x_1) \equiv \psi(x_0 + s) = 0.0001$ 。 ψ_1 的值对找到的本征值不会有任何影响。如果我们令 ψ_1 为 0.001, 而不是 0.0001, 公式 (4.67) 表明, 这只需将后续点上的所有 ψ 值乘以 10 即可 (问题 4.41)。这不会影响本征值 [见公式 (3.14) 后的示例]。在找到每个本征值后, 可以对波函数进行归一化处理。

图 4.8: Numerov 方法求解的节点数与能量 E_{guess} 的函数关系。

现在我们有 ψ_0 和 ψ_1 的值, 可以使用式 (4.67) 计算 $\psi_2 \equiv \psi(x_2) \equiv \psi(x_1 + 2s)$ 的值, 其中我们用 E_{guess} 计算得到 G 的值。接着, 在式 (4.67) 令 $n = 2$, 我们可以计算出 ψ_3 的值, 以此类推, 直到达到 x_{max} 。如果 E_{guess} 不等于或不非常接近于本征值, 那么 ψ 将不满足平方可积的要求, 且 $|\psi(x_{max})|$ 的值会变得非常大。如果发现 $|\psi(x_{max})|$ 不接近于零, 那我们重新选一个 E_{guess} , 并从 x_0 开始重复上述过程。这个过程将会循环往复, 直到找到能使 $|\psi(x_{max})|$ 非常接近于零的 E_{guess} 的值。此时的 E_{guess} 基本上等同于一个本征值。找到本征值的系统方法是计算由 E_{guess} 生成的 ψ 中的节点。回忆在一维问题中 (第 4.2 节), 基态的内部节点数为 0, 第一激发态的内部节点数为 1, 以此类推。令 $E_1, E_2, E_3, \dots$ 分别表示基态、第一激发态和第二激发态等的能量值。如果 ψ_{guess} 在 x_0 和 x_{max} 之间没有节点, 那么 E_{guess} 应该小于或等于 E_1 。如果 ψ_{guess} 在 x_0 和 x_{max} 之间有一个

节点, 那么 E_{guess} 应该位于 E_1 和 E_2 之间。随后将给出例子。

无量纲变量

Numerov 方法需要我们猜测 E 的值。但是我们猜测的数量级: 10^{-20} J, 10^{-15} J, ... 应该是多少? 为了回答这个问题, 我们以谐振子为例, 用无量纲变量重表示薛定谔方程。

谐振子的势能函数为 $V = \frac{1}{2}kx^2$, 其薛定谔方程包含三个常数, k 、 m 和 $\hbar$ 。我们试图找到无量纲约化能量 E_r 和无量纲约化 x 坐标 x_r , 它们的定义是

$$E_r \equiv E/A, \quad x_r \equiv x/B \quad (4.68)$$

其中常数 A 是 k 、 m 和 $\hbar$ 的组合, 具有能量的量纲, 而 B 是具有长度量纲的组合。能量的量纲为 质量 $\times$ 长度² $\times$ 时间⁻², 我们写作

$$[E] = \text{ML}^2\text{T}^{-2} \quad (4.69)$$

其中, E 的括号表示其维度, M、L 和 T 分别表示质量、长度和时间。方程 $V = \frac{1}{2}kx^2$ 表明 k 的量纲为 能量 $\times$ 长度⁻², 由式 (4.69), 有 $[k] = \text{MT}^{-2}$ 。 $\hbar$ 的量纲为 能量 $\times$ 时间。因此,

$$[m] = \text{M}, \quad [k] = \text{MT}^{-2}, \quad [\hbar] = \text{ML}^2\text{T}^{-1} \quad (4.70)$$

式 (4.68) 中的 A 和 B 的量纲分别为能量和长度, 则

$$[A] = \text{ML}^2\text{T}^{-2}, \quad [B] = \text{L} \quad (4.71)$$

令 $A = m^a k^b \hbar^c$, 其中 a 、 b 和 c 是待定的指数, 由 A 的量纲一定为 ML^2T^{-2} 所确定。我们有

$$[A] = [m^a k^b \hbar^c] = \text{M}^a (\text{MT}^{-2})^b (\text{ML}^2\text{T}^{-1})^c = \text{M}^{a+b+c} \text{L}^{2c} \text{T}^{-2b-c} \quad (4.72)$$

令 (4.71) 和 (4.72) 中 M、L 和 T 的指数相等, 得到

$$a + b + c = 1, \quad 2c = 2, \quad -2b - c = -2$$

解这个方程组, 得到 $c = 1$, $b = \frac{1}{2}$, $a = -\frac{1}{2}$ 。因此

$$A = m^{-1/2} k^{1/2} \hbar \quad (4.73)$$

同样地, 令 $B = m^d k^e \hbar^f$ 。用得出式 (4.73) 相同的量纲分析法, 有 (问题 4.44)

$$B = m^{-1/4} k^{-1/4} \hbar^{1/2} \quad (4.74)$$

根据式 (4.68)、(4.73) 和 (4.74), 谐振子的约化变量为

$$E_r = E/m^{-1/2} k^{1/2} \hbar, \quad x_r = x/m^{-1/4} k^{-1/4} \hbar^{1/2} \quad (4.75)$$

使用 $k^{1/2} = 2\pi\nu m^{1/2}$ [式 (4.23)] 将 k 从 (4.75) 中消去, 并回忆 $\alpha \equiv 2\pi\nu m/\hbar$ [式 (4.31)], 我们得到以下备选的表达式

$$E_r = E/h\nu, \quad x_r = \alpha^{1/2} x \quad (4.76)$$

与方程 $E_r \equiv E/A$ [式 (4.68)] 类似, 我们可以定义约化势能函数 V_r :

$$V_r \equiv V/A \quad (4.77)$$

由于 $|\psi(x)|^2 dx$ 是概率，概率是没有量纲的，归一化后的 $\psi(x)$ 一定具有长度^{-1/2} 的量纲。因此，我们可以定义一个没有量纲的约化波函数 ψ_r 。由式 (4.71)， B 具有长度的量纲，则 $B^{-1/2}$ 具有长度^{-1/2} 的量纲。因此，

$$\psi_r = \psi/B^{-1/2} \quad (4.78)$$

ψ_r 满足 $\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_r|^2 dx_r = 1$ ；这是由式 (4.76)、(4.78) 和 $\int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 dx = 1$ 得出的。

我们现在使用无量纲变量 E_r 、 x_r 和 ψ_r 来重写薛定谔方程。有

$$\begin{aligned} \frac{d^2\psi}{dx^2} &= \frac{d^2}{dx^2} B^{-1/2} \psi_r = B^{-1/2} \frac{d}{dx} \frac{d\psi_r}{dx} = B^{-1/2} \frac{d}{dx} \frac{d\psi_r}{dx_r} \frac{dx_r}{dx} = B^{-1/2} \frac{d}{dx_r} \frac{d\psi_r}{dx_r} \frac{dx_r}{dx} \frac{dx_r}{dx} \\ &= B^{-5/2} \frac{d^2\psi_r}{dx_r^2} \end{aligned} \quad (4.79)$$

其中，我们用到了 $dx_r/dx = B^{-1/2}$ 。将 (4.68)、(4.77) 和 (4.79) 代入薛定谔方程 $-(\hbar^2/m)(d^2\psi/dx^2) + V\psi = E\psi$ ，得到

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{m} B^{-5/2} \frac{d^2\psi_r}{dx_r^2} + AV_r B^{-1/2} \psi_r &= AE_r B^{-1/2} \psi_r \\ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{AB^2} \frac{d^2\psi_r}{dx_r^2} + V_r \psi_r &= E_r \psi_r \end{aligned} \quad (4.80)$$

根据式 (4.73) 和 (4.74)，有 $AB^2 = \hbar^2/m$ ，所以对于谐振子，有 $\hbar^2/mAB^2 = 1$ 。

更一般地说，让 V 包含一个无量纲参数 c 。例如，我们有 $V = cx^4$ 或 $V = cx^2(1 + 0.05m^{1/2}c^{1/2}\hbar^{-1}x^2)$ （注意 $m^{1/2}c^{1/2}\hbar^{-1}x^2$ 是无量纲的，因为 1 是无量纲的，所以它必须是无量纲的）。式 (4.80) 中的 AB 一定可以写成 $\hbar^r m^s c^t$ 的形式，其中 r 、 s 和 t 是待定的指数。由于 (4.80) 中的 $V_r \psi_r$ 是无量纲的，因此第一项也是无量纲的。那么 $\hbar^2/mAB^2$ 是无量纲的， AB^2 与 $\hbar^2/m$ 具有相同的量纲。所以 $r = 2$ ， $s = 1$ ， $t = 0$ 。因此， $AB^2 = \hbar^2/m$ ，带入 (4.80)，有

$$\frac{d^2\psi}{dx_r^2} = (2V_r - 2E_r) \psi_r \quad (4.81)$$

$$\psi'' = G_r \psi_r, \quad \text{其中 } G_r \equiv 2V_r - 2E_r \quad (4.82)$$

对于谐振子， $V_r \equiv V/A = \frac{1}{2}kx^2/m^{-1/2}\hbar = \frac{1}{2}x_r^2$ ，因此 [式 (4.73) 和式 (4.75)]:

$$V_r = \frac{1}{2}x_r^2 \quad (4.83)$$

将谐振子薛定谔方程约化为只涉及无量纲量的形式 (4.81) 后，我们可以预期最低能量本征值的数量级为 1。

约化谐振子薛定谔方程 (4.82) 与 (4.66) 具有相同的形式，所以我们可以用 Numerov 公式 (4.67) 来求解。使用 ψ_r 的值代替 ψ ， G_r 的值代替 G ，与 (4.68) 类似， s_r 的值代替 s 。

一旦找到约化能量 E_r 的数值，就可以根据 (4.75) 或 (4.76) 求出能量 E 。

x_r 、 x_0 、 x_{max} 和 s_r 的选择

我们需要选择 x_r 的起始值、结束值，以及相邻点之间的间隔值 s_r 。假设我们希望找到满足 $E_r \leq 5$ 的谐振子的所有本征函数和本征值。我们从左侧经典禁区开始求解，因此首先要找到 $E_r = 5$ 的经典禁区。经典允许和经典禁止区域的边界满足 $E_r = V_r$ 。由式 (4.83)，有 $V_r = \frac{1}{2}x_r^2$ ，因此 $E_r = V_r$ 变成了 $5 = \frac{1}{2}x_r^2$ 所以满足 $E_r \leq 5$ 的经典允许区域为 $x_r = -(10)^{1/2} = -3.16$ 到 $x_r = (10)^{1/2} = 3.16$ 。若 $E_r < 5$ ，则经典允许区域将更小。我们希望从左侧经典禁区 (ψ 非常小) 内的某一点开始求解，我们希望在右侧经典禁区内的某一点结束求解。对于 $E_r = 5$ ，左侧的经典禁区在 $x_r = -3.16$ 处结

束,, 所以一个合理的选择为 $x_r = -5$ [太深入经典禁区有时会带来麻烦 (见下文), 因此在选择起点时可能需要试错]。由于 V 是对称的, 因此我们将在 $x_r = 5$ 处结束求解。

为了达到合理的精确度, 通常至少需要 100 个点, 因此我们取 $s_r = 0.1$ 以得到 100 个点。从 Numerov 方法的推导中可以看出, s_r 必须很小。合理的规则可能是 s_r 不大于 0.1。

如果像通常情况那样, 当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时有 $V \rightarrow \infty$, 那么在经典禁区内起步太远会使 Numerov 公式 (4.67) 中的分母 $1 - G_{n+1}s^2/12$ 变成负数。我们有 $G_r = 2V_r - 2E_r$, 如果我们从 V_r 非常大的点 x_0 开始, 该点的 G_r 可能大到足以使 Numerov 公式的分母为负。这样, 该方法就会失效。我们将 ψ_0 取为零, 将 ψ_1 取为正数。Numerov 公式 (4.67) 表明, 如果分母是负数, 那么 ψ_2 也将是负数, 我们将在 x_1 和 x_2 之间产生一个虚假的 ψ 节点。为了避免这个问题, 我们可以减小步长 s_r 或 x_r 、 x_{max} 、 $-x_r$ 和 $-x_0$ 。(见问题 4.46)。

Numerov 方法的计算机程序

使用电子表格求解一维薛定谔方程

Numerov 方法步骤摘要

总结

习题

Chapter 5

角动量

5.1 同时确定多个属性

在本章中，我们将讨论角动量，在下一章中，我们将证明对于氢原子的静止态，电子角动量的大小是恒定的。首先，我们要考虑用什么标准来决定一个系统的哪些性质可以同时赋予定值。

在第3.3节中，我们假设：若态函数 Ψ 是算符 $\hat{A}$ 的本征函数，本征值为 s ，则对物理量 A 的测量结果一定为 s 。若 Ψ 同时是 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 的本征函数，即 $\hat{A}\Psi = s\Psi$ ， $\hat{B}\Psi = t\Psi$ ，那么我们就可以同时为物理量 A 和 B 赋以确定的值。什么时候 Ψ 会同时是两个算符的本征函数呢？在第7章中，我们将证明如下两个理论。首先，两个算符的同时本征函数的完整集合存在的必要条件是算符之间可对易（这里使用的“完整”一词有一定的技术含义，我们将在第7章再讨论这个问题）。反之亦然，若对应于物理量的两个算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 可对易，则存在一组完整的函数，它们同时是 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 的本征函数。因此，若 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ ，那么 Ψ 可以同时是 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 的本征函数。

回忆算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 的交换子为 $[\hat{A}, \hat{B}] \equiv \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$ [式 (3.7)]。下列等式有助于计算交换子。通过详细写出交换子可以证明这些等式（问题 5.2）：

$$[\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}] \quad (5.1)$$

$$[\hat{A}, \hat{A}^n] = 0, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (5.2)$$

$$[k\hat{A}, \hat{B}] = [\hat{A}, k\hat{B}] = k[\hat{A}, \hat{B}] \quad (5.3)$$

$$[\hat{A}, \hat{B} + \hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}] + [\hat{A}, \hat{C}] \quad [\hat{A} + \hat{B}, \hat{C}] = [\hat{A}, \hat{C}] + [\hat{B}, \hat{C}] \quad (5.4)$$

$$[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}] \quad [\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B} \quad (5.5)$$

其中 k 是常数，所有算符都假设为线性算符。

例题：从 $[\partial/\partial x, x] = 1$ [式 (3.8)] 出发，使用对易子的性质（式 (5.1) 至 (5.5)）求以下对易子：

(a) $[\hat{x}, \hat{p}_x]$ ；(b) $[\hat{x}, \hat{p}_x^2]$ ；(c) 三维单粒子系统的 $[\hat{x}, \hat{H}]$ 。

(a) 使用式 (5.3) 和 (5.1)，因为 $[\partial/\partial x, x] = 1$ ，我们有

$$\begin{aligned} [\hat{x}, \hat{p}_x] &= \left[\hat{x}, \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \right] = \frac{\hbar}{i} \left[\hat{x}, \frac{\partial}{\partial x} \right] = -\frac{\hbar}{i} \left[\frac{\partial}{\partial x}, \hat{x} \right] = -\frac{\hbar}{i} \\ &[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar \end{aligned} \quad (5.6)$$

(b) 由式 (5.5) 和 (5.6), 有

$$\begin{aligned} [\hat{x}, \hat{p}_x^2] &= [\hat{x}, \hat{p}_x] \hat{p}_x + \hat{p}_x [\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar \cdot \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \cdot i\hbar \\ [\hat{x}, \hat{p}_x^2] &= 2\hbar^2 \frac{\partial}{\partial x} \end{aligned} \quad (5.7)$$

(c) 使用式 (5.4)、(5.3) 和 (5.7), 有

$$\begin{aligned} [\hat{x}, \hat{H}] &= [\hat{x}, \hat{T} + \hat{V}] = [\hat{x}, \hat{T}] + [\hat{x}, \hat{V}(x, y, z)] = [\hat{x}, \hat{T}] \\ &= [\hat{x}, (1/2m) (\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2)] \\ &= (1/2m) [\hat{x}, \hat{p}_x^2] + (1/2m) [\hat{x}, \hat{p}_y^2] + (1/2m) [\hat{x}, \hat{p}_z^2] \\ &= \frac{1}{2m} 2\hbar^2 \frac{\partial}{\partial x} + 0 + 0 \\ [\hat{x}, \hat{H}] &= \frac{\hbar^2}{m} \frac{\partial}{\partial x} = \frac{i\hbar}{m} \hat{p}_x \end{aligned} \quad (5.8)$$

练习: 求证: 对于单粒子三维系统, 有

$$[\hat{p}_x^2, \hat{H}] = -i\hbar \partial V(x, y, z) / \partial x \quad (5.9)$$

这些对易子有重要的物理影响。由于 $[\hat{x}, \hat{p}_x] \neq 0$, 我们不能希望态函数同时是 $\hat{x}$ 和 $\hat{p}_x$ 的本征函数。因此, 与不确定性原理相符, 我们不能同时测定 x 和 p_x 的精确值。由于 $\hat{x}$ 与 $\hat{H}$ 不可对易, 我们不能指望同时为能量和 x 坐标赋予确定的值。定态 (具有确定的能量) 会显示出 x 的各种可能值, 观察到各种 x 值的概率由玻恩公设给出。

对于不是 $\hat{A}$ 的本征函数的态函数 Ψ , 在完全相同的系统中对 A 的测量将得到各种可能的结果。我们需要对观测值 A_i 的分布或离散性进行某种测量。如果 $\langle A \rangle$ 是这些值的平均值, 那么每个测量值与平均值的偏差为 $A_i - \langle A \rangle$ 。如果我们对所有偏差求平均值, 就会得到零, 因为正负偏差会抵消。因此, 为了使所有偏差都为正值, 我们要将它们平方。偏差平方的平均值称为 A 的**方差** (variance), 在统计学中用 $\sigma^2(A)$ 表示, 在量子力学中用 $(\Delta A)^2$ 表示:

$$(\Delta A)^2 \equiv \sigma^2(A) = \langle (A - \langle A \rangle)^2 \rangle = \int \Psi^* (\hat{A} - \langle A \rangle)^2 \Psi d\tau \quad (5.10)$$

其中我们用到了平均值的表达式 (3.88)。定义 (5.10) 与以下表达式等价 (问题 5.7):

$$(\Delta A)^2 = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2 \quad (5.11)$$

方差的正平方根称为**标准差** (standard deviation), 用 ΔA 或 $\sigma(A)$ 表示。标准差是最常用的价差度量, 我们将用它来度量属性 A 的“不确定性”。

罗伯逊 (Robertson) 于 1929 年证明, 状态函数为 Ψ 的量子力学系统的两个属性的标准偏差的乘积必须满足不等式

$$\sigma(A) \sigma(B) = \Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} \left| \int \Psi^* [\hat{A}, \hat{B}] \Psi d\tau \right| \quad (5.12)$$

(5.12) 的证明源于量子力学公设, 见问题 7.60。如果 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 可对易, 那么式 (5.12) 中的积分为零, 则 ΔA 和 ΔB 可能都为零, 与上文的讨论相符。

作为式 (5.12) 的一个例子, 我们使用式 (5.6)、 $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$ [式 (1.34)], 以及归一化方法:

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{1}{2} \left| \int \Psi^* [\hat{x}, \hat{p}_x] \Psi d\tau \right| = \frac{1}{2} \left| \int \Psi^* i\hbar \Psi d\tau \right| = \frac{1}{2} \hbar |i| \left| \int \Psi^* \Psi d\tau \right|$$

$$\sigma(x)\sigma(p_x) \equiv \Delta x \Delta p_x \geq \frac{1}{2}\hbar \quad (5.13)$$

式 (5.13) 通常被认为是**海森堡不确定性原理** (Heisenberg Uncertainty Principle) (第1.3节) 的定量表述。然而, 公式 (5.12) 和 (5.13) 中标准偏差的含义与第 1.3 节中不确定度的含义截然不同。为了在式 (5.13) 中找到 Δx , 我们选取大量的系统, 每个系统都有相同的状态函数 ψ , 在每个系统中对 x 进行一次测量。将测得的数据标记为 x_i , 计算 $\langle x \rangle$ 和偏差的平方 $(x_1 - \langle x \rangle)^2$ 。我们求出偏差平方的平均值, 得到方差, 再取平方根, 得到标准偏差 $\sigma(x) \equiv \Delta x$ 。然后我们再取大量的系统, 它们具有与得到 Δx 时一致的状态 Ψ , 对每个系统测量一次 p_x , 由这些数据计算出 Δp_x 。因此, (5.13) 中的统计量 Δx 和 Δp_x 不是单个测量的误差, 也不是通过同时测量 x 和 p_x 得出的。

令 $\varepsilon(x)$ 是对 x 的单次测量的典型误差, 令 $\eta(p_x)$ 是测量 x 时对 p_x 造成的典型干扰。1927 年, 海森堡分析了进行位置测量的具体思想实验, 得出结论: 乘积 $\varepsilon(x)\eta(x)$ 的数量级为 $\hbar$ 或更大。海森堡没有给出这些量的精确定义。小泽正直 (Masanao Ozawa) 将海森堡的关系改写为

$$\varepsilon(x)\eta(p_x) \geq \frac{1}{2}\hbar$$

其中 $\varepsilon(x)$ 定义为 x 的测量值与理论值的方均根偏差, $\eta(p_x)$ 定义为测量 x 所产生的 p_x 变化的方均根偏差。更一般地说, 对于任意两个性质, 小泽将海森堡不确定性原理写成

$$\varepsilon(A)\eta(B) \geq \frac{1}{2} \left| \int \Psi^* [\hat{A}, \hat{B}] \Psi d\tau \right| \quad (5.14)$$

小泽提出的论点是: 在某些情况下, 海森堡不等式 (5.14) 可能被违反。小泽推导出以下关系来取代 (5.14) [M. Ozawa, Phys. Rev. A, 67, 042105 (2003); available at arxiv.org/abs/quant-ph/0207121]:

$$\varepsilon(A)\eta(B) + \varepsilon(A)\sigma(B) + \sigma(A)\eta(B) \geq \frac{1}{2} \left| \int \Psi^* [\hat{A}, \hat{B}] \Psi d\tau \right|$$

其中 $\sigma(A)$ 和 $\sigma(B)$ 由式 (5.10) 给出。2012 年, 一项测量中子自旋分量的实验发现: 自旋分量不服从海森堡误差-扰动不等式 (5.14), 但服从小泽不等式 [J. Erhart 等, 《自然物理学》, 8, 185 (2012); arxiv.org/abs/1201.1833]。

另一个不等式是海森堡不确定关系, 即用一台仪器同时测量 A 和 B 的两种性质:

$$\varepsilon(A)\varepsilon(B) \geq \frac{1}{2} \left| \int \Psi^* [\hat{A}, \hat{B}] \Psi d\tau \right|$$

其中 $\varepsilon(A)$ 和 $\varepsilon(B)$ 分别是测量 A 与 B 时的实验误差。这一关系已被证明是成立的, 前提是某个可信的假设 (相信对目前所有可用的测量设备都是成立的) 成立 (见上文引用的小泽论文参考文献 6-12)。

例题: 式 (3.91)、(3.92)、(3.39)、(3.89) 之后的等式和问题 3.48 指出: 对于单粒子三维系统的基态, 有

$$\langle x \rangle = \frac{a}{2}, \quad \langle x^2 \rangle = \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2\pi^2} \right) a^2, \quad \langle p_x \rangle = 0, \quad \langle p_x^2 \rangle = \frac{h^2}{4a^2}$$

使用这些结果证明该系统是否遵守不确定性原理 (5.13)。

我们有

$$(\Delta x)^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2 = \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2\pi^2} \right) a^2 - \frac{a^2}{4} = \frac{\pi^2 - 6}{12\pi^2} a^2$$

$$\Delta x = \left(\frac{\pi^2 - 6}{12} \right)^{1/2} \frac{a}{\pi}$$

$$\Delta p_x = \langle p_x^2 \rangle - \langle p_x \rangle^2 = \frac{h^2}{4a^2}, \quad \Delta p_x = \frac{h}{2a}$$

$$\Delta x \Delta p_x = \left(\frac{\pi^2 - 6}{12} \right)^{1/2} \frac{h}{2\pi} = 0.568\hbar > \frac{1}{2}\hbar$$

还有一种涉及能量和时间的不确定关系：

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{1}{2}\hbar \quad (5.15)$$

一些文章指出：(5.15) 是通过将 $i\hbar \partial/\partial t$ 作为能量算符，并乘以 t 作为时间算符而从 (5.12) 推导出来的。然而，能量算符是哈密顿 $\hat{H}$ ，而不是 $i\hbar \partial/\partial t$ 。此外，时间不是一种可观测的参数，而是量子力学中的一个参数。因此，不存在量子力学的时间算符（量子力学中的名词 **可观测** (observable) 指的是系统的物理可测量属性）。方程 (5.15) 必须通过特殊处理才能得出，我们略去不表（见 Ballentine, 第 12.3 节）。式 (5.15) 的推导表明： Δt 被解释为能量不确定度为 ΔE 的状态的时间寿命。通常情况下，(5.15) 中的 Δt 是能量测量的持续时间。然而，Aharonov 和 Bohm 已经证明：“能量可以在任意短的时间内重复测量”[Y. Aharonov and D. Bohm, *Phys. Rev.*, 122, 1649 (1961); 134, B1417 (1964); see also S. Massar and S. Popescu, *Phys. Rev. A*, 71, 042106 (2005); P. Busch, *The Time-Energy Uncertainty Relation*, arxiv.org/abs/quant-ph/0105049].

现在，我们来考虑同时为三个物理量赋予确定值的可能性：假设

$$[\hat{A}, \hat{B}] = 0, \quad [\hat{A}, \hat{C}] = 0 \quad (5.16)$$

这是否足以确保存在三个算符的同时本征函数？由于 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ ，我们可以为 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 构造一组共同的本征函数。由于 $[\hat{A}, \hat{C}] = 0$ ，我们可以为 $\hat{A}$ 和 $\hat{C}$ 构造一组共同的本征函数。如果这两组本征函数是相同的，那么我们会为所有三个算符找到一组共同的本征函数。因此我们要问：线性算符 $\hat{A}$ 的本征函数集是唯一确定的吗（除了乘以任意常数）？一般来说，答案都是否。如果与 $\hat{A}$ 的本征值相对应的独立本征函数不止一个（即简并），那么简并本征值的本征函数的任何线性组合都是 $\hat{A}$ 的本征函数（第 3.6 节）。给出 $\hat{B}$ 本征函数所需的适当线性组合很可能与给出 $\hat{C}$ 本征函数的线性组合不同。事实上，要想拥有三个算符的共同完整的本征函数集，除了满足式 (5.16) 外，还需要满足 $[\hat{B}, \hat{C}] = 0$ 。要有一组完整的函数同时是几个算符的本征函数，每个算符必须与其他每个算符可对易。

5.2 矢量

下一节我们将求解角动量的本征值问题，角动量是一种矢量。因此，我们首先回顾一下矢量。

完全由大小指定的物理属性（如质量、长度、能量）称为**标量** (scalar)。需要同时指定大小和方向的物理属性（如力、速度、动量）称为**矢量** (vector)。矢量由一条有方向的线段表示，其长度和方向表示属性的大小和方向。

两个矢量 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 的和由如下过程定义：滑动第一个矢量，使其终点与第二个矢量的起点重合，同时保持其方向不变。然后从第二个矢量的尾部到第一个矢量的头部绘制一个新的矢量。参见图 5.1。矢量与标量乘积 $c\mathbf{A}$ 定义为：长度为 $|c|$ 的矢量长度乘以 $\mathbf{A}$ 的长度，若 c 为正，则方向与 $\mathbf{A}$ 相同；若 c 为负，则方向与 $\mathbf{A}$ 相反。





图 5.1: 两个矢量的和

图 5.2: 单位矢量 $\mathbf{i}$ 、 $\mathbf{j}$ 和 $\mathbf{k}$, $\mathbf{A}$ 的三个分量

为了获得表示矢量的代数（以及几何）方法，我们在空间中建立了笛卡尔坐标。我们在 x 轴正方向画一个单位矢量，称为 $\mathbf{i}$ （与虚数单位没有关系）。 y 轴和 z 轴的单位矢量分别称为 $\mathbf{j}$ 和 $\mathbf{k}$ （图 5.2）。为了用这三个单位矢量表示空间中的任意矢量 $\mathbf{A}$ ，我们首先将 $\mathbf{A}$ 的起点与原点重合，保持其方向不变。然后，我们找到 $\mathbf{A}$ 在 x 轴、 y 轴和 z 轴上的投影，分别为 A_x 、 A_y 和 A_z 。由矢量加和的定义，我们有（图 5.2）：

$$\boxed{\mathbf{A} = A_x \mathbf{i} + A_y \mathbf{j} + A_z \mathbf{k}} \quad (5.17)$$

我们可以通过指定 $\mathbf{A}$ 的三个分量（ A_x 、 A_y 和 A_z ）来指定矢量 $\mathbf{A}$ 。因此，三维空间中的矢量可以定义为由三个数组成的有序集合。

当且仅当两个矢量所有对应的分量都相等时： $A_x = B_x$ 、 $A_y = B_y$ 和 $A_z = B_z$ ，我们才说这两个向量 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 相等。因此，一个矢量方程等价于三个标量方程。

为了将两个矢量相加，我们将它们对应的分量相加：

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = A_x \mathbf{i} + A_y \mathbf{j} + A_z \mathbf{k} + B_x \mathbf{i} + B_y \mathbf{j} + B_z \mathbf{k}$$

$$\boxed{\mathbf{A} + \mathbf{B} = (A_x + B_x) \mathbf{i} + (A_y + B_y) \mathbf{j} + (A_z + B_z) \mathbf{k}} \quad (5.18)$$

若 c 是标量，则

$$\boxed{c\mathbf{A} = cA_x \mathbf{i} + cA_y \mathbf{j} + cA_z \mathbf{k}} \quad (5.19)$$

矢量 $\mathbf{A}$ 的模 (magnitude) 为它的长度, 由 A 或 $|\mathbf{A}|$ 表示。模 A 是一个标量。

两个矢量 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ 的点积 (dot product) 或数量积 (scalar product) 定义为

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \cos \theta = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} \quad (5.20)$$

其中 θ 是 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 之间的夹角。点积是三个标量的乘积, 因此是一个标量。注意 $|\mathbf{A}| \cos \theta$ 是 $\mathbf{A}$ 在 $\mathbf{B}$ 方向上的投影。根据矢量加法的定义, 可以得出矢量 $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ 在某个矢量 $\mathbf{C}$ 上的投影是 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 在 $\mathbf{C}$ 上的投影之和。因此,

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) + (\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}) \quad (5.21)$$

由于三个单位矢量 $\mathbf{i}$ 、 $\mathbf{j}$ 和 $\mathbf{k}$ 的长度均为单位长度且互相垂直, 我们有

$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{k} = \cos 0 = 1, \quad \mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{i} \cdot \mathbf{k} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{k} = \cos(\pi/2) = 0 \quad (5.22)$$

使用 (5.22) 和分配律 (5.21), 我们有

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = (A_x \mathbf{i} + A_y \mathbf{j} + A_z \mathbf{k}) \cdot (B_x \mathbf{i} + B_y \mathbf{j} + B_z \mathbf{k})$$

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z \quad (5.23)$$

其中点积的 9 项中有 6 项为零。

由式 (5.20) 有

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = |\mathbf{A}|^2 \quad (5.24)$$

使用式 (5.23), 我们有

$$|\mathbf{A}| = (A_x^2 + A_y^2 + A_z^2)^{1/2} \quad (5.25)$$

对于三维矢量, 还有另一种乘积方式。 $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ 的叉积 (cross product) 或向量积 (vector product) 是一个新的矢量, 其模为

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \sin \theta \quad (5.26)$$

其线段垂直于 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 所在的平面, 其方向与 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 形成一个右手定则的系统 (与 x 轴、 y 轴和 z 轴的右手定则相同)。见图 5.3。因此, 由定义, 我们有

$$\mathbf{B} \times \mathbf{A} = -\mathbf{A} \times \mathbf{B}$$

同样地 (见 *Taylor and Mann*, Section 10.2)

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \times \mathbf{B} + \mathbf{A} \times \mathbf{C} \quad (5.27)$$

对于三个单位向量, 我们有




图 5.3: 两个矢量的叉积

$$\mathbf{i} \times \mathbf{i} = \mathbf{j} \times \mathbf{j} = \mathbf{k} \times \mathbf{k} = \sin 0 = 0$$

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}, \quad \mathbf{j} \times \mathbf{i} = -\mathbf{k}, \quad \mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{j} = -\mathbf{i}, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}, \quad \mathbf{i} \times \mathbf{k} = -\mathbf{j}$$

使用这些等式及分配律 (5.27)，我们有

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \times \mathbf{B} &= (A_x \mathbf{i} + A_y \mathbf{j} + A_z \mathbf{k}) \times (B_x \mathbf{i} + B_y \mathbf{j} + B_z \mathbf{k}) \\ \mathbf{A} \times \mathbf{B} &= (A_y B_z - A_z B_y) \mathbf{i} + (A_z B_x - A_x B_z) \mathbf{j} + (A_x B_y - A_y B_x) \mathbf{k} \end{aligned}$$

为了便于记忆，我们可以将叉积表示为行列式（见第 8.3 节）：

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = \mathbf{i} \begin{vmatrix} A_y & A_z \\ B_y & B_z \end{vmatrix} - \mathbf{j} \begin{vmatrix} A_x & A_z \\ B_x & B_z \end{vmatrix} + \mathbf{k} \begin{vmatrix} A_x & A_y \\ B_x & B_y \end{vmatrix} \quad (5.28)$$

我们定义如下的矢量**微分** (del) 算符：

$$\nabla \equiv \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z} \quad (5.29)$$

则由式 (3.23)，线动量的矢量算符为 $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla$ 。

函数 $g(x, y, z)$ 的**梯度** (gradient) 定义为将微分算符作用到函数 g 上的结果：

$$\mathbf{grad} g(x, y, z) \equiv \nabla g(x, y, z) \equiv \mathbf{i} \frac{\partial g}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial g}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial g}{\partial z} \quad (5.30)$$

一个标量函数的梯度为一个矢量函数。矢量 $\nabla g(x, y, z)$ 代表函数 g 的空间变化率： ∇g 在 x 方向的分量表示函数 g 在 x 方向的变化率，以此类推。可以证明，矢量 ∇g 指向 g 变化率最大的方向。由式 (4.24)，势能和力之间的关系为

$$\mathbf{F} = -\nabla V(x, y, z) = -\mathbf{i} \frac{\partial V}{\partial x} - \mathbf{j} \frac{\partial V}{\partial y} - \mathbf{k} \frac{\partial V}{\partial z} \quad (5.31)$$

假设某矢量 $\mathbf{A}$ 的三个分量是某参数 t 的函数，即 $A_x = A_x(t)$ 、 $A_y = A_y(t)$ 和 $A_z = A_z(t)$ 。则我们将 $\mathbf{A}$ 对 t 的**导数** (derivative) 定义为

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \mathbf{i} \frac{dA_x}{dt} + \mathbf{j} \frac{dA_y}{dt} + \mathbf{k} \frac{dA_z}{dt} \quad (5.32)$$

矢量符号是表示函数变量的一种便捷方法。双粒子系统波函数可以写作 $\psi(x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2)$ ，如果矢量 $\mathbf{r}_1$ 从原点指向粒子 1，那么 $\mathbf{r}_1$ 就具有 x, y, z 三个方向的分量，指定 $\mathbf{r}_1$ 等同于指定三个坐标 x, y, z 。 $\mathbf{r}_2$ 也是如此。因此，我们可以将波函数写成 $\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$ 。矢量符号也可以用在积分中，例如式 (3.57) 对全空间的积分经常写成 $\int \cdots \int |\Psi(\mathbf{r}_1, \cdots, \mathbf{r}_n)|^2 d\mathbf{r}_1 \cdots d\mathbf{r}_n$ 。

n 维空间的矢量

矢量的定义可以推广到三维以上的空间。三维空间中的矢量 $\mathbf{A}$ 可以由其模 $|\mathbf{A}|$ 和方向来定义；若在笛卡尔坐标系中，还可以用其三个分量 (A_x, A_y, A_z) 来定义。因此，我们可以把三维矢量定义为按特定顺序排列的三个实数 (A_x, A_y, A_z) 的集合。 n 维实数矢量“空间”（有时称为超空间）中的矢量 $\mathbf{B}$ 定义为 n 个实数的有序集合 $(B_1, B_2, \cdots, B_n)$ ，其中 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 是 $\mathbf{B}$ 的**分量** (components)。不要担心无法将 n 维空间中的矢量可视化。

函数的变量通常使用 n 维矢量符号表示。例如，在双粒子系统中，与 $\psi(x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2)$ 不同，我们可以定义一个六维矢量 $\mathbf{q}$ ，其分量满足 $q_1 = x_1, q_2 = y_1, q_3 = z_1, q_4 = x_2, q_5 = y_2, q_6 = z_2$ ，

且将波函数写成 $\psi(\mathbf{q})$ 。对于有 n 个粒子的系统，我们可以定义一个有 $3n$ 个分量的矢量 $\mathbf{q}$ ，将波函数写成 $\psi(\mathbf{q})$ ，使用 $\int |\psi(\mathbf{q})|^2 d\mathbf{q}$ 来进行归一化处理。

寻找分子平衡几何的理论使用 n 维矢量（第 15.10 节）。第 5.2 节的其余部分与第 15.10 节相关，在学习第 15.10 节之前不必阅读。

当且仅当 n 维矢量 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{C}$ 的所有分量都相等时： $B_1 = C_1, B_2 = C_2, \dots, B_n = C_n$ ，我们才说这两个向量**相等** (equal)。因此，在 n 维空间中，一个矢量方程等价于 n 个标量方程。两个 n 维矢量 $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{D}$ 和 (sum) 的定义为矢量 $(B_1 + D_1, B_2 + D_2, \dots, B_n + D_n)$ 。矢量的差定义类似。矢量 $k\mathbf{B}$ 定义为矢量 $(kB_1, kB_2, \dots, kB_n)$ ，其中 k 是标量。在三维空间中，若 $k > 0$ ，则矢量 $k\mathbf{A}$ 的方向一致。在 n 维空间中亦然。与实数对 (A_x, A_y, A_z) 定义三维空间中的一个点类似， $(B_1, B_2, \dots, B_n)$ 定义 n 维空间中的一个**点** (point)。

n 维实数矢量的**长度** (length) (或**大小** (magnitude) 或**欧几里得范数** (Euclidean norm)) $|\mathbf{B}|$ (有时表示为 $\|\mathbf{B}\|$) 定义为

$$|\mathbf{B}| \equiv (\mathbf{B} \cdot \mathbf{B})^{1/2} = (B_1^2 + B_2^2 + \dots + B_n^2)^{1/2}$$

长度为 1 的矢量称为**归一化的** (normalized)。

两个 n 维矢量 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{G}$ 的**内积** (inner product) 或**数量积** (scalar product) 定义为标量

$$\mathbf{B} \cdot \mathbf{G} \equiv B_1 G_1 + B_2 G_2 + \dots + B_n G_n$$

若 $\mathbf{B} \cdot \mathbf{G} = 0$ ，则称 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{G}$ **正交** (orthogonal)。由式 (5.20)，两个 n 维矢量夹角 θ 的余弦值定义为 $\cos \theta \equiv (\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}) / |\mathbf{B}| |\mathbf{C}|$ 。我们可以证明，这个定义使得 θ 位于 -1 到 1 的范围内。

在三维空间内，单位矢量 $\mathbf{i} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{j} = (0, 1, 0)$, $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$ 互相垂直。因此，任意矢量都可以表示为这三个矢量的线性组合 [式 (5.17)]。在 n 维空间中，单位矢量 $\mathbf{e}_1 \equiv (1, 0, \dots, 0)$, $\mathbf{e}_2 \equiv (0, 1, \dots, 0)$, $\dots$, $\mathbf{e}_n \equiv (0, 0, \dots, 1)$ 互相正交。由于任意 n 维矢量 $\mathbf{B}$ 等于 $B_1 \mathbf{e}_1 + B_2 \mathbf{e}_2 + \dots + B_n \mathbf{e}_n$ ，任意 n 维矢量都可以表示为这 n 个单位矢量的线性组合。因此，这 n 个矢量可以说是 n 维实数矢量空间的**基** (basis)。由于矢量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ 是正交且归一的，它们是这个实矢量空间的**正交基** (orthonormal basis)。点积 $\mathbf{B} \cdot \mathbf{e}_i$ 给出了矢量 $\mathbf{B}$ 在 $\mathbf{e}_i$ 方向上的分量。矢量空间有许多可能的基集。任何由 n 个线性无关的实矢量组成的集合都可以作为 n 维实矢量空间的基。

一个三维矢量可以用它的三个分量来指定，也可以用它的长度和方向来指定。可以通过给出矢量与 x 、 y 和 z 轴正半轴所成的三个角度来指定方向。这些角度称为矢量的**方向角** (direction angles)，其值在 0 到 π 之间。但是，一旦给出了其他两个方向角， z 轴的方向角就会固定下来，因此只有两个方向角是独立的。因此，一个三维矢量可以用长度和两个方向角来表示。同样，在 n 维空间中，一个矢量和每个单位矢量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ 之间的方向角也可以根据上述两个矢量之间夹角的余弦公式求出。因此，一个 n 维矢量可以用它的长度和 $n - 1$ 个方向角来指定。

三变量函数的梯度由 (5.30) 定义。 n 变量函数 $f(q_1, q_2, \dots, q_n)$ 的**梯度** (gradient) 定义为 n 维矢量，其分量分别为 f 对每个变量的一阶偏导数：

$$\nabla f \equiv (\partial f / \partial q_1) \mathbf{e}_1 + (\partial f / \partial q_2) \mathbf{e}_2 + \dots + (\partial f / \partial q_n) \mathbf{e}_n$$

我们考虑的是实数 n 维矢量空间。狄拉克 (Dirac) 对量子力学的表述使用的是复数、无穷维的矢量空间，对它的讨论从略。

5.3 单粒子系统的角动量

在第 3.3 节中，我们找到了线动量算符 $\hat{p}_x$ 的本征函数和对应的本征值。本节中我们对粒子的角动量进行类似的分析。角动量在原子结构的量子力学中扮演重要的角色。我们从回顾经典力学的角

动量开始。

单粒子的经典力学角动量

考虑一个质量为 m 的运动粒子。我们建立一个固定在空间的直角坐标系。设 $\mathbf{r}$ 为从原点指向粒子瞬时位置的矢量，我们有

$$\mathbf{r} = ix + jy + kz \quad (5.33)$$

其中 x 、 y 和 z 是粒子在给定瞬间的坐标。这些坐标是时间的函数。将速度矢量 $\mathbf{v}$ 定义为粒子位置矢量 $\mathbf{r}$ 对时间的导数，我们有 [式 (5.32)]

$$\mathbf{v} \equiv \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{i} \frac{dx}{dt} + \mathbf{j} \frac{dy}{dt} + \mathbf{k} \frac{dz}{dt} \quad (5.34)$$

$$v_x = dx/dt, \quad v_y = dy/dt, \quad v_z = dz/dt$$

我们定义粒子的**线动量** (linear momentum) 的矢量 $\mathbf{p}$ 为

$$\boxed{\mathbf{p} \equiv m\mathbf{v}} \quad (5.35)$$

$$p_x = mv_x, \quad p_y = mv_y, \quad p_z = mv_z \quad (5.36)$$

粒子相对于坐标原点的**角动量** (angular momentum) $\mathbf{L}$ 在经典力学中定义为

$$\boxed{\mathbf{L} \equiv \mathbf{r} \times \mathbf{p}} \quad (5.37)$$

$$\mathbf{L} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x & y & z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix} \quad (5.38)$$

$$L_x = yp_z - zp_y, \quad L_y = zp_x - xp_z, \quad L_z = xp_y - yp_x \quad (5.39)$$

其中，我们用到了式 (5.28)。 L_x 、 L_y 和 L_z 分别是角动量矢量 $\mathbf{L}$ 在 x 、 y 和 z 方向上的分量。角动量向量的方向垂直于由粒子的位置矢量 $\mathbf{r}$ 和速度矢量 $\mathbf{v}$ 所确定的平面 (图5.4)。




图 5.4: $\mathbf{L} \equiv \mathbf{r} \times \mathbf{p}$

作用在粒子上的**力矩** (torque) $\boldsymbol{\tau}$ 定义为力 $\mathbf{F}$ 和位置矢量 $\mathbf{r}$ 的叉积: $\boldsymbol{\tau} \equiv \mathbf{r} \times \mathbf{F}$ 。可以证明: $\boldsymbol{\tau} = d\mathbf{L}/dt$ 。当没有力矩作用于粒子时, 其角动量的变化率为零; 也就是说, 其角动量是恒定的 (或守恒的)。对于绕太阳运行的行星来说, 引力是沿径向分布的。由于两个平行矢量的叉积为零, 因此行星上没有力矩, 其角动量是守恒的。

单粒子轨道角动量算符

现在, 让我们来看看量子力学的处理方法。量子力学中有两种角动量。**轨道角动量** (orbital angular momentum) 是粒子在空间运动的结果, 与经典力学量 $\mathbf{L}$ 类似。**自旋角动量** (spin angular momentum) (第10章) 是许多微观粒子的固有属性, 与经典力学没有类似之处。我们现在只考虑轨道角动量。将经典方程 (5.39) 中的坐标和角动量替换为相应的算符 [式 (3.21)-(3.23)], 我们就得到了粒子轨道角动量分量的量子力学算符。有

$$\hat{L}_x = -i\hbar \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right) \quad (5.40)$$

$$\hat{L}_y = -i\hbar \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right) \quad (5.41)$$

$$\hat{L}_z = -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right) \quad (5.42)$$

(由于 $\hat{y}\hat{p}_z = \hat{p}_z\hat{y}$ 等, 我们在构造这些算符时不会遇到不可对易的问题)。使用

$$\hat{L}^2 = |\hat{\mathbf{L}}|^2 = \hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{L}} = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2 \quad (5.43)$$

我们可以根据 (5.40)-(5.42) 中的算符构建角动量大小平方的算符。

由于对易关系决定了哪些物理量可以同时被赋予定值, 我们对角动量的对易关系进行了研究。将算符 $\hat{L}_y$ 作用到函数 $f(x, y, z)$ 上, 我们有

$$\hat{L}_y f(x, y, z) = -i\hbar \left(z \frac{\partial f}{\partial x} - x \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

将 $\hat{L}_x$ 作用到上一个方程上, 我们有

$$\hat{L}_x \hat{L}_y f = -\hbar^2 \left(y \frac{\partial f}{\partial x} + yz \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} - yx \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} - z^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} + zx \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} \right) \quad (5.44)$$

同样地,

$$\hat{L}_x f = -i\hbar \left(y \frac{\partial f}{\partial z} - z \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

将 $\hat{L}_y$ 作用到上一个方程上, 我们有

$$\hat{L}_y \hat{L}_x f = -\hbar^2 \left(zy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} - z^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} - xy \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} + x \frac{\partial f}{\partial y} + xz \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} \right) \quad (5.45)$$

(5.44) 减去 (5.45), 我们得到

$$\begin{aligned} \hat{L}_x \hat{L}_y f - \hat{L}_y \hat{L}_x f &= -\hbar^2 \left(y \frac{\partial f}{\partial x} - x \frac{\partial f}{\partial y} \right) \\ [\hat{L}_x, \hat{L}_y] &= i\hbar \hat{L}_z \end{aligned} \quad (5.46)$$

其中我们用到了类似以下的关系:

$$\boxed{\frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}} \quad (5.47)$$

对于品优函数是正确的。我们可以用相同的过程求出 $[\hat{L}_y, \hat{L}_z]$ 和 $[\hat{L}_z, \hat{L}_x]$ 。但我们可以通过注意 (5.40)-(5.42) 中的某种对称性来节省时间。所谓 x 、 y 和 z 的**循环排列** (cyclic permutation) 是指用 y 替换 x , 用 z 替换 y , 用 x 替换 z 。如果我们在 $\hat{L}_x$ 中进行循环排列, 就得到了 $\hat{L}_y$, 在 $\hat{L}_y$ 中进




图 5.5: 球面坐标

行循环排列就得到了 $\hat{L}_z$ ，在 $\hat{L}_z$ 中进行循环排列就得到了 $\hat{L}_x$ 。因此，对 (5.46) 连续进行两次循环置换，就可以得到

$$[\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar \hat{L}_x, \quad [\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar \hat{L}_y \quad (5.48)$$

接下来，我们利用第5.1节中对易子的性质，求 $\hat{L}^2$ 和它对应分量的对易子。

$$\begin{aligned} [\hat{L}^2, \hat{L}_x] &= [\hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2, \hat{L}_x] \\ &= [\hat{L}_x^2, \hat{L}_x] + [\hat{L}_y^2, \hat{L}_x] + [\hat{L}_z^2, \hat{L}_x] \\ &= [\hat{L}_y^2, \hat{L}_x] + [\hat{L}_z^2, \hat{L}_x] \\ &= \hat{L}_y [\hat{L}_y, \hat{L}_x] + [\hat{L}_y, \hat{L}_x] \hat{L}_y + [\hat{L}_z, \hat{L}_x] \hat{L}_z + \hat{L}_z [\hat{L}_z, \hat{L}_x] \\ &= -i\hbar \hat{L}_z \hat{L}_y - i\hbar \hat{L}_y \hat{L}_z + i\hbar \hat{L}_y \hat{L}_z + i\hbar \hat{L}_z \hat{L}_y \\ &= 0 \end{aligned} \quad (5.49)$$

对 x, y 和 z 进行循环替换后， $\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2$ 没有变化，如果对式 (5.49) 进行循环替换，我们就可以得到

$$[\hat{L}^2, \hat{L}_y] = 0, \quad [\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0 \quad (5.50)$$

我们可以给 L, L_x, L_y, L_z 中的哪些量赋定值？由于 $\hat{L}^2$ 与其所有分量对应算符均可对易，我们可以为 L^2 和其任意一个分量指定一个精确的值。然而， $\hat{\mathbf{L}}$ 的任意两个分量之间都不存在对易关系，因此我们不能同时确定多个分量（这个说法有一个例外，稍后讨论）。传统的做法是将 L_z 作为角动量的分量，与 L^2 一起指定。注意：在指定 $L^2 = |\mathbf{L}|^2$ 的值时，我们并没有指定矢量 $\mathbf{L}$ 的方向。我们只指定了其大小。完整指定 $\mathbf{L}$ 需要同时指定其三个分量，这是我们做不到的。在经典力学中，当角动量守恒时，其三个分量均具有确定的值。而在量子力学中，当角动量守恒时，只有其大小和其中一个分量是确定的。

现在，使用这些算符在空间直角坐标系中的形式，我们尝试求出 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的本征函数和本征值。然而，我们会发现得到的偏微分方程无法分离变量。因此，我们将这些算符转换为**球面坐标** (spherical coordinate)。坐标 r 表示点 (x, y, z) 到原点的距离。而角度 θ 是矢量 $\mathbf{r}$ 与 z 轴正半轴之间的夹角， ϕ 是矢量 $\mathbf{r}$ 在 xOy 平面上的投影与 x 轴正半轴之间的夹角（数学书通常将 θ 与 ϕ 互换）。使用三角法计算，有

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \theta \quad (5.51)$$

$$r^2 = x^2 + y^2 + z^2, \quad \cos \theta = \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}}, \quad \tan \phi = \frac{y}{x} \quad (5.52)$$

为了将角动量算符转换为球坐标, 我们需要对 $\partial/\partial x$ 、 $\partial/\partial y$ 和 $\partial/\partial z$ 进行球坐标变换 [如果需要, 可以略读这一变换。在 (5.64) 之后重新开始阅读]。

要进行这种变换, 我们需要使用链式法则 (chain rule)。假设我们有一个关于 r 、 θ 和 ϕ 的函数 $f(r, \theta, \phi)$ 。如果我们改变自变量, 将

$$r = r(x, y, z), \quad \theta = \theta(x, y, z), \quad \phi = \phi(x, y, z)$$

带入 f , 我们就将其变换为 x 、 y 和 z 的函数

$$f[r(x, y, z), \theta(x, y, z), \phi(x, y, z)] = g(x, y, z)$$

例如, 假设 $f(r, \theta, \phi) = 3r \cos \theta + 2 \tan^2 \phi$ 。使用式 (5.52), 我们有 $g(x, y, z) = 3z + 2y^2/x^2$ 。

链式法则告诉我们 $g(x, y, z)$ 的偏导数是如何与 $f(r, \theta, \phi)$ 的偏导数联系起来的。事实上,

$$\left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)_{y,z} = \left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_{\theta,\phi} \left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)_{y,z} + \left(\frac{\partial f}{\partial \theta}\right)_{r,\phi} \left(\frac{\partial \theta}{\partial x}\right)_{y,z} + \left(\frac{\partial f}{\partial \phi}\right)_{r,\theta} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_{y,z} \quad (5.53)$$

$$\left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)_{x,z} = \left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_{\theta,\phi} \left(\frac{\partial r}{\partial y}\right)_{x,z} + \left(\frac{\partial f}{\partial \theta}\right)_{r,\phi} \left(\frac{\partial \theta}{\partial y}\right)_{x,z} + \left(\frac{\partial f}{\partial \phi}\right)_{r,\theta} \left(\frac{\partial \phi}{\partial y}\right)_{x,z} \quad (5.54)$$

$$\left(\frac{\partial g}{\partial z}\right)_{x,y} = \left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_{\theta,\phi} \left(\frac{\partial r}{\partial z}\right)_{x,y} + \left(\frac{\partial f}{\partial \theta}\right)_{r,\phi} \left(\frac{\partial \theta}{\partial z}\right)_{x,y} + \left(\frac{\partial f}{\partial \phi}\right)_{r,\theta} \left(\frac{\partial \phi}{\partial z}\right)_{x,y} \quad (5.55)$$

为了将这些方程转换为算符方程, 我们删去 f 和 g , 得出

$$\frac{\partial}{\partial x} = \left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)_{y,z} \frac{\partial}{\partial r} + \left(\frac{\partial \theta}{\partial x}\right)_{y,z} \frac{\partial}{\partial \theta} + \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_{y,z} \frac{\partial}{\partial \phi} \quad (5.56)$$

$\partial/\partial y$ 和 $\partial/\partial z$ 的方程类似。现在的任务是计算类似于 $(\partial r/\partial x)_{y,z}$ 的偏导数。将 (5.52) 中第一个方程在 y 和 z 恒定的条件下对 x 求偏导数, 我们有

$$2r \left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)_{y,z} = 2x = 2r \sin \theta \cos \phi$$

$$\left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)_{y,z} = \sin \theta \cos \phi \quad (5.57)$$

将式 $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$ 对 y 和 z 求偏导数, 我们有

$$\left(\frac{\partial r}{\partial y}\right)_{x,z} = \sin \theta \cos \phi, \quad \left(\frac{\partial r}{\partial z}\right)_{x,y} = \cos \theta \quad (5.58)$$

由 (5.52) 中第二个方程, 我们有

$$-\sin \theta \left(\frac{\partial \theta}{\partial x}\right)_{y,z} = -\frac{xz}{r^3}$$

$$\left(\frac{\partial \theta}{\partial x}\right)_{y,z} = \frac{\cos \theta \cos \phi}{r} \quad (5.59)$$

同样地,

$$\left(\frac{\partial \theta}{\partial y}\right)_{x,z} = \frac{\cos \theta \sin \phi}{r}, \quad \left(\frac{\partial \theta}{\partial z}\right)_{x,y} = -\frac{\sin \theta}{r} \quad (5.60)$$

由 $\tan \phi = y/x$, 我们有

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_{y,z} = -\frac{\sin \phi}{r \sin \theta}, \quad \left(\frac{\partial \phi}{\partial y}\right)_{x,z} = \frac{\cos \phi}{r \sin \theta}, \quad \left(\frac{\partial \phi}{\partial z}\right)_{x,y} = 0 \quad (5.61)$$

将 (5.57)、(5.59) 和 (5.61) 代入 (5.56), 我们得到

$$\frac{\partial}{\partial x} = \sin \theta \cos \phi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta \cos \phi}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} - \frac{\sin \phi}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \quad (5.62)$$

类似地, 我们可以得到

$$\frac{\partial}{\partial y} = \sin \theta \sin \phi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta \sin \phi}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\cos \phi}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \quad (5.63)$$

$$\frac{\partial}{\partial z} = \cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \quad (5.64)$$

最后，我们可以用球面坐标来表示角动量分量了。将 (5.51)、(5.63) 和 (5.64) 带入 (5.40)，得到

$$\begin{aligned}\hat{L}_x &= -i\hbar \left[r \sin \theta \sin \phi \left(\cos \theta \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right. \\ &\quad \left. - r \cos \theta \left(\sin \theta \sin \phi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta \sin \phi}{r} \frac{\partial}{\partial \phi} + \frac{\cos \phi}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \right] \\ \hat{L}_x &= i\hbar \left(\sin \phi \frac{\partial}{\partial \theta} - \cos \theta \cos \phi \frac{\partial}{\partial \phi} \right)\end{aligned}\quad (5.65)$$

同样，我们有

$$\hat{L}_y = -i\hbar \left(\cos \phi \frac{\partial}{\partial \theta} - \cot \theta \sin \phi \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \quad (5.66)$$

$$\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi} \quad (5.67)$$

对 $\hat{L}_x$ 、 $\hat{L}_y$ 和 $\hat{L}_z$ 进行平方并相加，我们可以构造出 $\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2$ [式 (5.43)]。结果为（问题 5.17）

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \cot \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right) \quad (5.68)$$

虽然角动量算符取决于所有三个直角坐标 x 、 y 和 z ，但它们只涉及两个球面坐标 θ 和 ϕ 。

单粒子轨道角动量的本征函数和本征值

我们现在希望找到 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的共同本征函数，记作 Y 。由于这些算符只涉及 θ 和 ϕ ，那么 Y 就是这两个变量的函数： $Y = Y(\theta, \phi)$ （当然，由于这些算符都是线性算符，我们可以用任意一个关于 r 的函数乘以 Y 而不改变 Y 是 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的本征函数的事实）。我们必须解以下方程：

$$\hat{L}_z Y(\theta, \phi) = bY(\theta, \phi) \quad (5.69)$$

$$\hat{L}^2 Y(\theta, \phi) = cY(\theta, \phi) \quad (5.70)$$

其中 b 和 c 分别是 $\hat{L}_z$ 和 $\hat{L}^2$ 的本征值。

使用算符 $\hat{L}_z$ ，我们有

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi} Y(\theta, \phi) = bY(\theta, \phi) \quad (5.71)$$

由于 (5.71) 中的算符不涉及 θ ，我们可以尝试分离变量。将 Y 写成

$$Y(\theta, \phi) = S(\theta)T(\phi) \quad (5.72)$$

则方程 (5.71) 变为

$$\begin{aligned}-i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi} [S(\theta)T(\phi)] &= bS(\theta)T(\phi) \\ -i\hbar S(\theta) \frac{dT(\phi)}{d\phi} &= bS(\theta)T(\phi) \\ \frac{dT(\phi)}{T(\phi)} &= \frac{ib}{\hbar} d\phi \\ T(\phi) &= Ae^{ib\phi/\hbar}\end{aligned}\quad (5.73)$$

其中 A 是任意常数。

T 适合作为本征函数吗。答案是否定的，因为它一般不是单值函数。如果我们将 ϕ 增加 2π ，我们仍将处于空间中的同一点，因此我们希望这样做时 T 保持不变。为了使 T 成为单值函数，我们需要做如下限制：

$$\begin{aligned} T(\phi + 2\pi) &= T(\phi) \\ Ae^{ib\phi/\hbar} e^{ib2\pi/\hbar} &= Ae^{ib\phi/\hbar} \\ e^{ib2\pi/\hbar} &= 1 \end{aligned} \quad (5.74)$$

为了满足 $e^{i\alpha} = \cos \alpha + i \sin \alpha = 1$ ，我们需要 $\alpha = 2\pi m$ ，其中

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm \dots$$

因此，由式 (5.74) 我们得到

$$\begin{aligned} 2\pi b/\hbar &= 2\pi m \\ b &= m\hbar, \quad m = \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots \end{aligned} \quad (5.75)$$

式 (5.73) 变为

$$T(\phi) = Ae^{im\phi}, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (5.76)$$

角动量在 z 方向分量的本征值是量子化的。

通过归一化 T ，我们可以确定常数 A 。首先，让我们考虑对关于 r 、 θ 和 ϕ 的函数 F 进行归一化。三个独立变量的取值范围是（见图 5.5）

$$0 \leq r \leq \infty, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \phi < 2\pi \quad (5.77)$$

球坐标系下的体积微元为（*Taylor and Mann*，第 13.9 节）

$$d\tau = r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi \quad (5.78)$$

(5.78) 是一个无限小区域空间的体积，其球面坐标位于 r 到 $r + dr$ 、 θ 到 $\theta + d\theta$ 和 ϕ 到 $\phi + d\phi$ 之间。因此，球坐标下 F 的归一化条件为

$$\int_0^\infty \left[\int_0^\pi \left[\int_0^{2\pi} |F(r, \theta, \phi)|^2 d\phi \right] \sin \theta d\theta \right] r^2 dr = 1 \quad (5.79)$$

如果 F 恰好可以写成

$$F(r, \theta, \phi) = R(r) S(\theta) T(\phi)$$

则对 (5.79) 使用积分 (3.74)，有

$$\int_0^\infty |R(r)|^2 r^2 dr \int_0^\pi |S(\theta)|^2 \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} |T(\phi)|^2 d\phi = 1$$

方便的做法是将 F 的每个因子都作归一化处理：

$$\int_0^\infty |R(r)|^2 r^2 dr = 1, \quad \int_0^\pi |S(\theta)|^2 \sin \theta d\theta = 1, \quad \int_0^{2\pi} |T(\phi)|^2 d\phi = 1 \quad (5.80)$$

因此，

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} (Ae^{im\phi})^* (Ae^{im\phi}) d\phi &= 1 = |A|^2 \int_0^{2\pi} d\phi \\ |A| &= (2\pi)^{-1/2} \end{aligned}$$

$$T(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\phi}, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (5.81)$$

我们现在尝试使用式 (5.70) 来求解 $\hat{L}^2$ 的本征值 c 。对 $\hat{L}^2$ 使用式 (5.68)、对 Y 使用式 (5.72)，由式 (5.81)，我们有

$$\begin{aligned} -\hbar^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \cot \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right) \left(S(\theta) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\phi} \right) &= c S(\theta) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\phi} \\ \frac{d^2 S}{d\theta^2} + \cot \theta \frac{dS}{d\theta} - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} S &= -\frac{c}{\hbar^2} S \end{aligned} \quad (5.82)$$

为了解方程 (5.82)，我们需要进行一些繁琐的操作，如果需要，可以略过不读。在式 (5.91) 处重新开始阅读。首先，为了方便起见，我们将自变量代替为

$$w = \cos \theta \quad (5.83)$$

将 S 变换为一个新的关于 w 的函数：

$$S(\theta) = G(w) \quad (5.84)$$

由链式法则，我们有

$$\frac{dS}{d\theta} = \frac{dG}{dw} \frac{dw}{d\theta} = -\sin \theta \frac{dG}{dw} = -(1-w^2)^{1/2} \frac{dG}{dw} \quad (5.85)$$

同样地，我们得出（问题 5.25）

$$\frac{d^2 S}{d\theta^2} = (1-w^2) \frac{d^2 G}{dw^2} - w \frac{dG}{dw} \quad (5.86)$$

由式 (5.86)、(5.85) 和 $\cot \theta = \cos \theta / \sin \theta = w / (1-w^2)^{1/2}$ ，我们可以将 (5.82) 重写为

$$(1-w^2) \frac{d^2 G}{dw^2} - 2w \frac{dG}{dw} + \left[\frac{c}{\hbar^2} - \frac{m^2}{1-w^2} \right] G(w) = 0 \quad (5.87)$$

w 的取值范围是 $-1 \leq w \leq 1$ 。

在尝试幂级数求解时，为了得到两项的递推关系，我们需要对因变量作如下改变：

$$G(w) = (1-w^2)^{|m|/2} H(w) \quad (5.88)$$

对 (5.88) 求导，我们得到了 G' 和 G'' ，在除以 $(1-w^2)^{|m|/2}$ 后，我们可以将 (5.87) 变为

$$(1-w^2) H'' - 2(|m|+1)wH' + [c\hbar^{-2} - |m|(|m|+1)]H = 0 \quad (5.89)$$

现在，我们尝试 H 的幂级数解

$$H(w) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n w^n \quad (5.90)$$

对其求导 [与式 (4.36)-(4.38) 类似]，我们有

$$H'(w) = \sum_{j=0}^{\infty} j a_j w^{j-1}$$

$$H''(w) = \sum_{j=0}^{\infty} j(j-1) a_j w^{j-2} = \sum_{j=0}^{\infty} (j+2)(j+1) a_{j+2} w^j$$

将这些幂级数带入式 (5.89)，合并求和后，有

$$\sum_{j=0}^{\infty} \left[(j+2)(j+1) a_{j+2} + \left(-j^2 - j - 2|m|j + \frac{c}{\hbar^2} - |m|^2 - |m| \right) a_j \right] w^j = 0$$

令 w^j 的系数为零，我们得到

$$a_{j+2} = \frac{(j+|m|)(j+|m|+1) - c/\hbar^2}{(j+1)(j+2)} a_j \quad (5.91)$$

与谐振子的例子一样，式 (5.89) 的通解也是偶次幂级数（系数由 a_0 决定）和奇次幂级数（系数由 a_1 决定）的任意线性组合。可以证明，由式 (5.91) 定义的无穷级数不是品优函数。[许多文献都指出：该级数在 $w = \pm 1$ 处发散。然而，这并不足以否定该无穷级数，因为本征函数是平方可积的，即使某两点上是无穷的。仔细讨论见 M. Whippman, Am. Phys., 34, 656 (1966)。] 因此，与谐振子的情况一致，我们必须让级数在某一项 $a_k w^k$ 处打断。根据 k 是奇数还是偶数，我们设 a_0 或 a_1 为零，从而消除其他级数。

令式 (5.91) 中 a_k 的系数为零，得到

$$c = \hbar^2 (k + |m|) (k + |m| + 1), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (5.92)$$

由于 $|m|$ 的值为 $0, 1, 2, \dots$ ， $k + |m|$ 的值为 $0, 1, 2, \dots$ 。因此，我们可以定义量子数 l 为

$$l = k + |m| \quad (5.93)$$

角动量大小平方的本征值为

$$c = l(l+1)\hbar^2, \quad l = 0, 1, 2, \dots \quad (5.94)$$

单粒子轨道角动量的大小为

$$|\mathbf{L}| = [l(l+1)]^{1/2} \hbar \quad (5.95)$$

由式 (5.93) 有 $|m| = l$ 。因此， m 的取值范围为

$$m = -l, -l+1, -l+2, \dots, -1, 0, 1, \dots, l-2, l-1, l \quad (5.96)$$

现在让我们检查角动量的本征函数。由式 (5.83)、(5.84)、(5.88)、(5.90) 和 (5.93)，本征函数中的 θ 因子为

$$S_{l,m}(\theta) = \sin^{|m|} \theta \sum_{\substack{j=1,3,\dots \\ j=0,2,\dots}}^{l-|m|} a_j \cos^j \theta \quad (5.97)$$

其中， $l - |m|$ 的奇偶性决定求和从 $j = 1$ 还是 $j = 0$ 开始。使用式 (5.94)， a_j 的系数满足的递推关系 (5.91) 可以写成

$$a_{j+2} = \frac{(j + |m|)(j + |m| + 1) - l(l+1)}{(j+1)(j+2)} a_j \quad (5.98)$$

$\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的本征函数由式 (5.72) 和式 (5.81) 给出：

$$Y_l^m(\theta, \phi) = S_{l,m}(\theta) T(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} S_{l,m}(\theta) e^{im\phi} \quad (5.99)$$

Y_l^m 中的 m 是一个标签，而不是指数。

例题：分别求当 (a) $l = 0$ ；(b) $l = 1$ 时 $Y_l^m(\theta, \phi)$ 、 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的本征值。

(a) 对于 $l = 0$ ，由式 (5.96)，有 $m = 0$ 。则式 (5.97) 变为

$$S_{0,0}(\theta) = a_0 \quad (5.100)$$

由归一化条件 (5.80)，我们有

$$\int_0^\pi |a_0|^2 \sin \theta d\theta = 1 = 2|a_0|^2$$

$$|a_0| = 2^{-1/2}$$

则式 (5.99) 变为

$$Y_0^0(\theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \quad (5.101)$$

[显然, 式 (5.101) 是 $\hat{L}^2$ 、 $\hat{L}_x$ 、 $\hat{L}_y$ 和 $\hat{L}_z$ 的本征函数, 方程 (5.65)-(5.68)。] 对于 $l = 0$, 本征函数不存在角度依赖关系, 我们说本征函数是**球对称的** (spherically symmetric)。

对于 $l = 0$ 和 $m = 0$, 由式 (5.69)、(5.70)、(5.75) 和 (5.94), 我们有 $\hat{L}^2$ 的本征值为 $c = 0$, $\hat{L}_z$ 的本征值为 $b = 0$ 。

(b) 对于 $l = 1$, 由式 (5.96), 有 $m = -1, 0, 1$ 。当 $|m| = 1$ 时, 式 (5.97) 变为

$$S_{1,\pm 1}(\theta) = a_0 \sin \theta \quad (5.102)$$

(5.102) 中的 a_0 和 (5.100) 中的 a_0 不一定相等。由归一化条件, 有

$$1 = |a_0|^2 \int_0^\pi \sin^2 \theta \sin \theta d\theta = |a_0|^2 \int_{-1}^1 (1 - w^2) dw$$

$$|a_0| = \sqrt{3}/2$$

其中, 我们将 w 用 $\cos \theta$ 代替。因此, 我们有 $S_{1,\pm 1} = (3^{1/2}/2) \sin \theta$, 式 (5.99) 变为

$$Y_1^1 = (3/8\pi)^{1/2} \sin \theta e^{i\phi}, \quad Y_1^{-1} = (3/8\pi)^{1/2} \sin \theta e^{-i\phi} \quad (5.103)$$

当 $l = 1$ 而 $m = 0$ 时, 我们得出 (见下文的练习题) $S_{1,0} = (3/2)^{1/2} \cos \theta$, $Y_1^0 = (3/4\pi)^{1/2} \cos \theta$ 。因此, 当 $l = 1$ 时, 由式 (5.94) 可得 $\hat{L}^2$ 的本征值为 $2\hbar^2$; 由式 (5.75), $\hat{L}_z$ 的本征值为 $\hbar$ 、0 和 $-\hbar$, 分别与 $m = 1, 0, -1$ 对应。

练习: 验证 $S_{1,0}$ 和 Y_1^0 的表达式。

函数 $S_{l,m}(\theta)$ 在数学中是众所周知的, 是乘以一个归一化系数后的连带勒让德函数 (associated Legendre function)。连带勒让德函数的定义见问题 5.34。表 (5.1) 列出了 $l \leq 3$ 的 $S_{l,m}(\theta)$ 表达式。

表 5.1: $S_{l,m}(\theta)$

$l = 0:$	$S_{0,0} = \frac{1}{2}\sqrt{2}$
$l = 1:$	$S_{1,0} = \frac{1}{2}\sqrt{6} \cos \theta$ $S_{1,\pm 1} = \frac{1}{2}\sqrt{3} \sin \theta$
$l = 2:$	$S_{2,0} = \frac{1}{4}\sqrt{10} (3 \cos^2 \theta - 1)$ $S_{2,\pm 1} = \frac{1}{2}\sqrt{15} \sin \theta \cos \theta$ $S_{2,\pm 2} = \frac{1}{4}\sqrt{15} \sin^2 \theta$
$l = 3:$	$S_{3,0} = \frac{3}{4}\sqrt{14} \left(\frac{5}{3} \cos^3 \theta - \cos \theta\right)$ $S_{3,\pm 1} = \frac{1}{8}\sqrt{42} \sin \theta (5 \cos^2 \theta - 1)$ $S_{3,\pm 2} = \frac{1}{4}\sqrt{105} \sin^2 \theta \cos \theta$ $S_{3,\pm 3} = \frac{1}{8}\sqrt{70} \sin^3 \theta$

$$\hat{L}^2 Y_l^m(\theta, \phi) = l(l+1) \hbar^2 Y_l^m(\theta, \phi), \quad l = 0, 1, 2, \dots \quad (5.104)$$

$$\hat{L}_z Y_l^m(\theta, \phi) = m\hbar Y_l^m(\theta, \phi), \quad m = -l, -l+1, \dots, l-1, l \quad (5.105)$$

其中，本征函数由式 (5.99) 给出。我们通常使用符号 m_l 代替 m 来表示 L_z 量子数。我们稍后会看到球谐函数是正交函数（方程 7.27）。

由于 $l \geq |m|$ ，因此除了 $l = 0$ 以外，轨道角动量 $\mathbf{L}$ 的大小 $[l(l+1)]^{1/2} \hbar^2$ 大于其 z 方向的分量 $|m|\hbar$ 。如果可以让角动量的大小等于其 z 分量，这就意味着 x 和 y 分量为零，我们就可以指定 $\mathbf{L}$ 的所有三个分量了。然而这是做不到的，因为角动量三个分量的算符不可对易。只有一种例外，就是 l 为零时。在该情况中， $|\mathbf{L}|^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2 = 0$ ，因此所有三个分量都为零。由式 (5.12)，角动量分量的不确定性满足

$$\Delta L_x \Delta L_y \geq \left| \frac{1}{2} \Psi^* [\hat{L}_x, \hat{L}_y] \Psi \right| = \frac{\hbar}{2} \left| \int \Psi^* \hat{L}_z \Psi d\tau \right| \quad (5.106)$$

通过循环排列能得出其余两个相似的方程。当 $\hat{L}_x$ 、 $\hat{L}_y$ 和 $\hat{L}_z$ 的本征值为零时， $\hat{L}_x \Psi = 0$ ， $\hat{L}_y \Psi = 0$ ， $\hat{L}_z \Psi = 0$ ，式 (5.106) 的右侧和另两个相似的方程也为零，因此 $\Delta L_x = \Delta L_y = \Delta L_z = 0$ 被允许。然而，根据第 5.1 节，要同时得到两个算符的本征函数，这两个算符必须可对易，这又是怎么回事呢？答案是，这个定理指的是一个算符的整套本征函数是另一个算符的本征函数的可能性。因此，尽管 $\hat{L}_x$ 和 $\hat{L}_z$ 不可对易，但仍有可能使得 $\hat{L}_x$ 的本征函数同时也是 $\hat{L}_z$ 的本征函数（ $l = 0 = m$ 时）。然而，使得 $\hat{L}_x$ 的所有本征函数都是 $\hat{L}_z$ 的本征函数是不可能的。




图 5.6: $\mathbf{L}$ 的方向

由于我们无法指定 L_x 和 L_y ，所以矢量 $\mathbf{L}$ 可以位于以 z 轴为轴，高度为 $m\hbar$ 的圆锥面上的任何位置。当 $l = 1$ 时， $\mathbf{L}$ 相对于 z 轴的可能方向如图 5.7 所示。对于每一个 $\hat{L}^2$ 的本征值，都有 $2l+1$ 个不同的本征函数 Y_l^m ，与 m 的 $2l+1$ 个取值相对应。我们说 $\hat{L}^2$ 的本征值是 $(2l+1)$ 重简并的，简并（degeneracy）一词适用于任何算符的本征值，而不仅仅是哈密顿算符。




图 5.7: $l = 1$ 时 $\mathbf{L}$ 相对于 z 轴的方向

当然， z 轴并没有什么特别之处。空间中的所有方向都是等价的。如果我们选择确定 L^2 和 L_x (而不是 L_z)，我们会得到与 L_z 相同的 L_x 的本征值。然而，解 $\hat{L}_z$ 的本征方程更为简单，因为在球坐标系中， $\hat{L}_z$ 的形式更简单，其中涉及到围绕 z 轴的旋转角度 ϕ 。

5.4 角动量阶梯算符法

通过将轨道角动量的算符表示为微分算符，并求解由此产生的微分方程，我们得到了 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的本征值。我们现在证明：只需要利用算符之间的对易关系就能找到这些本征值。本节的工作适用于任何满足角动量对易关系的算符。它尤其适用于自旋角动量（第 10 章）和轨道角动量。

我们使用字母 L 来表示轨道角动量。在这里，我们将使用字母 M 来表示我们正在处理的任何一种角动量。我们三个线性算符 $\hat{M}_x$ 、 $\hat{M}_y$ 和 $\hat{M}_z$ ，我们只知道它们符合对易关系 [与式 (5.46) 和 (5.48) 相似]

$$[\hat{M}_x, \hat{M}_y] = i\hbar\hat{M}_z, \quad [\hat{M}_y, \hat{M}_z] = i\hbar\hat{M}_x, \quad [\hat{M}_z, \hat{M}_x] = i\hbar\hat{M}_y \quad (5.107)$$

我们定义算符 $\hat{M}^2$ 为

$$\hat{M}^2 = \hat{M}_x^2 + \hat{M}_y^2 + \hat{M}_z^2 \quad (5.108)$$

我们的问题是如何找到 $\hat{M}^2$ 和 $\hat{M}_z$ 的本征值。

使用式 (5.107) 和 (5.108)，我们从对 $\hat{M}^2$ 及其分量的对易子进行评估开始。与推导 (5.49) 和 (5.50) 时的推导类似，我们有

$$[\hat{M}^2, \hat{M}_x] = [\hat{M}^2, \hat{M}_y] = [\hat{M}^2, \hat{M}_z] = 0 \quad (5.109)$$

因此，我们可以得到 $\hat{M}^2$ 和 $\hat{M}_z$ 的同时本征函数。

现在我们定义两个新算符，**升算符** (raising operator) $\hat{M}_+$ 和**降算符** (lowering operator) $\hat{M}_-$ ，它们的定义为

$$\hat{M}_+ \equiv \hat{M}_x + i\hat{M}_y \quad (5.110)$$

$$\hat{M}_- \equiv \hat{M}_x - i\hat{M}_y \quad (5.111)$$

这些是**阶梯算符** (ladder operator) 的例子。使用这些术语的原因很快就会清楚。我们有

$$\begin{aligned} \hat{M}_+\hat{M}_- &= (\hat{M}_x + i\hat{M}_y)(\hat{M}_x - i\hat{M}_y) = \hat{M}_x(\hat{M}_x - i\hat{M}_y) + i\hat{M}_y(\hat{M}_x - i\hat{M}_y) \\ &= \hat{M}_x^2 - i\hat{M}_x\hat{M}_y + i\hat{M}_y\hat{M}_x + \hat{M}_y^2 = \hat{M}^2 - \hat{M}_z^2 + i[\hat{M}_y, \hat{M}_x] \\ \hat{M}_+\hat{M}_- &= \hat{M}^2 - \hat{M}_z^2 + \hbar\hat{M}_z \end{aligned} \quad (5.112)$$

同样地，我们有

$$\hat{M}_-\hat{M}_+ = \hat{M}^2 - \hat{M}_z^2 - \hbar\hat{M}_z \quad (5.113)$$

对于这些算符与 $\hat{M}_z$ 的对易子，我们有

$$\begin{aligned} [\hat{M}_+, \hat{M}_z] &= [\hat{M}_x + i\hat{M}_y, \hat{M}_z] = [\hat{M}_x, \hat{M}_z] + i[\hat{M}_y, \hat{M}_z] = -i\hbar\hat{M}_y - \hbar\hat{M}_x \\ [\hat{M}_+, \hat{M}_z] &= -\hbar\hat{M}_+ \\ \hat{M}_+\hat{M}_z &= \hat{M}_z\hat{M}_+ - \hbar\hat{M}_+ \end{aligned} \quad (5.114)$$

其中我们用到了式 (5.107)。同样地，我们有

$$\hat{M}_-\hat{M}_z = \hat{M}_z\hat{M}_- + \hbar\hat{M}_- \quad (5.115)$$

设 Y 是 $\hat{M}^2$ 和 $\hat{M}_z$ 的共同本征函数, 即

$$\hat{M}^2 Y = cY \quad (5.116)$$

$$\hat{M}_z Y = bY \quad (5.117)$$

其中 c 和 b 是本征值。将算符 $\hat{M}_+$ 作用于式 (5.117), 我们有

$$\hat{M}_+ \hat{M}_z Y = \hat{M}_+ bY$$

使用式 (5.114), 及 $\hat{M}_+$ 是线性算符, 我们有

$$\begin{aligned} (\hat{M}_z \hat{M}_+ - \hbar \hat{M}_+) Y &= b \hat{M}_+ Y \\ \hat{M}_z (\hat{M}_+ Y) &= (b + \hbar) (\hat{M}_+ Y) \end{aligned} \quad (5.118)$$

最后一个方程说明: $\hat{M}_+ Y$ 是算符 $\hat{M}_z$ 的本征函数, 其本征值为 $b + \hbar$ 。换句话说, 将升算符 $\hat{M}_+$ 作用到本征函数 Y 上后, 可以将 Y 转换成另一个 $\hat{M}_z$ 的本征函数, 其本征值比 Y 的大 $\hbar$ 。如果我们现在对式 (5.118) 使用升算符, 并再次使用式 (5.114), 我们得到

$$\hat{M}_z (\hat{M}_+^2 Y) = (b + 2\hbar) (\hat{M}_+^2 Y)$$

重复应用升算符, 有

$$\hat{M}_z (\hat{M}_+^k Y) = (b + k\hbar) (\hat{M}_+^k Y), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (5.119)$$

如果我们对式 (5.117) 使用降算符 $\hat{M}_-$ 并应用式 (5.115), 我们已同样的方式发现:

$$\hat{M}_z (\hat{M}_- Y) = (b - \hbar) (\hat{M}_- Y) \quad (5.120)$$

$$\hat{M}_z (\hat{M}_-^k Y) = (b - k\hbar) (\hat{M}_-^k Y) \quad (5.121)$$

这样, 通过对本征值为 b 的本征函数使用升降算符, 我们得到了一个本征值阶梯, 阶梯之间的差值为 $\hbar$:

$$\dots, \quad b - 2\hbar, \quad b - \hbar, \quad b, \quad b + \hbar, \quad b + 2\hbar, \quad \dots$$

函数 $\hat{M}_\pm^k Y$ 是 $\hat{M}_z$ 的本征函数, 其本征值为 $b \pm k\hbar$ [式 (5.119) 和 (5.121)]。我们现在表明这些函数也是 $\hat{M}^2$ 的本征函数, 其本征值为 c :

$$\hat{M}_z \hat{M}_\pm^k Y = (b \pm k\hbar) \hat{M}_\pm^k Y \quad (5.122)$$

$$\hat{M}^2 \hat{M}_\pm^k Y = c \hat{M}_\pm^k Y \quad (5.123)$$

为了证明 (5.123), 我们首先表明 $\hat{M}^2$ 与 $\hat{M}_+$ 和 $\hat{M}_-$ 对易。我们有

$$[\hat{M}^2, \hat{M}_\pm] = [\hat{M}^2, \hat{M}_x \pm i\hat{M}_y] = [\hat{M}^2, \hat{M}_x] \pm i[\hat{M}^2, \hat{M}_y] = 0 \pm 0 = 0$$

也有

$$[\hat{M}^2, \hat{M}_\pm^2] = [\hat{M}^2, \hat{M}_\pm] \hat{M}_\pm + \hat{M}_\pm [\hat{M}^2, \hat{M}_\pm] = 0 + 0 = 0$$

通过归纳法可以得出

$$[\hat{M}^2, \hat{M}_\pm^k] = 0, \quad \text{或} \quad \hat{M}^2 \hat{M}_\pm^k = \hat{M}_\pm^k \hat{M}^2, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (5.124)$$

如果我们对式 (5.116) 使用升降算符 $\hat{M}_\pm$, 并使用 (5.124), 我们有

$$\hat{M}_\pm^k \hat{M}^2 Y = \hat{M}_\pm^k cY$$

$$\hat{M}^2 (\hat{M}_\pm^k Y) = c (\hat{M}_\pm^k Y) \quad (5.125)$$

这正是我们想要证明的。

接下来我们想证明：使用阶梯算符生成的 $\hat{M}_z$ 的本征值集合是有界的。对于特定的，本征值为 b 的算符 $\hat{M}_z$ 的本征函数 Y ，我们有

$$\hat{M}_z Y = bY$$

若考虑由阶梯算符生成的本征函数与本征值的集合，我们有

$$\hat{M}_z Y_k = b_k Y_k \quad (5.126)$$

其中

$$Y_k = \hat{M}_\pm^k Y \quad (5.127)$$

$$b_k = b \pm k\hbar \quad (5.128)$$

($\hat{M}_+$ 和 $\hat{M}_-$ 的使用破坏了 Y 的归一性，所以 Y_k 不是归一化的。若想找到归一化常数，见问题 10.27。)

对式 (5.126) 使用 $\hat{M}_z$ ，我们有

$$\begin{aligned} \hat{M}_z^2 Y_k &= b_k \hat{M}_z Y_k \\ \hat{M}_z^2 Y_k &= b_k^2 Y_k \end{aligned} \quad (5.129)$$

现在用式 (5.123) 减去式 (5.129)，使用式 (5.127) 和 (5.108)，有

$$\begin{aligned} \hat{M}^2 Y_k - \hat{M}_z^2 Y_k &= c Y_k - b_k^2 Y_k \\ (\hat{M}_x^2 + \hat{M}_y^2) Y_k &= (c - b_k^2) Y_k \end{aligned} \quad (5.130)$$

算符 $\hat{M}_x^2 + \hat{M}_y^2$ 对应于一个非负的物理量，因此其本征值应该是非负的（在问题 7.11 中得到证明）。因此，式 (5.130) 表明 $c - b_k^2 \geq 0$ 即 $c^{1/2} \geq |b_k|$ 。因此，

$$c^{1/2} \geq b_k \geq c^{1/2}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (5.131)$$

由于 k 变化时 c 保持不变，因此式 (5.131) 表明本征值 b 同时具有上界和下界。令 $b_{\max}$ 和 $b_{\min}$ 分别为 b_k 的最大值和最小值， $Y_{\max}$ 和 $Y_{\min}$ 分别为对应的本征函数：

$$\hat{M}_z Y_{\max} = b_{\max} Y_{\max} \quad (5.132)$$

$$\hat{M}_z Y_{\min} = b_{\min} Y_{\min} \quad (5.133)$$

现在，将升算符作用到式 (5.132) 上，并使用式 (5.114)，我们有

$$\begin{aligned} \hat{M}_z \hat{M}_+ Y_{\max} &= b_{\max} \hat{M}_+ Y_{\max} \\ \hat{M}_z (\hat{M}_+ Y_{\max}) &= (b_{\max} + \hbar) (\hat{M}_+ Y_{\max}) \end{aligned} \quad (5.134)$$

由于最后一个方程声明 $\hat{M}_+ Y_{\max}$ 是 $\hat{M}_z$ 的本征函数，其本征值为 $b_{\max} + \hbar$ ，因此似乎与 $b_{\max}$ 是 b_k 的最大值矛盾。解决这一矛盾的唯一办法就是让 $\hat{M}_+ Y_{\max} = 0$ 消失（基于物理原因，我们总是拒绝将零作为本征函数）。因此，

$$\hat{M}_+ Y_{\max} = 0 \quad (5.135)$$

将算符作用到式 (5.133) 上，并使用式 (5.113)、(5.132) 和 (5.116)，我们有

$$0 = \hat{M}_- \hat{M}_+ Y_{\max} = (\hat{M}^2 \hat{M}_z^2 - \hbar \hat{M}_z) Y_{\max} = (c - b_{\max}^2 + \hbar b_{\max}) Y_{\max}$$

$$\begin{aligned}
c - b_{\max}^2 - \hbar b_{\max} &= 0 \\
c &= b_{\max}^2 + \hbar b_{\max}
\end{aligned} \tag{5.136}$$

类似的论证表明

$$\hat{M}_- Y_{\min} = 0 \tag{5.137}$$

通过将升算符作用于这个方程并使用式 (5.112), 我们有

$$c = b_{\min}^2 - \hbar b_{\min}$$

从式 (5.136) 中减去最后一个等式, 得出

$$b_{\max}^2 + \hbar^2 b_{\max} + (\hbar^2 b_{\min} - b_{\min}^2) = 0$$

这是一个关于 $b_{\max}$ 的二次方程, 使用通常的公式 (在量子力学中仍然有效), 有

$$b_{\max} = -b_{\min}, \quad b_{\max} = b_{\min} - \hbar$$

由于第二个根表明 $b_{\max}$ 小于 $b_{\min}$, 应舍去, 所以

$$b_{\min} = -b_{\max} \tag{5.138}$$

除此以外, 式 (5.128) 表明 $b_{\max}$ 和 $b_{\min}$ 之差是 $\hbar$ 的整数倍:

$$b_{\max} - b_{\min} = \hbar n, \quad n = 0, 1, 2, \dots \tag{5.139}$$

将 (5.138) 代入 (5.139), 我们得到了 $\hat{M}_z$ 的本征值:

$$\begin{aligned}
b_{\max} &= \frac{1}{2} n \hbar \\
b_{\max} &= j \hbar \quad j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \dots \\
b_{\min} &= -j \hbar
\end{aligned} \tag{5.140}$$

$$b = -j \hbar, (-j+1) \hbar, (-j+2) \hbar, \dots, (j-2) \hbar, (j-1) \hbar, j \hbar \tag{5.141}$$

由式 (5.136), 我们找到了 $\hat{M}^2$ 的本征值:

$$c = j(j+1) \hbar^2, \quad j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \dots \tag{5.142}$$

因此,

$$\hat{M}^2 Y = j(j+1) \hbar^2 Y, \quad j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \dots \tag{5.143}$$

$$\hat{M}_z Y = m_j \hbar Y, \quad m_j = -j, -j+1, \dots, j-1, j \tag{5.144}$$

通过使用算符间的对易关系, 我们已经找到了 $\hat{M}^2$ 和 $\hat{M}_z$ 的本征值。然而, 将式 (5.143) 和 (5.144) 与式 (5.104) 和 (5.105) 进行比较, 我们发现: 角量子数除了可以取整数以外, 还可以取半整数值。这或许表明: 除了轨道角动量以外, 可能还有另一种角动量。在第10章中, 我们将看到自旋角动量可以具有半整数和整数量子数。对于轨道角动量, $T(\phi)$ 本征函数的单值定解条件 [见 (5.73) 之后的等式] 消除了角动量量子数的半整数值。[并不是每个人都接受单值性作为波函数的有效边界条件, 而且还有许多其他拒绝半整轨道-角动量量子数的理由; 见 C. G. Gray, Am. J. Phys., 37, 559 (1969); M. L. Whippman, Am. J. Phys., 34, 656 (1966)。]

阶梯算符法也可用于求解其他本征值问题, 见问题 5.36.

总结

习题

Chapter 6

氢原子

6.1 单粒子中心力问题

在研究氢原子之前，我们先来看看单个粒子在中心力作用下运动这一更为普遍的问题。本节的结果适用于任何中心力问题。例如氢原子（第 6.5 节）和各向同性的三维谐振子（第 6.3 节）。

中心力（central force）是由球面对称的势能函数导出的，这意味着中心力只是粒子与原点距离的函数 $V = V(r)$ 。力和势能的关系由式 (5.31) 给出：

$$\mathbf{F} = -\nabla V(x, y, z) = -\mathbf{i}(\partial V/\partial x) - \mathbf{j}(\partial V/\partial y) - \mathbf{k}(\partial V/\partial z) \quad (6.1)$$

(6.1) 中的偏导数可以用链式法则求得 [式 (5.53)- (5.55)]。在这个例子中，由于 V 只是 r 的函数，所以我们有 $(\partial V/\partial \theta)_{r,\phi} = 0$ 和 $(\partial V/\partial \phi)_{r,\theta} = 0$ 。因此，

$$\left(\frac{\partial V}{\partial x}\right)_{y,z} = \frac{dV}{dr} \left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)_{y,z} = \frac{x}{r} \frac{dV}{dr} \quad (6.2)$$

$$\left(\frac{\partial V}{\partial y}\right)_{x,z} = \frac{y}{r} \frac{dV}{dr}, \quad \left(\frac{\partial V}{\partial z}\right)_{x,y} = \frac{z}{r} \frac{dV}{dr} \quad (6.3)$$

其中我们用到了式 (5.57) 和 (5.58)。则方程 (6.1) 可以写成

$$\mathbf{F} = -\frac{1}{r} \frac{dV}{dr} (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) = -\frac{dV(r)}{dr} \frac{\mathbf{r}}{r} \quad (6.4)$$

其中 $\mathbf{r}$ 的计算使用了式 (5.33)。式 (6.4) 中的 $\mathbf{r}/r$ 是径向上的单位矢量。因此中心力是径向的。

现在，让我们来看看受中心力作用的单粒子量子力学。其哈密顿算符为

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V} = -(\hbar^2/2m) \nabla^2 + V(r) \quad (6.5)$$

其中 $\nabla^2 \equiv \partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2 + \partial^2/\partial z^2$ [式 (3.46)]。由于 V 是球对称的，我们将在球坐标系中进行计算。因此，我们希望将拉普拉斯算符转换为球坐标的形式。我们已经有了 $\partial/\partial x$ 、 $\partial/\partial y$ 和 $\partial/\partial z$ 的表达式 [式 (5.62)-(5.65)]，通过将这些算符平方并相加，我们就得到了拉普拉斯算符。该计算留作课后习题。结果为（问题 6.4）：

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r^2} \cot \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \quad (6.6)$$

回过头来看式 (5.68)，其中给出了单粒子轨道角动量大小平方的算符 $\hat{L}^2$ ，我们可以看到

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} - \frac{1}{r^2 \hbar^2} \hat{L}^2 \quad (6.7)$$

哈密顿算符 (6.5) 变为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{2mr^2} \hat{L}^2 + V(r) \quad (6.8)$$

在经典力学中, 受中心力作用的粒子其角动量是守恒的 (第5.3节)。在量子力学中, 我们可能会问, 我们是否可以拥有能量和角动量都有确定值的状态? 为了使 $\hat{H}$ 的本征函数组也是 $\hat{L}^2$ 的本征函数, 对易子 $[\hat{H}, \hat{L}^2]$ 必须为零。我们有

$$\begin{aligned} [\hat{H}, \hat{L}^2] &= [\hat{T}, \hat{L}^2] + [\hat{V}, \hat{L}^2] \\ [\hat{T}, \hat{L}^2] &= \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{2mr^2} \hat{L}^2, \hat{L}^2 \right] \\ [\hat{T}, \hat{L}^2] &= -\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r}, \hat{L}^2 \right] + \frac{1}{2m} \left[\frac{1}{r^2} \hat{L}^2, \hat{L}^2 \right] \end{aligned} \quad (6.9)$$

回忆 $\hat{L}^2$ 只是 θ 和 ϕ 的函数, 而不是 r 的函数 [式 (5.68)]。因此它与任何包含 r 的算符可对易。[为了证明这一结论, 我们必须使用 (5.47) 类似的关系, 但将 x 和 z 分别换成 r 和 θ 。] 因此, 式 (6.9) 中第一项的对易子为零。此外, 由于任何算符都与它自己对易, 式 (6.9) 第二项的对易子也为零。因此, $[\hat{T}, \hat{L}^2] = 0$ 。同样地, 由于 $\hat{L}^2$ 不包含 r , V 只是 r 的函数, 我们有 $[\hat{V}, \hat{L}^2] = 0$ 。因此,

$$[\hat{H}, \hat{L}^2] = 0, \quad \text{若 } V = V(r) \quad (6.10)$$

当势能函数与 θ 和 ϕ 都无关时, $\hat{H}$ 和 $\hat{L}^2$ 可对易。

现在, 我们来考虑算符 $\hat{L}_z = -i\hbar\partial/\partial\phi$ [式 (5.67)]。由于 $\hat{L}_z$ 不包含 r , 因此它与 $\hat{L}^2$ 可对易 [式 (5.50)], 因此 $\hat{H}$ (6.8) 和 $\hat{L}_z$ 也可对易。我们有

$$[\hat{H}, \hat{L}_z] = 0, \quad \text{若 } V = V(r) \quad (6.11)$$

因此, 我们现在有了中心力问题中, 一组同时是 $\hat{H}$ 、 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的本征函数的函数。令 ψ 表示这些共同本征函数:

$$\boxed{\hat{H}\psi = E\psi} \quad (6.12)$$

$$\boxed{\hat{L}^2\psi = l(l+1)\hbar^2\psi, \quad l = 0, 1, 2, \dots} \quad (6.13)$$

$$\boxed{\hat{L}_z\psi = m\hbar\psi, \quad m = -l, -l+1, \dots, l-1, l} \quad (6.14)$$

其中, 我们用到了式 (5.104) 和式 (5.105)。

根据式 (6.8) 和 (6.13), 对薛定谔方程 (6.12), 有

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{2mr^2} \hat{L}^2\psi + V(r)\psi &= E\psi \\ -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2mr^2}\psi + V(r)\psi &= E\psi \end{aligned} \quad (6.15)$$

$\hat{L}^2$ 的本征函数是球谐函数 $Y_l^m(\theta, \phi)$, 由于 $\hat{L}^2$ 不包含 r , 我们可以将任意一个关于 r 的函数与球谐函数相乘, 新函数依然是 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的本征函数。因此,

$$\boxed{\psi = R(r)Y_l^m(\theta, \phi)} \quad (6.16)$$

将 (6.16) 代入 (6.15), 然后两边同除以 Y_l^m , 得到关于未知函数 $R(r)$ 的微分方程:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(R'' + \frac{2}{r} R' \right) + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2mr^2} R + V(r)R = ER \quad (6.17)$$

我们已经证明: 对于任意势能函数 $V(r)$ 是球对称的单粒子问题, 定态波函数为 $\psi = R(r)Y_l^m(\theta, \phi)$, 其中 $R(r)$ 满足微分方程 (6.17)。通过指定式 (6.17) 中势能函数 $V(r)$ 的形式, 我们可以针对某个特定问题解决它。

6.2 非相互作用粒子和变量分离

到目前为止，我们只解决了单粒子量子力学问题。氢原子是一个双粒子系统，作为处理氢原子的第一步，我们首先考虑一个更简单的情况，即两个不相相互作用的粒子。

假设一个系统由两个无相互作用的粒子 1 和 2 组成。令 q_1 和 q_2 分别表示粒子 1 的 (x_1, y_1, z_1) 坐标和粒子 2 的 (x_2, y_2, z_2) 坐标。由于粒子之间没有相互作用力，系统的经典机械能就是两个粒子的能量之和： $E = E_1 + E_2 = T_1 + V_1 + T_2 + V_2$ ，经典哈密顿量是两个粒子哈密顿量之和： $H = H_1 + H_2$ 。因此，系统的哈密顿算符为

$$\hat{H} = \hat{H}_1 + \hat{H}_2$$

其中 $\hat{H}_1$ 只和坐标 q_1 有关，动量算符 $\hat{p}_1$ 对应于 q_1 。系统的薛定谔方程为

$$(\hat{H}_1 + \hat{H}_2) \psi(q_1, q_2) = E \psi(q_1, q_2) \quad (6.18)$$

我们尝试用分离变量法来求解 (6.18)，令

$$\psi(q_1, q_2) = G_1(q_1) G_2(q_2) \quad (6.19)$$

我们有

$$\hat{H}_1 G_1(q_1) G_2(q_2) + \hat{H}_2 G_1(q_1) G_2(q_2) = E G_1(q_1) G_2(q_2) \quad (6.20)$$

由于 $\hat{H}_1$ 只包含粒子 1 的位置和动量算符，我们有 $\hat{H}_1 [G_1(q_1) G_2(q_2)] = G_2(q_2) \hat{H}_1 G_1(q_1)$ ，因此，就 $\hat{H}_1$ 而言， $G_2(q_2)$ 是常数。使用这个方程以及类似的关于 $\hat{H}_2$ 的方程，我们发现 (6.20) 变为

$$G_2(q_2) \hat{H}_1 G_1(q_1) + G_1(q_1) \hat{H}_2 G_2(q_2) = E G_1(q_1) G_2(q_2) \quad (6.21)$$

$$\frac{\hat{H}_1 G_1(q_1)}{G_1(q_1)} + \frac{\hat{H}_2 G_2(q_2)}{G_2(q_2)} = E \quad (6.22)$$

现在，通过与式 (3.65) 相同的论证，我们得出结论：在 (6.22) 中，左边的每项必须是常数。令 E_1 和 E_2 分别表示这些常数，我们有

$$\frac{\hat{H}_1 G_1(q_1)}{G_1(q_1)} = E_1, \quad \frac{\hat{H}_2 G_2(q_2)}{G_2(q_2)} = E_2$$

$$E = E_1 + E_2 \quad (6.23)$$

因此，当系统由两个无相互作用的粒子组成时，通过求解下式，我们可以将双粒子问题简化为两个单粒子问题：

$$\hat{H}_1 G_1(q_1) = E_1 G_1(q_1), \quad \hat{H}_2 G_2(q_2) = E_2 G_2(q_2) \quad (6.24)$$

它们是每个粒子的独立薛定谔方程。

将该结果推广到 n 个无相互作用的粒子，我们有

$$\hat{H} = \hat{H}_1 + \hat{H}_2 + \dots + \hat{H}_n$$

$$\psi(q_1, q_2, \dots, q_n) = G_1(q_1) G_2(q_2) \dots G_n(q_n) \quad (6.25)$$

$$E = E_1 + E_2 + \dots + E_n \quad (6.26)$$

$$\hat{H}_i G_i = E_i G_i, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (6.27)$$

对于一个无相互作用粒子系统，能量是每个粒子各自能量的总和，波函数是每个粒子波函数的乘积。利用哈密顿算符 $\hat{H}_i$ ，求解粒子 i 的薛定谔方程，即可求得粒子 i 的波函数 G_i 。

这些结果也适用于单个粒子，其哈密顿算符是每个坐标的独立项之和：

$$\hat{H} = \hat{H}_x(\hat{x}, \hat{p}_x) + \hat{H}_y(\hat{y}, \hat{p}_y) + \hat{H}_z(\hat{z}, \hat{p}_z)$$

在这种情况下，我们得出结论：波函数和能量分别为

$$\psi(x, y, z) = F(x)G(y)K(z), E = E_x + E_y + E_z$$

$$\hat{H}_x F(x) = E_x F(x), \quad \hat{H}_y G(y) = E_y G(y), \quad \hat{H}_z K(z) = E_z K(z)$$

例如三维盒子中的质点（第 3.5 节）、三维自由质点（问题 3.42）和三维谐振子（问题 4.20）。

6.3 将双粒子问题简化为两个单粒子问题

氢原子包含两个粒子——质子和电子。对于一个双粒子系统（粒子 1 的坐标为 (x_1, y_1, z_1) ，粒子 2 的坐标为 (x_2, y_2, z_2) ），粒子间相互作用的势能通常只是粒子相对坐标 $x_2 - x_1$ 、 $y_2 - y_1$ 和 $z_2 - z_1$ 的函数。在这种情况下，双粒子问题可以简化为两个单粒子问题，正如我们现在所要证明的。

先考虑经典力学处理两个相互作用粒子的情况，令其质量分别为 m_1 和 m_2 。我们用从直角坐标系原点出发的半径矢量 $\mathbf{r}_1$ 和 $\mathbf{r}_2$ 来指定它们的位置（图 6.1）。粒子 1 和 2 的坐标分别为 (x_1, y_1, z_1) 和 (x_2, y_2, z_2) 。我们从粒子 1 到粒子 2 画出矢量 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$ ，并用 x 、 y 和 z 表示其分量：




图 6.1: 质心位于 C 的双粒子系统

$$\boxed{x = x_2 - x_1, \quad y = y_2 - y_1, \quad z = z_2 - z_1} \quad (6.28)$$

x 、 y 和 z 称为**相对坐标**或**内坐标** (relative or internal coordinates)。

我们现在从原点指向系统的质心 C 画出矢量 $\mathbf{R}$ ，其分量用 X 、 Y 和 Z 表示：

$$\mathbf{R} = \mathbf{i}X + \mathbf{j}Y + \mathbf{k}Z \quad (6.29)$$

根据双粒子系统质心的定义，有

$$X = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}, \quad Y = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2}{m_1 + m_2}, \quad Z = \frac{m_1 z_1 + m_2 z_2}{m_1 + m_2} \quad (6.30)$$

这三个方程与矢量方程等价：

$$\mathbf{R} = \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2}{m_1 + m_2} \quad (6.31)$$

我们也有

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1 \quad (6.32)$$

我们将式 (6.31) 和 (6.32) 联立为关于 $\mathbf{r}_1$ 和 $\mathbf{r}_2$ 的方程组，并求解得到

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{R} - \frac{m_2}{m_1 + m_2} \mathbf{r}, \quad \mathbf{r}_2 = \mathbf{R} + \frac{m_1}{m_1 + m_2} \mathbf{r} \quad (6.33)$$

方程 (6.31) 和 (6.32) 代表了一种将 x_1, y_1, z_1 和 x_2, y_2, z_2 坐标转换为 X, Y, Z 和 x, y, z 坐标的变换。考虑一下在这种变化下，系统的哈密顿量会发生什么变化。用字母顶上的点表示对时间的导数。粒子 1 的速度为 [式 (5.34)] $\mathbf{v}_1 = d\mathbf{r}_1/dt = \dot{\mathbf{r}}_1$ 。系统的动能为两个粒子的动能之和：

$$T = \frac{1}{2}m_1 |\dot{\mathbf{r}}_1|^2 + \frac{1}{2}m_2 |\dot{\mathbf{r}}_2|^2 \quad (6.34)$$

将 (6.33) 的时间导数代入 (6.34)，我们得到

$$T = \frac{1}{2}m_1 \left(\dot{\mathbf{R}} - \frac{m_2}{m_1 + m_2} \dot{\mathbf{r}} \right) \cdot \left(\dot{\mathbf{R}} - \frac{m_2}{m_1 + m_2} \dot{\mathbf{r}} \right) + \frac{1}{2}m_2 \left(\dot{\mathbf{R}} + \frac{m_1}{m_1 + m_2} \dot{\mathbf{r}} \right) \cdot \left(\dot{\mathbf{R}} + \frac{m_1}{m_1 + m_2} \dot{\mathbf{r}} \right)$$

其中，我们用到了 $|\mathbf{A}|^2 = \mathbf{A} \cdot \mathbf{A}$ [式 (5.24)]。使用矢量数量积的分配律，化简后，我们得到

$$T = \frac{1}{2}(m_1 + m_2) |\dot{\mathbf{R}}|^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \right) |\dot{\mathbf{r}}|^2 \quad (6.35)$$

令 M 为系统的总质量：

$$M \equiv m_1 + m_2 \quad (6.36)$$

我们定义双粒子系统的**折合质量** (reduced mass) 为

$$\mu \equiv \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (6.37)$$

那么

$$T = \frac{1}{2}M |\dot{\mathbf{R}}|^2 + \frac{1}{2}\mu |\dot{\mathbf{r}}|^2 \quad (6.38)$$

(6.38) 的第一项是质量为 M 的整个系统平动产生的动能。**平动** (translational motion) 是指每个质点都经历相同位移的运动。 $\frac{1}{2}M |\dot{\mathbf{R}}|^2$ 是位于质心，具有质量 M 的假想粒子的动能。(6.38) 的第二项是两个粒子内运动 (相对运动) 产生的动能。内运动有两种形式。两个粒子间的距离 r 可以变化 (振动)，以及矢量 $\mathbf{r}$ 的方向可以发生变化 (转动)。注意： $|\dot{\mathbf{r}}| = |d\mathbf{r}/dt| \neq d|\mathbf{r}|/dt$ 。

与六个原始坐标 $x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2$ 相对应，我们有六个线动量：

$$p_{x_1} = m_1 \dot{x}_1, \quad \dots, \quad p_{z_2} = m_2 \dot{z}_2 \quad (6.39)$$

将 (6.34) 和 (6.38) 相比较，我们将新坐标 X, Y, Z, x, y, z 的动量定义为

$$p_X \equiv M \dot{X}, \quad p_Y \equiv M \dot{Y}, \quad p_Z \equiv M \dot{Z} \\ p_x \equiv \mu \dot{x}, \quad p_y \equiv \mu \dot{y}, \quad p_z \equiv \mu \dot{z}$$

我们定义两个新动量矢量：

$$\mathbf{p}_M = iM\dot{X} + jM\dot{Y} + kM\dot{Z}, \quad \text{和} \quad \mathbf{p}_\mu = i\mu\dot{x} + j\mu\dot{y} + k\mu\dot{z}$$

将这些动量代入式 (6.38)，我们得到

$$T = \frac{|\mathbf{p}_M|^2}{2M} + \frac{|\mathbf{p}_\mu|^2}{2\mu} \quad (6.40)$$

现在，我们来考虑势能。我们限制 V 只是两个粒子的相对坐标 x, y 和 z 的函数：

$$V = V(x, y, z) \quad (6.41)$$

(6.41) 的一个例子是相互作用遵守库仑定律的两个带电粒子 [见式 (3.53)]。根据对 V 的这一限制, 哈密顿函数为

$$H = \frac{p_M^2}{2M} + \left[\frac{p_\mu^2}{2\mu} + V(x, y, z) \right] \quad (6.42)$$

现在, 假设我们有一个由质量为 M 的粒子和质量为 μ 的粒子组成的系统, 前者不受力, 后者受势能函数 $V(x, y, z)$ 的作用。再假设这些粒子之间没有相互作用。如果 (X, Y, Z) 表示质量为 M 的粒子的坐标, 而 (x, y, z) 表示质量为 μ 的粒子的坐标, 那么这个假设系统的哈密顿量是什么? 显然, 它与式 (6.42) 完全相同。

哈密顿量 (6.42) 可以看作是两个无相互作用假想粒子的哈密顿量之和: 质量为 M 的粒子其哈密顿量为 $p_M^2/2M$, 质量为 μ 的粒子其哈密顿量为 $p_\mu^2/2\mu + V(x, y, z)$ 。因此, 第6.2的结果表明: 系统的量子力学能量是两个假想粒子的能量之和 [式 (6.23)]: $E = E_M + E_\mu$ 。由式 (6.24) 和 (6.42) 可知, 平动能 E_M 可以通过求解薛定谔方程 $(\hat{p}_M^2/2M)\psi_M = E_M\psi_M$ 得到。这是质量为 M 的自由粒子的薛定谔方程, 因此其可能的本征值全是非负数 [式 (2.31)]: $E_m \geq 0$ 。由式 (6.42) 和 (6.24) 可知, 内运动能 E_μ 可以通过求解以下薛定谔方程得到:

$$\left[\frac{\hat{p}_\mu^2}{2\mu} + V(x, y, z) \right] \psi_\mu(x, y, z) = E_\mu \psi_\mu(x, y, z) \quad (6.43)$$

这样, 我们就把两个粒子根据仅取决于相对坐标 x, y, z 的势能函数 $V(x, y, z)$ 进行相互作用的问题分离成了两个独立的单粒子问题: (1) 质量为 M 的整体系统平动, 它只是在系统能量的基础上增加了一个恒非负的能量 E_M ; (2) 通过求解质量为 μ 的假想粒子的薛定谔方程 (6.43) 来处理相对运动或内部运动, 该粒子的坐标为相对坐标 x, y, z , 并在势能 $V(x, y, z)$ 的作用下运动。

例如, 对于包含一个电子 (e) 和一个质子 (p) 的氢原子, 原子的总能量为 $E = E_M + E_\mu$, 其中的 E_M 是质量为 $M = m_e + m_p$ 的整个原子在空间中的平动能, 其中的 E_μ 是通过将 $\mu = m_e m_p / (m_e + m_p)$ 代入 (6.43) 得到的, V 是电子和质子相互作用的库仑定律势能; 见第 6.5 节。

6.4 双粒子的刚性转子模型

在求解氢原子的薛定谔方程之前, 我们先来处理双粒子的刚性转子。这是一个双粒子系统, 粒子之间的距离固定, 由一根长度为 d 的刚性无质量杆连接。对于这个问题, 图6.1中的矢量 $\mathbf{r}$ 的长度 $|\mathbf{r}|$ 是常数 d 。因此 (见第6.3节), 内运动的动能完全是转动能。转子的能量完全由动能提供, 以及

$$V = 0 \quad (6.44)$$

方程 (6.44) 是 (6.41) 的一个特例, 因此, 我们可以利用上一节得到的结果, 将系统的平动分离出来。我们将只关注转动能量。旋转运动的哈密顿算符由 (6.43) 中括号内的项给出:

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}_\mu^2}{2\mu} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (6.45)$$

其中 m_1 和 m_2 是两个粒子的质量。质量为 μ 的假想粒子的坐标为 m_1 和 m_2 之间的相对坐标。[式 (6.28)]。

与使用相对笛卡尔坐标 x, y 和 z 不同, 使用相对球坐标 r, θ 和 ϕ 来描述转子会更有成效。 r 坐标与图6.1中的矢量 $\mathbf{r}$ 的长度相同, 由于 m_1 和 m_2 受限于保持固定的距离, 我们有 $r = d$ 。因此, 这个问题等价于一个质量为 μ 的粒子受限在半径为 r 的球面上运动。由于径向坐标是恒定的, 波函数将只是 θ 和 ϕ 的函数。因此, 对波函数进行运算时, 式 (6.8) 中拉普拉斯算符的前两项为零, 可

以省略。换个角度看问题，我们注意到式 (6.8) 中涉及 r 导数的算符对应于径向运动的动能，而由于没有径向运动， $\hat{H}$ 中不包含 r 的导数。

由于 $V = 0$ 是 $V = V(r)$ 的特例，第6.1节的结论表明：本征函数由式 (6.16) 给出，其中 r 的因子被省略：

$$\psi = Y_l^m(\theta, \phi) \quad (6.46)$$

其中，转动角量子数用 J 而不是 l 来表示。

哈密顿算符由式 (6.8) 给出，其中省略了 r 的导数及 $V(r) = 0$ 。因此，

$$\hat{H} = (2\mu d^2)^{-1} \hat{L}^2$$

使用式 (6.13)，有

$$\begin{aligned} \hat{H}\psi &= E\psi \\ (2\mu d^2)^{-1} \hat{L}^2 Y_J^m(\theta, \phi) &= E Y_J^m(\theta, \phi) \\ (2\mu d^2)^{-1} J(J+1) \hbar^2 Y_J^m(\theta, \phi) &= E Y_J^m(\theta, \phi) \\ E &= \frac{J(J+1) \hbar^2}{2\mu d^2} \end{aligned} \quad (6.47)$$

由 n 个粒子组成的系统绕空间某一特定轴旋转产生的**转动惯量** (moment of inertia) I 定义为

$$I \equiv \sum_{i=1}^n m_i \rho_i^2 \quad (6.48)$$

其中 m_i 是粒子 i 的质量， ρ_i 是粒子 i 到旋转轴的垂直距离。 I 的值与选择的旋转轴有关。对于双粒子的刚性转子，我们选择通过质心并垂直于连接 m_1 和 m_2 的直线作为我们的轴线（图 6.2）。如果我们将转子置于坐标系的 x 轴上，使得质心 C 位于原点，连接 m_1 和 m_2 的直线与 x 轴重合，那么 C 的坐标为 $(0, 0, 0)$ ， m_1 的坐标为 $(-\rho_1, 0, 0)$ ， m_2 的坐标为 $(\rho_2, 0, 0)$ 。将这些坐标带入式 (6.30)，我们得到

$$m_1 \rho_1 = m_2 \rho_2 \quad (6.49)$$

转子绕我们选择的轴旋转的转动惯量为




图 6.2: 用于计算双粒子刚性转子转动惯量的轴线（虚线）。 C 是质心。

$$I = m_1 \rho_1^2 + m_2 \rho_2^2 \quad (6.50)$$

使用式 (6.49)，我们可以将 (6.50) 写成 (问题 6.14)

$$I = \mu d^2 \quad (6.51)$$

其中 $\mu \equiv m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ 是系统的折合质量， $d \equiv \rho_1 + \rho_2$ 是 m_1 和 m_2 之间的距离。双粒子刚性转子允许的能级由式 (6.47) 给出：

$$E = \frac{J(J+1)\hbar^2}{2I}, \quad J = 0, 1, 2, \dots \quad (6.52)$$

最低的能级满足 $E = 0$ ，所以没有零点转动能。转动能为零，因此转子的角动量为零，这并不违反不确定性原理；回顾公式 (5.105) 后面的讨论。请注意： E 随着 $J^2 + J$ 的增大而增大，因此相邻旋转能级的间隔随着 J 的增大而增大。

转子的能级 (6.52) 是简并的吗？能量只取决于 J ，而波函数 (6.46) 同时取决于 J 和 m ，其中 $m\hbar$ 是转子角动量在 z 方向上的分量。对于每个 J 的值，都有 $2J+1$ 个 m 的可能值，从 $-J$ 到 J 。因此，能级是 $(2J+1)$ -重简并的。简并能级的状态具有不同的转子绕空间固定轴方向的角动量矢量方向。

波函数 (6.46) 中的 θ 和 ϕ 角是两个质点的相对坐标。如果我们建立一个笛卡尔坐标系，令转子的质心与原点重合，那么 θ 和 ϕ 将如图 6.3 所示。该坐标系与转子质心的平移运动相同，但不在空间中转动。

转动角动量 $[J(J+1)\hbar^2]^{1/2}$ 是两个粒子相对于系统质心 C 处原点的角动量。

双原子分子的旋转能级可以用双粒子刚性转子模型 (6.52) 来很好地近似。研究发现 (Levine, *Molecular Spectroscopy*, Section 4.4)：当双原子分子吸收或发射辐射时，允许的纯转动跃迁由以下选律给出：

$$\Delta J = \pm 1 \quad (6.53)$$

此外，分子必须具有非零偶极矩，才能显示出纯转动光谱。纯转动跃迁 (pure rotational transition) 是指只有转动量子数发生变化的跃迁。[振动-转动跃迁 (第 4.3 节) 涉及振动量子数和转动量子数的变化。] 相邻较低旋转能级之间的能级间隔明显小于振动能级之间的能级间隔，纯转动光谱位于微波 (或远红外) 区域。因此，双原子分子纯转动光谱线的频率 (近似值) 为：

$$\nu = \frac{E_{J+1} - E_J}{h} = \frac{[(J+1)(J+2) - J(J+1)]\hbar^2}{8\pi^2 I} = 2(J+1)B \quad (6.54)$$

$$B \equiv h/8\pi^2 I, \quad J = 0, 1, 2, \dots \quad (6.55)$$

B 称为分子的转动常数 (rotational constant)。




图 6.3: 双粒子刚性转子的坐标系

在室温下，具有较低 J 值的双粒子旋转能级间隔通常小于 kT 或与 kT 处于同一数量级，因此，玻尔兹曼分布律 (4.63) 表明：室温下许多转动能级可以被显著占据。 $J = 0$ 的双原子分子吸收辐射后会产生一条频率为 $2B$ 的谱线（对应 $J = 0 \rightarrow 1$ 的跃迁）， $J = 1$ 的分子吸收辐射后会产生一条频率为 $4B$ 的谱线（对应 $J = 1 \rightarrow 2$ 的跃迁）， $J = 2$ 的分子吸收辐射后会产生一条频率为 $6B$ 的谱线（对应 $J = 2 \rightarrow 3$ 的跃迁），依此类推。见图6.4。




图 6.4: 双粒子刚性转子吸收跃迁

通过测量转动吸收频率可以得到 B 的值。根据 B ，我们可以得到分子的转动惯量 I ，根据 I 我们可以得到键长 d 。找到的 d 值是 $v = 0$ 振动运动的平均值。由于图4.6和图 13.1 中的势能曲线不对称， d 比图 13.1 中的平衡键长略长。

如第4.3节所述， $^1\text{H}^{35}\text{Cl}$ 和 $^1\text{H}^{37}\text{Cl}$ 等同位素分子的电子能量曲线 $U(R)$ 几乎相同，因此其平衡核间距也几乎相同。然而，不同的同位素质量会产生不同的转动惯量，从而产生不同的转动吸收频率。

由于分子不是刚性的，因此双原子分子的旋转能级与刚性转子的旋转能级略有不同。由式 (6.52) 和 (6.55)，双粒子刚性转子的能级为 $E_{rot} = BhJ(J+1)$ 。由于分子振动的非谐性（图4.6、4.5），当振动量子数 v 增加时，核间距平均值也会增加，所以 v 增加时，转动惯量 I 也会增加，则转动常数 B 减小。为了考虑 B 对 v 的依赖性，在 E_{rot} 中用 B_v 代替 B 。振动能级 v 的平均转动常数 (mean rotational constant) B_v 满足 $B_v = B_e - \alpha_e(v + 1/2)$ ，其中 B_e 是利用图4.5和4.5势能曲线底部的平衡核间距 R_e 计算得出的，振转耦合常数 (vibrational-rotational coupling constant) α_e 是一个大于零的常数（因分子的不同而异），且远小于 B_e 。此外，随着转动能量的增加，平衡核间距有非常轻微的增加 [这种现象称为离心形变 (centrifugal distortion)]。这就在 E_{rot} 中引入了一项 $-hDJ^2(J+1)^2$ ，其中离心形变常数 D 是一个极小的正数，随着分子的不同而异。例如，对 $^{12}\text{C}^{15}\text{O}$ 分子， $B_0 = 57636 \text{ MHz}$ ， $\alpha_e = 540 \text{ MHz}$ ， $D = 0.18 \text{ MHz}$ 。如第4.3节所述，对于轻双原子分子，几乎所有分子在室温下都处在基态振动能级，观测到的转动常数为 B_0 。

有关双原子分子核运动的更多讨论，请参见第13.2节。关于多原子分子的转动能，请参见 Townes and Schawlow, chaps. 2-4。

例题：分子 $^{12}\text{C}^{32}\text{S}$ 的最低频率纯转动吸收线位于 48991.0 MHz 。计算分子的键长。

最低频率的转动吸收为 $J = 0 \rightarrow 1$ 线。根据式 (1.4)、(6.52) 和 (6.51)，有

$$h\nu = E_{upper} - E_{lower} = \frac{1(2)\hbar^2}{2\mu d^2} - \frac{0(1)\hbar^2}{2\mu d^2}$$

其中 $d = (h/4\pi^2\nu\mu)^{1/2}$ 。使用附录中的表 A.3, 有

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} = \frac{12 (31.97207)}{(12 + 31.97207)} \frac{1}{6.02214 \times 10^{23}} \text{ g} = 1.44885 \times 10^{-23} \text{ kg}$$

质量的国际单位为千克, 则

$$\begin{aligned} d &= \frac{1}{2\pi} \left(\frac{h}{\nu_{0 \rightarrow 1} \mu} \right)^{1/2} = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{6.62607 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}}{(48991.0 \times 10^6 \text{ s}^{-1}) (1.44885 \times 10^{-26} \text{ kg})} \right]^{1/2} \\ &= 1.5377 \times 10^{-10} \text{ m} = 1.5377 \text{ \AA} \end{aligned}$$

练习: 分子 $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$ 的 $J = 1 \rightarrow 2$ 的纯转动跃迁位于 230.538 GHz。 (1 GHz = 10^9 Hz。) 计算分子的键长。(答案: $1.1309 \times 10^{-10} \text{ m}$ 。)

6.5 氢原子

氢原子包含一个质子和一个电子, 若用 e 表示质子的电荷量 ($e = +1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$), 则电子的电荷量为 $-e$ 。

一些科学家推测, 质子和电子的电荷量并不完全相等。实验表明, 电子和质子的电荷量差距在 10^{-21} 的数量级。见 G. Bressi 等., *Phys. Rev. A*, **83**, 052101 (2011) (available online at arxiv.org/abs/1102.2766).

我们将假定质子和电子是质点, 其相互作用遵守库仑定律。在讨论原子和分子时, 我们通常会考虑孤立的系统, 而忽略原子和分子间的相互作用。

我们不只讨论氢原子, 而是稍微考虑一个更为普遍的问题: **类氢原子** (hydrogenlike atom), 它由一个电子和一个电荷为 Ze 的原子核组成。若 $Z = 1$, 则类氢原子就是氢原子; 若 $Z = 2$, 则类氢原子是 He^+ ; 若 $Z = 3$, 则类氢原子是 Li^{2+} ; 依此类推。类氢原子是量子化学中最重要的系统。由于存在电子间斥力, 因此无法获得具有一个以上电子的原子的薛定谔方程的精确解。如果作为粗略的第一近似值, 我们忽略这些斥力, 那么电子就可以独立处理 (参见第 6.2 节)。原子波函数将由单电子函数的乘积近似得出, 而单电子函数将是类氢波函数。单电子波函数 (无论是否为类氢波函数) 称为**轨道** (orbital)。(更确切地说, **轨道**是一个单电子空间波函数, 空间一词的意思是波函数取决于电子的三个空间坐标 x, y 和 z 或 r, θ 和 ϕ 。我们将在第 10 章中看到, 电子自旋的存在为单电子波函数增加了第四个坐标, 即所谓的自旋轨道。) 原子中电子的轨道称为**原子轨道** (atomic orbital)。我们将使用原子轨道来构建多电子原子的近似波函数 (第 11 章)。轨道还可用于构建分子的近似波函数。

对于类氢原子, 令 (x, y, z) 为电子相对于原子核的坐标, 再令 $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 。电子在类氢原子中受到的库仑力为 [见公式 (1.37)]

$$\mathbf{F} = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{\mathbf{r}}{r} \quad (6.56)$$

其中 $\mathbf{r}/r$ 是 $\mathbf{r}$ 方向的单位矢量。负号表示为吸引力。

我们考虑了库仑定律出现微小偏差的可能性。实验表明, 如果将库仑定律力写成与 r^{-2+s} 成正比, 那么 $|s| < 10^{-16}$ 。库仑定律的偏差可以证明光子静止质量不为零。没有证据表明光子的静止质量不为零, 而且数据表明, 任何这种质量都必须小于 10^{-51} g ; A. S. Goldhaber and M. M. Nieto, *Rev. Mod. Phys.*, **82**, 939 (2010) (arxiv.org/abs/0809.1003); G. Spavieri et al., *Eur. Phys. J. D*, **61**, 531 (2011) (link.springer.com/content/pdf/10.1140/epjd/e2011-10508-7).




图 6.5: 相对球坐标

式 (6.56) 中的力是中心力，将其与式 (6.4) 相比较，有 $d(r)/dr = Ze^2/4\pi\epsilon_0 r^2$ 。积分，得出

$$V = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{1}{r^2} dr = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (6.57)$$

其中积分常数取 0，以便在电荷间距无限大时能满足 $V = 0$ 。对于任意两个相距 r_{12} ，电荷量分别为 Q_1 和 Q_2 的粒子，式 (6.57) 可以写成

$$V = -\frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \quad (6.58)$$

由于这个双粒子系统的势能只取决于粒子的相对坐标，我们可以应用第 6.3 节的结果将问题简化为两个单粒子问题。原子的整体平移运动只是在总能量中增加了一个常数，我们将不再关注它。为了处理系统的内部运动，我们引入一个质量由下式定义的假想粒子

$$\mu = \frac{m_e m_N}{m_e + m_N} \quad (6.59)$$

其中 m_e 为电子的质量， m_N 为原子核的质量。质量为 μ 的粒子在势能函数 (6.57) 的作用下运动，其坐标 (r, θ, ϕ) 是一个粒子相对于另一个粒子的球面坐标（图 6.5）。

粒子内部运动的哈密顿算符为 [式 (6.43)]

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (6.60)$$

由于 V 只是坐标 r 的函数，这是一个单粒子中心力问题，所以我们可以使用第 6.1 节的结果来求解。使用方程 (6.16) 和 (6.17)，我们可以写出波函数

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r) Y_l^m(\theta, \phi), \quad l = 0, 1, 2, \dots, \quad |m| \leq l \quad (6.61)$$

其中 Y_l^m 是球谐函数，径向函数 $R(r)$ 满足

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \left(R'' + \frac{2}{r} R' \right) + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2} R - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} R = ER(r) \quad (6.62)$$

为了节省时间，我们定义常数 a 满足

$$a \equiv \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{\mu e^2} \quad (6.63)$$

则方程 (6.62) 可以写成

$$R'' + \frac{2}{r} R' + \left[\frac{8\pi\epsilon_0 E}{ae^2} + \frac{2Z}{ar} - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] R = 0 \quad (6.64)$$

径向方程的求解

现在我们可以尝试 (6.64) 的幂级数解法，但得到的是三项递推关系，而不是两项递推关系。因此，我们要寻找一种能得到两项递推关系的替代方法。事实证明，通过研究大 r 值时解的行为，可以找到合适的替代方法。当 r 值很大时，方程 (6.64) 变为

$$R'' + \frac{8\pi\epsilon_0 E}{ae^2} R = 0, \quad \text{当 } r \text{ 很大时} \quad (6.65)$$

该微分方程可以使用特征方程 (2.7) 求解。其解为

$$\exp \left[\pm (-8\pi\epsilon_0 E/ae^2)^{1/2} r \right] \quad (6.66)$$

假设 E 为正数。(6.66) 中平方根符号下的量是负数，乘以 r 的因子是虚数：

$$R(r) \sim e^{\pm i\sqrt{2\mu E r}/\hbar}, \quad E \geq 0 \quad (6.67)$$

其中我们用到了 (6.63)。(6.67) 中的符号 $\sim$ 表示我们给出的是在 r 值较大时 $R(r)$ 的行为，这就是函数的渐近 (asymptotic) 行为。请注意 (6.67) 与自由粒子波函数公式 (2.30) 的相似性。(6.67) 并没有给出正能量波函数中的完整径向因子。进一步的研究 (*Bethe and Salpeter*, 第 21-24 页) 表明，无论 E 的值如何， $E \geq 0$ 的径向函数在所有 r 值上都是有限的。因此，正如自由粒子一样，氢原子的所有非负能量都是允许的。在物理学上，这些本征函数对应于电子不与原子核结合的状态，即原子电离时的状态。（一个经典的机械比喻是彗星围绕太阳在双曲线轨道上运动。彗星不受约束，只访问太阳系一次。）由于我们得到的 $E \geq 0$ 的允许值是连续的而不是离散的，因此正能量本征函数又称为**连续谱本征函数** (continuum eigenfunctions)。连续谱波函数的角度部分是球面谐波。与自由粒子波函数一样，连续谱本征函数也不是通常意义上可归一化的。

现在我们考虑氢原子的束缚态，即 $E < 0$ 。（对于一个**束缚态**，当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时， $\psi \rightarrow 0$ 。）在这种情况下，(6.66) 中括号内的量为正数。由于我们希望波函数在 r 变为无穷大时保持有限，因此我们更倾向于使用 (6.66) 中的负号，为了得到两项递推关系，我们将其替换为

$$R(r) = e^{-Cr} K(r) \quad (6.68)$$

$$C \equiv \left(-\frac{8\pi\epsilon_0 E}{ae^2} \right)^{1/2} \quad (6.69)$$

其中，(6.68) 中的 e 是自然对数的底数，而不是电子的电荷量。使用代换 (6.68) 无法保证当 r 很大时的波函数行为。这样代换得到的微分方程仍然有两个线性独立的解。我们可以在微分方程中进行任意代换；事实上，我们可以进行如下代换 $R(r) = e^{+Cr} J(r)$ 并最终得到正确的本征函数和本征值。 J 和 K 的关系自然是 $J(r) = e^{-2Cr} K(r)$ 。

根据 (6.68)，我们来计算 R' 和 R'' ，带入 (6.64)，乘以 $r^2 e^{Cr}$ 并利用 (6.69) 得到 $K(r)$ 的微分方程：

$$r^2 K'' + (2r - 2Cr^2) K' + [(2Za^{-1} - 2C)r - l(l+1)] K = 0 \quad (6.70)$$

现在，我们可以用以下形式的幂级数来代替 K ：

$$K = \sum_{k=0}^{\infty} c_k r^k \quad (6.71)$$

如果我们这样做，就会发现：一般来说，(6.71) 中的前几项的系数都是零。如果 c_s 是第一个不为零的系数，那么 (6.71) 可以写为

$$K = \sum_s^{\infty} c_k r^k, \quad c_s \neq 0 \quad (6.72)$$

令 $j \equiv k - s$ ，再定义 $b_j \equiv c_{j+s}$ ，我们有

$$K = \sum_{j=0}^{\infty} c_{j+s} r^{j+s} = r^s \sum_{j=0}^{\infty} b_j r^j, \quad b_0 \neq 0 \quad (6.73)$$

(虽然我们所做的各种替换看似随意，但它们却是用幂级数求解微分方程的标准程序。) 将整数 s 代入微分方程即可求出结果。方程 (6.73) 变为

$$K(r) = r^s M(r) \quad (6.74)$$

$$M(r) = \sum_{j=0}^{\infty} b_j r^j, \quad b_0 \neq 0 \quad (6.75)$$

求出 (6.74) 中的 K' 和 K'' ，将其代入 (6.70)，得到

$$r^2 M'' + [(2s+2)r - 2Cr^2] M' + [s^2 + s + (2Za^{-1} - 2C - 2Cs)r - l(l+1)] M = 0 \quad (6.76)$$

为了求出 s ，我们先看 $r=0$ 时的 (6.76)。由 (6.75)，我们得到

$$M(0) = b_0, \quad M'(0) = b_1, \quad M''(0) = 2b_2 \quad (6.77)$$

在 (6.76) 中使用 (6.77)，得到

$$b_0 (s^2 + s - l^2 - l) = 0 \quad (6.78)$$

由于 b_0 不为零，括号中式子就必须为零： $s^2 + s - l^2 - l = 0$ 。这是一个关于未知数 s 的二次方程。它的根为

$$s = l, \quad s = -l - 1 \quad (6.79)$$

这些根对应于微分方程的两个线性独立解。让我们从波函数正确行为的角度来研究它们。由 (6.68)、(6.74) 和 (6.75)，我们有

$$R(r) = e^{-Cr} r^s \sum_{j=0}^{\infty} b_j r^j \quad (6.80)$$

由于 $e^{-Cr} = 1 - Cr + \dots$ ，当 r 很小时， $R(r)$ 的行为与 $b_0 r^s$ 相同。当 $s = l$ 时， $R(r)$ 在原点处表现正常。然而，当 $s = -l - 1$ 时， $R(r)$ 与下式在 r 很小时成正比：

$$\frac{1}{r^{l+1}} \quad (6.81)$$

由于 $l = 0, 1, 2, \dots$ ，则根 $s = -l - 1$ 使得波函数中径向部分在原点处变得无限大。许多文献都将此作为拒绝接受这一根的充分理由。然而，这并不是一个很好的论据，因为对于相对论 (relativistic) 氢原子来说， $l = 0$ 的本征函数在 $r = 0$ 处是无限的。因此，让我们从平方可积性的角度来研究 (6.81)，因为我们当然要求束缚态本征函数是可归一化的。

与 (6.81) 类似的径向函数的归一化积分 [式 (5.80)] (当 r 不是很大时) 如下

$$\int_0^\infty |R|^2 r^2 dr \approx \int_0^\infty \frac{1}{r^{2l}} dr \quad (6.82)$$

积分下限处的积分行为是

$$\left. \frac{1}{r^{2l}} \right|_{r=0} \quad (6.83)$$

对于 $l = 1, 2, 3, \dots$ ，(6.83) 是无限的，那么归一化积分也是无限的。因此我们舍去当 $l \geq 1$ 时的根 $s = -l - 1$ 。不过，对于 $l = 0$ ，(6.83) 是有限的，平方可积性也没有问题。因此，径向方程存在一个平方可积的解，在小 r 时表现为 r^{-1} 。

对这一解决方案的进一步研究表明，它所对应的能量值是实验氢原子谱所不存在的。因此， r^{-1} 的解必须被舍去，但对这样做的原因存在一些争议。一种观点认为：除原点外， $1/r$ 的在空间的任何地方都满足薛定谔方程，因此必须予以舍去 [Dirac, page 156; B. H. Armstrong and E. A. Power, *Am. J. Phys.*, **31**, 262 (1963)]。第二种观点认为，必须舍去 $1/r$ 的解，因为哈密顿算符对它来说不是厄米的 (Merzbacher, Section 10.5)。(在第 7 章中，我们将定义厄米算符，并说明量子力学算符必须是厄米的。) 进一步讨论见 A. A. Khelashvili 和 T. P. Nadareishvili, *Am. J. Phys.*, **79**, 668 (2011) (see arxiv.org/abs/1102.1185) and in Y. C. Cantelaube, arxiv.org/abs/1203.0551.

取 (6.79) 的第一个根，我们得到了径向部分的因子 (6.80)

$$R(r) = e^{-Cr} r^l M(r) \quad (6.84)$$

由于 $s = l$, (6.75) 变为

$$rM'' + (2l + 1 - 2Cr) M' + (2Za^{-1} - 2C - 2Cl) M = 0 \quad (6.85)$$

由 (6.75)，我们有

$$\begin{aligned} M(r) &= \sum_{j=0}^{\infty} b_j r^j \quad (6.86) \\ M' &= \sum_{j=0}^{\infty} b_j j r^{j-1} = \sum_{j=1}^{\infty} j b_j r^{j-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) b_{k+1} r^k = \sum_{j=0}^{\infty} (j+1) b_{j+1} r^j \\ M'' &= \sum_{j=0}^{\infty} j(j-1) b_j r^{j-2} = \sum_{j=1}^{\infty} b_j j(j-1) r^{j-2} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) k b_{k+1} r^{k-1} \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} (j+1) j b_{j+1} r^{j-1} \quad (6.87) \end{aligned}$$

将这些式子代入 (6.85) 并求和，得到

$$\sum_{j=0}^{\infty} \left[j(j+1) b_{j+1} + 2(l+1)(j+1) b_{j+1} + \left(\frac{2Z}{a} - 2C - 2Cl - 2Cj \right) b_j \right] r^j = 0$$

令 r^j 的系数为零，得到递推关系式

$$b_{j+1} = \frac{2C + 2Cl + 2Cj - 2Za^{-1}}{j(j+1) + 2(l+1)(j+1)} b_j \quad (6.88)$$

现在我们必须研究大 r 时无穷级数 (6.86) 的行为。根据对 (4.42) 中谐振子幂级数的相同检验方法得出的结果，对于大 r ，无穷级数 (6.86) 的表现与 e^{2Cr} 一致 (见问题 6.20)。当 r 很大时，径向函数 (6.84) 的表现

$$R(r) \sim e^{-Cr} r^l e^{2Cr} = r^l e^{Cr} \quad (6.89)$$

因此，当 r 变得无穷大时， $R(r)$ 将变为无穷大，并且不具有平方可积性。避免这种“无穷大灾难” (如谐振子情况) 的唯一方法是让级数在有限的项数后被打断，在这种情况下， e^{-Cr} 因子将确保波函数在 r 变为无穷大时趋于零。令该级数的最后一项为 $b_k r^k$ 。那么为了使 $b_{k+1}, b_{k+2}, \dots$ 都为零，我们必须让 $j = k$ 时，递推关系 (6.88) 中与 b_j 相乘的系数消失。因此，

$$2C(k+l+1) = 2Za^{-1}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (6.90)$$

k 和 l 都是整数，现在我们定义一个新的整数 n ：

$$n \equiv k + l + 1, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (6.91)$$




图 6.6: 氢原子的能级

根据 (6.91), 量子数 l 必须满足

$$l \leq n - 1 \quad (6.92)$$

因此, l 的取值范围为 0 到 $n - 1$ 。

能级

将 (6.91) 代入 (6.90), 得到

$$Cn = Za^{-1} \quad (6.93)$$

将 $C \equiv (-8\pi\epsilon_0 E/ae^2)^{1/2}$ [式 (6.69)] 代入 (6.93), 解出 E , 得到

$$E = -\frac{Z^2}{n^2} \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a} = -\frac{Z^2 \mu e^4}{8\epsilon_0^2 n^2 h^2} \quad (6.94)$$

其中 $a \equiv 4\pi\epsilon_0 \hbar^2 / \mu e^2$ [式 (6.63)]。这些是类氢原子的束缚态能级, 它们是离散的。图 6.6 显示了氢原子 ($Z = 1$) 的势能曲线 [公式 (6.57)] 和一些允许能级。横线表示允许使用所有正能量。

事实证明, 在光的吸收和发射过程中, n 的所有变化都是允许的。因此, 氢原子谱线的波长 [公式 (4.64)] 为

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} = \frac{E_2 - E_1}{hc} = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a h c} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad (6.95)$$

其中 $R_H = 109677.6 \text{ cm}^{-1}$ 是氢的里德伯常数 (Rydberg constant)。

简并

氢原子的能级是简并的吗? 对于束缚态, 能量 (6.94) 只取决于 n 。然而, 波函数 (6.61) 取决于所有三个量子数 n 、 l 和 m , 它们的允许值分别为 [式 (6.91)、(6.92)、(5.104) 和 (5.105)]

$$n = 1, 2, 3, \dots \quad (6.96)$$

$$l = 0, 1, 2, \dots, n - 1 \quad (6.97)$$

$$m = -l, -l+1, \dots, 0, \dots, l-1, l \quad (6.98)$$

l 或 m 值不同但 n 值相同的氢原子态具有相同的能量。能级是简并的，只有 $n=1$ 除外，此时 l 和 m 必须都为 0。对于给定的 n 值，我们可以有 n 个不同的 l 值。对于每个 l 值，我们都可以有 $2l+1$ 个 m 值。H 原子束缚态能级的简并度等于 n^2 （省略了旋转方面的考虑），见问题 6.16。对于连续能级，事实证明，对于给定的能量， l 的最大值没有限制；因此，这些能级是无穷重简并的。

氢原子的径向方程也可以通过梯形算符（也称为因式分解（factorization））来求解；参见 Z. W. Salsburg, *Am. J. Phys.*, **33**, 36 (1965)。

6.6 束缚态氢原子波函数

径向因子

使用 (6.93)，我们有递推关系 (6.88)

$$b_{j+1} = \frac{2Z}{na} = \frac{j+l+1-n}{(j+1)(j+2l+2)} b_j \quad (6.99)$$

(6.91) 前面的讨论表明：多项式 $M(r) = \sum_j b_j r^j$ 中 r 的最高次幂为 $k = n-l-1$ 。因此，将 $C = Z/na$ (6.93) 代入 $R(r) e^{-Cr} M(r)$ (6.84)，我们得到

$$R_{nl}(r) = r^l e^{-Zr/na} \sum_{j=0}^{n-l-1} b_j r^j \quad (6.100)$$

其中 $a \equiv 4\pi\epsilon_0\hbar^2/\mu e^2$ [式 (6.63)]。完整的类氢束缚态波函数为 [式 (6.61)]

$$\psi_{nlm} = R_{nl}(r) Y_l^m(\theta, \phi) = R_{nl}(r) S_{lm}(\theta) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\phi} \quad (6.101)$$

其中前几个 θ 函数见表 5.1。

$R(r)$ 有多少个节点？径向函数在 $r = \infty$ 、 $l \neq 0$ 时 $r=0$ 和使 $M(r)$ 消失的 r 值处为零。 $M(r)$ 是一个 $n-l-1$ 次多项式，可以证明， $M(r)=0$ 的所有根均为正实数。因此，除了原点和无穷远之外， $R(r)$ 还有 $n-l-1$ 个节点。球谐函数的节点将在问题 6.41 中讨论。

基态波函数和能量

对于类氢原子的基态，我们有 $n=1$ ， $l=0$ ， $m=0$ 。因此，径向因子 (6.100) 为

$$R_{10}(r) = b_0 e^{-Zr/a} \quad (6.102)$$

常数 b_0 可以通过归一化条件 [式 (5.80)] 来确定：

$$|b_0|^2 \int_0^\infty e^{-2Zr/a} r^2 dr = 1$$

使用附录中的积分 (A.8)，我们得到

$$R_{10}(r) = 2 \left(\frac{Z}{a} \right)^{3/2} e^{-Zr/a} \quad (6.103)$$

乘上 $Y_0^0 = 1/(\sqrt{4\pi})$ ，我们得到基态波函数：

$$\psi_{100} = \frac{1}{\pi^{1/2}} \left(\frac{Z}{a} \right)^{3/2} e^{-Zr/a} \quad (6.104)$$

氢原子的能量和波函数涉及约化质量，由式 (6.59) 给出

$$\mu_H = \frac{m_e m_p}{m_e + m_p} = \frac{m_e}{1 + m_e/m_p} = \frac{m_e}{1 + 0.000544617} = 0.9994557 m_e \quad (6.105)$$

其中 m_p 是质子的质量， m_e/m_p 的值从表 A.1 中可以查到。约化质量与电子的质量非常接近。正因为如此，一些教科书在 H 原子薛定谔方程中使用电子的质量而不是约化质量。这相当于假设质子的质量与 (6.105) 中电子的质量相比是无限大的，并且所有的内部运动都是电子的运动。对于氢原子来说，用电子质量代替约化质量所带来的误差约为 1/2000。对于较重的原子，假设原子核无限重所带来的误差甚至比这还要小。此外，对于多电子原子，核运动的修正形式也相当复杂。基于这些原因，我们今后将假设原子核无限重，并在书写原子的薛定谔方程时简单地使用电子质量。

如果我们用电子质量代替氢原子的约化质量，则由 (6.63) 定义的量 a 变为

$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{m_e e^2} = 0.529177 \text{ \AA} \quad (6.106)$$

其中下标 0 表示使用电子质量而不是约化质量。因为 a_0 是玻尔理论中氢原子基态中电子移动的圆半径，所以它被称为**玻尔半径** (Bohr radius)。当然，由于基态波函数 (6.104) 对所有有限的 r 值都不为零，因此在离原子核的任何距离上都有一定概率找到电子。电子当然不会被限制在一个圆内。

电子能量的方便单位是**电子伏特** (electronvolt) (eV)，定义为电子在 1 伏特 (V) 电位差中加速所获得的动能。电位差的定义是单位电荷的能量。由于 $e = 1.6021766 \times 10^{-19} \text{ C}$ 以及 $1 \text{ V C} = 1 \text{ J}$ ，因此

$$1 \text{ eV} = 1.6021766 \times 10^{-19} \text{ J} \quad (6.107)$$

例题：使用国际单位制计算氢原子的基态能量，并将结果转换为电子伏特。

氢原子基态能量由式 (6.94) 给出，其中 $n = 1$, $Z = 1$ ，能量为 $E = -\mu e^4 / 8\hbar^2 \epsilon_0^2$ 。将 μ 用 (6.105) 代替，得到

$$\begin{aligned} E &= -\frac{0.9994557 (9.109383 \times 10^{-31} \text{ kg}) (1.6021766 \times 10^{-19} \text{ C})^4}{8 (6.626070 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})^2 (8.8541878 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N} \cdot \text{m}^2)^2} \frac{Z^2}{n^2} \\ E &= - (2.178686 \times 10^{-18} \text{ J}) (Z^2/n^2) [(1 \text{ eV}) / (1.6021766 \times 10^{-19} \text{ J})] \\ E &= - (13.598 \text{ eV}) (Z^2/n^2) = -13.598 \text{ eV} \end{aligned} \quad (6.108)$$

这是一个值得记住的数字。基态氢原子电离所需的最小能量为 13.598 eV。

练习：求 Li^{2+} 的 $n = 2$ 能量，用电子伏特表示；尽可能减少计算量。(答案：-30.60 eV。)

例题：求氢原子基态的动能平均期望 $\langle T \rangle$ 。

对 $\langle T \rangle$ 的计算，我们使用 (3.89)；而对 $\nabla^2 \psi$ 的计算，我们使用 (6.7)。因此，

$$\begin{aligned} \langle T \rangle &= \int \psi^* \hat{T} \psi d\tau = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \int \psi^* \nabla^2 \psi d\tau \\ \nabla^2 \psi &= \frac{\partial^2 \psi}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial \psi}{\partial r} - \frac{1}{r^2 \hbar^2} \hat{L}^2 \psi = \frac{\partial^2 \psi}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial \psi}{\partial r} \end{aligned}$$

其中，我们用到了 $\hat{L}^2 \psi = l(l+1) \hbar^2 \psi$ 以及对于 s 态有 $l = 0$ 。将 $Z = 1$ 带入 (6.104)，我们

有 $\psi = \pi^{-1/2} a^{-3/2} e^{-r/a}$ 。因此, $\partial\psi/\partial r = -\pi^{-1/2} a^{-5/2} e^{-r/a}$, $\partial^2\psi/\partial r^2 = \pi^{-1/2} a^{-7/2} e^{-r/a}$ 。使用 $d\tau = r^2 \sin\theta dr d\theta d\phi$ (5.78), 我们有

$$\begin{aligned}\langle T \rangle &= -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{1}{\pi a^4} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^\infty \left(\frac{1}{a} e^{-2r/a} - \frac{2}{r} e^{-2r/a} \right) r^2 \sin\theta dr d\theta d\phi \\ &= -\frac{\hbar^2}{2\mu\pi a^4} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^\infty \left(\frac{r^2}{a} e^{-2r/a} - 2r e^{-2r/a} \right) dr = \frac{\hbar^2}{2\mu a^2} = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a}\end{aligned}$$

其中, 我们用到了附录中的积分 A.8 以及 $a = 4\pi\epsilon_0\hbar^2/\mu e^2$ 。根据 (6.94), $e^2/8\pi\epsilon_0 a$ 为基态氢原子能量的负值, $\langle T \rangle$ 由 (6.108) 给出 $\langle T \rangle = 13.598 \text{ eV}$ 。(另见第14.4节。)

练习: 使用 (6.113), 求氢原子 $2p_0$ 的动能平均期望 $\langle T \rangle$ 。(答案: $e^2/32\pi\epsilon_0 a = (13.598 \text{ eV})/4 = 3.40 \text{ eV}$ 。)

让我们来看看基态波函数 (6.104) 的一个重要性质。我们有 $r = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$ 。对于在 x 轴上的点, $y = 0, z = 0$, 则 $r = (x^2)^{1/2} = |x|$ 。即

$$\psi_{100}(x, 0, 0) = \pi^{-1/2} (Z/a)^{-3/2} e^{-Z|x|/a} \quad (6.109)$$

图 6.7 显示了 (6.109) 沿 x 轴的变化情况。尽管 ψ_{100} 在原点处连续, 但曲线切线的斜率在原点左侧为正, 而在原点右侧为负。因此 $\partial\psi/\partial x$ 在原点处不连续。我们说波函数在原点处有一个尖点 (cusp)。尖顶的出现是因为势能 $V = -Ze^2/4\pi\epsilon_0 r$ 在原点处变得无限大。回想一下, 箱中粒子波函数在箱壁上的斜率是不连续的。




图 6.7: 氢原子基态波函数中的尖点

我们用三个下标来表示氢原子束缚态波函数, 分别表示 n 、 l 和 m 的值。在另一种表示中, l 的值用字母表示:

字母	s	p	d	f	g	h	i	k	...
l	0	1	2	3	4	5	6	7	...

(6.110)

字母 s 、 p 、 d 、 f 源于光谱学, 分别代表尖锐 (sharp)、主要 (principal)、扩散 (diffuse) 和基本 (fundamental)。之后, 我们按字母顺序排列, 只是省略了 j 。在 l 的字母前, 我们写上 n 的值。因此, 基态波函数 ψ_{100} 可以写成 ψ_{1s} 或更简单的 $1s$ 。

$n = 2$ 的波函数

对于 $n = 2$, 我们有状态 ψ_{200} 、 ψ_{21-1} 、 ψ_{210} 、 ψ_{211} 。我们将 ψ_{200} 表示为 ψ_{2s} 或简单的 $2s$ 。为了区分三个 $2p$ 函数, 我们使用下标来表示 m 值, 并将它们表示为 $2p_1$ 、 $2p_0$ 和 $2p_{-1}$ 。从 (6.100) 可

以看出，波函数中的径向因子取决于 n 和 l ，但不取决于 m 。因此，三个 $2p$ 波函数都具有相同的径向因子。根据 (6.100) 和 (6.99) 可以用通常的方法求出 $2s$ 和 $2p$ 的径向因子，然后进行归一化处理。结果见表 6.1。请注意， $n = 2$ 径向函数中的指数因子与 R_{1s} 函数中的指数因子不同。将径向因子乘以适当的球谐函数，就能得到完整的波函数。使用 (6.101)、表 6.1 和表 5.1，我们有

$$2s = \frac{1}{2\pi^{1/2}} \left(\frac{Z}{a}\right)^{3/2} \left(1 - \frac{Zr}{2a}\right) e^{-Zr/2a} \quad (6.111)$$

$$2p_{-1} = \frac{1}{8\pi^{1/2}} \left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2} r e^{-Zr/2a} \sin \theta e^{-i\phi} \quad (6.112)$$

$$2p_0 = \frac{1}{2\pi^{1/2}} \left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2} r e^{-Zr/2a} \cos \theta \quad (6.113)$$

$$2p_1 = \frac{1}{8\pi^{1/2}} \left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2} r e^{-Zr/2a} \sin \theta e^{i\phi} \quad (6.114)$$

表 6.1: 类氢原子波函数的径向因子

$R_{1s} = 2 \left(\frac{Z}{a}\right)^{3/2} e^{-Zr/a}$
$R_{2s} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{Z}{a}\right)^{3/2} \left(1 - \frac{Zr}{2a}\right) e^{-Zr/2a}$
$R_{2p} = \frac{1}{2\sqrt{6}} \left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2} r e^{-Zr/2a}$
$R_{3s} = \frac{2}{3\sqrt{3}} \left(\frac{Z}{a}\right)^{3/2} \left(1 - \frac{Zr}{3a} + \frac{2Z^2 r^2}{27a^2}\right) e^{-Zr/3a}$
$R_{3p} = \frac{8}{27\sqrt{6}} \left(\frac{Z}{a}\right)^{3/2} \left(\frac{Zr}{a} - \frac{Z^2 r^2}{6a^2}\right) e^{-Zr/3a}$
$R_{3d} = \frac{4}{81\sqrt{30}} \left(\frac{Z}{a}\right)^{7/2} r^2 e^{-Zr/3a}$

表 6.1 列出了类氢波函数中的一些归一化径向因子。图 6.8 是一些径向函数的示意图。除了 s 状态以外，因子 r^l 使得径向函数在 $r = 0$ 处为零。

径向分布函数

在空间中位于 r 到 $r + dr$ 、 θ 到 $\theta + d\theta$ 、 ϕ 到 $\phi + d\phi$ 的体积微元内找到电子的概率为 [式 (5.78)]


$$|\psi|^2 d\tau = [R_{nl}(r)]^2 |Y_l^m(\theta, \phi)|^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi \quad (6.115)$$

我们现在想知道：在不限制 θ 和 ϕ 值的情况下，电子的径向坐标介于 r 和 $r + dr$ 之间的概率是多少？我们想知道在以原点为中心的薄球壳中找到电子的概率，其内半径为 r ，外半径为 $r + dr$ 。因此，我们必须在保持 r 不变的情况下，将 θ 和 ϕ 所有可能值的无穷小概率 (6.115) 相加。这相当于在 θ 和 ϕ 上对 (6.115) 进行积分。因此，在 r 到 $r + dr$ 的区间内找到电子的概率为

$$[R_{nl}(r)]^2 r^2 dr \int_0^{2\pi} \int_0^\pi |Y_l^m(\theta, \phi)|^2 \sin \theta d\theta d\phi = [R_{nl}(r)]^2 r^2 dr \quad (6.116)$$

其中，我们用到了球谐函数是归一化的：

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi |Y_l^m(\theta, \phi)|^2 \sin \theta d\theta d\phi = 1 \quad (6.117)$$



氢原子 ($Z = 1$) 波函数径向因子 $R_{nl}(r)$ 的示意
图 6.8: 图。所有图表都使用了相同的比例尺。(在某些课本中, 这些函数没有按比例绘制)。

从 (5.72) 和 (5.80) 可以看出。函数 $R^2(r)r^2$ 决定了在距离原子核 r 处找到电子的概率, 称为**径向分布函数** (radial distribution function); 见图 6.9。


对于氢原子的 $1s$ 基态, 概率密度 $|\psi|^2$ 由式 (6.104) 给出, 等于 $e^{-2r/a}$ 乘上一个常数, 因此 $|\psi_{1s}|^2$ 在 $r = 0$ 处达到最大值 (见图 6.14)。然而, 径向分布函数 $[R_{1s}(r)]^2 r^2$ 在原点处为零, 而在 $r = a$ 处达到最大值 (见图 6.9)。这两个事实并不矛盾。概率密度 $|\psi|^2$ 与在体积为 $dxdydz$ 的无限小盒子中找到电子的概率成正比, 而这一概率在原子核处为最大值。径向分布函数与在内外半径分别为 r 和 $r + dr$ 的薄球壳中找到电子的概率成正比, 这一概率在 $r = a$ 处达到最大值。由于 ψ_{1s} 只与 r 有关, $1s$ 的概率密度在薄球壳中基本恒定。如果我们把薄壳想象成无数个无穷小的盒子, 每个盒子的体积都是 $dxdydz$, 那么我们就可以把在薄壳中每个小盒子中的概率 $|\psi_{1s}|^2 dxdydz$ 相加, 得到在薄壳中找到电子的概率是 $|\psi_{1s}|^2 V_{\text{shell}}$ 。薄壳的体积 V_{shell} 为

$$\frac{4}{3}\pi(r+dr)^3 - \frac{4}{3}\pi r^3 = 4\pi r^2 dr$$

其中 $(dr)^2$ 和 $(dr)^3$ 与 dr 相比可以忽略。因此, 位于薄壳中的概率是

$$|\psi_{1s}|^2 V_{\text{shell}} = R_{1s}^2 (Y_0^0)^2 4\pi r^2 dr = R_{1s}^2 \left[(4\pi)^{-1/2} \right]^2 4\pi r^2 dr = R_{1s}^2 r^2 dr$$

与 (6.116) 一致。 $1s$ 径向分布函数在 $r = 0$ 时为零, 因为当 r 变为零时, 薄球壳的体积 $4\pi r^2 dr$ 变

图 6.9: 氢原子径向分布函数 $[R_{nl}(r)]^2 r^2$ 的图象。

为零。它们的乘积 $|\psi_{1s}|^2 4\pi r^2 dr$ 在 $r = a$ 处达到最大值。

例题：求基态 H 原子中电子与原子核的距离小于 a 的概率。

我们希望找到径向坐标介于 0 到 a 之间的概率。将处于 r 和 $r + dr$ 之间的无穷小概率 (6.116) 在 0 到 a 的范围内求和，就可以得出这个结果。这个无穷小量之和就是定积分

$$\begin{aligned} \int_0^a R_{10}^2 r^2 dr &= \frac{4}{a^3} \int_0^a e^{-2r/a} r^2 dr = -\frac{4}{a^3} e^{-2r/a} \left(-\frac{r^2}{2} - \frac{2ra^2}{4} - \frac{2a^3}{8} \right) \Big|_0^a \\ &= 4 [e^{-2} (-5/4) - (-1/4)] = 0.323 \end{aligned}$$

其中 R_{10} 来自表 6.1，用到了附录中的积分 A.7。

练习：求 $2p_1$ H 原子中电子与原子核的距离小于 a 的概率。使用积分表或网站 integrals.wolfram.com。(答案：0.00366。)

实际类氢函数

除了 $m = 0$ 以外，因子 $e^{im\phi}$ 使得球谐函数为复数。化学家通常不使用 (6.112) 和 (6.114) 等复波函数，而是使用由复函数的线性组合形成的实类氢波函数。第 3.6 节的定理给出了这一步骤的理由：简并能级的任何本征函数的线性组合都是具有相同本征值的哈密顿算符的本征函数。由于氢原子的能量与 m 无关，状态 $2p_1$ 和 $2p_{-1}$ 属于一个简并的能级。它们的任何线性组合都是哈密顿算符的本征函数，具有相同的能量本征值。

将这两个函数组合起来得到一个实函数的方法是

$$2p_x \equiv \frac{1}{\sqrt{2}} (2p_1 + 2p_{-1}) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2} r e^{-Zr/2a} \sin \theta \cos \phi \quad (6.118)$$

其中，我们用到了 (6.112)、(6.114) 和 $e^{\pm i\phi} = \cos \phi \pm i \sin \phi$ 。因子 $1/\sqrt{2}$ 使得波函数 $2p_x$ 归一化：

$$\begin{aligned} \int |2p_x|^2 d\tau &= \frac{1}{2} \left(\int |2p_1|^2 d\tau + \int |2p_{-1}|^2 d\tau + \int (2p_{-1})^* 2p_1 d\tau + \int (2p_1)^* 2p_{-1} d\tau \right) \\ &= \frac{1}{2} (1 + 1 + 0 + 0) = 1 \end{aligned}$$

其中我们用到了 $2p_1$ 和 $2p_{-1}$ 是归一化且互相正交的性质，因为

$$\int_0^{2\pi} (e^{i\phi})^* e^{i\phi} d\phi = \int_0^{2\pi} e^{2i\phi} d\phi = 0$$

如果我们注意到 (5.51) 给出了下式，那么 (6.118) 的命名 $2p_x$ 就会更加清晰：

$$2p_x = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2} x e^{-Zr/2a} \quad (6.119)$$

第二种组合函数的方法是

$$2p_y \equiv \frac{1}{i\sqrt{2}} (2p_1 - 2p_{-1}) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2} r \sin \theta \sin \phi e^{-Zr/2a} \quad (6.120)$$

$$2p_y = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2} y e^{-Zr/2a} \quad (6.121)$$

函数 $2p_0$ 是实数，通常用下式表示：

$$2p_0 = 2p_z = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2} z e^{-Zr/2a} \quad (6.122)$$

其中大写的 Z 表示核中的质子数，小写的 z 为电子的 z 坐标。函数 $2p_x$ 、 $2p_y$ 和 $2p_z$ 是互相正交的。注意 $2p_z$ 在 xOy 平面内为零，在该平面上方为正，在下方为负。

函数 $2p_{-1}$ 和 $2p_1$ 都是算符 $\hat{L}^2$ 的本征函数，其本征值也相同，为 $2\hbar^2$ 。第 3.6 节的推理表明，线性组合 (6.118) 和 (6.120) 也是 $\hat{L}^2$ 的本征函数，其本征值为 $2\hbar^2$ 。然而， $2p_{-1}$ 和 $2p_1$ 是 $\hat{L}_z$ 的本征函数，但本征值分别为 $-\hbar$ 和 $\hbar$ 。因此， $2p_x$ 和 $2p_y$ 不是 $\hat{L}_z$ 的本征函数。

我们可以推广这一过程，为更高的状态构建实波函数。由于 m 的范围是从 $-l$ 到 $+l$ ，对于每个包含因子 $e^{-i|m|\phi}$ 的复函数，都有一个 n 和 l 值相同但包含因子 $e^{+i|m|\phi}$ 的函数，将这些函数相减，得到两个实函数，其中一个具有因子 $\cos(|m|\phi)$ ，另一个具有因子 $\sin(|m|\phi)$ 。表 6.2 列出了类氢原子的实波函数。这些函数的下标来自与 $2p_x$ 、 $2p_y$ 和 $2p_z$ 函数类似的考虑。例如， $3d_x$ 函数与 xy 成正比（问题 6.37）。

实类氢波函数由复函数导出，方法如下：当 $m \neq 0$ 时，将 $e^{im\phi}/(2\pi)^{1/2}$ 替换为 $\pi^{-1/2} \cos(|m|\phi)$ 或 $\pi^{-1/2} \sin(|m|\phi)$ ；当 $m = 0$ 时，对于实函数和复函数， ϕ 因子都为 $1/(2\pi)^{1/2}$ 。

在处理分子时，实类氢轨道比复类氢轨道更有用。例如，我们将在第 7 节中看到，氧原子的实原子轨道 $2p_x$ 、 $2p_y$ 和 $2p_z$ 具有适当的对称性，可用于构建 H_2O 分子的波函数，而复数 $2p$ 轨道则不具备这种对称性。

表 6.2: 类氢原子的实波函数

$1s = \frac{1}{\pi^{1/2}} \left(\frac{Z}{a}\right)^{3/2} e^{-Zr/a}$
$2s = \frac{1}{4(2\pi)^{1/2}} \left(\frac{Z}{a}\right)^{3/2} \left(2 - \frac{Zr}{2a}\right) e^{-Zr/2a}$
$2p_z = \frac{1}{4(2\pi)^{1/2}} \left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2} r e^{-Zr/2a} \cos \theta$
$2p_x = \frac{1}{4(2\pi)^{1/2}} \left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2} r e^{-Zr/2a} \sin \theta \cos \phi$
$2p_y = \frac{1}{4(2\pi)^{1/2}} \left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2} r e^{-Zr/2a} \sin \theta \sin \phi$
$3s = \frac{1}{81(3\pi)^{1/2}} \left(\frac{Z}{a}\right)^{3/2} \left(27 - 18\frac{Zr}{a} + 2\frac{Z^2 r^2}{a^2}\right) e^{-Zr/3a}$
$3p_z = \frac{2^{1/2}}{81\pi^{1/2}} \left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2} \left(6 - \frac{Zr}{a}\right) r e^{-Zr/3a} \cos \theta$
$3p_x = \frac{2^{1/2}}{81\pi^{1/2}} \left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2} \left(6 - \frac{Zr}{a}\right) r e^{-Zr/3a} \sin \theta \cos \phi$
$3p_y = \frac{2^{1/2}}{81\pi^{1/2}} \left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2} \left(6 - \frac{Zr}{a}\right) r e^{-Zr/3a} \sin \theta \sin \phi$
$3d_{z^2} = \frac{1}{81(6\pi)^{1/2}} \left(\frac{Z}{a}\right)^{7/2} r^2 e^{-Zr/3a} (3\cos^2 \theta - 1)$
$3d_{xz} = \frac{2^{1/2}}{81(6\pi)^{1/2}} \left(\frac{Z}{a}\right)^{7/2} r^2 e^{-Zr/3a} \sin \theta \cos \theta \cos \phi$
$3d_{yz} = \frac{2^{1/2}}{81(6\pi)^{1/2}} \left(\frac{Z}{a}\right)^{7/2} r^2 e^{-Zr/3a} \sin \theta \cos \theta \sin \phi$
$3d_{x^2-y^2} = \frac{1}{81(2\pi)^{1/2}} \left(\frac{Z}{a}\right)^{7/2} r^2 e^{-Zr/3a} \sin^2 \theta \cos 2\phi$
$3d_{xy} = \frac{1}{81(2\pi)^{1/2}} \left(\frac{Z}{a}\right)^{7/2} r^2 e^{-Zr/3a} \sin^2 \theta \sin 2\phi$

6.7 类氢轨道

类氢波函数是单电子空间波函数，类氢轨道也是单电子空间波函数（第 6.5 节）。这些函数是针对单电子原子得出的，我们不能指望用它们来真正准确地表示多电子原子的波函数。第 11 章将讨论如何使用轨道概念来近似多电子原子的波函数。现在我们只讨论单电子原子。

描绘轨道有两种完全不同的方法。一种方法是绘制函数图象；第二种方法是绘制概率密度恒定的等值面。

首先考虑绘制函数图象。要将 ψ 的变化绘制成三个自变量 r 、 θ 和 ϕ 的函数，我们需要四个维度。我们世界的三维特性使我们无法绘制这样的图表。因此，我们绘制 ψ 中某个因子的图象。绘制 $R(r)$ 与 r 的关系图，我们得到图 6.8 的曲线，其中不包含 ψ 角度变化的任何信息。




图 6.10: 氢原子波函数中 s 和 p_z 的 θ 因子的极坐标图。

现在来考虑 $S(\theta)$ 的图象，由表 (5.1)，我们有


$$S_{0,0} = 1/\sqrt{2}, \quad S_{1,0} = \frac{1}{2}\sqrt{6}\cos\theta$$

我们可以使用二维直角坐标绘制这些函数的图象，在纵轴上绘制 S ，在横轴上绘制 θ 。 $S_{0,0}$ 给出了一条水平直线，而 $S_{1,0}$ 给出了一条余弦曲线。更常见的情况是使用平面极坐标系绘制 S 的图象。变量 θ 是与 z 轴正半轴的夹角，而 $S(\theta)$ 是从原点到图上点的距离。对于 $S_{0,0}$ 我们得到了一个圆；对于 $S_{1,0}$ ，我们得到了两个相切的圆（图 6.10）。 $S_{1,0}$ 图像中较低的圆旁边的负号，表示当 $\frac{1}{2}\pi < \theta \leq \pi$ 时， $S_{1,0}$ 为负值。严格来说，在绘制 $\cos\theta$ 时，我们只得到了较高的圆，它被绘制了两次；要得到两个相切的圆，我们必须绘制 $|\cos\theta|$ 。

我们可以绘制一张 $|S(\theta)T(\phi)|$ 与 θ 和 ϕ 的函数关系图，而不是分别绘制角向因子的图象。我们将使用球坐标，从原点到图上点的距离将为 $|S(\theta)T(\phi)|$ 。对于 s 状态， ST 与角度无关，因此我们得到了一个半径为 $1/(4\pi)^{1/2}$ 的球面。而对于 p_z 状态， $ST = \frac{1}{2}(3/\pi)^{1/2}\cos\theta$ ， $|ST|$ 的图象由两个球体组成，球体中心位于 z 轴，并与原点相切（图 6.11）。毫无疑问，图 6.11 是大家很熟悉的。有些书上说这给出了 p_z 轨道的形状，这是错误的。图 6.11 只是一张波函数 p_z 中的角向因子图。角向因子 p_x 和 p_y 的图形分别给出了位于 x 和 y 轴上的切线球。如果我们以球面坐标绘制 S^2T^2 ，就会得到具有我们熟悉的八字形截面的表面；重复一遍，这些是图形，而不是轨道形状。

现在，考虑绘制概率密度恒定的等值面。我们将在空间中画出曲面，在每个曲面上，概率密度 $|\psi|^2$ 的值都是恒定的。自然，如果 $|\psi|^2$ 在给定的曲面上是常数，那么 $|\psi|$ 在该曲面上也是常数。 $|\psi|^2$ 和 $|\psi|$ 的等值面是相同的。


对于 s 轨道， ψ 只与 r 有关，等值面就是一个恒定 r 的曲面，即以原点为中心的球面。为了确定一个轨道的大小，我们取一个等值面，在这个等值面内找到电子的概率比如说是 95%，因此我们希望 $\int_V |\psi|^2 d\tau = 0.95$ ，其中 V 是轨道等值面所包围的体积。

图 6.11: p_z 波函数中角向因子 $|Y_1^0(\theta, \phi)|$ 的图象。

让我们来计算类氢轨道 $2p_y$ 在 yOz 平面上的横截面。在该平面上, 有 $\phi = \pi/2$ (图6.5) 以及 $\sin \phi = 1$; 因此表 6.2 给出了该轨道在 yOz 平面上的情况

$$|2p_y| = k^{5/2} \pi^{-1/2} r e^{-kr} |\sin \theta| \quad (6.123)$$

其中 $k = Z/2a$ 。为了找到轨道横截面, 我们使用平面极坐标来绘制 ψ 固定值的 (6.123) 图; r 是到原点的距离, 而 θ 是与 z 轴的夹角。图 6.12 显示了典型等值线的结果 (问题 6.44)。由于 $y e^{-kr} = y \exp \left[-k(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} \right]$, 我们可以看到 $2p_y$ 轨道是 y 和 $(x^2 + z^2)$ 的函数。因此, 在以 y 轴为中心、平行于 xOz 平面的圆上, $2p_y$ 是常数。因此, 将图 6.12 中的横截面绕 y 轴旋转, 可以得到一对扭曲的椭圆体, 从而形成三维等值面。实际 $2p$ 轨道的形状是两个分离的扭曲椭圆体, 而不是两个相切的球体。

图 6.12: $2p_y$ 轨道等值线。

现在来考虑两个复轨道 $2p_{\pm 1}$ 的形状。我们有

$$2p_{\pm 1} = k^{5/2} \pi^{-1/2} r e^{-kr} \sin \theta e^{\pm i\phi}$$

$$|2p_{\pm 1}| = k^{5/2} \pi^{-1/2} e^{-kr} r |\sin \theta| \quad (6.124)$$

这两个轨道有相同的形状。由于 (6.124) 和 (6.123) 的右边相同, 我们得出结论: 图 6.12 也给出了 yOz 平面上 $2p_{\pm 1}$ 轨道的横截面。由于 [式 (5.51)]

$$e^{-kr} r |\sin \theta| = \exp \left[-k(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} \right] (x^2 + y^2)^{1/2}$$

我们看到 $2p_{\pm 1}$ 轨道是 z 和 $(x^2 + y^2)$ 的函数, 因此, 我们将图 6.12 绕 z 轴旋转, 就能得到三维轨道形状。这样就形成了一个甜甜圈状的表面。

图 6.13 显示了一些类氢轨道面。 $2s$ 轨道有一个看不到的球形节点； $3s$ 轨道有两个这样的节点。 $3p_z$ 轨道有一个球形节点（虚线表示）和一个节点平面（ xOy 平面）。 $3d_{z^2}$ 轨道有两个节点锥。 $3d_{x^2-y^2}$ 轨道有两个节平面。请注意，不同轨道的视图并不相同。波函数的相对符号已标出。表 6.2 中的其他三个实 $3d$ 轨道与 $3d_{x^2-y^2}$ 轨道形状相同，但方向不同。 $3d_{xy}$ 轨道的裂片位于 x 轴和 y 轴之间，它是通过将 $3d_{x^2-y^2}$ 轨道绕 z 轴旋转 45° 而得到的。 $3d_{yz}$ 和 $3d_{xz}$ 轨道的裂片分别位于 y 轴和 z 轴之间以及 x 轴和 z 轴之间。（真实类氢轨道的在线三维视图见 www.falstad.com/qmatom；可使用鼠标旋转）





图 6.13: 一些氢原子轨道的形状。

图 6.14 表示各种轨道在 yOz 平面上的概率密度。特定区域中点的数量与该区域中的 $|\psi|^2$ 值成正比。将这些图表绕垂直 (z) 轴旋转，就得到了三维概率密度。 $2s$ 轨道的角度系数是一个常数，因此没有角向节点；对于这个轨道， $n - l - 1 = 1$ ，表明有一个径向节点。图 6.14 显示了 $\psi_{2s} = 0$ 的球面。

薛定谔最初对 $|\psi|^2$ 的解释是，电子被“涂抹”成电子云。如果我们考虑一个电子从一种介质传递到另一种介质，我们会发现 $|\psi|^2$ 在两种介质中都不为零。根据电子云的解释，这意味着电子的一部



一些氢原子状态的概率密度。有关精确

图 6.14: 的立体图, 请参见 D. T. Cromer, *J. Chem. Educ.*, **45**, 626 (1968).

分被反射, 一部分被透射。然而, 在实验中, 我们永远无法检测到电子的一小部分; 电子是不可分割的实体。根据玻恩解释, 两种介质中的 $|\psi|^2$ 值给出了反射和透射的概率, 从而解决了这一难题。我们绘制的轨道形状给出了找到电子的总概率为 95% 的空间区域。

6.8 塞曼效应

1896 年, 塞曼 (Zeeman) 观察到外加磁场会导致原子光谱线分裂。我们将研究氢原子的塞曼效应 (Zeeman Effect)。我们首先回顾一下磁学。

磁场产生于移动的电荷。速度为 $\mathbf{v}$ 的电荷 Q 在空间 P 点产生磁场 $\mathbf{B}$, 其中

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Q\mathbf{v} \times \mathbf{r}}{r^3} \quad (6.125)$$

其中 $\mathbf{r}$ 是从电荷 Q 到点 P 的位置矢量, μ_0 [称为**真空磁导率** (permeability of vacuum) 或**磁常数** (magnetic constant)] 定义为 $4\pi \times 10^{-7} \text{ N C}^{-2} \text{ s}^2$ 。[公式 (6.125) 只适用于速度远小于光速的非加速电荷。] 矢量 $\mathbf{B}$ 称为**磁感应强度** (magnetic induction) 或**磁通量** (magnetic flux density)。(以前认为矢量 $\mathbf{H}$ 是基磁场矢量, 所以称 $\mathbf{H}$ 为**磁场强度**。现在人们知道 $\mathbf{B}$ 是基磁场矢量) 公式 (6.125) 采用国际单位制, Q 单位为库仑, $\mathbf{B}$ 单位为特斯拉 (Tesla) (T), 其中 $1 \text{ T} = 1 \text{ N C}^{-1} \text{ m}^{-1} \text{ s}$ 。

两个电荷 $+Q$ 和 $-Q$ 相隔很小的距离 b 就构成了一个电偶极子。**电偶极矩** (electric dipole moment) 被定义为从 $-Q$ 到 $+Q$ 的矢量, 大小为 Qb 。对于一个小的平面电流环, 电流中的移动电荷所产生的磁场与电偶极子所产生的电场的数学表达式相同, 只是电偶极矩被**磁偶极矩** (magnetic dipole moment) $\mathbf{m}$ 所取代; $\mathbf{m}$ 是一个大小为 IA 的矢量, 其中 I 是在面积为 A 的环中流动的电流。 $\mathbf{m}$ 的方向与电流回路的平面垂直。

考虑与以速度 v 在半径为 r 的圆内运动的电荷 Q 有关的磁 (偶极) 子。电流是单位时间内的电荷流量。圆的周长为 $2\pi r$, 旋转一周的时间为 $2\pi r/v$ 。因此, 电流为 $I = Qv/2\pi r$ 。因此, 磁偶极矩 $\mathbf{m}$ 的大小为

$$|\mathbf{m}| = IA = (Qv/2\pi r) \pi r^2 = Qvr/2 = Qrp/2m \quad (6.126)$$

其中 m 是带电粒子的质量, p 为其动量。由于径向矢量 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{p}$ 垂直, 我们有

$$\mathbf{m}_L = \frac{Q\mathbf{r} \times \mathbf{p}}{2m} = \frac{Q}{2m} \mathbf{L} \quad (6.127)$$

其中我们用到了轨道角动量 $\mathbf{L}$ 的定义, $\mathbf{m}$ 的下标表示它来源于粒子的轨道运动。虽然我们用圆周运动的特殊情况得出了 (6.127), 但其有效性是普遍的。对于一个电子, $Q = -e$, 因其轨道运动而产生

的磁矩为

$$\mathbf{m}_L = -\frac{e}{2m_e} \mathbf{L} \quad (6.128)$$

矢量 $\mathbf{L}$ 的大小由 (5.95) 给出, 而具有轨道角动量子数 l 的电子的轨道磁矩大小为

$$|\mathbf{m}_L| = \frac{e\hbar}{2m_e} [l(l+1)]^{1/2} = \mu_B [l(l+1)]^{1/2} \quad (6.129)$$

常量 $e\hbar/2m_e$ 称为玻尔磁子 (Bohr magneton), 记作 μ_B :

$$\mu_B \equiv e\hbar/2m_e = 9.2740 \times 10^{-24} \text{ J/T} \quad (6.130)$$

现在我们来考虑给氢原子施加外部磁场。磁偶极子 $\mathbf{m}$ 与外部磁场 $\mathbf{B}$ 之间的相互作用能量可表示为

$$E_B = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B} \quad (6.131)$$

使用式 (6.128), 我们有

$$E_B = \frac{e}{2m_e} \mathbf{L} \cdot \mathbf{B} \quad (6.132)$$

我们沿外加磁场的方向确定 z 轴的位置: $\mathbf{B} = B\mathbf{k}$, 其中 $\mathbf{k}$ 是 z 方向的单位矢量。我们有

$$E_B = \frac{e}{2m_e} B (L_x \mathbf{i} + L_y \mathbf{j} + L_z \mathbf{k}) \cdot \mathbf{k} = \frac{e}{2m_e} B L_z = \frac{\mu_B}{\hbar} B L_z$$

其中 L_z 是轨道角动量在 z 方向上的分量。我们现在将 L_z 替换为算符 $\hat{L}_z$, 在哈密顿算符中得到以下由外部磁场产生的附加项:

$$\hat{H}_B = \mu_B B \hbar^{-1} \hat{L}_z \quad (6.133)$$

外加磁场中氢原子的薛定谔方程为

$$(\hat{H} + \hat{H}_B) \psi = E \psi \quad (6.134)$$

其中, $\hat{H}$ 是在无外场作用下氢原子的哈密顿算符。我们很容易验证公式 (6.134) 的解就是复类氢波函数 (6.61):

$$(\hat{H} + \hat{H}_B) R(r) Y_l^m(\theta, \phi) = \hat{H} R Y_l^m + \mu_B \hbar^{-1} B \hat{L}_z R Y_l^m = \left(-\frac{Z^2}{n^2} \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a} + \mu_B B m \right) R Y_l^m \quad (6.135)$$

其中用到了式 (6.94) 和 (5.105)。因此, 能量中存在一个附加项, 而外部磁场消除了 m 简并。由于显而易见的原因, m 通常被称为磁量子数 (magnetic quantum number)。实际上, 由于电子自旋磁矩的存在, 观测到的能量偏移与公式 (6.135) 的预测值并不一致 (第 10 章和第 11.7 节。)

在第 5 章中, 我们发现在量子力学中, $\mathbf{L}$ 位于一个圆锥面上。对 $\mathbf{L}$ 在外加磁场中运动的经典力学处理表明: 场对 $\mathbf{m}_L$ 产生力矩, 使 $\mathbf{L}$ 以 $|\mathbf{m}_L| B/2\pi |\mathbf{L}|$ 给定的恒定频率绕 $\mathbf{B}$ 的方向旋转, 同时与 $\mathbf{B}$ 保持恒定角度。这种脱落运动称为进动 (precession)。在量子力学中, 完整指定 $\mathbf{L}$ 是不可能的。然而, 我们会发现 $\langle \mathbf{L} \rangle$ 绕着场的方向进动。(Dicke and Wittke, Section 12-3)

6.9 径向薛定谔方程的数值解法

对于单粒子中心力问题, 波函数 $\psi = R(r) Y_l^m(\theta, \phi)$ 由 (6.16) 给出, 径向因子 $R(r)$ 通过求解径向方程 (6.17) 得到。第 4.4 节中的 Numerov 方法适用于形式为 $\psi'' = G(x) \psi(x)$ 的微分方程 [式 (4.66)], 为了应用该方法, 我们需要消去 (6.17) 中的一阶导数 R' 。让我们定义 $F(r) \equiv rR(r)$, 则

$$R(r) = r^{-1} F(r) \quad (6.136)$$

因此, $R' = -r^{-2}F + r^{-1}F'$, $R'' = -2r^{-3}F + 3r^{-2}F' - r^{-1}F''$ 。将这些表达式代入 (6.17), 将径向方程变换为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}F''(r) + \left[V(r) + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2mr^2} \right] F(r) = EF(r) \quad (6.137)$$

$$F''(r) = G(r)F(r), \quad \text{其中 } G(r) \equiv \frac{m}{\hbar^2}(2V - 2E) + \frac{l(l+1)}{r^2} \quad (6.138)$$

其形式符合了 Numerov 方法的要求。为了使用数值法解 (6.137), 我们需要分别处理每个 l 的值。方程 (6.137) 类似于—维薛定谔方程—— $(\hbar^2/2m)\psi''(x) + V(x)\psi(x) = E\psi(x)$, 只不过用 r (范围是 $0 \rightarrow \infty$) 代替了 x (范围是 $-\infty$ 到 $+\infty$), $F(r) \equiv rR(r)$ 代替了 ψ , $V(r) + l(l+1)\hbar^2/2mr^2$ 代替了 $V(x)$ 。我们可以预期, 对于每个 l 值, 能量最低的解将有 0 个内部节点 (即 $0 < r < \infty$ 的节点), 下一个最低的解将有 1 个内部节点, 依此类推。

回顾式 (6.81) 之后的讨论, 若 $R(r)$ 在原点附近表现与 $1/r^b$ 相似, 那么如果 $b > 1$, 则 $R(r)$ 不是平方可积的; 值 $b = 1$ 是不允许的, 如 (6.83) 之后所述。因此, 当 $r = 0$ 时, 必须有 $F(r) \equiv rR(r)$ 为零。

对于 $l \neq 0$ 的情况, (6.138) 中的 $G(r)$ 在 $r = 0$ 处发散, 这会让大多数电脑感到不爽。为了避免这个问题, 我们可以从极小的 r 值开始求解 (例如, 10^{-15} 为无量纲的 r_r) 并近似 $F(r)$ 在该点为零。

例如, 我们将使用 Numerov 方法求解最低束缚态 H 原子能量。有 $V = -e^2/4\pi\epsilon_0 r = -e'^2/r$, 其中 $e' \equiv e/(4\pi\epsilon_0\hbar^2/m)^{1/2}$ 。径向方程 (6.62) 包含三个常数 e' 、 μ 和 $\hbar$, 其中 $e' \equiv e/(4\pi\epsilon_0\hbar^2/m)^{1/2}$ 具有国际单位 $\text{m N}^{1/2}$ (见附录的表 A.1), 因此, 有量纲的 $[e'] = \text{L}^{3/2}\text{M}^{1/2}\text{T}^{-1}$ 。按照公式 (4.73) 的推导过程, 我们发现 H 原子的约化能量和约化径向坐标为 (问题 6.47)

$$E_r = E/\mu e'^4 \hbar^{-2}, \quad r_r = r/B = r/\hbar^2 \mu^{-1} e'^{-2} \quad (6.139)$$

使用 (6.139)、(4.76) 和 (4.77) 将 ψ 替换为 F , 使用 $B = \hbar^2 \mu^{-1} e'^{-2}$ 将氢原子的式 (6.137) 变换为 (问题 6.47)

$$F_r'' = G_r F_r, \quad \text{其中 } G_r = l(l+1)/r_r^2 - 2/r_r - 2E_r \quad (6.140)$$

其中 $F_r = F/B^{-1/2}$ 。

氢原子束缚态能量均小于零。假设我们想知道 $E_r \leq -0.04$ 的氢原子束缚态本征值。令该能量等于 V_r , 我们有 (问题 6.47) $-0.04 = -1/r_r$, 而这个能量值的经典允许区域从 $r_r = 0$ 一直延伸到 $r_r = 25$ 。进入经典禁区 2 个单位长度, 我们有 $r_{r,\max} = 27$ 并要求 $F_r(27) = 0$ 。我们将 s_r 设为 0.1, 将 0 到 27 均分为 270 个点 (更准确地说, 是 10^{-15} 到 $27 + 10^{-15}$)。

(6.140) 中的 G_r 包含参数 l , 所以必须修改表 4.1 中的程序, 以输入 l 的值。设置电子表格时, 请在某个单元格中输入 l 值, 并在输入定义 G_r 的单元格 B7 的公式时参考该单元格 (图 4.9 4.8)。A 列的起始位置为 $r_r = 1 \times 10^{-15}$ 。电子表格的 C 列将包含 F_r 值, 而不是 ψ_r 值, F_r 在 $r_r = 1 \times 10^{-15}$ 处与零相差很小, 可以忽略不计, 因此在该点将取为零。

根据上述选择, 我们可以找到 (问题 6.48a) 的最低三个 $l = 0$ 的 H 原子本征值为 $E_r = -4970, -0.1246, -0.0205499$, 最低两个 $l = 1$ 本征值为 -0.1250 和 -0.05526 。真实值 [式 (6.94) 和 (6.139)] 为 $-0.5000, -0.1250, -0.05555$ 。精度一般的主要原因是 $G(r)$ 在 $r = 0$ 附近的快速变化。如果 s_r 取为 0.025 而不是 1 (得到 1080 个点), $l = 0$ 的本征值将精确到 $-0.4998, -0.12497$ 和 -0.05510 。另见问题 6.48b。

总结

习题

Chapter 7

量子力学理论

7.1 符号

单电子原子的薛定谔方程（第6章）是可以精确求解的。然而，由于哈密顿算符中的电子间斥力项，多电子原子和分子的薛定谔方程无法精确求解。因此，我们必须寻求近似的求解方法。第8章和第9章将介绍两种主要的近似方法，即变分法和微扰理论。要推导出这些方法，我们必须进一步发展量子力学理论，这就是本章所要做的。

在开始之前，我们先介绍一些符号。夹在两个函数之间的算符在全空间上的定积分经常出现，并使用各种缩写：

$$\int f_m^* \hat{A} f_n d\tau \equiv \langle f_m | \hat{A} | f_n \rangle \equiv \langle m | \hat{A} | n \rangle \quad (7.1)$$

其中 f_m 和 f_n 是两个函数。如式 (7.1) 所示，若两个函数的含义是明确的，我们就可以只用下标来区分。狄拉克引入的上述符号称为**括号符号** (bracket notation) (此处为直译，多用狄拉克符号，下同)。另一种符号是

$$\int f_m^* \hat{A} f_n d\tau \equiv A_{mn} \quad (7.2)$$

符号 A_{mn} 和 $\langle m | \hat{A} | n \rangle$ 都表示我们使用字母在前的复函数的复共轭。定积分 $\langle m | \hat{A} | n \rangle$ 称为算符 $\hat{A}$ 的一个**矩阵元** (matrix element)。矩阵是数字的矩形数组，遵守一定的组合规则 (见第7.10节)。

我们将对两个函数全空间的定积分写作

$$\int f_m^* f_n d\tau \equiv \langle f_m | f_n \rangle \equiv \langle m | n \rangle \quad (7.3)$$

注意：

$$\langle f | \hat{B} | g \rangle = \langle f | \hat{B} g \rangle$$

其中 f 和 g 是函数。由于 $(\int f_m^* f_n d\tau)^* = \int f_n^* f_m d\tau$ ，我们可以得到

$$\boxed{\langle m | n \rangle^* = \langle n | m \rangle} \quad (7.4)$$

由于取了 (7.1) 中 f_m 的复共轭，因此可以得出

$$\boxed{\langle cf | \hat{B} | g \rangle = c^* \langle f | \hat{B} | g \rangle \quad \text{和} \quad \langle f | \hat{B} | cg \rangle = c \langle f | \hat{B} | g \rangle} \quad (7.5)$$

其中 $\hat{B}$ 是线性算符， c 是常数。

7.2 厄米算符

代表物理量的量子力学算符都是线性算符（第3.1节）。这些算符必须满足一个额外的要求，我们现在就来讨论这个问题。

厄米算符的定义

设 $\hat{A}$ 是对应某个物理量 A 的线性算符。则 A 的平均期望为 [式 (3.88)]

$$\langle A \rangle = \int \Psi^* \hat{A} \Psi d\tau$$

其中 Ψ 是系统的态函数。由于物理量的平均值一定是一个实数，我们要求

$$\begin{aligned} \langle A \rangle &= \langle A \rangle^* \\ \int \Psi^* \hat{A} \Psi d\tau &= \left[\int \Psi^* \hat{A} \Psi d\tau \right]^* = \int (\Psi^*)^* (\hat{A} \Psi)^* d\tau \\ \int \Psi^* \hat{A} \Psi d\tau &= \int \Psi (\hat{A} \Psi)^* d\tau \end{aligned} \quad (7.6)$$

式 (7.6) 必须对每个代表系统可能状态的波函数 Ψ 都成立，也就是说，所有品优函数 Ψ 都必须满足式 (7.6)。对所有品优函数都满足式 (7.6) 的算符称为**厄米算符** (Hermitian operator) (由数学家厄米的名字命名——Charles Hermite)。

许多教科书将厄米算符定义为对所有品优函数 f 和 g 都满足下式的线性算符：

$$\int f^* \hat{A} g d\tau = \int g (\hat{A} f)^* d\tau \quad (7.7)$$

注意：在 (7.7) 的左侧，算符 $\hat{A}$ 作用在函数 g 上；而在右侧，算符 $\hat{A}$ 作用在函数 f 上。对于特例 $f = g$ ，式 (7.7) 退化为式 (7.6)。等式 (7.7) 显然是比 (7.6) 更强的要求，但我们将证明 (7.7) 是 (7.6) 的结果。因此，两种厄米算符的定义是等价的。

我们首先在 (7.6) 中令 $\Psi = f + cg$ ，其中 c 是一个任意常数。则

$$\begin{aligned} \int (f + cg)^* \hat{A} (f + cg) d\tau &= \int (f + cg) [\hat{A} (f + cg)]^* d\tau \\ &= \int (f^* + c^* g^*) \hat{A} f d\tau + \int (f^* + c^* g^*) \hat{A} c g d\tau \\ &= \int (f^* + c^* g^*) \hat{A} f d\tau + \int (f^* + c^* g^*) c \hat{A} g d\tau \\ &= \int f^* \hat{A} f d\tau + c^* \int g^* \hat{A} f d\tau + c \int f^* \hat{A} g d\tau + c^* c \int g^* \hat{A} g d\tau \\ &= \int f (\hat{A} f)^* d\tau + c \int g (\hat{A} f)^* d\tau + c^* \int f (\hat{A} g)^* d\tau + c c^* \int g (\hat{A} g)^* d\tau \end{aligned}$$

根据 (7.6)，最后一个等式两边的首项相等；同样，两边的尾项也相等。因此，

$$c^* \int g^* \hat{A} f d\tau + c \int f^* \hat{A} g d\tau = c \int g (\hat{A} f)^* d\tau + c^* \int f (\hat{A} g)^* d\tau \quad (7.8)$$

在 (7.8) 中令 $c = 1$ ，我们有

$$\int g^* \hat{A} f d\tau + \int f^* \hat{A} g d\tau = \int g (\hat{A} f)^* d\tau + \int f (\hat{A} g)^* d\tau \quad (7.9)$$

在 (7.8) 中令 $c = i$, 两边同除以 i , 我们有

$$-\int g^* \hat{A} f \, d\tau + \int f^* \hat{A} g \, d\tau = \int g (\hat{A} f)^* \, d\tau - \int f (\hat{A} g)^* \, d\tau \quad (7.10)$$

将 (7.9) 和 (7.10) 相加, 我们得到了 (7.7)。结论得到了证明。

因此, 厄米算符 $\hat{A}$ 定义为满足如下条件的线性算符:

$$\boxed{\int f_m^* \hat{A} f_n \, d\tau = \int f_n (\hat{A} f_m)^* \, d\tau} \quad (7.11)$$

其中 f_m 和 f_n 是任意的品优函数, 积分为对全空间的定积分。使用狄拉克符号和矩阵元符号, 我们将其记作

$$\boxed{\langle f_m | \hat{A} | f_n \rangle = \langle f_n | \hat{A} | f_m \rangle^*} \quad (7.12)$$

$$\boxed{\langle m | \hat{A} | n \rangle = \langle n | \hat{A} | m \rangle^*} \quad (7.13)$$

$$\boxed{A_{mn} = (A_{nm})^*} \quad (7.14)$$

(7.12) 的两边不同之处在于交换了函数并取了复共轭。

厄米算符的例子

让我们证明, 我们一直在使用的一些算符确实是厄米的。简单起见, 我们将从一个维度进行研究。要证明一个算符是厄米的, 只需证明它对所有品优函数都满足式 (7.6) 即可。不过, 我们将通过证明满足 (7.11) 来增加一点难度。

首先, 来考虑单粒子一维势能算符。式 (7.11) 的右侧为

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_n(x) [V(x) f_m(x)]^* \, dx \quad (7.15)$$

由于势能是实函数, 我们有 $V^* = V$ 。此外, 式 (7.15) 中因子的顺序无关紧要。因此,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_n (V f_m)^* \, dx = \int_{-\infty}^{\infty} f_n V^* f_m^* \, dx = \int_{-\infty}^{\infty} f_m^* V f_n \, dx$$

这就证明了 V 是厄米的。

再考虑动量在 x 方向分量的算符 $\hat{p}_x = -i\hbar d/dx$ [式 (3.23)]。对于这个算符, 式 (7.11) 的左侧为

$$-i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} f_m^*(x) \frac{df_n(x)}{dx} \, dx$$

现在我们使用分部积分法:

$$\int_a^b u(x) \frac{dv(x)}{dx} \, dx = u(x) v(x) \Big|_a^b - \int_a^b v(x) \frac{du(x)}{dx} \, dx \quad (7.16)$$

令

$$u(x) \equiv -i\hbar f_m^*(x), \quad v(x) \equiv f_n(x)$$

那么

$$-i\hbar f_m^* \frac{df_n}{dx} \, dx = -i\hbar f_m^* f_n \Big|_{-\infty}^{\infty} + i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} f_n(x) \frac{df_m^*(x)}{dx} \, dx \quad (7.17)$$

由于 f_m 和 f_n 是品优函数, 因此在无穷远处它们的值为 (如果它们在无穷远处不为零, 则不符合平方可积的要求)。于是, (7.17) 变为

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_m^* \left(-i\hbar \frac{df_n}{dx} \right) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f_n \left(-i\hbar \frac{df_m}{dx} \right)^* dx$$

与 (7.11) 一致, 证明了 $\hat{p}_x$ 是厄米的。证明动能算符是厄米的留给读者自行考虑。可以证明, 两个厄米算符的和也是厄米的。因此, 哈密顿算符 $\hat{H} = \hat{T} + \hat{V}$ 也是厄米的。

厄米算符定理

现在我们证明一些有关厄米算符的本征值和本征函数的重要定理。

由于与物理量 A 相对应的算符 $\hat{A}$ 的本征值是测量 A 的可能结果 (第 3.3 节), 因此这些特征值都应该是实数。我们现在证明厄米算符的本征值是实数。

我们现在知道 $\hat{A}$ 是厄米算符。将这个条件转换为方程, 对于所有品优函数 f_m 和 f_n , 我们有 [式 (7.11)]

$$\int f_m^* \hat{A} f_n d\tau = \int f_n (\hat{A} f_m)^* d\tau \quad (7.18)$$

我们希望证明 $\hat{A}$ 的每个本征值都是实数。将其转换为方程, 我们希望证明 $a_i = a_i^*$, 其中本征值 a_i 满足 $\hat{A} g_i = a_i g_i$, 其中 g_i 是 $\hat{A}$ 的本征函数。

为了将本征值 a_i 引入式 (7.18), 我们将 (7.18) 写成一个特例, 其中 $f_m = g_i$ 和 $f_n = g_i$:

$$\int g_i^* \hat{A} g_i d\tau = \int g_i (\hat{A} g_i)^* d\tau$$

使用 $\hat{A} g_i = a_i g_i$, 我们有

$$\begin{aligned} a_i \int g_i^* g_i d\tau &= \int g_i (a_i g_i)^* d\tau = a_i^* \int g_i g_i^* d\tau \\ (a_i - a_i^*) \int |g_i|^2 d\tau &= 0 \end{aligned} \quad (7.19)$$

由于对 $|g_i|^2$ 的积分永远不会为负, 因此 (7.19) 中积分为零的唯一可能情况是 g_i 在所有坐标值下都为零。然而, 基于物理原因, 我们总是拒绝将 $g_i = 0$ 作为本征函数。因此, 式 (7.19) 中的积分不能为零。那么只有 $(a_i - a_i^*) = 0$, 即 $a_i = a_i^*$ 。得证。

定理 1: 厄米算符的本征值为实数。

为了帮助读者熟悉狄拉克符号, 我们将使用狄拉克符号重新证明定理 1。在式 (7.13) 中, 令 $m = i$ 以及 $n = i$, 我们得到了 $\langle i | \hat{A} | i \rangle = \langle i | \hat{A} | i \rangle^*$ 。选择下标为 i 的函数作为 $\hat{A}$ 的本征函数, 使用本征方程 $\hat{A} g_i = a_i g_i$, 我们有 $\langle i | a_i | i \rangle = \langle i | a_i | i \rangle^*$ 。因此, $a_i \langle i | i \rangle = a_i^* \langle i | i \rangle^* = a_i^* \langle i | i \rangle$, 则 $(a_i - a_i^*) \langle i | i \rangle = 0$ 。所以 $a_i = a_i^*$, 其中我们用到了 (7.4) 中 $m = n$ 。

我们已经证明: 两个不同的箱中粒子能量本征函数 ψ_i 和 ψ_j 是正交的, 也就是说对 $i \neq j$, 有 $\int_{-\infty}^{\infty} \psi_i^* \psi_j dx = 0$ [式 (2.26)]。若两个坐标相同的函数 f_1 和 f_2 满足下式。则它们是**正交的**(orthogonal):

$$\boxed{\int f_1^* f_2 d\tau = 0} \quad (7.20)$$

其中的积分是对坐标的全空间进行定积分。我们现在证明更一般的结论: 厄米算符的本征函数是或可以被选择为相互正交的。有

$$\hat{B}F = sF, \quad \hat{B}G = tG \quad (7.21)$$

其中 F 和 G 是厄米算符 $\hat{B}$ 的两个线性无关的本征函数，我们希望证明

$$\int F^* G \, d\tau \equiv \langle F|G \rangle = 0$$

我们从 (7.12) 开始，它表达了 $\hat{B}$ 的厄米性质：

$$\langle F|\hat{B}|G \rangle = \langle G|\hat{B}|F \rangle^*$$

使用式 (7.21)，我们有

$$\begin{aligned} \langle F|t|G \rangle &= \langle G|s|F \rangle^* \\ t \langle F|G \rangle &= s^* \langle G|F \rangle \end{aligned}$$

由于厄米算符的本征值为实数（定理 1），我们有 $s^* = s$ 。使用 $\langle G|F \rangle = \langle F|G \rangle^*$ （式 (7.4)），我们得到

$$\begin{aligned} t \langle F|G \rangle &= s \langle F|G \rangle \\ (t - s) \langle F|G \rangle &= 0 \end{aligned}$$

若 $s \neq t$ ，则

$$\langle F|G \rangle = 0 \quad (7.22)$$

我们已经证明，对应于不同本征值的厄米算符的两个本征函数是正交的。现在的问题是：我们能否有两个具有相同本征值的独立本征函数？答案是肯定的。在简并的情况下，我们有一个以上的本征函数有相同的本征值。因此，只有当厄米算符的两个独立本征函数不对应于一个简并本征值时，我们才能确定它们是正交的。现在我们要证明，在简并的情况下，我们可以构造出彼此正交的本征函数。我们将使用第 3.6 节中证明的定理，即任何与简并本征值对应的本征函数线性组合都是具有相同本征值的本征函数。因此，让我们假设 F 和 G 是具有相同本征值的独立本征函数：

$$\hat{B}F = sF, \quad \hat{B}G = sG$$

我们对 F 和 G 进行线性组合，形成两个新的本征函数 g_1 和 g_2 ，它们将相互正交。我们选择

$$g_1 \equiv F, \quad g_2 \equiv G + cF$$

其中常数 c 的选择是为了确保正交性。我们希望

$$\begin{aligned} \int g_1^* g_2 \, d\tau &= 0 \\ \int F^* (G + cF) \, d\tau &= \int F^* G \, d\tau + c \int F^* F \, d\tau = 0 \end{aligned}$$

因此，我们选择

$$c = - \int F^* G \, d\tau / \int F^* F \, d\tau \quad (7.23)$$

我们有两个与简并本征值相对应的正交本征函数 g_1 和 g_2 。这个过程 [称为**施密特正交化**或**格拉姆-施密特正交化** (Schmidt orthogonalization or Gram-Schmidt orthogonalization)] 可以推广到 n 重简并的情况，从而得到与简并本征值相对应的 n 个线性无关的正交本征函数。

因此，虽然不能保证简并本征值的本征函数是正交的，但如果我们愿意，总是可以通过施密特（或其他）正交化方法来选择它们是正交的。事实上，除非另有说明，我们将始终假定本征函数是正交的：

$$\int g_i^* g_k \, d\tau = 0, \quad i \neq k \quad (7.24)$$

其中 g_i 和 g_k 是厄米算符的独立本征函数。我们证明了：

定理 2: 厄米算符 $\hat{B}$ 的两个对应不同本征值的本征函数是正交的。属于简并本征值的 $\hat{B}$ 的本征函数总是可以选择为正交的。

本征函数通常可以乘以一个常数来归一化，除非另有说明，我们将假定所有本征函数都归一化了：

$$\int g_i^* g_i d\tau = 1 \quad (7.25)$$

例外情况是本征值形成一个连续体，而不是一组离散的值。在这种情况下，本征函数不满足平方可积性。例子有动量本征函数、自由粒子能量本征函数和氢原子连续能量本征函数。

使用 Kronecker 三角，定义为 $\delta_{jk} \equiv 1$ 当 $j = k$ 时， $\delta_{jk} \equiv 0$ 当 $j \neq k$ [式 (2.28)]，我们可以将 (7.24) 和 (7.25) 组合成一个方程：

$$\int g_i^* g_k d\tau = \langle i|k \rangle = \delta_{ik} \quad (7.26)$$

其中 g_i 和 g_k 是某厄米算符的本征函数。

例如，考虑球谐函数。我们希望证明

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi [Y_l^m(\theta, \phi)]^* Y_{l'}^{m'}(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi = \delta_{l,l'} \delta_{m,m'} \quad (7.27)$$

其中 θ 因子来自球面坐标中的体积元素，(5.78)。球谐函数是厄米算符 $\hat{L}^2$ 的本征函数 [式 (5.104)]。由于属于不同本征值的厄米算符的本征函数是正交的，我们得出：除非 $l = l'$ ，否则 (7.27) 中的积分为零。同样地，由于 Y_l^m 系列函数是 $\hat{L}_z$ 的本征函数 [式 (5.105)]，因此除非 $m = m'$ ，否则 (7.27) 中的积分为零。此外， Y_l^m 中的乘常数 [问题 5.34 的式 (5.147)] 可以选择使得球谐函数得到归一化 [式 (6.117)]。因此，(7.27) 成立。

若 f 或 g 是某厄米算符的本征函数，则积分 $\langle f|\hat{B}|g \rangle$ 可以得到简化。若 $\hat{B}g = cg$ ，其中 c 是常数，则

$$\langle f|\hat{B}|g \rangle = \langle f|\hat{B}g \rangle = \langle f|cg \rangle = c \langle f|g \rangle$$

若 $\hat{B}f = kf$ ，其中 k 是常数，那么利用 $\hat{B}$ 的厄米特性就可以得到

$$\langle f|\hat{B}|g \rangle = \langle g|\hat{B}|f \rangle^* = \langle g|\hat{B}f \rangle^* = \langle g|kf \rangle^* = k^* \langle g|f \rangle^* = k \langle f|g \rangle$$

其中用到了本征值 k 是实数。关系 $\langle f|\hat{B}|g \rangle = k \langle f|g \rangle$ 表明厄米算符 $\hat{B}$ 可以在 $\langle f|\hat{B}|g \rangle$ 向左作用。

不确定性原理的证明见问题 7.60。

7.3 用本征函数展开

在上一节中，我们证明了厄米算符本征函数的正交性。现在我们讨论这些函数的另一个重要性质；这一性质使我们可以用这些本征函数来展开一个任意的品优函数。

我们使用了 Taylor 级数展开 (问题 4.1) 来将函数表示为 $(x - a)$ 的非负整数幂的线性组合。除了 $1, (x - a), (x - a)^2, \dots$ 以外，我们还能将函数展开为其他函数集的线性组合吗？答案是肯定的，正如傅里叶 (Fourier) 在 1807 年所发现的那样。Fourier 级数是将一个函数展开为无数个正弦和余弦函数的线性组合。我们将不再详细介绍 Fourier 级数，而只是举例说明。

使用箱中粒子的波函数展开函数

让我们考虑用箱中粒子的定态波函数来展开一个函数，即 [式 (2.23)]

$$\psi_n = \left(\frac{2}{l}\right)^{1/2} \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (7.28)$$

其中 x 介于 0 和 l 之间。用如下形式的级数表示区间 $0 \leq x \leq l$ 内的任意函数 $f(x)$ 的可能性有多大?

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \psi_n = \left(\frac{2}{l}\right)^{1/2} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right), \quad 0 \leq x \leq l \quad (7.29)$$

其中 a_n 等为常数。将 $x=0$ 和 $x=l$ 代入 (7.29)，我们得到限制条件 $f(0)=0$ 和 $f(l)=0$ 。也就是说， $f(x)$ 必须满足和 ψ_n 相同的边界条件。我们同样假设 $f(x)$ 的有限、单值以及连续，但不一定可导。根据上述假设，可以证明展开式 (7.29) 是成立的。我们将不证明 (7.29)，而只是说明它在表示函数时的用法。

在我们对某一特定函数 $f(x)$ 应用式 (7.29) 之前，我们必须推导出展开系数 a_n 的表达式。我们先将 (7.29) 两边乘以 ψ_m^* ：

$$\psi_m^* f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \psi_m^* \psi_n = \left(\frac{2}{l}\right) \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \sin\left(\frac{m\pi x}{l}\right) \quad (7.30)$$

现在我们将该方程从 0 到 l 进行积分。假设将积分和无限求和互换是成立的，我们可以得出

$$\int_0^l \psi_m^* f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_0^l \psi_m^* \psi_n dx = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \left(\frac{2}{l}\right) \int_0^l \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \sin\left(\frac{m\pi x}{l}\right) dx$$

我们已经证明了箱中粒子波函数的正交性 [式 (2.27)]。因此，最后一个方程变为

$$\int_0^l \psi_m^* f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \delta_{mn} \quad (7.31)$$

(7.31) 中的求和方式经常出现。将其展开，我们得到

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \delta_{mn} &= a_1 \delta_{m,1} + a_2 \delta_{m,2} + \dots + a_{m-1} \delta_{m,m-1} + a_m \delta_{m,m} + a_{m+1} \delta_{m,m+1} + \dots \\ &= 0 + 0 + \dots + a_m + 0 + \dots \\ \sum_{n=1}^{\infty} a_n \delta_{mn} &= a_m \end{aligned} \quad (7.32)$$

因此，除了 $n=m$ 的项以外， δ_{mn} 都为零，那么只有一项是保留的，其他项都消失，式 (7.31) 变为

$$a_m = \int_0^l \psi_m^* f(x) dx \quad (7.33)$$

这正是希望的系数表达式。




图 7.1: 按箱中粒子函数展开的函数。

在 (7.33) 中将 m 替换为 n 并带入到 (7.29) 中，我们得到

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\int_0^l \psi_n^* f(x) dx \right] \psi_n(x) \quad (7.34)$$

这是任意函数 $f(x)$ 作为箱中粒子波函数 ψ_n 的线性组合的展开所需的表达式。注意：定积分 $\int_0^l \psi_n^* f(x) dx$ 是一个数，而不是一个关于 x 的函数。

我们现在使用 (7.29) 来代表一个特定的函数，图 (7.1) 所示的函数由下式定义：

$$\begin{cases} f(x) = 0, & 0 \leq x < \frac{l}{2} \\ f(x) = 1, & \frac{l}{2} \leq x < l \end{cases} \quad (7.35)$$

为了找到展开系数 a_n ，我们将 (7.35) 和 (7.28) 代入 (7.33) 中：

$$\begin{aligned} a_n &= \int_0^l \psi_n^* f(x) dx = \left(\frac{2}{l}\right)^{1/2} \int_0^l \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) f(x) dx \\ a_n &= \left(\frac{2}{l}\right)^{1/2} \int_0^{l/2} x \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx + \left(\frac{2}{l}\right)^{1/2} \int_{l/2}^l (l-x) \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx \end{aligned}$$

使用附录中的积分 A.1，我们得到

$$a_n = \frac{(2l)^{3/2}}{n^2 \pi^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \quad (7.36)$$

将 (7.36) 代入 (7.29)，我们得到 [由于 $\sin(n\pi/2)$ 在 n 为奇数时为 1 或 -1，在 n 为偶数时为 0]：

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{4l}{\pi^2} \left[\sin\left(\frac{\pi x}{l}\right) - \frac{1}{3^2} \sin\left(\frac{3\pi x}{l}\right) + \frac{1}{5^2} \sin\left(\frac{5\pi x}{l}\right) - \dots \right] \\ f(x) &= \frac{4l}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{(2n-1)^2} \sin\left[(2n-1) \frac{\pi x}{l}\right] \end{aligned} \quad (7.37)$$

其中 $f(x)$ 由 (7.35) 给出。让我们检查 $x = \frac{1}{2}l$ 时 (7.37) 的值：

$$f\left(\frac{l}{2}\right) = \frac{4l}{\pi^2} \left(1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \dots\right) \quad (7.38)$$

将 (7.38) 的右边作为我们在无穷级数中所取项数的函数列表，我们可以得到

项数	1	2	3	4	5	20	100
式 (7.38) 的右侧	0.405l	0.450l	0.467l	0.475l	0.480l	0.495l	0.499l

如果我们取无穷多项，那么级数的和应为 $\frac{1}{2}l$ ，与 $f(\frac{l}{2})$ 的值一致。假设级数成立，我们会得到一个有趣的结果，即 (7.38) 中右侧括号的求和等于 $\pi^2/8$ 。图 7.2 显示了 $f(x) - \sum_{n=1}^k a_n \psi_n$ 的图形 [其中 f 、 a_n 和 ψ_n 的定义见 (7.35)、(7.36) 和 (7.28)]，其中 k 是取的项数，分别为 1 和 5。随着 k （即展开式中的项数）的增加，级数逐渐趋近于 $f(x)$ ，而 f 与级数之间的差值逐渐趋于零。

用本征函数展开函数

我们已经看到了用一组函数——箱中粒子能量本征函数——来展开一个函数的例子。我们可以使用许多不同的函数集来展开任意函数。如果每个品优函数 f 都服从与 g_i 函数相同的边界条件，并且可以根据以下条件展开为 g_i 的线性组合，则称函数集 $g_1, g_2, \dots, g_i, \dots$ 为**完备集** (complete set)：

$$f = \sum_i a_i g_i \quad (7.39)$$

其中 a_i 是常数。当然，我们很容易理解 f 和 g_i 都是同一组自变量的函数。(7.39) 中的和省略了极限。不言而喻，这个和包含了完整集合的所有成员。根据 Fourier 分析定理（我们尚未证明），可以证明粒子箱中的能量本征函数是一个完备集。




图 7.1 中以粒子箱中波函数展开的函数，展开式分
图 7.2: 别取 1 项和 5 项时，(a) 误差和 (b) 百分比误差图。

我们现在假设：表示物理量的每个厄米算符的本征函数集是一个完备集。（本征函数的完备性在很多情况下都可以证明，但在一般情况下必须假设。）因此，每个满足与本征函数集合相同边界条件的品优函数都可以根据 (7.39) 展开。方程 (7.29) 就是 (7.39) 的一个例子。

谐振子波函数由厄米多项式 H_v 乘以一个指数因子给出 [问题 4.21c 的式 (4.86)]。根据展开公设，任何品优函数 $f(x)$ 都可以展开为谐振子能量本征函数的线性组合：

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (2^n n!)^{-1/2} (\alpha/\pi)^{1/4} H_n(\alpha^{1/2} x) e^{-\alpha x^2/2}$$

使用氢原子束缚态波函数来展开任意函数 $f(r, \theta, \phi)$ 如何？答案是这些函数并不构成一个完备集，我们无法用它们来展开 f 。要有一个完备集，我们必须使用特定厄米算符的所有本征函数。除了氢原子哈密顿的束缚态本征函数外，我们还有与电离态相对应的连续态本征函数。如果将连续本征函数与束缚态本征函数一起包含在内，那么我们就得到了一个完备集。（对于箱中粒子和谐振子来说，连续函数不存在。）等式 (7.39) 意味着对连续本征函数（如果有的话）进行积分。因此，若 $\psi_{nlm}(r, \theta, \phi)$ 是氢原子束缚态函数， $\psi_{Elm}(r, \theta, \phi)$ 是连续本征函数，则式 (7.39) 变为

$$f(r, \theta, \phi) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{l=0}^{n-1} \sum_{m=-l}^l a_{nlm} \psi_{nlm}(r, \theta, \phi) + \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \int_0^{\infty} a_{lm}(E) \psi_{Elm}(r, \theta, \phi) dE$$

另一个例子：考虑算符 $\hat{p}_x$ 的本征函数 [式 (3.36)]：

$$g_k = e^{ikx/\hbar}, \quad -\infty < k < \infty$$

这里的本征值都是连续的，任意函数 f 的本征函数展开式 (7.39) 变为

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} a(k) e^{ikx/\hbar} dk$$

具有良好数学基础的读者可能会发现，这个积分几乎就是 $a(k)$ 的 Fourier 变换。

让我们对 $f = \sum_i a_i g_i$ [式 (7.39)] 中的展开系数进行计算，其中的 g_i 函数是厄米算符的本征函数的完备集。这一过程与推导 (7.33) 所用的过程相同。我们将 $f = \sum_i a_i g_i$ 与 g_k^* 相乘并对全空间积分：

$$g_k^* f = \sum_i a_i g_k^* g_i$$

$$\int g_k^* f \, d\tau = \sum_i a_i \int g_k^* g_i \, d\tau = \sum_i a_i \delta_{ik} = a_k$$

$$a_k = \int g_k^* f \, d\tau \quad (7.40)$$

其中我们用到了厄米算符本征函数之间的正交性： $\int g_k^* g_i \, d\tau = \delta_{ik}$ [式 (7.26)]。得出 (7.40) 的过程会经常用到，值得记住。将 (7.40) 中的 a_i 带入 $f = \sum_i a_i g_i$ 中，我们得到

$$f = \sum_i \left[\int g_i^* f \, d\tau \right] g_i = \sum_i \langle g_i | f \rangle g_i \quad (7.41)$$

例题： 令

$$F(x) = \begin{cases} x(l-x), & 0 \leq x \leq l \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

将 F 用箱中粒子能量本征函数 $\psi_n = (2/l)^{1/2} \sin(n\pi x/l)$, $0 \leq x \leq l$ 展开。

注意到 $F(0) = 0$ 以及 $F(l) = 0$ ，因此满足与 ψ_n 相同的边界条件。我们可以使用 ψ_n 来展开 F 。展开式为 $F = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \psi_n$ ，其中系数 $a_n = \int \psi_n^* F \, dx$ [式 (7.40) 和 (7.39)]。因此，

$$a_n = \int \psi_n^* F \, d\tau = \left(\frac{2}{l}\right)^{1/2} \int_0^l \left(\sin \frac{n\pi x}{l}\right) x(l-x) \, dx = \frac{2^{3/2} l^{5/2}}{n^3 \pi^3} [1 - (-1)^n]$$

其中积分计算的具体细节留作习题（问题 7.18）。展开式 $F = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \psi_n$ 为

$$x(l-x) = \frac{4l^2}{\pi^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n}{n^3} \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right), \quad 0 \leq x \leq l$$

练习： 令

$$G(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq l \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

将 G 用箱中粒子能量本征函数展开。由于 G 在原点和 l 点不为零，因此展开式在这些点上不表示 G ，而在其他地方表示 G 。利用展开式的前 7 项非零项计算 G 在 $x = \frac{1}{4}l$ 处的值。使用前 70 个非零项重复上述步骤（使用可编程计算器）。（答案：0.1219, 0.9977。）

以下是一条有用的定理：

定理 3： 令 $g_1, g_2, \dots$ 是厄米算符 $\hat{A}$ 的本征函数完备集，令 F 是 $\hat{A}$ 的本征函数，本征值为 k （也就是说， $\hat{A}F = kF$ ）。若 F 展开为 $F = \sum_i a_i g_i$ ，则展开式中的非零系数 a_i 仅对应于与 k 相同的本征值的本征函数 g_i 。（由于简并的存在，可能有多个本征函数 g_i 对应于同一本征值 k 。）

因此，在 F 的展开式中，我们只包括那些与 F 具有相同本征值的本征函数。根据 $a_k = \int g_k^* f \, d\tau$ [公式 (7.40)] 即可得出定理 3 的证明；若 F 和 g_i 对应于同一厄米算符 $\hat{A}$ 的不同本征值，那它们是正交的 [式 (7.22)]，则 a_k 消失。

我们偶尔会使用一种符号（称为 **ket** 符号），在这种符号中，函数 f 用以下符号表示 $|f\rangle$ 。这个符号似乎没有任何意义，但在量子力学的高级公式中，它具有特殊的意义。在 **ket** 符号中，式 (7.41)

可以写成

$$|f\rangle = \sum_i |g_i\rangle \langle g_i|f\rangle = \sum_i |i\rangle \langle i|f\rangle \quad (7.42)$$

Ket 符号方便地用于通过列出本征值来指定本征函数。例如，量子数分别为 n 、 l 和 m 的氢原子波函数可以写成 $\psi_{nlm} = |n, l, m\rangle$ 。

第7.2和7.3节的内容可以总结为厄米算符的本征函数构成一个完整的正交集，且本征值为实数。

7.4 对易算符的本征函数

如果态函数 Ψ 同时是两个算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 的本征函数，本征值分别为 a_j 和 b_j ，那么对物理量 A 的观测将得到值为 a_j 的结果，对物理量 B 的观测将得到值为 b_j 的结果。因此，当 Ψ 同时是 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 的本征函数时，物理量 A 和 B 都具有确定的值。

在第 5.1 节中，我们对两个算符的同时本征函数做了一些说明。现在我们证明这些陈述。

首先，我们证明：如果存在两个线性算符本征函数的共同完备集，那么这两个算符可对易。令 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 是两个线性算符， $g_1, g_2, \dots$ 是共同的本征函数完备集：

$$\hat{A}g_i = a_i g_i, \quad \hat{B}g_i = b_i g_i \quad (7.43)$$

其中 a_i 和 b_i 是本征值。我们需要证明

$$[\hat{A}, \hat{B}] = 0 \quad (7.44)$$

方程 (7.44) 是算符方程。要使两个算符相等，则用其中任何一个算符对任意品优函数 f 运算的结果必须相同。因此我们必须证明

$$(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})f = \hat{0}f = 0$$

其中 f 是任意函数。首先，我们根据完整的本征函数集 g_i 对 f 进行展开（假设它遵守适当的边界条件）：

$$f = \sum_i c_i g_i$$

将算符 $\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$ 作用于上述方程，我们得到

$$(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})f = (\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}) \sum_i c_i g_i$$

由于算符的积 $\hat{A}\hat{B}$ 和 $\hat{B}\hat{A}$ 是线性算符（问题 3.16），我们有

$$(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})f = \sum_i c_i (\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})g_i = \sum_i [\hat{A}(\hat{B}g_i) - \hat{B}(\hat{A}g_i)]$$

其中用到了算符和与积的定义。使用本征值方程 (7.43)，我们得到

$$(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})f = \sum_i [\hat{A}(b_i g_i) - \hat{B}(a_i g_i)] = \sum_i c_i (b_i a_i g_i - a_i b_i g_i) = 0$$

这就完成了如下定理的证明：

定理 4： 如果两个线性算符的本征函数完备集是相同的，那么这两个算符可对易。

有时有人错误地认为：如果 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 存在一个共同的本征函数，那么它们就可对易。举一个例子可以说明这种说法是错误的，考虑球谐函数 Y_0^0 ，它同时是 $\hat{L}_z$ 和 $\hat{L}_x$ 的本征函数，但显然这两个算符不可对易（第5.3节）。研究一下为这一错误说法提供的所谓证据是很有启发性的。令 g 为共同的本征函数： $\hat{A}g = ag$ 、 $\hat{B}g = bg$ 。我们有

$$\begin{aligned}\hat{A}\hat{B}g &= \hat{A}bg = abg \quad \text{和} \quad \hat{B}\hat{A}g = \hat{B}ag = bag = abg \\ \hat{A}\hat{B}g &= \hat{B}\hat{A}g\end{aligned}\tag{7.45}$$

通过从式 (7.45) 的两边消去 g ，我们完成了所谓的“证明”：

$$\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A} (?) \tag{7.46}$$

错误出现在从 (7.45) 导出 (7.46) 的过程中。 $\hat{A}\hat{B}$ 和 $\hat{B}\hat{A}$ 对单个函数 g 的作用结果是无法得出 $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$ 的。（例如，当 d/dx 和 d^2/dx^2 作用于函数 e^x 时，结果是相同的，但这并不意味着 d/dx 和 d^2/dx^2 是相等的。）这两个算符在作用于每个品优函数时必须得到相同的结果，我们才能得出它们相等的结论。因此，尽管 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 不可对易，但可能存在一个或更多的共同本征函数。然而，我们不可能有两个非对易算符的共同完整本征函数集，正如我们在本节前面所证明的那样。

我们已经证明了：若两个算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 的本征函数完备集是相同的，那么这两个算符可对易。现在我们证明：

定理 5： 如果两个厄米算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 可对易，我们可以为它们选择一组共同的完整本征函数。

证明如下。令 g_i 和 a_i 分别是算符 $\hat{A}$ 的本征函数和本征值：

$$\hat{A}g_i = a_i g_i$$

将 $\hat{B}$ 作用于上述方程，我们得到

$$\hat{B}\hat{A}g_i = \hat{B}(a_i g_i)$$

由于 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 可对易，以及 $\hat{B}$ 是线性算符，我们有

$$\hat{A}(\hat{B}g_i) = a_i (\hat{B}g_i) \tag{7.47}$$

该方程表明：函数 $\hat{B}g_i$ 也是算符 $\hat{A}$ 的本征函数，本征值为 a_i ，与 g_i 一致。假设算符 $\hat{A}$ 的本征值都是非简并的，那么对于任何给定的本征值 a_i ，存在唯一的线性无关的本征函数。如果是这样，那么两个对应于同一个本征值的本征函数 $\hat{B}g_i$ 和 g_i 是线性相关的，也就是说，其中一个一定是另一个的简单乘积：

$$\hat{B}g_i = k_i g_i \tag{7.48}$$

其中 k_i 是常数。这个方程说明了 g_i 是 $\hat{B}$ 的本征函数，因此得证。在第 7.3 节中，我们假设任何表示物理量的算符的本征函数都构成一个完备集。因此， g_i 构成一个完备集。

我们刚才证明了非简并情况下的定理，那么简并情况下呢？设本征值 a_i 是 n 重简并的。由式 (7.47)， $\hat{B}g_i$ 也是 $\hat{A}$ 的本征函数，本征值为 a_i 。因此，第 7.3 节中的定理 3 表明：若函数 $\hat{B}g_i$ 可以用算符 $\hat{A}$ 的本征函数完备集展开，那么除了本征值为 a_i 的项以外，其他项的系数均为零。也就是说， $\hat{B}g_i$ 一定是 n 个本征值为 a_i 的线性无关本征函数的线性组合：

$$\hat{B}g_i = \sum_{k=1}^n c_k g_k, \quad \text{其中} \quad \hat{A}g_k = a_i g_k \quad k = 1, 2, \dots, n \tag{7.49}$$

其中 $g_1, \dots, g_n$ 表示 n 个本征值为 a_i 的算符 $\hat{A}$ 的本征函数。式 (7.49) 表明 g_i 不一定是 $\hat{B}$ 的本征函数。然而, 通过对 n 个对应于简并本征值 a_i 的线性无关的 $\hat{A}$ 本征函数进行适当的线性组合, 我们能构造出一组新的 n 个线性无关的本征函数, 他们也将是 $\hat{B}$ 的本征函数。该说法的证明见 Merzbacher, 第 8.5 节。

因此, 当 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 可对易时, 我们可以为它们选择一组共同的本征函数完备集。例如, 考虑一个氢原子, 我们已经证明了算符 $\hat{L}_z$ 和 $\hat{H}$ 是可对易的。如果我们愿意, 我们可以将 $\hat{B}$ 的本征函数中的 ϕ 因子写成 $\sin m\phi$ 和 $\cos m\phi$ 的形式 (第 6.6 节)。如果这样做, 除了 $m=0$ 的情况以外, 我们就不会得到 $\hat{L}_z$ 的本征函数了。然而, 根据 3.6 节的定理, 以下线性组合

$$R(r) S(\theta) (\cos m\phi + i \sin m\phi) = R S e^{im\phi}, \quad m = -l, \dots, l$$

给出的 $\hat{L}_z$ 的本征函数仍然是 $\hat{H}$ 的本征函数。

将上述证明推广到两个以上算符的情况表明, 当且仅当每个算符都与其他算符可对易时, 对于一组厄米算符 $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}, \dots$, 存在一个共同的完整本征函数集。

与定理 5 相关的一个有用定理为:

定理 6: 若 g_m 和 g_n 是厄米算符 $\hat{A}$ 的本征函数, 但其本征值不同 (即 $\hat{A}g_m = a_m g_m$ 和 $\hat{A}g_n = a_n g_n$, 其中 $a_m \neq a_n$), 若线性算符 $\hat{B}$ 与 $\hat{A}$ 可对易, 那么

$$\langle g_n | \hat{B} | g_m \rangle = 0, \quad a_n \neq a_m \quad (7.50)$$

为了证明 (7.50), 我们从以下式子入手:

$$\langle g_n | \hat{A} \hat{B} | g_m \rangle = \langle g_n | \hat{B} \hat{A} | g_m \rangle \quad (7.51)$$

对上式的左侧使用算符 $\hat{A}$ 的厄米性质, 有

$$\begin{aligned} \langle g_n | \hat{A} \hat{B} | g_m \rangle &= \langle g_n | \hat{A} | \hat{B} g_m \rangle = \langle \hat{B} g_m | \hat{A} | g_n \rangle^* = \langle \hat{B} g_m | a_n | g_n \rangle^* \\ &= a_n^* \langle g_n | \hat{B} g_m \rangle = a_n \langle g_n | \hat{B} | g_m \rangle \end{aligned}$$

式 (7.51) 的右侧可以写成

$$\langle g_n | \hat{B} \hat{A} | g_m \rangle = \langle g_n | \hat{B} | \hat{A} g_m \rangle = a_m \langle g_n | \hat{B} | g_m \rangle$$

令 (7.51) 左右两边的最终表达式相等, 我们得到

$$\begin{aligned} a_n \langle g_n | \hat{B} | g_m \rangle &= a_m \langle g_n | \hat{B} | g_m \rangle \\ (a_n - a_m) \langle g_n | \hat{B} | g_m \rangle &= 0 \end{aligned}$$

由于 $a_n \neq a_m$, 因此 $\langle g_n | \hat{B} | g_m \rangle = 0$, 这就证明了 (7.50)。

7.5 宇称

某些量子力学算符没有相对应的经典类似量。宇称算符就是一个例子。回想一下, 谐振子的波函数要么是奇函数, 要么是偶函数。我们将展示这一性质与宇称算符的关系。

宇称算符 (parity operator) $\hat{\Pi}$ 定义为其对任意函数 f 的以下作用结果:

$$\boxed{\hat{\Pi} f(x, y, z) = f(-x, -y, -z)} \quad (7.52)$$

宇称算符将每个直角坐标替换为其负数。例如： $\hat{\Pi}(x^2 - ze^{ay}) = x^2 + ze^{-ay}$ 。

与其他任意量子力学算符一样，我们对宇称算符的本征函数 g_i 和本征值 c_i 很感兴趣：

$$\hat{\Pi}g_i = c_i g_i \quad (7.53)$$

问题的关键是求出 $\hat{\Pi}$ 的平方：

$$\hat{\Pi}^2 f(x, y, z) = \hat{\Pi} [\hat{\Pi} f(x, y, z)] = \hat{\Pi} f(-x, -y, -z) = f(x, y, z)$$

由于 f 是任意给定的函数，我们得到 $\hat{\Pi}^2$ 等于单位算符：

$$\hat{\Pi}^2 = \hat{1} \quad (7.54)$$

我们现在将 $\hat{\Pi}$ 作用到 (7.53) 的两边，得到 $\hat{\Pi}\hat{\Pi}g_i = \hat{\Pi}c_i g_i$ 。由于 $\hat{\Pi}$ 是线性算符（问题 7.26），我们有 $\hat{\Pi}^2 g_i = c_i \hat{\Pi}g_i$ ，则

$$\hat{\Pi}^2 g_i = c_i^2 g_i \quad (7.55)$$

其中用到了本征方程 (7.53)。由于 $\hat{\Pi}^2$ 是单位算符，式 (7.55) 的左侧是 g_i ，那么

$$g_i = c_i^2 g_i$$

函数 g_i 不可能处处为零（根据物理原理，零总是被拒绝作为本征函数）。因此，两边除以 g_i ，我们得到 $c_i^2 = 1$ ，即

$$c_i = \pm 1 \quad (7.56)$$

算符 $\hat{\Pi}$ 的本征值为 +1 和 -1。请注意，这一推导适用于其平方为单位算符的任何算符。

本征方程 g_i 等于什么？本征方程 (7.53) 为

$$\hat{\Pi}g_i(x, y, z) = \pm g_i(x, y, z)$$

$$g_i(-x, -y, -z) = \pm g_i(x, y, z)$$

若本征值为 +1，则 $g_i(-x, -y, -z) = g_i(x, y, z)$ ，这表明 g_i 是偶函数；若本征值为 -1，则 $g_i(-x, -y, -z) = -g_i(x, y, z)$ ，这表明 g_i 是奇函数。因此，宇称算符 $\hat{\Pi}$ 的本征函数为可能的品优奇函数和品优偶函数。

当宇称算符与哈密顿算符 $\hat{H}$ 可对易时，根据第 7.4 节的定理，我们可以为这两个算符选择一组共同的本征函数完备集。 $\hat{H}$ 的本征函数是定态波函数 ψ_i 。因此，若

$$[\hat{\Pi}, \hat{H}] = 0 \quad (7.57)$$

波函数 ψ_i 可以被选择成为 $\hat{\Pi}$ 的本征函数。我们刚刚证明了 $\hat{\Pi}$ 的本征函数是奇函数或偶函数。因此，当 (7.57) 成立时，每个波函数可以被选择为奇函数或偶函数。让我们看看宇称算符和哈密顿算符在什么情况下可对易。

对于单粒子系统，我们有

$$[\hat{H}, \hat{\Pi}] = [\hat{T}, \hat{\Pi}] + [\hat{V}, \hat{\Pi}] = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\left[\frac{\partial^2}{\partial x^2}, \hat{\Pi} \right] + \left[\frac{\partial^2}{\partial y^2}, \hat{\Pi} \right] + \left[\frac{\partial^2}{\partial z^2}, \hat{\Pi} \right] \right) + [\hat{V}, \hat{\Pi}]$$

由于

$$\begin{aligned} \hat{\Pi} \left[\frac{\partial^2}{\partial x^2} (x, y, z) \right] &= \frac{\partial}{\partial(-x)} \frac{\partial}{\partial(-x)} f(-x, -y, -z) = \frac{\partial^2}{\partial x^2} f(-x, -y, -z) \\ &= \frac{\partial^2}{\partial x^2} \hat{\Pi}(x, y, z) \end{aligned}$$

其中 f 是任意函数, 我们得到

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial x^2}, \hat{\Pi} \right] = 0$$

y 和 z 坐标有类似的方程, 则 $[\hat{H}, \hat{\Pi}]$ 变为

$$[\hat{H}, \hat{\Pi}] = [\hat{V}, \hat{\Pi}] \quad (7.58)$$

现在

$$\hat{\Pi}[V(x, y, z)f(x, y, z)] = V(-x, -y, -z)f(-x, -y, -z) \quad (7.59)$$

若势能函数为偶函数, 即 $V(-x, -y, -z) = V(x, y, z)$, 则 (7.59) 变为

$$\hat{\Pi}[V(x, y, z)f(x, y, z)] = V(x, y, z)f(-x, -y, -z) = V(x, y, z)\hat{\Pi}f(x, y, z)$$

所以 $[\hat{V}, \hat{\Pi}] = 0$ 。因此, 当势能函数为偶函数时, 宇称算符和哈密顿算符可对易:

$$[\hat{H}, \hat{\Pi}] = 0 \quad \text{若 } V \text{ 为偶函数} \quad (7.60)$$

这些结果很容易推广到 n 粒子的情况。对于一个 n 粒子系统, 宇称算符定义为

$$\hat{\Pi}f(x_1, y_1, z_1, \dots, x_n, y_n, z_n) = f(-x_1, -y_1, -z_1, \dots, -x_n, -y_n, -z_n) \quad (7.61)$$

很容易发现, 若 V 满足下式

$$V(x_1, y_1, z_1, \dots, x_n, y_n, z_n) = V(-x_1, -y_1, -z_1, \dots, -x_n, -y_n, -z_n) \quad (7.62)$$

则 (7.57) 成立。若 V 满足方程 (7.62), 则称其为 $3n$ 坐标的**偶函数** (even function of the $3n$ coordinates)。总而言之, 我们有

定理 7: 当势能 V 是偶函数时, 我们可以选择定态波函数, 使每个波函数要么是偶函数, 要么是奇函数。

要么是偶数要么是奇数的函数被称为具有确定的宇称 (definite parity)。

如果能级都是非简并能级 (在一维问题中通常如此), 那么每个能量本征值只对应一个独立的波函数, 波函数中没有可选择的元素 (除了任意的乘常数)。因此, 对于非简并情况, 当 V 是偶函数时, 定态波函数必须具有确定的宇称。例如, 一维谐振子的势能函数为 $V = \frac{1}{2}kx^2$, 是偶函数, 则波函数具有确定的宇称。

氢原子势能函数是偶函数, 类氢轨道可以选择具有确定的宇称 (问题 7.22 和 7.29)。

对于简并的情况, 我们在波函数中有一个选择元素, 因为与简并能级相对应的函数的任意线性组合是 $\hat{H}$ 的本征函数。对于简并能级, 通过适当的线性组合, 我们可以选择具有确定奇偶性的波函数, 但并不要求它们必须具有确定的奇偶性。

宇称有助于积分的计算。我们已经证明了当 $f(x)$ 为奇函数时有 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 0$ 。让我们将这一结果推广到 $3n$ 维情况。 $3n$ 个变量的**奇函数** (odd function) 满足

$$g(-x_1, -y_1, -z_1, \dots, -x_n, -y_n, -z_n) = -g(x_1, y_1, z_1, \dots, x_n, y_n, z_n) \quad (7.63)$$

若 g 是 $3n$ 个变量的奇函数, 则

$$\int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} g(x_1, \dots, z_n) dx_1 \dots dz_n = 0 \quad (7.64)$$

其中的积分是对 $3n$ 个坐标的积分。这个等式成立的原因为: $(x_1, y_1, z_1, \dots, x_n, y_n, z_n)$ 处 g 值对积分的贡献被 $(-x_1, -y_1, -z_1, \dots, -x_n, -y_n, -z_n)$ 处的 g 值抵消了。当积分是部分 (但不一定是全部) 变量的奇函数时, 等式 (7.64) 也成立。参见问题 7.30。

7.6 测量和态叠加

量子力学可被视为一种计算测量各种可能结果概率的方法。例如，如果我们知道态函数 $\Psi(x, t)$ ，那么在时刻 t 时测量粒子的位置位于 x 到 $x + dx$ 的无穷小区间内的概率为 $|\Psi(x, t)|^2 dx$ 。现在，我们考虑对一般性质 B 进行测量。我们的目的是找出如何使用 Ψ 来计算 B 的测量结果中每种可能结果的概率。本节的结果告诉我们状态函数 Ψ 中包含哪些信息，是量子力学的核心所在。

我们处理一个 n 粒子系统，使用 q 来表示 $3n$ 个坐标。我们推测，算符 $\hat{B}$ 的本征值 b_i 是对属性 B 进行测量的唯一可能结果。使用 g_i 来表示 $\hat{B}$ 的本征函数，我们有

$$\hat{B}g_i(q) = b_i g_i(q) \quad (7.65)$$

我们在第 7.3 节中假设，任何代表物理可观测属性的厄米算符的本征函数都构成一个完备集。由于 g_i 构成一个完备集，我们可以将态函数 Ψ 展开为

$$\Psi(q, t) = \sum_i c_i(t) g_i(q) \quad (7.66)$$

为了允许 Ψ 随时间变化，我们在系数 c_i 中引入时间依赖性。

由于 $|\Psi|^2$ 表示概率密度，我们要求

$$\int \Psi^* \Psi d\tau = 1 \quad (7.67)$$

将 (7.66) 代入归一化条件，并使用式 (1.33) 和 (1.32)，我们得到

$$1 = \int \sum_i c_i^* g_i^* \sum_j c_j g_j d\tau = \int \sum_i c_i^* g_i^* \sum_k c_k g_k d\tau = \int \sum_i \sum_k c_i^* c_k g_i^* g_k d\tau \quad (7.68)$$

由于 (7.68) 中两个和的求和下标不一定具有相同的值，因此这两个下标必须使用不同的符号。例如，考虑如下两个求和的积：

$$\sum_{i=1}^2 s_i \sum_{i=1}^2 t_i = (s_1 + s_2)(t_1 + t_2) = s_1 t_1 + s_1 t_2 + s_2 t_1 + s_2 t_2$$

如果我们不小心写成了

$$\sum_{i=1}^2 s_i \sum_{i=1}^2 t_i = (\text{错误的}) \sum_{i=1}^2 \sum_{i=1}^2 s_i t_i = \sum_{i=1}^2 (s_1 t_1 + s_2 t_2) = 2(s_1 t_1 + s_2 t_2)$$

我们就得到了错误的答案。写乘积的正确方式是

$$\sum_{i=1}^2 s_i \sum_{i=1}^2 t_i = \sum_{i=1}^2 s_i \sum_{k=1}^2 t_k = \sum_{i=1}^2 \sum_{k=1}^2 s_i t_k = \sum_{i=1}^2 (s_i t_1 + s_i t_2) = s_1 t_1 + s_1 t_2 + s_2 t_1 + s_2 t_2$$

这就得到了正确的结果。

假定交换 (7.68) 中的无限求和与积分是成立的，我们得到

$$\sum_i \sum_k c_i^* c_k \int g_i^* g_k d\tau = 1$$

由于 $\hat{B}$ 是厄米算符，它的本征函数之间应该是正交的 [式 (7.26)]；因此

$$\sum_i \sum_k c_i^* c_k \delta_{ik} = 1$$

$$\sum_i |c_i|^2 = 1 \quad (7.69)$$

我们很快就会指出 (7.69) 的重要性。

回顾假设 (第 3.7 节), 如果 Ψ 是系统的归一化状态函数, 那么属性 B 的平均值为

$$\langle B \rangle = \int \Psi^*(q, t) \hat{B} \Psi(q, t) d\tau$$

将展开式 (7.66) 代入上式, 我们得到

$$\langle B \rangle = \int \sum_i c_i^* g_i^* \hat{B} \sum_k c_k g_k d\tau = \sum_i \sum_k c_i^* c_k \int g_i^* \hat{B} g_k d\tau$$

其中我们用到了算符 $\hat{B}$ 的线性性质。使用 $\hat{B}g_k = b_k g_k$ [式 (7.65)], 我们有

$$\begin{aligned} \langle B \rangle &= \sum_i \sum_k c_i^* c_k b_k \int g_i^* g_k d\tau = \sum_i \sum_k c_i^* c_k b_k \delta_{ik} \\ \langle B \rangle &= \sum_i |c_i|^2 b_i \end{aligned} \quad (7.70)$$

我们如何解释 (7.70)? 我们在第 3.39 节中假设, 当我们测量算符所代表的物理性质时, 算符的本征值是我们能得到的唯一可能的数字。在对 B 的任何测量中, 我们都会得到其中一个值 b_i (假设没有实验误差)。现在回忆式 (3.81):

$$\boxed{\langle B \rangle = \sum_{b_i} P(b_i) b_i} \quad (7.71)$$

其中 $P(b_i)$ 是对 B 进行测量, 得到测量结果为 b_i 的概率。(7.71) 中的和涉及不同的本征值 b_i , 而 (7.70) 中的和涉及不同的本征函数 g_i , 因为展开式 (7.66) 涉及的是 g_i 。如果每个本征值只有一个独立的本征函数, 那么本征函数的总和就等于本征值的总和, 比较 (7.71) 和 (7.70) 可以看出, 当 $\hat{B}$ 本征值没有简并时, $|c_i|^2$ 就是在测量属性 B 时得到值 b_i 的概率。请注意, 这些值的总和为 1, 因为概率的总和必定为 1 [式 (7.69)]。假设本征值 b_i 是简并的。根据 (7.71), $P(b_i)$ 由与 b_i 相乘的量给出。在简并的情况下, (7.70) 中有不止一项包含 b_i , 所以在测量中获得 b_i 的概率 $P(b_i)$ 是所有本征值为 b_i 的本征函数对应的 $|c_i|^2$ 的总和。我们已经证明了如下定理:

定理 8: 若 b_m 是算符 $\hat{B}$ 的一个非简并本征值, g_m 是对应的归一化本征函数 ($\hat{B}g_m = b_m g_m$), 那么在量子力学系统中, 测量时状态函数为 Ψ 时, 对属性 B 的测量得到结果为 b_m 的概率由 $|c_m|^2$ 给出, 其中 c_m 是 g_m 在展开式 $\Psi = \sum_i c_i g_i$ 中的系数。若 b_m 是简并本征值, 则测量得到结果为 b_m 的概率由所有对应于 b_m 的本征函数的 $|c_i|^2$ 的总和给出。

什么时候可以准确预测 B 的测量结果? 若展开式 $\Psi = \sum_i c_i g_i$ 中的系数 c_i 全为零, 除了 c_i 等于零, 以及对于 $i \neq k$, $c_k \neq 0$ 的情况外, 这是可以做到的。对于这种情况, 式 (7.69) 表明 $|c_k|^2 = 1$, 我们一定会得到值为 b_k 的结果。在该情况中, 态函数 $\Psi = \sum_i c_i g_i$ 简化为 $\Psi = g_k$ 。当 Ψ 是 $\hat{B}$ 的本征函数, 本征值为 b_k 时, 若我们对 B 进行测量, 我们一定会得到值为 b_k 的结果。

因此, 我们可以将展开式 $\Psi = \sum_i c_i g_i$ [式 (7.66)] 看作是将一般状态 Ψ 表达为算符 $\hat{B}$ 本征态 g_i 的态叠加 (superposition)。每个本征态 g_i 对应于物理量 B 的一个可能测量结果 b_i 。任何本征函数 g_i 出现在 Ψ 展开式中的程度由 $|c_i|^2$ 给出, 它决定了在对 B 进行测量时得到结果 b_i 的概率。

为了得到概率 $|c_i|^2$, 我们如何计算出展开系数 c_i ? 我们将 g_j^* 与 $\Psi = \sum_i c_i g_i$ 相乘, 对全空间进行积分并使用厄米算符 $\hat{B}$ 本征函数的正交性:

$$\int g_j^* \Psi d\tau = \sum_i c_i \int g_j^* g_i d\tau = \sum_i c_i \delta_{ij}$$

$$c_j = \int g_j^* \Psi \, d\tau = \langle g_j | \Psi \rangle \quad (7.72)$$

在对性质 B 的测量中, 发现非简并本征值 b_j 的概率为

$$|c_j|^2 = \left| \int g_j^* \Psi \, d\tau \right|^2 = |\langle g_j | \Psi \rangle|^2 \quad (7.73)$$

其中 $\hat{B}g_j = b_j g_j$ 。量 $\langle g_j | \Psi \rangle$ 称为**概率幅** (probability amplitude)。

因此, 如果我们知道由状态函数 Ψ 确定的系统状态, 我们就可以使用 (7.73) 来预测对任何属性 B 进行测量的各种可能结果的概率。确定 $\hat{B}$ 的本征函数 g_j 和本征值 b_j 是一个数学问题。

为了在实验中确定测量 B 时发现 g_j 的概率, 我们需要大量 n 个相同的、无相互作用的系统, 每个系统都处于相同的状态 Ψ , 并测量每个系统中的属性 B 。如果第 n_j 次测量得到的结果为 b_j , 则 $P(b_j) = n_j/n = |\langle g_j | \Psi \rangle|^2$ 。

我们可以对定理 8 的第一部分进行如下重述:

定理 9: 若在某量子力学系统中对性质 B 进行测量, 测量时的状态为 Ψ , 则观测到算符 $\hat{B}$ 的非简并本征值 b_j 的概率为 $|\langle g_j | \Psi \rangle|^2$, 其中 g_j 是已归一化的, 对应于本征值 b_j 的本征函数。

如果归一化函数 g_j 和 Ψ 非常相似, 并且在空间的每个区域都有相似的大小, 那么积分 $\langle g_j | \Psi \rangle = \int g_j^* \Psi \, d\tau$ 的绝对值就会很大。若 g_j 和 Ψ 不相似, 那么在 g_i 很大而 Ψ 很小的区域中 (反之亦然), 乘积 $g_j^* \Psi$ 就会很小, 那么积分 $\int g_j^* \Psi \, d\tau$ 的绝对值也会很小, 即找到 b_j 的概率 $\langle g_j | \Psi \rangle$ 也会很小。

例题: 假设我们对氢原子核外电子的 L_z 分量进行测量, 开始测量时系统的状态为 $2p_x$ 。给出测量的可能结果, 并给出每种结果的概率。使用这些概率计算 $2p_x$ 状态的 $\langle L_z \rangle$ 。

由 (6.118):

$$\Psi = 2p_x = 2^{-1/2} (2p_1) + 2^{-1/2} (2p_{-1})$$

这个方程将 Ψ 展开为 $\hat{L}_z$ 的本征函数的线性组合。其中唯一两个具有非零系数的项为 $2p_1$ 和 $2p_{-1}$, 它们的本征值分别为 $\hbar$ 和 $-\hbar$ 。(回想一下, 1 和 -1 的下标给出了量子数 m , $\hat{L}_z$ 的本征值为 $m\hbar$ 。) 使用定理 8, 我们取 Ψ 展开式中系数绝对值的平方来得到概率。因此测量 L_z 时得到 $\hbar$ 的概率为 $|2^{-1/2}|^2 = 0.5$, 得到 $-\hbar$ 的概率也是 0.5。为了从这些概率计算 $\langle L_z \rangle$, 我们使用 (7.71):

$$\langle L_z \rangle = \sum_{L_{z,i}} P(L_{z,i}) L_{z,i} = 0.5\hbar + 0.5(-\hbar) = 0$$

其中 $P(L_{z,i})$ 是测量时得到结果 $L_{z,i}$ 的概率, 除了两项以外, 其他概率都为零。当然, $\langle L_z \rangle$ 也可以用平均值方程 (3.88) 计算: $\langle 2p_x | \hat{L}_z | 2p_x \rangle$ 。

练习: 写出满足如下条件的氢原子波函数: 对能量 E 测量时得到 $n = 2$ 能级的概率为 1, 对 L^2 测量时得到 $2\hbar^2$ 的概率为 1, 对 L_z 测量时得到 $-\hbar, 0, \hbar$ 的概率相等。是否只有一种可能的答案? (部分答案: 否。)

例题: 现有一个箱中粒子的系统, 箱子长为 l 。对系统的能量进行一次测量, 测量时粒子处于非定态 $\Psi = 30^{1/2} l^{-5/2} x(l-x)$, $0 \leq x \leq l$ 。给出测量的可能结果, 并给出每种结果的概率。

第 3.9 节的假设 (c) 给出了可能的结果, 即能量算符 $\hat{H}$ 的本征值。箱中粒子哈密顿算符的本征值为 $E = n^2 h^2 / 8ml^2$, 其中 $n = 1, 2, \dots$, 并且它们是非简并的。概率由 Ψ 对 $\hat{H}$ 的本征函数的展开式给出。即 $\Psi = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n$, 其中 $\psi_n = (2/l)^{1/2} \sin(n\pi x/l)$ 。在 (7.41) 之后的例子中, 函数 $x(l-x)$ 是根据箱中粒子能量本征函数展开的。状态函数 $30^{1/2} l^{-5/2} x(l-x)$ 等于 $x(l-x)$ 乘以归一化常数 $30^{1/2} l^{-5/2}$ 。因此, 因此, 将前面例子中的系数乘以 $30^{1/2} l^{-5/2}$, 就可以得到展开系数 c_n

$$c_n = \frac{(240)^{1/2}}{n^3 \pi^3} [1 - (-1)^n]$$

观测到能量值 $E_n = n^2 h^2 / 8ml^2$ 的概率 $P(E_n)$ 等于 $|c_n|^2$:

$$P(E_n) = \frac{240}{n^6 \pi^6} [1 - (-1)^n]^2 \quad (7.74)$$

前几个可能值的概率为

n	1	2	3	4	5
E_n	$h^2/8ml^2$	$4h^2/8ml^2$	$9h^2/8ml^2$	$16h^2/8ml^2$	$25h^2/8ml^2$
$P(E_n)$	0.99855	0	0.001370	0	0.000064

找到 $n = 1$ 能级的概率很高, 这对应于抛物线态函数 $30^{1/2} l^{-5/2} x(l-x)$ 与 $n = 1$ 的箱中粒子波函数 $(2/l)^{1/2} \sin(\pi x/l)$ 非常相似 (图 7.3)。零概率的能级为 $n = 2, 4, 6, \dots$, 这对应于以下事实: 若原点与箱子的中心重合, 则态函数 $\Psi = 30^{1/2} l^{-5/2} x(l-x)$ 是偶函数, 而 $n = 2, 4, 6, \dots$ 的箱中粒子波函数是奇函数 (图 2.3), 对 Ψ 的展开式没有贡献。当被积函数为奇函数时积分 $\langle g_n | \Psi \rangle$ 消失。




图 7.3: $\Psi = 30^{1/2} l^{-5/2} x(l-x)$ 和 $n = 1$ 箱中粒子波函数的图象

若性质 B 的本征值可以连续变化 (例如: 位置, 第 7.7 节), 则对 Ψ 展开式的求和 (7.66) 变为对 b 所有可能值的积分:

$$\Psi = \int c_b g_b(q) db \quad (7.75)$$

$|\langle g_b(q)|\Psi\rangle|^2$ 依然是概率密度, 也就是说, 在位于 b 到 $b + db$ 的无穷小区间内测量属性 B 时, 得到结果 b 的概率为

$$|\langle g_b(q)|\Psi(q,t)\rangle|^2 db \quad (7.76)$$

7.7 位置本征函数

我们推导出了线动量和角动量算符的本征函数。现在我们想知道: 位置算符 $\hat{x}$ 的本征函数是什么?

算符 $\hat{x}$ 表示对函数乘以 x 。将位置本征函数记作 $g_a(x)$, 写作

$$xg_a(x) = ag_a(x) \quad (7.77)$$

其中的 a 代表可能的本征值。由此可见,

$$(x - a)g_a(x) = 0 \quad (7.78)$$

由 (7.78), 我们得知:

$$g_a(x) = 0, \quad \text{若 } x \neq a \quad (7.79)$$

此外, 由于本征函数处处为零是不可接受的, 我们有

$$g_a(x) \neq 0, \quad \text{若 } x = a \quad (7.80)$$

这些结论是有道理的。如果某状态函数是 $\hat{x}$ 的本征函数, 本征值为 a , $\Psi = g_a(x)$, 我们知道 (第 7.6 节): 对 x 的测量一定得到值为 a 的结果。这只在 $x \neq a$ 时有概率密度 $|\Psi|^2$ 为零时才成立, 与 (7.79) 一致。

在更进一步考虑 $g_a(x)$ 的性质之前, 我们先定义海维赛德阶梯函数 (Heaviside step function) (见图 7.4):

$$\begin{aligned} H(x) &= 1, & x > 0 \\ H(x) &= 0, & x < 0 \\ H(x) &= \frac{1}{2}, & x = 0 \end{aligned} \quad (7.81)$$




图 7.4: 海维赛德阶梯函数

接下来, 我们再定义狄拉克 δ 函数 (Dirac δ function) $\delta(x)$ 为海维赛德阶梯函数的导数:

$$\delta(x) \equiv \frac{dH(x)}{dx} \quad (7.82)$$

根据 (7.81) 和 (7.82), 我们立即得出 (另见图7.4):

$$\delta(x) = 0, \quad x \neq 0 \quad (7.83)$$

由于 $H(x)$ 在 $x = 0$ 处的值突然变化, 其导数在原点为无穷大:

$$\delta(x) = \infty, \quad x = 0 \quad (7.84)$$

我们可以通过设置 $x = t - a$, 然后将符号 t 改为 x , 将这些方程稍作归纳。方程 (7.81) 至 (7.84) 可以写成

$$H(x - a) = 1, \quad x > a \quad (7.85)$$

$$H(x - a) = 0, \quad x < a \quad (7.86)$$

$$H(x - a) = \frac{1}{2}, \quad x = a \quad (7.87)$$

$$\delta(x - a) = dH(x - a)/dx \quad (7.88)$$

$$\delta(x - a) = 0, \quad x \neq a \quad \text{以及} \quad \delta(x - a) = \infty, \quad x = a \quad (7.89)$$

现在, 考虑如下的积分:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x - a) dx$$

我们使用分部积分法计算:

$$\begin{aligned} \int u dv &= uv - \int v du \\ u &= f(x), \quad dv = \delta(x - a) dx \end{aligned}$$

使用 (7.88), 我们有

$$\begin{aligned} du &= f'(x) dx, \quad v = H(x - a) \\ \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x - a) dx &= f(x) H(x - a) \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} H(x - a) f'(x) dx \\ \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x - a) dx &= f(\infty) - \int_{-\infty}^{\infty} H(x - a) f'(x) dx \end{aligned} \quad (7.90)$$

其中, 我们用到了 (7.85) 和 (7.90)。由于 $H(x - a)$ 在 $x < a$ 时为零, (7.90) 变为

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x - a) dx &= f(\infty) - \int_{-\infty}^a H(x - a) f'(x) dx \\ &= f(\infty) - \int_{-\infty}^a f'(x) dx = f(\infty) - f(x) \Big|_a^{\infty} \\ \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x - a) dx &= f(a) \end{aligned} \quad (7.91)$$

将 (7.91) 与方程 $\sum_k c_k \delta_{ik} = c_i$ 比较, 我们可以看到, 狄拉克 δ 函数在积分中所起的作用与 Kronecker 三角在求和中所起的作用相同。(7.91) 的一个特例为 $f(x) = 1$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - a) dx = 1$$

狄拉克 δ 函数的性质 (7.89) 与位置本征函数 $g_a(x)$ 的性质 (7.79) 和 (7.80) 一致。因此, 我们暂定

$$g_a(x) = \delta(x - a) \quad (7.92)$$

为了证明 (7.92), 我们现在需要证明其符合玻恩假设, 即在 a 到 $a + da$ 的无穷小区间内观测到 x 值的概率为 $|\Psi(a, t)|^2 da$ 。根据 (7.76), 这个概率由下式给出:

$$|\langle g_a(x) | \Psi(x, t) \rangle|^2 da = \left| \int_{-\infty}^{\infty} g_a^*(x) \Psi(x, t) dx \right|^2 da \quad (7.93)$$

先使用 (7.92) 后使用 (7.91), 我们将 (7.93) 变为

$$\left| \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - a) \Psi(x, t) dx \right|^2 da = |\Psi(a, t)|^2 da$$

得证。

由于 $\delta(x - a)$ 中的 a 可以去任何实数值, 那么 $\hat{x}$ 的本征值构成一个连续体: $-\infty < a < \infty$ 。与连续本征函数一致, $\delta(x - a)$ 不是平方可积的 (问题 7.43)。

总而言之, 位置的本征函数和本征值为

$$\hat{x} \delta(x - a) = a \delta(x - a) \quad (7.94)$$

其中 a 是任意实数。

δ 函数不是品优函数, 因此我们所做的处理缺乏严谨性, 会让数学家不寒而栗。不过, 我们可以将 δ 函数视为在零点处峰值逐渐增大的函数的极限情况, 从而对其进行严格的表述 (图 7.5)。 δ 函数其实不是函数, 而是数学家所说的分布 (distribution)。(见 en.wikipedia.org/wiki/Dirac_delta_function)




图 7.5: 近似 $\delta(x)$ 函数, 精确度依次提高。每条曲线下的面积为 1。

7.8 量子力学的基本假设

本节总结了前几章介绍的量子力学假设。

假设 1: 一个系统的状态由一个关于粒子坐标和时间的函数 Ψ 给出。这个函数被称为状态函数或波函数, 它包含了可以确定的关于系统的所有信息。我们进一步假设 Ψ 是单值、连续和平方可积的。对于连续态, 平方可积性的要求可以省略。

用“波函数”来称呼 Ψ 也许不是最好的选择。在三维空间中运动的物理波是三个空间坐标和时间的函数。然而，对于一个 n 粒子系统，函数 Ψ 是 $3n$ 空间坐标和时间的函数。因此，对于一个多粒子系统，我们不能把 Ψ 解释为任何一种物理波。状态函数最好被视为一个函数，我们可以从中计算出系统的各种属性。 Ψ 所包含信息的性质是假设 5 及其结果的主题。

假设 2: 每个物理可观测量属性都对应一个线性厄米算符。要找到这个算符，可以用笛卡尔坐标和相应的线动量分量写出可观测特性的经典力学表达式，然后用算符 x 替换每个坐标 x ，用算符 $-i\hbar \partial/\partial x$ 替换每个动量分量 p_x 。

我们在第 7.2 节中看到，对厄米算符的限制源于物理量的平均值必须是实数的要求。线性的要求与第 7.6 节讨论的态叠加密切相关。在我们对用 $\hat{B}$ 本征函数的叠加展开的状态其属性平均值 B 的 (7.70) 的推导中， $\hat{B}$ 的线性性质起了关键作用。

当经典量包含笛卡尔坐标与其共轭动量的乘积时，我们在构建正确的量子力学算符时就会遇到非对易的问题。已经提出了几种不同的规则来处理这种情况。见 J. R. Shewell, *Am. J. Phys.*, **27**, 16 (1959); E. H. Kerner and W. G. Sutcliffe, *J. Math. Phys.*, **11**, 391 (1970); A. de Souza Dutra, *J. Phys. A: Math. Gen.*, **39**, 203 (2006) (arxiv.org/abs/0705.3247).

在非笛卡尔坐标中寻找量子力学算符的过程非常复杂。见 K. Simon, *Am. J. Phys.*, **33**, 60 (1965); G. R. Gruber, *Found. Phys.*, **1**, 227 (1971).

假设 3: 对物理可观测量属性 B 的测量结果唯一可能的值是方程 $\hat{B}g_i = b_i g_i$ 中的本征值 b_i ，其中 $\hat{B}$ 是与属性 B 相对应的算符。本征函数 g_i 必须是品优函数。

我们主要关注原子和分子的能级。它们由能量算符的本征值，即哈密顿量 $\hat{H}$ 给出。 $\hat{H}$ 的本征方程， $\hat{H}\psi = E\psi$ ，是含时薛定谔方程。然而，要找到任何属性的可能值，都需要求解本征值方程。

假设 4: 若算符 $\hat{B}$ 代表某个物理可观测量的线性厄米算符，那么其本征函数 g_i 构成一个完备集。

有些厄米算符的本征函数并不构成一个完备集（见 *Griffiths*, pp. 99, 106; *Messiah*, p. 188; *Ballentine*, Sec. 1.3）。完备性要求对于发展量子力学理论至关重要，因此有必要假设所有与可观测性质相对应的厄米算符都有一组完备的本征函数。假设 4 使我们能够将任何状态的波函数展开为任何量子力学算符的正交本征函数的叠加：

$$\Psi = \sum_i c_i g_i = \sum_i |g_i\rangle \langle g_i|\Psi\rangle \quad (7.95)$$

假设 5: 若 $\Psi(q, t)$ 表示 t 时刻系统的已归一化状态函数，那么 t 时刻物理可观测测量 B 的平均值为

$$\langle B \rangle = \int \Psi^* \hat{B} \Psi \, d\tau \quad (7.96)$$

量子力学平均值的定义见第 3.7 节，不应与经典力学中使用的时间平均值相混淆。

根据假设 4 和 5，我们已经在第 7.6 节中得出了在对 B 的测量中观测到非简并本征值 b_i 的概率为 $P(b_i) = |\int g_i^* \Psi \, d\tau|^2 = |\langle g_i|\Psi\rangle|^2$ ，其中 $\hat{B}g_i = b_i g_i$ 。如果 Ψ 恰好是 $\hat{B}$ 的本征函数直译，也就是说 $\Psi = g_k$ ，那么 $P(b_i)$ 变为 $P(b_i) = |\int g_i^* g_k \, d\tau|^2 = |\delta_{ik}|^2 = \delta_{ik}$ ，其中用到了厄米算符 $\hat{B}$ 的本征函数之间互相正交的性质。当 $\Psi = g_k$ 时，我们一定会得到 b_k 的测量结果。

假设 6: 未受干扰的量子力学系统状态的时间发展由含时薛定谔方程给出

$$-\frac{\hbar}{i} \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi \quad (7.97)$$

其中 $\hat{H}$ 是系统的哈密顿（也是能量）算符。

含时薛定谔方程关于时间的一阶微分方程，因此就像在经典力学中一样，未受干扰系统的当前状态决定了未来状态。然而，与经典力学中的状态知识不同，量子力学中的状态知识只涉及测量各种可能结果的概率。因此，假设我们有几个完全相同的非相互作用系统，每个系统在 t_0 时刻的状态函数均为 $\Psi(t_0)$ 。如果每个系统都不受干扰，那么每个系统的状态函数的变化都将遵循 (7.97)。由于每个系统哈密顿量都相同，在未来的任意时刻 t_1 ，每个系统的状态函数都将变为 $\Psi(t_1)$ 。然而，假设我们在 t_2 时刻对每个系统的属性 B 进行一次观测。虽然在测量开始时，每个系统具有相同的态函数 $\Psi(t_2)$ ，我们不会在每个系统中得到相同的结果。相反地，我们会得到一系列 b_i 的可能值，其中 b_i 是 $\hat{B}$ 的本征值。我们得到每个 b_i 的相对次数可以通过下式计算： $|c_i|^2$ ，其中 $\Psi(t_2) = \sum_i c_i g_i$ ， g_i 是 $\hat{B}$ 的本征函数。

如果哈密顿算符与时间无关，我们就可能观测到具有确定能量 E 的状态。对于这样的状态，态函数必须满足

$$\hat{H} \Psi = E \Psi \quad (7.98)$$

含时薛定谔方程变为

$$-\frac{\hbar}{i} \frac{\partial \Psi}{\partial t} = E \Psi$$

积分得到 $\Psi = A e^{-iEt/\hbar}$ ，其中 A 是积分“常量”，与时间无关。函数 Ψ 与坐标和时间都相关，所以 A 是坐标的函数，我们将其命名为 $\psi(q)$ 。因此，对于具有确定能量的状态，有

$$\Psi(q, t) = e^{-iEt/\hbar} \psi(q) \quad (7.99)$$

函数 $\psi(q)$ 满足定态薛定谔方程

$$\hat{H} \psi(q) = E \psi(q)$$

由 (7.98) 和 (7.99) 可得上式。因子 $e^{-iEt/\hbar}$ 只简单表明波函数 $\Psi(q, t)$ 的相位随时间的变化，没有直接的物理意义。因此我们通常将 $\psi(q)$ 视为“波函数”。哈密顿算符在量子力学中扮演着独特的角色，因为它出现在基本动力学方程——含时薛定谔方程中。 $\hat{H}$ 的本征态（也成为定态）有特殊的性质，就是概率密度 $|\Psi|^2$ 不随时间变化。

含时薛定谔方程 (7.97) 为 $(i\hbar \partial/\partial t - \hat{H}) \Psi = 0$ 。由于算符 $i\hbar \partial/\partial t - \hat{H}$ 是线性算符，那么含时薛定谔方程 (7.97) 的解的任意线性组合也是 (7.97) 的解。例如，若 $\hat{H}$ 与时间无关，那么有定态解 $\Psi_n = e^{-iE_n t/\hbar} \psi_n(q)$ [式 (7.99)]。任意线性组合

$$\Psi = \sum_n c_n \Psi_n = \sum_n c_n e^{-iE_n t/\hbar} \psi_n(q) \quad (7.100)$$

（其中 c_n 是与时间无关的常数）也是含时薛定谔方程的解，尽管它不是 $\hat{H}$ 的本征函数。由于本征函数 Ψ_n 可以是复函数，若 $\hat{H}$ 与时间无关，那么任何态函数都可以写成 (7.100) 的形式。（另见第 9.8 节。）状态函数 (7.100) 表示一种没有确定能量的状态。相反地，当我们测量能量时，得到能量值为 E_n 的概率为 $|c_n e^{-iE_n t/\hbar}|^2 = |c_n|^2$ 。

为了求出 (7.100) 中的系数 c_n ，我们将 (7.100) 在 t_0 时刻的表达式写成 $\Psi(t_0) = \sum_n c_n e^{-iE_n t_0/\hbar} \psi_n(q)$ 。将其与 $\psi_j^*(q)$ 相乘并对全空间进行积分，得到

$$\langle \psi_j(q) | \Psi(q, t_0) \rangle = \sum_n c_n e^{-iE_n t_0/\hbar} \langle \psi_j | \psi_n \rangle = \sum_n c_n e^{-iE_n t_0/\hbar} \delta_{jn} = c_j e^{-iE_j t_0/\hbar}$$

则 $c_n = \langle \psi_j | \Psi(q, t_0) \rangle e^{iE_j t_0 / \hbar}$ 。则 (7.100) 变为

$$\Psi(q, t) = \sum_n \langle \psi_j(q) | \Psi(q, t_0) \rangle e^{-iE_j(t-t_0)/\hbar} \psi_j(q), \quad \text{若 } \hat{H} \text{ 与时间无关} \quad (7.101)$$

其中 $\hat{H}\psi_j = E_j\psi_j$, ψ_j 被选择为正交的。方程 (7.101) 告诉我们如何从初始时间 t_0 时的 Ψ 求出时间 t 时的 Ψ , 当 $\hat{H}$ 与 t 无关时, 它是含时薛定谔方程的通解。[方程 (7.101) 也可以直接从含时薛定谔方程导出, 见问题 7.46。]

例题: 长度为 l 的一维势箱中有一粒子, 其哈密顿量与时间无关, 其态函数为 $\Psi = 2^{-1/2}\psi_1 + 2^{-1/2}\psi_2$, 其中 ψ_1 和 ψ_2 分别是箱中粒子定态能量本征函数的 $n = 1$ 和 $n = 2$ 形式 [式 (2.23)]。(a) 求出概率密度, 表示为时间的函数; (b) 证明 $|\Psi|^2$ 振荡的周期为 $T = 8ml^2/3\hbar$; (c) 使用 Excel 或 Mathcad 绘制 $l|\Psi|^2$ 在每个时刻 $jT/8$ 随 x/l 变化的图象, 其中 $j = 0, 1, 2, \dots, 8$ 。

(a) 由于 $\hat{H}$ 与时间无关, 则在未来的任意时刻, Ψ 的形式由 (7.100) 给出, 其中 $c_1 = 2^{-1/2}$, $c_2 = 2^{-1/2}$, 其他的 c 值全为零。因此,

$$\begin{aligned} \Psi &= \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-iE_1 t / \hbar} \left(\frac{2}{l}\right)^{1/2} \sin\left(\frac{\pi x}{l}\right) + \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-iE_2 t / \hbar} \left(\frac{2}{l}\right)^{1/2} \sin\left(\frac{2\pi x}{l}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-iE_1 t / \hbar} \psi_1 + \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-iE_2 t / \hbar} \psi_2 \end{aligned}$$

因此, 我们有概率密度 (见问题 7.47)

$$\Psi^* \Psi = \frac{1}{2} \psi_1^2 + \frac{1}{2} \psi_2^2 + \psi_1 \psi_2 \cos[(E_2 - E_1)t / \hbar] \quad (7.102)$$

(b) $|\Psi|^2$ 中与时间有关的因子为余弦因子 (7.102)。最小正周期为余弦函数的参数函数增加 2π 的时间间隔, 即 $(E_2 - E_1)T / \hbar = 2\pi$ 。由于 $E_n = n^2 \hbar^2 / 8ml^2$, 因此周期为 $T = 2\pi \hbar / (E_2 - E_1) = 8ml^2 / 3\hbar$ 。

(c) 使用 (7.102) 和 ψ_1 、 ψ_2 的表达式, 以及 $T = 2\pi \hbar / (E_2 - E_1)$, 我们有

$$l|\Psi|^2 = \sin^2(\pi x_r) + \sin^2(2\pi x_r) + \sin(\pi x_r) \sin(2\pi x_r) \cos(2\pi t/T) \quad (7.103)$$

其中 $x_r = x/l$ 。由于 $t = jT/8$, 对于每个 j 的值, 函数图象很容易得到。图中显示, 概率密度最大值在方框的左右两侧摆动。使用 Mathcad, 我们可以制作出 $|\Psi|^2$ 随着时间变化而变化的影片 (问题 7.47)。(www.falstad.com/qm1d 上有一个在线资源, 可以让人们跟踪 $|\Psi|^2$ 作为时间函数的系统, 例如箱中粒子或谐振子, 对于任意选定的静止状态的初始混合物; 人们可以通过点击底部的小圆圈并拖动圆圈内的每个旋转箭头来选择混合物。)

当 $\hat{H}$ 与时间无关时, 方程 (7.100) 是含时薛定谔方程的通解, 其中的 c_n 是常数。对于一个受到随时间变化的外力作用的系统来说, 哈密顿算符包含一个与时间相关的项: $\hat{H} = \hat{H}^0 + \hat{H}'(t)$, 其中 $\hat{H}^0$ 是系统在外力作用下的哈密顿算符, $\hat{H}'(t)$ 是系统与外力作用随时间变化的势能。在这种情况下, 我们使用 $\hat{H}^0$ 的定态本征函数来展开 Ψ , 与 (7.100) 类似, 除了 c_n 与时间 t 有关。例如, 原子或分子暴露在电磁辐射 (光) 随时间变化的电场中; 见第 9.8 节。

是什么决定了系统处于 (7.99) 这样的定态还是 (7.100) 这样的非定态? 答案是系统的历史决定了它现在的状态。例如, 如果我们将一个处于定态的系统暴露在辐射下, 根据含时薛定谔方程, 辐射会导致其状态转变为非定态; 见第 9.8 节。

你可能会对玻恩假设的列表中没有 $|\Psi(x, t)|^2 dx$ 是在 x 和 $x + dx$ 之间找到粒子的概率感到奇

怪。它是假设 5 的结果，我们现在就说明这一点。方程 (3.81) 为 $\langle B \rangle = \sum_b P_b b$ ，其中 P_b 是测量具有离散值的属性 B 时观测到本征值 b 的概率。连续变量 x 对应的方程为 $\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} P(x) x dx$ ，其中 $P(x)$ 是测量连续变量 x 的概率密度。根据假设 5，我们有 $\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \hat{x} \Psi dx = \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi|^2 x dx$ 。将两个关于 $\langle x \rangle$ 的表达式相比较，我们得到 $|\Psi|^2$ 就是概率密度 $P(x)$ 。

第 10 章给出了涉及自旋和自旋统计定理的两个量子力学假设。

7.9 测量和量子力学解释

在量子力学中，系统的状态函数有两种变化方式。[参见 E. P. Wigner, *Am. J. Phys.*, **31**, 6 (1963).] 首先，含时薛定谔方程 (7.97) 给出了随时间发生的连续因果变化。其次，在对系统进行测量时，会发生突然的、不连续的、概率性的变化。这种变化无法准确预测，因为测量结果无法准确预测，只有概率 (7.73) 可以预测。由测量引起的 Ψ 的突然变化被称为**波函数坍缩** (reduction or collapse of the wave function)。对性质 B 的测量有结果 b_k ，而同时将系统的态函数转变为 g_k ，其中 g_k 是与 b_k 对应的 $\hat{B}$ 的本征函数。(若 b_k 是简并的，则 Ψ 变为对应于 b_k 的所有本征函数的线性组合。) 找到非简并本征值 b_k 的概率由 (7.73)，和定理 9 的 $|\langle g_k | \Psi \rangle|^2$ 给出，则当我们对性质 B 进行测量时， $|\langle g_k | \Psi \rangle|^2$ 是系统从状态 Ψ 转变为 g_k 的概率。

考虑一个例子。假设在 t 时刻，我们测量粒子的位置。假设 $\Psi(x, t_-)$ 是粒子测量前一瞬间的状态函数 (图 7.6a)。我们进一步假设，测量的结果是发现粒子位于以下空间的无限小区域内

$$a < x < a + da \quad (7.104)$$

我们现在想问：测量后一瞬间粒子的状态函数 $\Psi(x, t_+)$ 是什么？为了回答这个问题，假设我们在时间 t_+ 时对位置进行第二次测量。由于 t_+ 与第一次测量的时间 t 相差无穷小，我们仍然必须发现粒子被限制在 (7.104) 区域内。如果粒子在无限小的时间内移动了有限的距离，它就会有无限大的速度，这是不可接受的。由于 $|\Psi(x, t_+)|^2$ 表示找到连续变量 x 的概率密度，因此我们可以得出在 (7.104) 区域外， $|\Psi(x, t_+)|^2 = 0$ ，其图象一定如图 7.6b 所示。因此，在 t 时刻进行的位置测量将 Ψ 从一个遍布整个空间的函数坍缩为一个集中在 (7.104) 区域的函数。从 $\Psi(x, t_-)$ 到 $\Psi(x, t_+)$ 的变化是一种概率变化。




图 7.6: 对位置的测量导致波函数坍缩示意图

测量过程是量子力学中最具争议的领域之一。至于在测量过程中如何以及在哪个阶段出现坍缩，目前还不清楚。一些物理学家把 Ψ 的坍缩看作是一个额外的量子力学公设，而另一些物理学家则声称这是一个可以从其他公设中推导出来的定理。一些物理学家拒绝接受坍缩的观点 [见 M. Jammer, *The Philosophy of Quantum Mechanics*, Wiley, 1974, Section 11.4 ; L. E. Ballentine, *Am. J. Phys.*, **55**, 785 (1987)]。Ballentine 主张爱因斯坦对量子力学的统计集合解释，即波函数并不描述单个系统

的状态（如正统解释）(orthodox interpretation)，而是对以相同方式制备的大量系统的集合（集合）进行统计描述。在这种解释中，波函数的坍缩就不需要了。[见 L. E. Ballentine, *Am. J. Phys.*, **40**, 1763 (1972); *Rev. Mod. Phys.*, **42**, 358 (1970).] 统计集合解释存在许多严重问题 [见 Whitaker, pp. 213-217 ; D. Home and M. A. B. Whitaker, *Phys. Rep.*, **210**, 223 (1992); 问题 10.4], 这种解释在很大程度上已被否定。

“对大多数物理学家来说，找到一个一致的、可信的量子测量理论的问题仍未解决……。关于量子测量……众说纷纭……[是] 对整个量子力学解释的根本分歧的反映。”(M. Jammer, *The Philosophy of Quantum Mechanics*, pp. 519, 521).

量子力学的概率性质困扰了许多物理学家，包括爱因斯坦、德布罗意和薛定谔。这些物理学家和其他物理学家认为，量子力学可能无法完整描述物理现实。相反，量子力学的概率法则可能只是在亚量子力学层面上运行的、涉及“隐变量”的确定性法则的反映。物理学家博姆 (Bohm) 用尘埃粒子在空气中的布朗运动作了一个比喻。粒子的位置会发生随机波动，其运动并不完全由其位置和速度决定。当然，布朗运动是气体分子碰撞的结果，是由分子运动层面的变量决定的。同样，电子的运动可能是由存在于亚量子力学层面的隐变量决定的。由海森堡和玻尔提出的量子力学正统解释 [通常称为哥本哈根解释 (Copenhagen interpretation)] 否认隐变量的存在，并断言量子力学定律提供了对物理现实的完整描述。(F. J. Belinfante, *A Survey of Hidden-Variables Theories*, Pergamon, 1973, 中讨论了隐变量理论。)

1964 年, J. S. Bell 证明, 在某些实验中, 涉及对原本处于同一空间区域的两个相距甚远的粒子进行测量时, 任何可能的局部隐变量理论都必须做出与量子力学不同的预测 (见 Ballentine, Chapter 20)。在局部理论 (local theory) 中, 两个相距甚远的系统彼此独立运行。这些实验的结果与量子力学的预言一致, 从而为反对所有确定性的局部隐变量理论提供了非常有力的证据, 但并不排除非局部隐变量理论。这些实验见 A. Aspect, in *The Wave-Particle Dualism*, S. Diner et al. (eds.), Reidel, 1984, pp. 377-390; A. Shimony, *Scientific American*, Jan. 1988, p. 46; A. Zeilinger, *Rev. Mod. Phys.*, **71**, S288 (1999)。

量子理论预言并经实验证实, 当对曾经相互作用但现在被无限距离分开的两个粒子进行测量时, 对其中一个粒子的测量结果取决于对第二个粒子的测量结果, 而且还取决于测量的是第二个粒子的哪种性质。(这种粒子被称为纠缠 (entangled) 粒子。有关纠缠的更多信息, 请参阅 en.wikipedia.org/wiki/Quantum_entanglement; chaps.7-10 of J. Baggott, *Beyond Measure*, Oxford, 2004; L. Gilder, *The Age of Entanglement*, Vintage, 2009; Part II of A. Whitaker, *The New Quantum Age*, Oxford, 2012。)这种瞬时的“超距作用”(爱因斯坦的说法) 用一位物理学家的话说: “量子力学就是魔法”(D. Greenberger, quoted in N. D. Mermin, *Physics Today*, April 1985, p. 38)。

量子力学与心灵的关系一直是人们猜测的主题。Wigner 认为: 当测量结果进入观察者的意识时, 就会发生波函数的坍缩, 因此“具有意识的存在物在量子力学中的作用一定不同于无生命的测量装置”。他认为, 有意识的生命很可能遵守与无生命物体不同的自然法则, 并建议科学家寻找意识作用于物质的异常效应。[E. P. Wigner, “Remarks on the Mind-Body Question,” in *The Scientist Speculates*, I. J. Good, ed., Capricorn, 1965, p. 284; *Proc. Amer. Phil. Soc.*, **113**, 95 (1969); *Found. Phys.*, **1**, 35 (1970).]

1952 年, 戴维·玻姆 (David Bohm) (根据德布罗意在 1927 年提出的建议, 即波函数可以作为引导粒子运动的先导波) 设计了一种非局部确定性隐变量理论, 该理论预言了与量子力学相同的实验结果 [D. Bohm, *Phys. Rev.*, **85**, 166, 180 (1952)]。在玻姆的理论中, 粒子在任何一瞬间都有一个确定的位置和动量 (尽管这些量是无法观测到的), 而且粒子的运动轨迹是确定的。粒子还拥有一个波函数 Ψ , 其时间变化服从含时薛定谔方程。在玻姆的理论中, 波函数是决定粒子运动的真实物理实体。如果我们给定一个粒子在某一特定位置、某一特定波函数、某一特定时间 t , 那么玻姆理论

假定了一个特定的方程，可以让我们根据粒子的波函数和位置计算出粒子在该时间的速度；知道了 t 时的位置和速度，我们就可以求出时间 $t + dt$ 时的位置，并可以利用含时薛定谔方程求出 $t + dt$ 时的波函数，然后根据 $t + dt$ 时的位置和波函数计算出 $t + dt$ 时的速度，以此类推。因此，可以根据初始位置和波函数（假设我们知道势能）计算出路径。原来，在玻姆的理论中，粒子的位置服从类似牛顿第二定律的方程 $m d^2x/dt^2 = -\partial V/\partial x$ [式 (1.8) 以及 (1.12)]，只是把势能 V 换作 $V + Q$ ，其中 Q 是量子势，是由波函数以某种方式计算得出的。在玻姆理论中，波函数并没有发生坍缩。相反，系统与测量仪器的相互作用遵循了玻姆理论的方程，但这种相互作用导致系统在测量后以波函数坍缩时的方式演变。

多年来，博姆的研究在很大程度上被忽视了，但人们对他的理论的兴趣与日俱增。有关博姆理论的更多信息，参见 Whitaker, Chapter 7; D. Bohm and B.J. Hiley, *The Undivided Universe*, Routledge, 1992; D. Z. Albert, *Scientific American*, May 1994, p. 58; S. Goldstein, “Bohmian Mechanics,” plato.stanford.edu/entries/qm-bohm; en.wikipedia.org/wiki/De_Broglie-Bohm_theory。丽贝卡·戈德斯坦 (Rebecca Goldstein) 的小说《光的特性》(Properties of Light, Houghton Mifflin 出版社, 2000 年) 中的一个主要人物部分是以大卫·博姆 (David Bohm) 为原型创作的。

一些物理学家认为，波函数仅仅代表了我们对系统状态的认识 [哥本哈根观点采用了这种认识论 (epistemic 解释)，而另一些物理学家则认为，波函数直接对应于物理现实的一个要素本体论 (ontic 解释)]。2012 年发表的一篇论文利用某些温和的假设证明了一个结果，作者认为这个结果非常有利于本体论解释; M. F. Pusey, J. Barrett, and T. Rudolph, *Nature Phys.* **8**, 476 (2012) (arxiv.org/abs/1111.3328)。关于这一结果 (称为 PBR 定理) 的讨论，见 www.aps.org/units/gqi/newsletters/upload/vol6num3.pdf; mattleifer.info/2011/11/20/can-the-quantum-state-be-interpreted-statistically。

尽管量子力学的实验预测无可争议，但其概念解释仍是激烈争论的主题。附有相关评论的优秀文献有 B. S. DeWitt and R. N. Graham, *Am. J. Phys.*, **39**, 724 (1971); L. E. Ballentine, *Am. J. Phys.*, **55**, 785 (1987)。另见 B. d’Espagnat, *Conceptual Foundations of Quantum Mechanics*, 2nd ed., Benjamin, 1976; M. Jammer, *The Philosophy of Quantum Mechanics*, Wiley, 1974; Whitaker, Chapter 8; P. Yam, *Scientific American*, June 1997, p. 124。A. Cabello 关于量子力学基础的在线书目列出了对量子力学的 12 种不同解释 (arxiv.org/abs/quant-ph/0012089)；维基百科的一篇文章列出了对量子力学的 14 种解释 (en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics)。

7.10 矩阵

矩阵代数是现代分子量子力学计算的重要数学工具。矩阵也为量子力学的许多理论提供了便捷的表述方法。矩阵方法将在后面一些章节中使用，但本书的编写方式是：如果时间不允许，可以省略有关矩阵的材料。

矩阵 (matrix) 是由数字组成的矩形数组。组成矩阵的数字称为**矩阵元素** (matrix elements)。设矩阵 $\mathbf{A}$ 有 m 行 n 列，设 a_{ij} ($i = 1, 2, \dots, m$; $j = 1, 2, \dots, n$) 表示第 i 行第 j 列的元素。那么

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdots & \cdot \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$\mathbf{A}$ 称为 m 行 n 列矩阵。不要把 $\mathbf{A}$ 和行列式 (第 8.3 节) 混淆，矩阵的行数和列数不一定相等，也不

等于一个值。

一个**行矩阵** (row matrix) [也称为**行向量** (row vector)] 是一个只有一行的矩阵。一个**列矩阵** (column matrix) [也称为**列向量** (column vector)] 是一个只有一列的矩阵。

当且仅当两个矩阵 $\mathbf{R}$ 和 $\mathbf{S}$ 的行数和列数相等, 且对应元素也相等时, 我们才说它们是**相等的** (equal)。若 $\mathbf{R} = \mathbf{S}$, 那么对 $j = 1, \dots, m$ 和 $k = 1, \dots, n$, 都有 $r_{jk} = s_{jk}$, 其中 m 和 n 是 $\mathbf{R}$ 和 $\mathbf{S}$ 的维数。因此, 一个矩阵方程等价于 nm 个标量方程组。

两个矩阵 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 的**和** (sum) 定义为一个新的矩阵, 其各元素为 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 对应元素的和, 只有 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 的行数和列数相等时, 我们才能定义它们的和。若 $\mathbf{P} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$, 则我们有 mn 个标量方程 $p_{jk} = a_{jk} + b_{jk}$, 其中 $j = 1, \dots, m$ 和 $k = 1, \dots, n$ 。

$$\boxed{\text{若 } \mathbf{P} = \mathbf{A} + \mathbf{B}, \text{ 则 } p_{jk} = a_{jk} + b_{jk}} \quad (7.105)$$

标量 c 与矩阵 $\mathbf{A}$ 的乘积定义为将 $\mathbf{A}$ 的每个元素乘以 c :

$$\boxed{\text{若 } \mathbf{D} = c\mathbf{A}, \text{ 则 } d_{jk} = ca_{jk}} \quad (7.106)$$

若 $\mathbf{A}$ 是 m 行 n 列的矩阵, $\mathbf{B}$ 是 n 行 p 列的矩阵, 则**矩阵乘积** (matrix product) $\mathbf{AB}$ 定义为一个 m 行 p 列的矩阵, 其元素为

$$\boxed{r_{jk} \equiv a_{j1}b_{1k} + a_{j2}b_{2k} + \dots + a_{jn}b_{nk} = \sum_{i=1}^n a_{ji}b_{ik}} \quad (7.107)$$

为了计算 r_{jk} , 我们取 $\mathbf{A}$ 的第 j 行 (其元素为 $a_{j1}, a_{j2}, \dots, a_{jn}$), 将该行的每个元素与对应的 $\mathbf{B}$ 的第 k 列 (其元素为 $b_{1k}, b_{2k}, \dots, b_{nk}$) 相乘并相加。例如, 我们假设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & \frac{1}{2} \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{和} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 2 & 5 & 6 \\ -8 & 3 & 10 \end{pmatrix}$$

$\mathbf{A}$ 的列数和 $\mathbf{B}$ 的行数相等, 因此可以计算它们的乘积。 $\mathbf{AB}$ 是 2×3 矩阵 $\mathbf{A}$ 和 3×3 矩阵 $\mathbf{B}$ 的乘积, 则 $\mathbf{R} \equiv \mathbf{AB}$ 是 2×3 矩阵。元素 r_{21} 由 $\mathbf{A}$ 的第二行和 $\mathbf{B}$ 的第一列计算得到: $r_{21} = 0(1) + 4(2) + 1(-8) = 0$ 。再计算其余的元素, 我们可以得出

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 1 & 16\frac{1}{2} & 25 \\ 0 & 23 & 34 \end{pmatrix}$$

矩阵乘积是不可对易的, $\mathbf{AB}$ 和 $\mathbf{BA}$ 不一定相等。(在上例中, 乘积 $\mathbf{BA}$ 恰好没有定义。)可以证明, 矩阵乘法满足**结合律** (associative), 即 $\mathbf{A}(\mathbf{BC}) = (\mathbf{AB})\mathbf{C}$, 也满足**分配律** (distributive), 即 $(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{C} = \mathbf{AC} + \mathbf{BC}$ 和 $(\mathbf{B} + \mathbf{C})\mathbf{D} = \mathbf{BD} + \mathbf{CD}$ 。

行数和列数相等的矩阵称为**方阵** (square matrix)。方阵的**阶** (order) 等于其行数。

若 $\mathbf{A}$ 是一个方阵, 则其平方和立方分别定义为 $\mathbf{A}^2 \equiv \mathbf{AA}$ 和 $\mathbf{A}^3 \equiv \mathbf{AAA}, \dots$ 。

n 阶方阵的元素 $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ 位于其**主对角线** (principal diagonal) 上。若一个方阵的所有非对角元素都为零, 则称其为**对角矩阵** (diagonal matrix)。

方阵的**迹** (trace) 定义为主对角线元素的和。若 $\mathbf{A}$ 是一个 n 阶方阵, 则其迹为 $\text{Tr}\mathbf{A} = \sum_{i=1}^n a_{ii}$ 。

对角元素都为 1 的对角矩阵称为**单位矩阵** (identity matrix or unit matrix)。单位矩阵的第 (j, k) 个元素为 Kronecker delta 函数: $(\mathbf{I})_{jk} = \delta_{jk}$, 其中 $\mathbf{I}$ 是单位矩阵。例如, 一个三阶的单位阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

令 $\mathbf{B}$ 为一个与单位阵 $\mathbf{I}$ 同阶的矩阵, 则矩阵积 $\mathbf{IB}$ 的第 (j, k) 个元素由 (7.107) 给出: $(\mathbf{IB})_{jk} = \sum_i (\mathbf{I})_{ji} b_{ik} = \sum_i \delta_{ji} b_{ik} = b_{jk}$ 。由于对于所有的 j 和 k , $\mathbf{IB}$ 和 $\mathbf{B}$ 的第 (j, k) 个元素都相等, 我们有 $\mathbf{IB} = \mathbf{B}$ 。同理, $\mathbf{BI} = \mathbf{B}$ 。因此, 任意矩阵与单位矩阵相乘不会产生任何影响。

所有元素都为零的矩阵称为**零矩阵** (zero matrix), 表示为 $\mathbf{0}$ 。一个**非零矩阵** (nonzero matrix) 是一个至少有一个非零元素的矩阵。这些定义也适用于行向量和列向量。

量子化学中的大多数矩阵都是方阵或行矩阵或列矩阵。

矩阵和量子力学

在 7.1 节中, 积分 $\int f_m^* \hat{A} f_n d\tau$ 称为 $\hat{A}$ 的一个矩阵元。现在, 我们通过证明此类积分遵守矩阵代数规则来证明这一名称的合理性。

令函数 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 是一个完全且正交的函数集, 令 $\{f_i\}$ 表示这个完备集。则数字 $A_{mn} \equiv \langle f_m | \hat{A} f_n \rangle \equiv \int f_m^* \hat{A} f_n d\tau$ 称为以 $\{f_i\}$ 为基的线性算符 $\hat{A}$ 的矩阵元 (matrix element of the linear operator $\hat{A}$ in the basis $\{f_i\}$)。方阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots \\ A_{21} & A_{22} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle f_1 | \hat{A} f_1 \rangle & \langle f_1 | \hat{A} f_2 \rangle & \dots \\ \langle f_2 | \hat{A} f_1 \rangle & \langle f_2 | \hat{A} f_2 \rangle & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \quad (7.108)$$

称为线性算符 $\hat{A}$ 以 $\{f_i\}$ 为基的**矩阵表示** (matrix representative)。因为 $\{f_i\}$ 通常包含无穷多个函数, 所以 $\mathbf{A}$ 通常是一个无穷阶矩阵。

考虑矩阵元积分的加和。假设 $\hat{C} = \hat{A} + \hat{B}$ 。一个典型的以 $\{f_i\}$ 为基的 $\hat{C}$ 矩阵元为

$$\begin{aligned} C_{mn} &= \langle f_m | \hat{C} | f_n \rangle = \langle f_m | \hat{A} + \hat{B} | f_n \rangle = \int f_m^* (\hat{A} + \hat{B}) f_n d\tau \\ &= \int f_m^* \hat{A} f_n d\tau + \int f_m^* \hat{B} f_n d\tau = A_{mn} + B_{mn} \end{aligned}$$

因此, 若 $\hat{C} = \hat{A} + \hat{B}$, 则 $C_{mn} = A_{mn} + B_{mn}$, 这是 (7.105) 的矩阵加和形式。因此, 若 $\hat{C} = \hat{A} + \hat{B}$, 则 $\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$, 其中 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{C}$ 是算符的 $\hat{A}$ 、 $\hat{B}$ 和 $\hat{C}$ 的矩阵表示。

相似地, 若 $\hat{P} = c\hat{S}$, 其中 c 为常数, 则我们得到 (问题 7.52) $P_{jk} = cS_{jk}$, 这是矩阵与标量相乘的规则。

最后, 假设 $\hat{R} = \hat{S}\hat{T}$, 我们有

$$R_{mn} = \int f_m^* \hat{R} f_n d\tau = \int f_m^* \hat{S}\hat{T} f_n d\tau \quad (7.109)$$

函数 $\hat{T} f_n$ 可以用完全正交函数集 $\{f_i\}$ 展开 [式 (7.41)]:

$$\hat{T} f_n = \sum_i c_i f_i = \sum_i \langle f_i | \hat{T} f_n \rangle f_i = \sum_i \langle f_i | \hat{T} | f_n \rangle f_i = \sum_i T_{in} f_i$$

则 R_{mn} 变为

$$R_{mn} = \int f_m^* \hat{S} \sum_i T_{in} f_i d\tau = \sum_i \int f_m^* \hat{S} f_i d\tau T_{in} = \sum_i S_{mi} T_{in} \quad (7.110)$$

方程 $R_{mn} = \sum_i S_{mi} T_{in}$ 是 (7.107) 的矩阵乘积形式。因此, 若 $\hat{R} = \hat{S}\hat{T}$, 则 $\mathbf{R} = \mathbf{S}\mathbf{T}$ 。

我们已经证明: 我们已经证明, 在一个完整的正交基集中, 线性算符的矩阵表示所服从的方程与算符所服从的方程相同。将 (7.109) 与 (7.110) 结合起来, 我们可以得出有用的结论

$$\sum_i \langle m | \hat{S} | i \rangle \langle i | \hat{T} | n \rangle = \langle m | \hat{S}\hat{T} | n \rangle \quad (7.111)$$

假设选择的基函数 $\{f_i\}$ 为算符 $\hat{A}$ 的本征函数 g_i 的完全正交集，其中 $\hat{A}g_i = a_i g_i$ 。则矩阵元 A_{mn} 表示为

$$A_{mn} = \langle g_m | \hat{A} | g_n \rangle = \langle g_m | \hat{A} g_n \rangle = \langle g_m | a_n g_n \rangle = a_n \langle g_m | g_n \rangle = a_n \delta_{mn}$$

以 $\hat{A}$ 的本征函数为正交基表示 $\hat{A}$ 的矩阵是一个对角矩阵，其对角元素为 $\hat{A}$ 的本征值 a_n 。相反地，我们可以证明（问题 7.53），当某算符 $\hat{A}$ 以其完整正交基表示为对角矩阵时，那么基函数为 $\hat{A}$ 的本征函数，对角元素为 $\hat{A}$ 的本征值。

我们使用了完全正交基 $\{f_i\}$ 来将算符 $\hat{A}$ 表示为 (7.108) 的矩阵 $\mathbf{A}$ 。这组基还可以用来表示任意函数 u ，如下所示。根据 $u = \sum_i u_i f_i$ ，用完备集 $\{f_i\}$ 展开函数 u ，其中展开系数 u_i 由 (7.40) 给出： $u_i = \langle f_i | u \rangle$ 。展开系数 $u_1, u_2, \dots$ 构成的集合形成一个列矩阵（列向量），称为 $\mathbf{u}$ ，则 $\mathbf{u}$ 称为函数 u 以 $\{f_i\}$ 为基的**矩阵表示**（matrix representative）。若 $\hat{A}u = w$ ，其中 w 是另一个函数，那么我们可以证明（问题 7.54） $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{w}$ ，其中 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{w}$ 分别是算符 $\hat{A}$ 、函数 u 和函数 w 以 $\{f_i\}$ 为基的矩阵表示。因此，若我们知道算符 $\hat{A}$ 的矩阵表示 $\mathbf{A}$ ，那么我们就得知算符 $\hat{A}$ 作用于任意函数 u 的结果。那么知道了矩阵表示 $\mathbf{A}$ 等价于知道了算符 $\hat{A}$ 。

总结

习题

Chapter 8

变分法

8.1 变分理论

为了处理包含相互作用粒子系统（如原子和分子）的定态薛定谔方程，我们必须使用近似方法。本章讨论变分法，它允许我们在不求解薛定谔方程的情况下近似得到系统的基态能量。变分法基于如下理论：

变分理论：

给定一个系统，其哈密顿算符 $\hat{H}$ 与时间无关，其最低能量本征值为 E_1 ，如果 ϕ 是系统粒子坐标的任何满足问题定解条件的已归一化品优函数，那么

$$\int \phi^* \hat{H} \phi \, d\tau \geq E_1, \quad \phi \text{ 已归一化} \quad (8.1)$$

变分理论允许我们计算系统基态能量的最大值。

为了证明 (8.1)，我们将 ϕ 用 $\hat{H}$ 的本征函数完全正交集，即定态本征函数 ψ_k 展开：

$$\phi = \sum_k a_k \psi_k \quad (8.2)$$

其中

$$\hat{H} \psi_k = E_k \psi_k \quad (8.3)$$

注意：展开式 (8.2) 要求 ϕ 满足与 ψ_k 相同的定解条件。将 (8.2) 代入 (8.1) 的左侧，我们得到

$$\int \phi^* \hat{H} \phi \, d\tau = \int \sum_k a_k^* \psi_k^* \hat{H} \sum_j a_j \psi_j \, d\tau = \int \sum_k a_k^* \psi_k^* \sum_j a_j \hat{H} \psi_j \, d\tau$$

利用本征方程 (8.3)，并假设交换积分和无限求和是成立的，我们可以得到

$$\begin{aligned} \int \phi^* \hat{H} \phi \, d\tau &= \int \sum_k a_k^* \psi_k^* \hat{H} \sum_j a_j \psi_j \, d\tau = \int \sum_k a_k^* \psi_k^* \sum_j a_j \hat{H} \psi_j \, d\tau \\ &= \sum_k \sum_j a_k^* a_j E_j \delta_{kj} \end{aligned}$$

其中用到了本征函数 ψ_k 的正交性。我们对 j 求和，像往常一样，除了 $j = k$ 的项之外，Kronecker δ 使所有项都为零，从而得到

$$\int \phi^* \hat{H} \phi \, d\tau = \sum_k a_k^* a_k E_k = \sum_k |a_k|^2 E_k \quad (8.4)$$

由于 E_1 是 $\hat{H}$ 的最低能量本征值, 我们有 $E_k \geq E_1$, 又由于 $|a_k|^2$ 为非负数, 我们可以将不等式 $E_k \geq E_1$ 的左右两侧乘以 $|a_k|^2$ 而不改变不等号的方向, 从而得到 $|a_k|^2 E_k \geq |a_k|^2 E_1$ 。因此, $\sum_k |a_k|^2 E_k \geq \sum_k |a_k|^2 E_1$, 使用 (8.4), 我们得到

$$\int \phi^* \hat{H} \phi d\tau = \sum_k |a_k|^2 E_k \geq \sum_k |a_k|^2 E_1 = E_1 \sum_k |a_k|^2 \quad (8.5)$$

因为 ϕ 已归一化, 我们有 $\int \phi^* \phi d\tau = 1$ 。将展开式 (8.2) 代入归一化条件, 得到

$$\begin{aligned} 1 = \int \phi^* \phi d\tau &= \int \sum_k a_k^* \psi_k^* \sum_j a_j \psi_j d\tau = \sum_k \sum_j a_k^* a_j \int \psi_k^* \psi_j d\tau = \sum_k \sum_j a_k^* a_j \delta_{kj} \\ &= \sum_k |a_k|^2 \end{aligned} \quad (8.6)$$

[注意, 在推导公式 (8.4) 和 (8.6) 时, 我们基本上分别重复了公式 (7.70) 和 (7.69) 的推导。]

将 (8.6) 代入 (8.5) 就得到了变分理论 (8.1) 的证明:

$$\int \phi^* \hat{H} \phi d\tau \geq E_1, \quad \phi \text{ 已归一化} \quad (8.7)$$

假设我们有一个未归一化的函数 ϕ 。为了应用变分理论, 我们用一个归一化常数 N 乘以 ϕ 使得 $N\phi$ 满足归一化条件。在 (8.7) 中, 我们将 ϕ 替换为 $N\phi$, 得到

$$|N|^2 \int \phi^* \hat{H} \phi d\tau \geq E_1 \quad (8.8)$$

N 由下式导出: $\int (N\phi)^* (N\phi) d\tau = |N|^2 \int \phi^* \phi d\tau = 1$, 因此 $|N|^2 = 1 / \int \phi^* \phi d\tau$ 。将其代入 (8.8), 我们得到

$$\boxed{\frac{\int \phi^* \hat{H} \phi d\tau}{\int \phi^* \phi d\tau} \geq E_1} \quad (8.9)$$

其中 ϕ 是满足问题定解条件的任意品优函数 (不必归一化)。

函数 ϕ 称为**试探变分函数** (trial variational function), (8.1) 中的积分 [或 (8.9) 中的积分之比] 称为**变分积分** (variational integral)。为了获取基态能量 E_1 的良好近似值, 我们会尝试许多试探变分函数, 并寻找能给出最小变分积分值的函数。由 (8.1) 可知, 变分积分的值越小, 我们对 E_1 的近似就越好。推翻量子力学的一种方法是找到一个试探变分函数, 使已知 E_1 的某个系统的变分积分小于 E_1 。

令 ψ_1 为系统基态能量的真实波函数:

$$\hat{H}\psi_1 = E_1\psi_1 \quad (8.10)$$

如果我们碰巧幸运地发现了一个等于 ψ_1 的变分函数, 那么在 (8.1) 中使用 (8.10), 我们可以看到变分积分将等于 E_1 。因此, 基态波函数给出了变分积分的最小值。因此, 我们预期变分积分值越小, 试探变分函数就越接近真实的基态波函数。然而, 事实证明, 变分积分接近 E_1 的速度要比试探变分函数接近 ψ_1 的速度快得多, 而且有可能用一个相当差的 ϕ 得到一个相当好的近似值 E_1 。

在实践中, 人们通常会在试探函数 ϕ 中引入几个参数, 然后对这些参数进行变分, 从而使变分积分最小化。能否成功使用变分法, 取决于能否对试探函数做出正确的选择。

让我们来看一些变分法的例子。虽然这种方法的真正用途是针对我们不知道确切解的问题, 但我们还是要考虑那些完全可解的问题, 以便判断我们结果的准确性。

例题：为长度为 l 的一维势箱中的粒子设计一个试探变分函数。

波函数在势箱外为零，定解条件要求在 $x = 0$ 和 $x = l$ 处 $\psi = 0$ 。变分函数 ϕ 必须满足这些在边界点为零的条件。如公式 (4.57) 后所述，基态 ψ 在边界点内部没有节点，因此希望 ϕ 也没有内部节点。具有这些性质的一个简单函数为抛物线函数

$$\phi = x(l - x), \quad 0 \leq x \leq l \quad (8.11)$$

以及在势箱外，有 $\phi = 0$ 。由于我们尚未归一化 ϕ ，我们使用 (8.9) 来计算。势箱内部的哈密顿算符为 $-(\hbar^2/2m) d^2/dx^2$ 。对于 (8.9) 的分子和分母，我们可以得出

$$\int \phi^* \hat{H} \phi d\tau = -\frac{\hbar^2}{2m} \int_0^l (lx - x^2) \frac{d^2}{dx^2} (lx - x^2) dx = \frac{\hbar^2}{m} \int_0^l (lx - x^2) dx = \frac{\hbar^2 l^3}{6m} \quad (8.12)$$

$$\int \phi^* \phi d\tau = \int_0^l x^2 (l - x)^2 dx = \frac{l^5}{30} \quad (8.13)$$

将它们带入变分理论 (8.9)，我们得到

$$E_1 \leq \frac{5\hbar^2}{4\pi^2 ml^2} = 0.1266515 \frac{\hbar^2}{ml^2}$$

根据 (2.20)， E_1 的准确值为 $\hbar^2/8ml^2 = 0.125\hbar^2/8ml^2$ ，能量的误差约为 1.3%。

由于 $\int |\phi|^2 d\tau = l^5/30$ ，将 (8.11) 归一化为 $(30/l^5)^{1/2} x(l - x)$ 。图 7.3 显示，该函数与真正的箱中粒子基态波函数非常相似。

练习：一个单粒子一维系统的势能函数满足

$$V = \begin{cases} V_0, & 0 \leq x \leq l \\ \infty, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

(其中 V_0 是常数)。

(a) 使用试探函数

$$\phi = \begin{cases} \sin(\pi x/l), & 0 \leq x \leq l \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

来估算该系统的基态能量；

(b) 解释为什么 (a) 的结果是该系统的准确基态能量。提示：见第 4 章的问题之一。(答案：(a) $V_0 + \hbar^2/8ml^2$ 。)

上一个例题的试探函数中没有参数。下一个例题有。

例题：对于一维谐振子，设计一个带有参数的变分函数，并找出参数的最佳值。估计基态能量。

变分函数 ϕ 必须平方可积，即当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时， $\phi \rightarrow 0$ 。函数 e^{-x} 在 $+\infty$ 时满足条件，但在 $-\infty$ 时变为无穷大。函数 e^{-x^2} 在 $\pm\infty$ 时都满足条件。然而，从量纲上看，这种做法并不令人满意，因为 e 的指数必须是无量纲的。这可以从 Taylor 级数中看出 $e^z = 1 + z + z^2/2! + z^3/3! + \dots$ [式 (4.44)]。由于该级数中的所有项都必须有相同的量纲，那么 z 的量纲就必须为 1，也就是说 e^z

中的 z 必须是无量纲的。因此，我们将 e^{-x^2} 替换为 e^{-cx^2} ，其中 c 的量纲为长度⁻²。我们将 c 作为变分参数。真实的基态 ψ 没有节点。此外，由于 $V = \frac{1}{2}kx^2$ 是偶函数，由于奇函数在原点有节点，那么基态的 ψ 一定具有确定的宇称，也一定是偶函数。试探函数 e^{-cx^2} 具有我们需要的性质：无节点，且为偶函数。

对 $\hat{H}$ 使用 (4.30)，再使用附录中的积分，有（问题 8.3）

$$\begin{aligned}\int \phi^* \hat{H} \phi d\tau &= -\frac{\hbar^2}{2m} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2cx^2} \frac{d^2 e^{-cx^2}}{dx^2} dx + 2\pi^2 \nu^2 m \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-2cx^2} dx \\ &= \frac{\hbar^2}{m} \left(\frac{\pi c}{m}\right)^{1/2} + \nu^2 m \left(\frac{\pi^5}{8}\right)^{1/2} c^{-3/2} \\ \int \phi^* \phi d\tau &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2cx^2} dx = 2 \int_0^{\infty} e^{-2cx^2} dx = \left(\frac{\pi}{2c}\right)^{1/2}\end{aligned}$$

试探积分 W 为

$$W \equiv \frac{\int \phi^* \hat{H} \phi d\tau}{\int \phi^* \phi d\tau} = \frac{\hbar^2 c}{2m} + \frac{\pi^2 \nu^2 m}{2c} \quad (8.14)$$

现在，我们通过改变 c 来最小化 W (8.14)。 W 最小的必要条件为

$$\begin{aligned}\frac{dW}{dc} &= 0 = \frac{\hbar^2}{2m} - \frac{\pi^2 \nu^2 m}{2c^2} \\ c &= \pm \pi \nu m / \hbar\end{aligned} \quad (8.15)$$

其中，负根 $c = -\pi \nu m / \hbar$ 应舍去，因其会导致 $\phi = e^{-cx^2}$ 不满足平方可积的要求。将 $c = \pi \nu m / \hbar$ 代入 (8.14)，我们得到 $W = \frac{1}{2} \hbar \nu$ 。这是一维谐振子基态能量的准确值。当 $c = \pi \nu m / \hbar$ 时，变分函数 ϕ 除了未归一化以外，与谐振子基态波函数 (4.53) 和 (4.31) 完全一致。

对于归一化的谐振子变分函数 $\phi = (2c/\pi)^{1/4} e^{-cx^2}$ ，若 c 的值很大，会导致 ϕ 在 $x = 0$ 附近从其最大值快速下降。那么概率密度就只在 $x = 0$ 附近较大。势函数 $V = \frac{1}{2}kx^2$ 在 $x = 0$ 附近也很小，所以较大的 c 意味着较小的 $\langle V \rangle = \langle \phi | V | \phi \rangle$ 。[注意： $\langle V \rangle$ 等于 (8.14) 右侧的第二项。]然而，由于较大的 c 值使得 ϕ 从其最大值快速减小，那么在 $x = 0$ 附近 $|d\phi/dx|$ 的值变得很大，根据问题 7.7b，大 $|d\phi/dx|$ 意味着大 $\langle T \rangle$ [等于 (8.14) 右侧的第一项。] c 的最佳值可以使总和 $\langle T \rangle + \langle V \rangle = W$ 最小化。在原子和分子中，真正的波函数是通过将电子限制在低 V 区域（靠近原子核）来最小化 $\langle V \rangle$ 的趋势与通过允许电子概率密度在大区域内扩散来最小化 $\langle T \rangle$ 的趋势之间的折衷。

练习：考虑一个单粒子一维系统，其势函数满足

$$V = \begin{cases} V = 0, & -\frac{1}{2}l \leq x \leq \frac{1}{2}l \\ V = b\hbar^2/ml^2, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

其中 b 是正常数（图 2.5 中的 $V_0 = b\hbar^2/ml^2$ 和原点发生了偏移）。

(a) 对于变分函数

$$\phi = \begin{cases} (x-c)(x+c) = x^2 - c^2, & -c \leq x \leq c \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

其中变分参数 $c > \frac{1}{2}l$ 。我们发现变分积分 W 由下式给出：

$$W = \frac{\hbar^2}{ml^2} \left[\frac{5l^2}{4c^2} + b \left(1 - \frac{15l}{16c} + \frac{5l^3}{32c^3} - \frac{3l^5}{256c^5} \right) \right]$$

在同一幅图上绘制 ϕ 和 V 的图象。求使 W 最小的 c 值所满足的方程。

(b) 当 $V_0 = 20\hbar^2/ml^2$ 时, 求出 c 的最佳值和 W 的值, 将其与基态能量真实值 $2.814\hbar^2/ml^2$ 进行比较 (问题 4.31c)。(提示: 可以使用 Excel 表格求解器或可编程计算器来计算 c/l 的值。)

(答案: (a) $48t^4 - 24t^2 - 128t^3/b + 3 = 0$, 其中 $t \equiv c/l$; (b) $c = 0.6715l$, $W = 3.454\hbar^2/ml^2$ 。)

8.2 变分法的推广

上一节介绍的变分法只提供了基态能量和波函数的信息。现在我们讨论将变分法推广到激发态。(另请参见第 8.5 节)。

考虑一下我们可以如何推广变分法, 来估算第一激发态的能量。根据能量从低到高:

$$E_1 \leq E_2 \leq E_3 \leq \dots$$

我们将系统的状态标号为 $1, 2, 3, \dots$ 。我们已经证明: 对于一个已归一化的变分函数 ϕ , 有 [式 (8.4) 和 (8.6)]

$$\int \phi^* \hat{H} \phi d\tau = \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^2 E_k \quad \text{和} \quad \int \phi^* \phi d\tau = \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^2 = 1$$

其中的 a_k 是展开式 $\phi = \sum_k a_k \psi_k$ 中的系数 [式 (8.2)]。我们有 $a_k = \langle \psi_k | \phi \rangle$ [式 (7.40)]。让我们只讨论与真实基态波函数 ψ 正交的归一化函数 ϕ 。那么 $a_1 = \langle \psi_1 | \phi \rangle = 0$, 因此

$$\int \phi^* \hat{H} \phi d\tau = \sum_{k=2}^{\infty} |a_k|^2 E_k \quad \text{和} \quad \int \phi^* \phi d\tau = \sum_{k=2}^{\infty} |a_k|^2 = 1 \quad (8.16)$$

对于 $k \geq 2$, 我们有 $E_k \geq E_2$ 和 $|a_k|^2 E_k \geq |a_k|^2 E_2$ 。因此,

$$\sum_{k=2}^{\infty} |a_k|^2 E_k \geq \sum_{k=2}^{\infty} |a_k|^2 E_2 = E_2 \sum_{k=2}^{\infty} |a_k|^2 = E_2 \quad (8.17)$$

将 (8.16) 和 (8.17) 相结合, 我们得到了所需的结果:

$$\int \phi^* \hat{H} \phi d\tau \geq E_2, \quad \text{若} \quad \int \psi^* \phi d\tau = 0 \quad \text{且} \quad \int \phi^* \phi d\tau = 1 \quad (8.18)$$

通过不等式 (8.18) 我们可以得到第一激发态的能量 E_2 的上限。然而, 限制条件 $\langle \psi_1 | \phi \rangle = 0$ 使得这种方法在应用上会很麻烦。

对于特定的系统, 尽管我们不知道真实基态波函数, 但确定 $\langle \psi_1 | \phi \rangle = 0$ 是可能的。 V 是 x 的偶函数的一维问题就是一个例子。在这种情况下, 基态波函数总是偶函数, 而第一激发态波函数是奇函数。(所有波函数必须具有确定的宇称。基态波函数是无节点的, 由于奇函数在原点消失, 所以基态波函数必须是偶函数。第一个激发态波函数有一个节点, 一定是奇函数。) 因此, 对于奇函数, $\langle \psi_1 | \phi \rangle = 0$ 一定成立, 偶函数 ψ_1 乘以一个奇函数 ϕ 得到一个奇被积函数, 从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 的积分为零。

另一个例子是在中心场中运动的粒子 (第 6.1 节)。势能的形式可能使我们无法求解本征函数中的径向因子 $R(r)$ 。然而, 其中的角度因子 ψ 是球谐函数 [式 (6.16)], 而不同 l 值的球谐函数是正交的。因此, 我们可以利用试探函数中的因子 Y_l^m , 求出任意给定角动量 l 的最低态能量上限。这一结果取决于将 (8.18) 推广到更高的激发态:

$$\frac{\int \phi^* \hat{H} \phi d\tau}{\int \phi^* \phi d\tau} \geq E_{k+1}, \quad \text{若} \quad \int \psi_1^* \phi d\tau = \int \psi_2^* \phi d\tau = \dots = \int \psi_k^* \phi d\tau = 0 \quad (8.19)$$

8.3 行列式

第 8.5 节讨论了一种变分函数，它产生了一个涉及行列式的方程。因此，我们现在讨论行列式。

行列式 (Determinant) 是一个包含 n^2 个量 (称为**元素** (elements)) 的正方形数组；行列式的值是根据其元素计算出来的，计算方法稍后给出。 n 称为行列式的**阶** (order)。使用 a_{ij} 来代表一个典型元素，我们有 n 阶行列式

$$\det(a_{ij}) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (8.20)$$

(8.20) 中的竖线与绝对值无关。在考虑 n 阶行列式值的定义方法之前，我们先考虑一阶、二阶和三阶行列式。

一阶行列式有一个元素，其值就是该元素本身。因此，

$$|a_{11}| = a_{11} \quad (8.21)$$

其中的竖线表示行列式而不是绝对值。

二阶行列式有四个元素，其值定义为

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \quad (8.22)$$

三阶行列式的值定义为

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \quad (8.23)$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} \quad (8.24)$$

三阶行列式的计算方法是：用正负号交替写下第一行的元素，然后将每个元素乘以某个二阶行列式；在三阶行列式中划掉某个元素出现的行和列，就能找到与该元素相乘的二阶行列式。将 n 阶行列式的第 i 行和第 j 列删去后得到的 $(n-1)$ 阶行列式称为元素 a_{ij} 的**余子式** (minor)。我们再定义 a_{ij} 的**代数余子式** (cofactor) 为 a_{ij} 的余子式乘以 $(-1)^{i+j}$ 。因此，(8.23) 说明三阶行列式的计算方法是：将顶行的每个元素乘以它的代数余子式，然后将三个乘积相加。[注意：式 (8.22) 通过代数余子式符合该方法。因为 a_{11} 的代数余子式为 a_{22} ， a_{12} 的代数余子式为 $-a_{21}$ 。] 一个数值的例子如下

$$\begin{vmatrix} 5 & 10 & 2 \\ 0.1 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 4 \end{vmatrix} = 5 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} - 10 \begin{vmatrix} 0.1 & 1 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 0.1 & 3 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} \\ = 5(8) - 10(0.4) + 2(0.4) = 36.8$$

我们将 a_{ij} 的余子式记为 M_{ij} ，代数余子式记为 C_{ij} ，则

$$c_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij} \quad (8.25)$$

则三阶行列式的展开式 (8.23) 可以写为

$$\det(a_{ij}) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13} \quad (8.26)$$

三阶行列式可以用任意一行的元素和相应的代数余子式展开。例如，利用第二行展开三阶行列式，我们可以得出

$$\det(a_{ij}) = a_{21}C_{21} + a_{22}C_{22} + a_{23}C_{23} \quad (8.27)$$

$$\det(a_{ij}) = -a_{21} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{22} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{23} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \quad (8.28)$$

二阶行列式的展开式表明 (8.28) 等于 (8.24)。我们也可以使用任意一列的元素和相应的代数余子式来展开行列式，这一点很容易得到验证。因此，对于三阶行列式，我们可以写成

$$\det(a_{ij}) = a_{k1}C_{k1} + a_{k2}C_{k2} + a_{k3}C_{k3} = \sum_{l=1}^3 a_{kl}C_{kl}, \quad k = 1, 2, 3$$

$$\det(a_{ij}) = a_{1k}C_{1k} + a_{2k}C_{2k} + a_{3k}C_{3k} = \sum_{l=1}^3 a_{lk}C_{lk}, \quad k = 1, 2, 3$$

第一个展开式按某一行展开，第二个则按某一列展开。

我们通过类似的行（或列）展开来定义高阶行列式。对于 n 阶行列式，

$$\det(a_{ij}) = \sum_{l=1}^n a_{kl}C_{kl} = \sum_{l=1}^n a_{lk}C_{lk}, \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (8.29)$$

一些有关行列式的性质如下所述（证明见 *Sokolnikoff and Redheffer*, pp. 702–707）：

1. 如果行列式某行（或列）的每个元素都为零，则行列式的值为零。
2. 交换行列式的两行（或两列）会使行列式的值改变符号。
3. 如果行列式的两行（或两列）相同，则该行列式的值为零。
4. 如果将行列式的一行（或一列）乘以一个常数 k ，则该行列式的值也乘以 k 。
5. 如在一行的每个元素上加上另一行相应元素的相同常数倍数，行列式的值不变。这个定理也适用于将一列的倍数加到另一列。
6. 互换所有相应的行和列，行列式的值保持不变。（这种互换意味着第一列变为第一行，第二列变为第二行，等等）

例题：使用性质 5 计算

$$B = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{vmatrix} \quad (8.30)$$

将第一行的元素乘以 -2 并加到第四行，将其变为 $2 + (-2)1 = 0$, $3 + (-2)2 = -1$, $4 + (-2)3 =$

$-2, 1 + (-2)4 = -7$ 。同理，将第一行乘以 -3 并加到第三行，乘以 -4 并加到第二行。这样，(8.30) 变为

$$B = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -7 & -10 & -13 \\ 0 & -2 & -8 & -10 \\ 0 & -1 & -2 & -7 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} -7 & -10 & -13 \\ -2 & -8 & -10 \\ -1 & -2 & -7 \end{vmatrix} \quad (8.31)$$

其中，我们将 B 按第一列展开。第二行减去第三行的两倍，第一行再减去第三行的七倍，得出

$$B = \begin{vmatrix} 0 & 4 & 36 \\ 0 & -4 & 4 \\ -1 & -2 & -7 \end{vmatrix} = (-1) \begin{vmatrix} 4 & 36 \\ -4 & 4 \end{vmatrix} = -(16 + 144) = -160 \quad (8.32)$$

行列式中从左上方到右下方的对角线就是**主对角线** (principal diagonal)。**对角行列式** (diagonal determinant) 是指除主对角线上的元素外，其他元素均为零的行列式。对于一个对角行列式，

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} \begin{vmatrix} a_{33} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{44} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (8.33)$$

$$= \cdots = a_{11} a_{22} a_{33} \cdots a_{nn}$$

对角行列式的值等于其对角元素的乘积。

一个行列式的唯一非零元素出现在以主对角线为中心的方形块中，这个行列式就是**块对角形式** (block diagonal form)。如果我们把每个正方形块看作行列式，那么块对角行列式就等于块的乘积。例如

$$\begin{vmatrix} a & b & 0 & 0 & 0 & 0 \\ c & d & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & f & g & h \\ 0 & 0 & 0 & i & j & k \\ 0 & 0 & 0 & l & m & n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} (e) \begin{vmatrix} f & g & h \\ i & j & k \\ l & m & n \end{vmatrix} \quad (8.34)$$

虚线（图中未画出）勾勒出区块的轮廓。用顶行元素展开左边的行列式，再用它们的顶行展开后面的几个行列式，就可以很容易地证明方程 (8.34) (问题 8.21)。

8.4 联立线性方程组

要处理下一节所要讨论的变分函数，我们需要知道联立线性方程组。

考虑以下关于 n 个未知数的 n 个线性方程系统：

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n \end{aligned} \quad (8.35)$$

其中的 a 和 b 是已知常数, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是未知数。如果至少有一个 b 值为非零, 我们得到了一个 **非齐次** (inhomogeneous) 方程组。这样的系统可以用 Cramer 法则 (Cramer's rule) 求解。(Cramer 法则的证明见 *Sokolnikoff and Redheffer*, pp. 708.) 令 $\det(a_{ij})$ 表示 (8.35) 中未知数的系数行列式, 由 Cramer 法则, x_k ($k = 1, 2, \dots, n$) 的值由下式给出:

$$x_k = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,k-1} & b_1 & a_{1,k+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,k-1} & b_2 & a_{2,k+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,k-1} & b_n & a_{n,k+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\det(a_{ij})}, \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (8.36)$$

其中的 $\det(a_{ij})$ 由 (8.20) 给出, 分子中的行列式通过将 $\det(a_{ij})$ 的第 k 列替换为 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 来获得。虽然 Cramer 法则具有理论意义, 但不应在数值计算中使用, 因为连续消除未知数的效率更高。

一种广泛使用的连续消元法称为**高斯消元法** (Gaussian elimination), 其过程如下: 将第一个方程的两边同除以 x_1 的系数 a_{11} , 使得 x_1 的系数变为 1。然后用第二个方程减去第一个方程的 a_{21} 倍, 用第三个方程减去第一个方程的 a_{31} 倍, 以此类推, 直到用第 n 个方程减去第一个方程的 a_{n1} 倍。这就在所有方程中消去了 x_1 (除了第一个方程)。接下来, 将第二个方程的两边同除以 x_2 的系数 a_{22} , 使得 x_2 的系数变为 1。然后用第三, 第四 $\dots$, 第 n 个方程减去第二个方程的适当倍数, 这就消去了 x_2 (除了第一和第二个方程)。重复这个过程, 直到第 n 个方程只包含 x_n , 第 $n-1$ 个方程只包含 x_{n-1} 和 x_n , 等等。通过第 n 个方程解得 x_n , 然后将其代入第 $n-1$ 个方程中解得 x_{n-1} , 将 x_{n-1} 和 x_n 代入第 $n-2$ 个方程中解得 x_{n-2} , 以此类推, 直到解出所有未知数。如果在任何阶段, 我们想要除以的系数恰好为零, 那么零系数的等式就会与后来在所需位置上具有非零系数的等式交换。(高斯消元法也是一种有效的行列式求值方法, 见问题 8.25。)

一种相关的方法是**高斯-若尔当消元法** (Gauss-Jordan elimination), 其过程与高斯消元法类似, 但与高斯消元法将 x_2 从方程 3, 4, $\dots, n$ 中消去不同, 通过减去第二个方程的适当倍数, 我们将 x_2 从方程 1, 3, 4, $\dots, n$ 中消去; 与将 x_3 从方程 4, 5, $\dots, n$ 中消去不同, 我们将 x_3 从方程 1, 2, 4, 5, $\dots, n$ 中消去, 以此类推。最后, 方程 1 只包含 x_1 , 方程 2 只包含 x_2 , 方程 n 只包含 x_n 。高斯-若尔当消元法比高斯消元法需要更多的计算量。

若 (8.35) 中所有的 b 都为零, 我们得到了一个**齐次线性方程组** (homogeneous linear equations):

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= 0 \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= 0 \end{aligned} \quad (8.37)$$

(8.37) 的一组显而易见的解为 $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$, 称为**平凡解** (trivial solution)。若 (8.37) 的系数行列式 $\det(a_{ij})$ 不为零, 我们可以使用 Cramer 法则 (8.36) 来求解未知数, 并发现 $x_k = 0, k = 1, 2, \dots, n$, 因为 (8.36) 分子中的行列式有一列所有元素都为零。因此, 当 $\det(a_{ij}) \neq 0$ 时, 唯一的解就是平凡解, 这没有任何意义。要使关于 n 个未知数的, 由 n 个齐次方程组成的线性方程组有一组非平凡解, 系数的行列式必须为零。而且, 这个条件足以确保非平凡解的存在。因此, 我们得到了极为重要的定理:

当且仅当系数行列式为零时, 关于 n 个未知数的, 由 n 个齐次方程组成的线性方程组有一组非平凡解。

假设 $\det(a_{ij}) = 0$, 则 (8.37) 有一组非平凡解。我们如何找到它呢? 由于 $\det(a_{ij}) = 0$, Cramer 法则 (8.36) 给出 $x_k = 0/0, k = 1, 2, \dots, n$, 这没有任何意义。因此, Cramer 法则并不能立即起到

帮助作用。注意到, 若 $x_1 = d_1, x_2 = d_2, \dots, x_n = d_n$ 是 (8.37) 的一组解, 那么 $x_1 = cd_1, x_2 = cd_2, \dots, x_n = cd_n$ 也是 (8.37) 的一组解, 其中 c 是任意常数。这一点很容易看出, 因为

$$a_{11}cd_1 + a_{12}cd_2 + \dots + a_{1n}cd_n = c(a_{11}d_1 + a_{12}d_2 + \dots + a_{1n}d_n) = c \cdot 0 = 0$$

以此类推。因此, 线性齐次方程组的解将包含一个任意常数, 我们无法为每一个未知数找到一个唯一的值。为了求解 (8.37), 我们给任意一个未知数赋以任意的值, 如 $x_n = c$, 其中 c 是任意常数。确定了 x_n 的值之后, 我们将 (8.37) 中每个方程的最后一项移到右边, 得到

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1,n-1}x_{n-1} &= -a_{1n}c \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2,n-1}x_{n-1} &= -a_{2n}c \\ &\vdots \\ a_{n-1,1}x_1 + a_{n-1,2}x_2 + \dots + a_{n-1,n-1}x_{n-1} &= -a_{n-1,n}c \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{n,n-1}x_{n-1} &= -a_{nn}c \end{aligned} \quad (8.38)$$

我们现在有 $n-1$ 个未知数和 n 个方程, 这比我们需要的多了一个。因此, 我们删去 (8.38) 中的任意一个方程, 以最后一个为例。这就得到了关于 $n-1$ 个未知数的, 由 $n-1$ 个非齐次方程组成的线性方程组。然后就可以用 Cramer 法则 (8.36) 来求解未知数 $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ 。因为 (8.38) 中, 右侧的常数都包含因子 c , 所以根据 8.3 节的定理 4, $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ 的值也包含因子 c 。因此, (8.37) 的解可以写成

$$x_1 = ce_1, \quad x_2 = ce_2, \quad \dots, \quad x_{n-1} = ce_{n-1}, \quad x_n = c \quad (8.39)$$

其中 c 是任意常数, $e_1, e_2, \dots, e_{n-1}$ 是数字。

例题: 求解:

$$3x_1 + 4x_2 + x_3 = 0$$

$$x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 0$$

$$x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 0$$

这是线性齐次方程组, 我们先计算系数行列式。得出 (见练习)

$$\begin{vmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \\ 1 & -2 & 5 \end{vmatrix} = 0$$

因此, 存在一组非平凡解。我们给 x_3 赋值 c , 删去第三个方程, 得到

$$3x_1 + 4x_2 = -c$$

$$x_1 + 3x_2 = 2c$$

第一个方程减去第二个方程的三倍, 得到 $-5x_2 = -7c$, 因此 $x_2 = \frac{7}{5}c$ 。代入 $x_1 + 3x_2 = 2c$, 得到 $x_1 + \frac{21}{5}c = 2c$, 因此 $x_1 = -\frac{11}{5}c$ 。因此, 通解为 $x_1 = -\frac{11}{5}c, x_2 = \frac{7}{5}c, x_3 = c$ 。对于那些对分式过敏的人 (无意冒犯, 译者注), 我们定义一个新的任意常数 $s \equiv \frac{1}{5}c$, 则 $x_1 = -11s, x_2 = 7s, x_3 = 5s$ 。

练习:

(a) 证明本例中系数行列式的值为零;

(b) 证明: 将第二个方程乘以某个常数并与第一个方程相加, 就可以得到本例中的第三个方程。

如果 $n-1$ 个未知数中的 $n-1$ 个非均质方程组的行列式 [(8.38), 最后一个方程省略] 恰好为零, 则上述步骤将失效。这样 Cramer 法则的分母中就有了一个零, 也就失去了作用。为了解决这个问题, 我们可以先将任意值赋值给另一个未知数, 而不是 x_n 。我们还可以尝试删去 (8.38) 的其他方程, 而不是最后一个方程。我们要寻找的是一个不会消失的 $n-1$ 阶行列式, 它由系统 (8.37) 的系数行列式通过删除一行和一列而形成。如果存在这样的行列式, 那么按照给出的步骤, 正确选择要舍弃的方程, 正确选择要赋值的未知数, 我们就可以求解方程组, 并得到形式为 (8.39) 的解。如果不存在这样的行列式, 我们就必须给两个未知数任意赋值, 并尝试从这里开始求解。因此, (8.37) 的解可能包含两个 (甚至更多) 任意常数。

求解线性齐次方程组的有效方法是对方程进行高斯-若尔当消元。如果只存在平凡解, 最终得到的方程组将是 $x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_n = 0$ 。如果存在非平凡解, 则至少有一个方程会简化为 $0 = 0$ 的形式; 如果得到 m 个 $0 = 0$ 形式的方程, 我们就为其中的 m 个未知数指定任意常数, 并用这 m 个未知数来表示其余的未知数。

例题: 使用高斯-若尔当消元法求解上例中的方程组。

在使用高斯消元法或高斯-若尔当消元法求解包含 n 个齐次或非齐次方程的方程组时, 通过略去变量 $x_1, \dots, x_n$, 只写出包含第 n 行和第 $(n+1)$ 列系数和常数 (包含任意零系数) 组成的阵列, 我们可以省去不必要的过程; 然后, 我们对每一行的数字进行运算, 就好像这一行就是它所代表的等式一样, 从而产生下一个阵列。

为了开始除法消元, 我们交换第一个方程和第二个方程, 从而以 $a_{11} = 1$ 开始。分离系数并进行高斯-若尔当消元, 我们得到

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 3 & -2 & 0 & & 1 & 3 & -2 & 0 & & 1 & 3 & -2 & 0 & & 1 & 0 & \frac{11}{5} & 0 \\ 3 & 4 & 1 & 0 & \rightarrow & 0 & -5 & 7 & 0 & \rightarrow & 0 & -1 & -\frac{7}{5} & 0 & \rightarrow & 0 & 1 & -\frac{7}{5} & 0 \\ 1 & -2 & 5 & 0 & & 0 & -5 & 7 & 0 & & 0 & 0 & 0 & 0 & & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

第一个阵列是原方程组, 但第一个和第二个方程互换。为了将 x_1 从第二和第三个方程中消去, 我们将第二个方程乘以 -3 并加到第二个方程上, 将第一个方程乘以 -1 并加到第三个方程上, 这就得到了第二个阵列。对第二行除以 5 得到第三个阵列。为了将 x_2 从第一和第三个方程中消去, 我们将第二个方程乘以 -3 并加到第一个方程上, 将第二个方程乘以 $-7/5$ 并加到第三个方程上, 得到第四个阵列。由于第四个阵列中 x_3 的系数为零, 我们不能使用第三个方程从第一和第二个方程中消去 x_3 (这原本是高斯-若尔当消元法的下一步)。因此, 我们将 $0 = 0$ 的第三个方程删去, 设 $x_3 = k$, 其中 k 是任意常数。最后一个阵列中的第一和第二个方程有 $x_1 + \frac{11}{5}x_3 = 0$ 和 $x_2 - \frac{7}{5}x_3 = 0$, 或 $x_1 = -\frac{11}{5}x_3$ 和 $x_2 = \frac{7}{5}x_3$ 。因此, 通解为 $x_1 = -\frac{11}{5}k$, $x_2 = \frac{7}{5}k$, $x_3 = k$ 。

8.5 线性变分函数

在分子研究中被广泛使用的一种变分函数为线性变分函数。**线性变分函数** (linear variational function) 是 n 个线性无关函数 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 的线性组合:

$$\phi = c_1 f_1 + c_2 f_2 + \dots + c_n f_n = \sum_{j=1}^n c_j f_j \quad (8.40)$$

其中 ϕ 是试探变分函数, 系数 c_j 是待确定使得变分积分最小的参数。函数 f_j [称为**基函数** (basis functions)] 必须满足问题的定解条件。我们将只讨论实函数 ϕ , 则 c_j 和 f_j 分别是实数和实函数。在 (8.40) 中, f_j 是已知函数。

我们现在应用变分理论 (8.9)。对于线性变分函数，我们有

$$\int \phi^* \phi \, d\tau = \int \sum_{j=1}^n c_j f_j \sum_{k=1}^n c_k f_k \, d\tau = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n c_j c_k \int f_j f_k \, d\tau = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n c_j c_k S_{jk} \quad (8.41)$$

我们定义**重叠积分** (overlap integral) S_{jk} 为

$$S_{jk} \equiv \int f_j^* f_k \, d\tau \quad (8.42)$$

注意: S_{jk} 不一定等于 δ_{jk} , 因此, 没有理由认为函数组 f_j 是相互正交的。它们也不一定是任何一个算符的本征函数。(8.9) 的分母为

$$\begin{aligned} \int \phi^* \hat{H} \phi \, d\tau &= \int \sum_{j=1}^n c_j f_j \hat{H} \sum_{k=1}^n c_k f_k \, d\tau \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n c_j c_k \int f_j \hat{H} f_k \, d\tau = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n c_j c_k H_{jk} \end{aligned}$$

其中, 我们定义 H_{jk} 为

$$H_{jk} \equiv \int f_j^* \hat{H} f_k \, d\tau \quad (8.43)$$

那么变分积分 W 为

$$W \equiv \frac{\int \phi^* \hat{H} \phi \, d\tau}{\int \phi^* \phi \, d\tau} = \frac{\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n c_j c_k H_{jk}}{\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n c_j c_k S_{jk}} \quad (8.44)$$

$$W \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n c_j c_k S_{jk} = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n c_j c_k H_{jk} \quad (8.45)$$

现在我们将 W 最小化, 以尽可能接近 $E_1 (W \geq E_1)$ 。变分积分 W 是 n 个独立变量 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 的函数:

$$W = W(c_1, c_2, \dots, c_n)$$

多个变量的函数 W 的最小值的一个必要条件是: 在最小值处, 函数 W 对每个变量的偏导数必须为零:

$$\frac{\partial W}{\partial c_i} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (8.46)$$

我们现在将 (8.45) 对每个变量 c_i 求偏导数, 获得 n 个方程

$$\frac{\partial W}{\partial c_i} \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n c_j c_k S_{jk} + W \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n c_j c_k S_{jk} = \frac{\partial}{\partial c_i} \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n c_j c_k H_{jk}, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (8.47)$$

那么

$$\frac{\partial}{\partial c_i} \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n c_j c_k S_{jk} = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \left[\frac{\partial}{\partial c_i} (c_j c_k) \right] S_{jk} = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \left(c_k \frac{\partial c_j}{\partial c_i} + c_j \frac{\partial c_k}{\partial c_i} \right) S_{jk}$$

c_j 是独立变量, 因此

$$\begin{aligned} \frac{\partial c_j}{\partial c_i} &= 0 \quad \text{若 } j \neq i, \quad \frac{\partial c_i}{\partial c_i} = 1 \quad \text{若 } j = i \\ \frac{\partial c_j}{\partial c_i} &= \delta_{ij} \end{aligned} \quad (8.48)$$

$$\begin{vmatrix} H_{11} - S_{11}W & H_{12} - S_{12}W & \cdots & H_{1n} - S_{1n}W \\ H_{21} - S_{21}W & H_{22} - S_{22}W & \cdots & H_{2n} - S_{2n}W \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H_{n1} - S_{n1}W & H_{n2} - S_{n2}W & \cdots & H_{nn} - S_{nn}W \end{vmatrix} = 0 \quad (8.58)$$

将 (8.58) 中的行列式展开, 我们得到关于未知数 W 的 n 次代数方程。这个方程有 n 个根, 可以证明它们都是实数。将这些根按照能量依次递增的顺序排列, 我们将其表示为

$$W_1 \leq W_2 \leq \cdots \leq W_n \quad (8.59)$$

如果我们将系统的束缚态按能量递增的顺序排列, 就会得出

$$E_1 \leq E_2 \leq \cdots \leq E_n \leq E_{n+1} \leq \cdots \quad (8.60)$$

其中的 E 表示各种状态的真是能量值。根据变分原理, 我们知道 $E_1 \leq W_1$ 。此外, 可以证明 [J. K. L. MacDonald, *Phys. Rev.*, **43**, 830 (1933); R. H. Young, *Int. J. Quantum Chem.*, **6**, 596 (1972); 见问题. 8.40]:

$$E_1 \leq W_1, \quad E_2 \leq W_2, \quad E_3 \leq W_3, \dots, \quad E_n \leq W_n \quad (8.61)$$

因此, 线性变分法提供了系统最低 n 个束缚态的能量上限。我们使用 $W_1, W_2, \dots, W_n$ 来表示最低态能量的近似值。如果需要更多状态的能量近似值, 我们可以在试探函数 ϕ 中添加更多的 f_k 。可以证明, 添加更多的函数 f_k 可以提高 (或不改变) 先前计算的能量的精确度。若 $\phi = \sum_k c_k f_k$ 中的 f_k 构成一个完备集, 那么我们就能够得到系统的真实波函数。不幸的是, 我们通常需要无数个函数才能得到一个完备集。

量子化学家可能会在线性变分函数中使用几十、几百、几千甚至几百万个项, 从而得到分子的精确结果。解 (8.58) [称为久期方程 (secular equation)] 及相关线性方程 (8.58) 的一种有效方法是矩阵法 (第 8.6 节)。

为了获得基态波函数的近似, 我们使用久期方程最小的根 W_1 , 将其带入方程组 (8.55), 解得系数 $c_1^{(1)}, c_2^{(1)}, \dots, c_n^{(1)}$, 其中我们添加了上标 (1) 来与 W_1 相对应。[如前所述, 我们只能确定系数之间的比值。根据 $c_1^{(1)}$ 的值, 我们可以得到 $c_2^{(1)}, c_3^{(1)}, \dots, c_n^{(1)}$ 的值, 再通过归一化条件确定 $c_1^{(1)}$ 。] 找到了 $c_k^{(1)}$ 之后, 我们将 $\phi_1 = \sum_{k=1}^n c_k^{(1)} f_k$ 作为基态波函数的近似。使用 (8.58) 中更高的根并带入 (8.55), 可以得到激发态波函数的近似。可以证明, 这些近似波函数是正交的 (问题 8.40)。

求解 (8.58) 和 (8.55) 时, 可通过使尽可能多的积分等于零来简化。我们可以通过将函数 f_k 选为与 $\hat{H}$ 相乘的某个算符 $\hat{A}$ 的本征函数, 使一些对角线外的 H_{ij} 消失。如果 f_i 和 f_j 对应于 $\hat{A}$ 的不同本征值, 则 H_{ij} 消失 (第 7.4 节的定理 6)。如果函数 f_k 是正交的, 则对角线外的 S_{ij} 消失 ($S_{ij} = \delta_{ij}$)。如果最初选择的 f_k 不是正交的, 我们可以使用施密特 (或其他) 程序找出这些 f_k 的 n 个正交线性组合, 然后使用正交化的函数。

当取消变分函数为实函数的限制时, 方程 (8.55) 和 (8.58) 也是成立的 (问题 8.39)。

例题: 给第 8.1 节第一个例题中的函数 $x(l-x)$ 添加函数, 使其形成粒子在长度为 l 的一维势箱中的线性变分函数, 并求出最低四个状态的近似能量和波函数。

在变分函数 $\phi = \sum_{k=1}^n c_k f_k$ 中, 我们选择 $f_1 = x(l-x)$ 。由于我们希望知道最低四个状态的近似, n 应至少为 4。有无数种可能的品优函数可以用于 f_2, f_3 和 f_4 。函数 $x^2(l-x)^2$ 满足在 $x=0$ 和 $x=l$ 处消失的定解条件, 且对其积分较为简单, 所以我们选择 $f_2 = x^2(l-x)^2$ 。

如果把原点放在势箱的中心, 势能 (图 2.1) 就是偶函数, 正如第 8.2 节所述, 波函数在偶函数和奇函数之间交替变化 (另见图 2.3)。(在本例中, 偶函数和奇函数指的是原点位于势箱

中心。) 函数 $f_1 = x(l-x)$ 和 $f_2 = x^2(l-x)^2$ 都是偶函数 (见问题 8.34)。若我们选择 $\phi = c_1 x(l-x) + c_2 x^2(l-x)^2$, 我们最终会得到波函数为偶函数的最低两个态的能量上限 ($n=1$ 和 $n=3$) 并得到这两个状态波函数的近似。由于我们还需要 $n=2$ 和 $n=4$ 状态的近似, 我们需要增加两个奇函数。如方程 (4.50) 之后所述, 奇函数必须在原点为零, 所以我们必须要求函数在势箱中点 $x = \frac{1}{2}l$ 处为零, 与 $x=0$ 和 $x=l$ 一致。满足这些性质的一个简单函数为 $f_3 = x(l-x)(\frac{1}{2}l-x)$ 。为了得到 f_4 , 我们将 f_2 乘以 $(\frac{1}{2}l-x)$ 。因此, 由 $\phi = \sum_{k=1}^4 c_k f_k$ 组成的线性变分函数, 其中

$$f_1 = x(l-x), f_2 = x^2(l-x)^2, f_3 = x(l-x)\left(\frac{1}{2}l-x\right), f_4 = x^2(l-x)^2\left(\frac{1}{2}l-x\right) \quad (8.62)$$

如 (8.40) 所假设的那样, f_1 、 f_2 、 f_3 和 f_4 线性无关。

因为 f_1 和 f_2 是偶函数, f_3 和 f_4 是奇函数, 所以许多积分都为零。因此,

$$S_{13} = S_{31} = 0, \quad S_{14} = S_{41} = 0, \quad S_{23} = S_{32} = 0, \quad S_{24} = S_{42} = 0 \quad (8.63)$$

因为这些重叠积分中的每一个积分的被积函数都是相对于方框中心原点的奇函数。函数 f_1 、 f_2 、 f_3 和 f_4 都是宇称算符 $\hat{\Pi}$ 的本征函数 (第 7.5 节), 其中, 偶函数 f_1 和 f_2 对应于本征值 $+1$, 奇函数 f_3 和 f_4 对应于本征值 -1 。由于 V 是偶函数, 所以 $\hat{H}$ 和 $\hat{\Pi}$ 对易, 根据 (7.4) 节的定理 6, 若 f_i 是奇函数而 f_j 是偶函数时, H_{ij} 为零, 反之亦然。因此,

$$H_{13} = H_{31} = 0, \quad H_{14} = H_{41} = 0, \quad H_{23} = H_{32} = 0, \quad H_{24} = H_{42} = 0 \quad (8.64)$$

根据 (8.63) 和 (8.64), $n=4$ 的久期方程 (8.58) 变为

$$\begin{vmatrix} H_{11} - S_{11}W & H_{12} - S_{12}W & 0 & 0 \\ H_{21} - S_{21}W & H_{22} - S_{22}W & 0 & 0 \\ 0 & 0 & H_{33} - S_{33}W & H_{34} - S_{34}W \\ 0 & 0 & H_{43} - S_{43}W & H_{44} - S_{44}W \end{vmatrix} = 0 \quad (8.65)$$

久期行列式为块对角行列式, 其值等于各个块的乘积 [式 (8.34)]:

$$\begin{vmatrix} H_{11} - S_{11}W & H_{12} - S_{12}W \\ H_{21} - S_{21}W & H_{22} - S_{22}W \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} H_{33} - S_{33}W & H_{34} - S_{34}W \\ H_{43} - S_{43}W & H_{44} - S_{44}W \end{vmatrix} = 0$$

该方程的四个根由以下两个方程给出:

$$\begin{vmatrix} H_{11} - S_{11}W & H_{12} - S_{12}W \\ H_{21} - S_{21}W & H_{22} - S_{22}W \end{vmatrix} = 0 \quad (8.66)$$

$$\begin{vmatrix} H_{33} - S_{33}W & H_{34} - S_{34}W \\ H_{43} - S_{43}W & H_{44} - S_{44}W \end{vmatrix} = 0 \quad (8.67)$$

令 (8.66) 的根为 W_1 和 W_2 , 它们分别代表 $n=1$ 和 $n=3$ 的近似能量, 同样地, 令 (8.67) 的根为 W_3 和 W_4 。在通过久期方程解出 W 后, 我们将其逐一带入方程组 (8.55) 以求得变分函数中的系数 c_k 。根据久期方程 (8.65), 带入 W_1 的方程组 (8.55) 为

$$\begin{cases} (H_{11} - S_{11}W_1)c^{(1)} + (H_{12} - S_{12}W_1)c^{(1)} = 0 \\ (H_{21} - S_{21}W_1)c^{(1)} + (H_{22} - S_{22}W_1)c^{(1)} = 0 \end{cases} \quad (8.68a)$$

$$\left. \begin{aligned} (H_{33} - S_{33}W_1)c^{(1)} + (H_{34} - S_{34}W_1)c^{(1)} &= 0 \\ (H_{43} - S_{43}W_1)c^{(1)} + (H_{44} - S_{44}W_1)c^{(1)} &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (8.68b)$$

由于 W_1 是 (8.66) 的根, 方程组 (8.68a) 的系数行列式 [即 (8.66) 中的行列式] 为零。那么 (8.68a) 有非平凡解 $c_1^{(1)}$ 和 $c_2^{(1)}$, 然而, W_1 不是 (8.67) 的根, 所以方程组 (8.68b) 的系数行列式不为零。因此, (8.68b) 只有平凡解 $c_3^{(1)} = c_4^{(1)} = 0$ 。则对应于根 W_1 的试探函数 ϕ_1 的形式为 $\phi_1 = \sum_{k=1}^4 c_k^{(1)} f_k = c_1^{(1)} f_1 + c_2^{(1)} f_2$ 。根据同样的理由说明 ϕ_3 是 f_1 和 f_2 的线性组合, 而 ϕ_2 和 ϕ_4 分别是 f_3 和 f_4 的线性组合:

$$\begin{aligned} \phi_1 &= c_1^{(1)} f_1 + c_2^{(1)} f_2, & \phi_3 &= c_1^{(3)} f_1 + c_2^{(3)} f_2 \\ \phi_2 &= c_3^{(2)} f_3 + c_4^{(2)} f_4, & \phi_4 &= c_3^{(4)} f_3 + c_4^{(4)} f_4 \end{aligned} \quad (8.69)$$

偶波函数 ψ_1 和 ψ_3 使用偶函数 f_1 和 f_2 的线性组合来近似, 而奇波函数 ψ_2 和 ψ_4 使用奇函数 f_3 和 f_4 的线性组合来近似。

当久期方程为块对角形式时, 它可以分解成两个或多个较简单的久期方程, 联立方程组 (8.55) 也可以分解成两个或多个较简单的方程组。

为了从 (8.66) 和 (8.67) 中解出 W_1 、 W_2 、 W_3 和 W_4 , 我们现在必须计算 H_{ij} 和 S_{ij} 。我们有

$$\begin{aligned} H_{11} &= \langle f_1 | \hat{H} | f_1 \rangle = \int_0^l x(l-x) \left(\frac{-\hbar^2}{2m} \right) \frac{d^2}{dx^2} [x(l-x)] dx = \frac{\hbar^2 l^3}{6m} \\ S_{11} &= \langle f_1 | f_1 \rangle = \int_0^l x^2(l-x)^2 dx = \frac{l^5}{30} \end{aligned}$$

其中用到了 (8.12) 和 (8.13)。使用 (8.62)、(8.49) 和 (8.52), 我们可以计算出剩余的积分 (问题 8.35):

$$\begin{aligned} H_{12} &= H_{21} = \langle f_2 | \hat{H} | f_1 \rangle = \hbar^2 l^5 / 30m, & H_{22} &= \hbar^2 l^7 / 105m \\ H_{33} &= \hbar^2 l^5 / 40m, & H_{44} &= \hbar^2 l^9 / 1260m, & H_{34} &= H_{43} = \hbar^2 l^7 / 280m \\ S_{12} &= S_{21} = \langle f_1 | f_2 \rangle = l^7 / 140, & S_{22} &= l^9 / 630 \\ S_{33} &= l^7 / 840, & S_{44} &= l^{11} / 27720, & S_{34} &= S_{43} = l^9 / 5040 \end{aligned}$$

方程 (8.66) 变为

$$\begin{vmatrix} \frac{\hbar^2 l^3}{6m} - \frac{l^5}{30} W & \frac{\hbar^2 l^5}{30m} - \frac{l^7}{140} W \\ \frac{\hbar^2 l^5}{30m} - \frac{l^7}{140} W & \frac{\hbar^2 l^7}{105m} - \frac{l^9}{630} W \end{vmatrix} = 0 \quad (8.70)$$

使用第8.3节的定理 4, 为了消去分式, 我们将行列式的第一行乘以 $420m/l^3$, 第二行乘以 $1260m/l^5$, 右侧乘以相同的因子, 得到

$$\begin{vmatrix} 70\hbar^2 - 14ml^2 W & 14\hbar^2 l^2 - 3ml^4 W \\ 42\hbar^2 - 9ml^2 W & 12\hbar^2 l^2 - 2ml^4 W \end{vmatrix} = 0$$

$$m^2 l^4 W^2 - 56ml^2 \hbar^2 W + 252\hbar^4 = 0$$

$$W = (\hbar^2 / ml^2) (28 \pm \sqrt{532}) = 0.1250018\hbar^2 / ml^2, \quad 1.293495\hbar^2 / ml^2 \quad (8.71)$$

将积分带入 (8.67), 得到根 (问题 8.36):

$$W = (\hbar^2 / ml^2) (60 \pm \sqrt{1620}) = 0.5002930\hbar^2 / ml^2, \quad 2.5393425\hbar^2 / ml^2 \quad (8.72)$$

则 $(ml^2/h^2)W$ 的近似值为 0.1250018、1.293495、0.5002930 和 2.5393425，与最低四个能级的准确值 [方程 (2.20)] $(ml^2/h^2)E = 0.125, 0.5, 1.125$ 和 2 相比较。对于 $n = 1, 2, 3$ 和 4，百分误差分别为 0.0014%、0.059%、15.0% 和 27.0%。 $n = 1$ 和 2 的近似非常好，而 $n = 3$ 和 4 极差 (lousy)。

我们现在尝试求出对应于这些 W 值的近似波函数。将 $W_1 = 0.1250018\hbar^2/ml^2$ 代入对应于 (8.71) 的方程组 (8.68a)，我们得到 (同除 h^2 后)

$$\begin{aligned} 0.023095c_1^{(1)} - 0.020381c_2^{(1)}l^2 &= 0 \\ -0.061144c_1^{(1)} + 0.053960c_2^{(1)}l^2 &= 0 \end{aligned} \quad (8.73)$$

例如，其中的第一个系数由下式求出：

$$70\hbar^2 - 14ml^2W_1 = 70\hbar^2/4\pi^2 - 14(0.1250018) = 0.023095\hbar^2$$

要求解齐次方程 (8.73)，我们可以按照第 8.4 节末尾给出的步骤进行。将 (8.73) 的第二个方程删去，将 $c_2^{(1)}$ 项移到等号右边，解出系数的比值，我们得到

$$c_1^{(1)} = k, \quad c_2^{(1)} = 1.133k/l^2$$

其中的 k 是常数。我们通过归一化条件来求出 k ：

$$\begin{aligned} \langle \phi_1 | \phi_1 \rangle &= 1 = \langle kf_1 + 1.133kf_2/l^2 | kf_1 + 1.133kf_2/l^2 \rangle \\ &= k^2 (\langle f_1 | f_1 \rangle + 2.266 \langle f_1 | f_2 \rangle / l^2 + 1.284 \langle f_2 | f_2 \rangle / l^4) \\ &= k^2 (S_{11} + 2.266S_{12}/l^2 + 1.284S_{22}/l^4) = 0.05156k^2l^5 \end{aligned}$$

其中用到了之前求出的重叠积分值。因此 $k = 4.404/l^{5/2}$ ，

$$\begin{aligned} \phi_1 &= c_1^{(1)}f_1 + c_2^{(1)}f_2 = 4.404f_1/l^{5/2} + 4.990f_2/l^{9/2} \\ \phi_1 &= l^{-1/2} [4.404(x/l)(1-x/l) + 4.990(x/l)^2(1-x/l)^2] \end{aligned} \quad (8.74)$$

其中用到了 (8.62)。

在 (8.55) 中轮流使用 W_2 、 W_3 和 W_4 ，我们可以得到以下归一化线性变分函数 (问题 8.38)，其中 $X \equiv x/l$ ：

$$\begin{aligned} \phi_2 &= l^{-1/2} \left[16.78X(1-X) \left(\frac{1}{2} - X \right) + 71.85X^2(1-X^2) \left(\frac{1}{2} - X \right) \right] \\ \phi_3 &= l^{-1/2} [28.65X(1-X) - 132.7X^2(1-X)^2] \\ \phi_4 &= l^{-1/2} \left[98.99X(1-X) \left(\frac{1}{2} - X \right) - 572.3X^2(1-X)^2 \left(\frac{1}{2} - X \right) \right] \end{aligned} \quad (8.75)$$

8.6 矩阵、本征值和本征向量

矩阵代数 (第 7.10 节) 是英国数学家阿瑟·凯利 (Arthur Cayley) 在 1855-1858 年间发展起来的，是处理同时线性方程组和从一组变量到另一组变量的线性变换的简便方法。[在 1860 年获得教授职位之前的 14 年里，凯利一直靠当律师养活自己。在做律师期间，他发表了数百篇数学论文，并经常与他的律师同事约翰·约瑟夫·西尔维斯特 (John Joseph Sylvester) 讨论数学问题。西尔维斯特为矩形阵列创造了“矩阵”一词 (取自拉丁文中“womb”一词)，并于 1855 年获得数学教授职位。]

多年来, 大多数物理学家都不知道矩阵代数, 当海森堡在 1925 年发现矩阵力学版本的量子力学时, 他并没有意识到他所处理的实体是矩阵。当他向玻恩展示自己的研究成果时, 受过良好数学训练的玻恩认出海森堡使用的是矩阵。如今, 矩阵代数已成为量子化学计算的重要工具, 并广泛应用于物理学的大多数分支。

线性非齐次方程组 (8.55) 可以写成矩阵形式:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \quad (8.76)$$

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b} \quad (8.77)$$

其中 $\mathbf{A}$ 是系数矩阵, $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{b}$ 都是列向量。利用矩阵乘法法则 (7.107) 很容易验证 (8.35) 和 (8.76) 的等价性。

方阵 $\mathbf{A}$ 的**行列式** (determinant) 是一个所有元素与 $\mathbf{A}$ 的元素完全一致的行列式。若 $\det \mathbf{A} \neq 0$, 则称矩阵 $\mathbf{A}$ 是**非奇异的** (nonsingular)。

n 阶方阵的**逆矩阵** (inverse matrix) 定义为与 $\mathbf{A}$ 相乘得到单位矩阵的矩阵。将逆矩阵记为 $\mathbf{A}^{-1}$, 那么

$$\boxed{\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}} \quad (8.78)$$

其中 $\mathbf{I}$ 是单位阵。可以证明, 当且仅当 $\det \mathbf{A} \neq 0$ 时, $\mathbf{A}^{-1}$ 才存在。(对于求 $\mathbf{A}^{-1}$ 的高效方法, 见 *Press et al.*, Section 2.3 ; *Shoup*, Section 3.3; 问题 8.51。许多电子表格都内置了计算逆矩阵的功能。)

若 (8.76) 中系数矩阵 $\mathbf{A}$ 的 $\det \mathbf{A} \neq 0$, 则可以通过将 $\mathbf{A}^{-1}$ 乘以 (8.77) 的两边来得到 $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$ 。由于矩阵乘法满足结合律 (第 7.10 节), 我们得到了 $\mathbf{A}^{-1}(\mathbf{A}\mathbf{x}) = (\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{I}\mathbf{x} = \mathbf{x}$ 。因此, 将 (8.77) 两边乘以 $\mathbf{A}^{-1}$, 我们得到 $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$ 作为线性非齐次方程组的一组解。

线性变分法被广泛用于求近似分子波函数, 而矩阵代数给出了求解线性变分法方程的计算效率最高的方法。若线性变分函数 $\phi = \sum_{k=1}^n c_k f_k$ 中的 $f_1, \dots, f_n$ 是正交的, 那么 $S_{ij} = \int f_i^* f_j d\tau = \delta_{ij}$, 则使变分积分最小的系数 c_k 构成的齐次方程组 (8.55) 变为

$$\begin{aligned} H_{11}c_1 + H_{12}c_2 + \cdots + H_{1n}c_n &= Wc_1 \\ H_{21}c_1 + H_{22}c_2 + \cdots + H_{2n}c_n &= Wc_2 \\ &\vdots \\ H_{n1}c_1 + H_{n2}c_2 + \cdots + H_{nn}c_n &= Wc_n \end{aligned} \quad (8.79a)$$

$$\begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} & \cdots & H_{1n} \\ H_{21} & H_{22} & \cdots & H_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H_{n1} & H_{n2} & \cdots & H_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = W \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \quad (8.79b)$$

$$\mathbf{H}\mathbf{c} = W\mathbf{c} \quad (8.79c)$$

其中 $\mathbf{H}$ 是方阵, 其元素为 $H_{ij} = \langle f_i | \hat{H} | f_j \rangle$, $\mathbf{c}$ 是系数 $c_1, \dots, c_n$ 组成的列向量。

若

$$\boxed{\mathbf{A}\mathbf{c} = \lambda\mathbf{c}} \quad (8.80)$$

其中 $\mathbf{A}$ 是方阵, $\mathbf{c}$ 是至少有一个元素不为零的列向量, λ 是标量, 则我们称 $\mathbf{c}$ 为**本征向量**(eigenvector) 或**特征向量**(characteristic vector), λ 为 $\mathbf{A}$ 的**本征值**(eigenvalue) 或**特征值**(characteristic value)。

将 (8.80) 与 (8.79c) 相比较, 求解 $S_{ij} = \delta_{ij}$ 的线性变分问题等价于求解矩阵 $\mathbf{H}$ 的本征值和本征向量。矩阵本征方程 $\mathbf{H}\mathbf{c} = W\mathbf{c}$ 等价于齐次方程组 (8.55), 当且仅当 $\det(H_{ij} - \delta_{ij}W) = 0$ 时的 c 有非平凡解 [$S_{ij} = \delta_{ij}$ 的方程 (8.57)]。对于一般的 n 阶方阵 $\mathbf{A}$, 本征值对应满足的方程为

$$\det(A_{ij} - \delta_{ij}\lambda) = 0 \quad (8.81)$$

方程 (8.81) 称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的**特征方程**(characteristic equation)。当我们展开 (8.81) 中的 n 阶行列式时, 就得到了一个 n 次多项式 [称为**特征多项式**(characteristic polynomial)], 其最高次项为 λ^n 。特征多项式对 λ 有 n 个根 (有些可能重合, 有些可能为虚数), 所以一个 n 阶方阵有 n 个本征值。[方阵 $\mathbf{A}$ 的本征值组有时可以称为 $\mathbf{A}$ 的**谱**(spectrum)。]

$\mathbf{H}$ 的矩阵方程 (8.79c) 与 $\mathbf{A}$ 的矩阵方程 (8.80) 相对应。 $\mathbf{A}$ 的特征向量元素满足以下方程组, 对应于 (8.79a):

$$\begin{aligned} A_{11}c_1 + A_{12}c_2 + \cdots + A_{1n}c_n &= \lambda c_1 \\ &\vdots \\ A_{n1}c_1 + A_{n2}c_2 + \cdots + A_{nn}c_n &= \lambda c_n \end{aligned} \quad (8.82)$$

对于每个不同的本征值, 我们都有一组不同的方程 (8.82) 和一组不同的数 $c_1, c_2, \dots, c_n$, 从而得到一个不同的本征向量。

如果矩阵的所有本征值都不同, 则可以证明求解独立本征向量 (见 *Strang*, Section 5.2), 这里的线性无关是指没有导致 n 个线性本征向量可以写成其他本征向量的线性组合。如果某些本征值相等, 那么矩阵的线性无关本征向量可能少于 n 个。量子力学中出现的矩阵通常是厄米矩阵 (本节稍后将对这一术语进行定义), 即使某些本征值相等, 阶数为 n 的厄米矩阵也总是具有 n 个线性无关的本征向量 (证明见 *Strang*, Section 5.6)。

若 $\mathbf{A}$ 是对角矩阵 (对 $i \neq j$ 有 $a_{ij} = 0$), 则 (8.81) 中的行列式为对角行列式。对角行列式的值等于其对角元素的乘积 [式 (8.33)], 所以对角矩阵的特征方程为

$$(a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda) \cdots (a_{nn} - \lambda) = 0$$

该方程的根为 $\lambda_1 = a_{11}$ 、 $\lambda_2 = a_{22}$ 、...、 $\lambda_n = a_{nn}$ 。对角矩阵的本征值就是其对角元素。(对于本征向量, 见问题 8.46。)

若 $\mathbf{c}$ 是 $\mathbf{A}$ 的本征向量, 很明显, $\mathbf{d} \equiv k\mathbf{c}$ 也是 $\mathbf{A}$ 的本征向量, 其中 k 是任意常数。若我们选择的 k 满足

$$\sum_{i=1}^n |d_i|^2 = 1 \quad (8.83)$$

则列向量 $\mathbf{d}$ 是**归一化的**(normalized)。若两个分别有 n 个元素的列向量 $\mathbf{b}$ 和 $\mathbf{c}$ 满足下式, 则称它们是**正交的**(orthogonal):

$$\sum_{i=1}^n b_i^* c_i = 0 \quad (8.84)$$

令变分方程 (8.79) 中 $\mathbf{H}$ 的 n 个本征值为 $W_1, W_2, \dots, W_n$, 对应的本征向量为 $\mathbf{c}^{(1)}, \mathbf{c}^{(2)}, \dots, \mathbf{c}^{(n)}$ 。则

$$\mathbf{H}\mathbf{c}^{(i)} = W_i \mathbf{c}^{(i)}, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (8.85)$$

其中 $\mathbf{c}^{(i)}$ 是列向量, 其元素为 $c_1^{(i)}, c_2^{(i)}, \dots, c_n^{(i)}$, 基函数 f_1 是正交的。此外, 设 $\mathbf{C}$ 为方阵, 其列为 $\mathbf{H}$ 的本征向量; 设 $\mathbf{W}$ 为对角矩阵, 其对角元素为 $\mathbf{H}$ 的本征值:

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} c_1^{(1)} & c_1^{(2)} & \cdots & c_1^{(n)} \\ c_2^{(1)} & c_2^{(2)} & \cdots & c_2^{(n)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_n^{(1)} & c_n^{(2)} & \cdots & c_n^{(n)} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{W} = \begin{pmatrix} W_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & W_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & W_n \end{pmatrix} \quad (8.86)$$

则 n 个本征方程组 (8.85) 可以写成单个方程:

$$\mathbf{H}\mathbf{C} = \mathbf{C}\mathbf{W} \quad (8.87)$$

为了验证矩阵方程 (8.87), 我们需要证明矩阵 $\mathbf{H}\mathbf{C}$ 的每个元素 $(\mathbf{H}\mathbf{C})_{ij}$ 等于矩阵 $\mathbf{C}\mathbf{W}$ 对应的元素 $(\mathbf{C}\mathbf{W})_{ij}$ 。根据矩阵乘法规则 (7.107), 我们有 $(\mathbf{H}\mathbf{C})_{ij} = \sum_k H_{ik} (\mathbf{C})_{kj} = \sum_k H_{ik} c_k^{(j)}$ 。考虑本征方程 $\mathbf{H}\mathbf{C}^{(j)} = W_j \mathbf{C}^{(j)}$ [式 (8.85)], $\mathbf{H}\mathbf{C}^{(j)}$ 和 $W_j \mathbf{C}^{(j)}$ 都是列矩阵。利用 (7.107) 令每个列矩阵第 i 行中的元素相等, 我们有 $\sum_k H_{ik} c_k^{(j)} = W_j c_i^{(j)}$ 。则

$$(\mathbf{H}\mathbf{C})_{ij} = \sum_k H_{ik} c_k^{(j)} = W_j c_i^{(j)}, \quad (\mathbf{C}\mathbf{W})_{ij} = \sum_k (\mathbf{C})_{ik} (\mathbf{W})_{kj} = \sum_k c_i^{(k)} \delta_{kj} W_k = c_i^{(j)} W_j$$

则 $(\mathbf{H}\mathbf{C})_{ij} = (\mathbf{C}\mathbf{W})_{ij}$, 从而验证了矩阵方程 (8.87)。

令矩阵 $\mathbf{C}$ 有逆阵 (见下文), 我们可以将 (8.87) 两边乘以 $\mathbf{C}^{-1}$, 得到 $\mathbf{C}^{-1}\mathbf{H}\mathbf{C} = \mathbf{C}^{-1}(\mathbf{C}\mathbf{W})$ 。[由于矩阵乘法不可对易, 当我们将 $\mathbf{H}\mathbf{C} = \mathbf{C}\mathbf{W}$ 两边乘以 $\mathbf{C}^{-1}$ 时, 必须把因子 $\mathbf{C}^{-1}$ 放在 $\mathbf{H}\mathbf{C}$ 和 $\mathbf{C}\mathbf{W}$ 的左边 (或右边)。] 得到了 $\mathbf{C}^{-1}\mathbf{H}\mathbf{C} = \mathbf{C}^{-1}(\mathbf{C}\mathbf{W}) = (\mathbf{C}^{-1}\mathbf{C})\mathbf{W} = \mathbf{I}\mathbf{W} = \mathbf{W}$:

$$\mathbf{C}^{-1}\mathbf{H}\mathbf{C} = \mathbf{W} \quad (8.88)$$

为了化简 (8.88), 我们必须了解更多关于矩阵的知识。

若方阵 $\mathbf{B}$ 的所有元素满足 $b_{mn} = b_{nm}$, 则 $\mathbf{B}$ 为**对称矩阵** (symmetric matrix)。对称矩阵的元素关于主对角线对称, 例如, $b_{12} = b_{21}$ 。若方阵 $\mathbf{D}$ 的所有元素满足 $d_{mn} = d_{nm}^*$, 则 $\mathbf{D}$ 为**厄米矩阵** (Hermitian matrix)。例如, 若

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 0 \\ 5 & i & 2i \\ 0 & 2i & 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{N} = \begin{pmatrix} 6 & 1+2i & 8 \\ 1-2i & -1 & -i \\ 8 & i & 0 \end{pmatrix} \quad (8.89)$$

则 $\mathbf{M}$ 是对称矩阵, $\mathbf{N}$ 是厄米矩阵。(注意: 厄米矩阵的对角元素一定是实数: $d_{mm} = d_{mm}^*$ 。) **实矩阵** (real matrix) 是指所有元素都是实数的矩阵。实厄米矩阵是对称矩阵。

矩阵的**转置** (transpose) $\mathbf{A}^T$ (也写作 $\tilde{\mathbf{A}}$) 是通过交换 $\mathbf{A}$ 的行和列, 使第 1 列变为第 1 行, 第 2 列变为第 2 行, 以此类推而形成的矩阵。矩阵 $\mathbf{A}^T$ 的元素 a_{mn}^T 与 $\mathbf{A}$ 的元素关系为 $a_{mn}^T = a_{nm}$ 。对于方阵, 转置是通过将元素关于主对角线反映得到的。对称矩阵的转置等于其本身。因此, 对于 (8.89) 中的矩阵 $\mathbf{M}$, 我们有 $\mathbf{M}^T = \mathbf{M}$ 。

矩阵 $\mathbf{A}$ 的**复共轭** (complex conjugate) $\mathbf{A}^*$ (国内主要写为 $\bar{\mathbf{A}}$, 译者注, 下同) 是通过将 $\mathbf{A}$ 的每个元素取复共轭得到的矩阵。矩阵 $\mathbf{A}$ 的**共轭转置** (conjugate transpose) $\mathbf{A}^\dagger$ (国内主要写为 $\mathbf{A}^H$) 是通过将 $\mathbf{A}^*$ 转置得到的矩阵, 因此 $\mathbf{A}^\dagger = (\mathbf{A}^*)^T$ 以及

$$a_{mn}^\dagger = a_{nm}^* \quad (8.90)$$

[物理学家将 $\mathbf{A}^\dagger$ 称为 $\mathbf{A}$ 的**伴随矩阵** (adjoint matrix), 是数学家用来表示一种完全不同的矩阵的名称。] 例如,

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 3+i \\ 0 & 4i \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B}^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3+i & 4i \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B}^\dagger = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3-i & -4i \end{pmatrix}$$

对于厄米矩阵 $\mathbf{A}$ ，根据 (8.90)，我们有 $a_{mn}^\dagger = a_{nm}$ ，因此 $(\mathbf{A}^\dagger)_{mn} = (\mathbf{A})_{mn}$ 以及 $\mathbf{A}^\dagger = \mathbf{A}$ 。因此，厄米矩阵的共轭转置等于它本身。[物理学家通常使用术语自伴随 (self-adjoint) 来描述厄米矩阵。]

方阵的逆矩阵等于其转置的矩阵称为**正交矩阵** (orthogonal matrix)：

$$\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T \quad \text{若 } \mathbf{A} \text{ 是正交矩阵} \quad (8.91)$$

方阵的逆矩阵等于其共轭转置的矩阵称为**酉矩阵** (unitary matrix)：

$$\mathbf{U}^{-1} = \mathbf{U}^\dagger \quad \text{若 } \mathbf{U} \text{ 是酉矩阵} \quad (8.92)$$

根据定义 (8.92)，我们得出：若 $\mathbf{U}$ 是酉矩阵，则 $\mathbf{U}^\dagger \mathbf{U} = \mathbf{I}$ 。令 $(\mathbf{U}^\dagger \mathbf{U})_{mn} = (\mathbf{I})_{mn}$ ，对于酉矩阵的 n 和 m 列，我们得到 (问题 8.43)：

$$\sum_k u_{km}^* u_{kn} = \delta_{mn} \quad (8.93)$$

因此，根据 (8.84) 和 (8.83) 的定义，酉矩阵的各列（视为列向量）是正交和归一化（正交）的。相反地，若对所有的列都有 (8.93) 成立，则 $\mathbf{U}$ 是酉矩阵。若 $\mathbf{U}$ 是实酉矩阵，则 $\mathbf{U}^\dagger = \mathbf{U}^T$ ，那么 $\mathbf{U}$ 是正交矩阵。

我们可以证明，厄米矩阵 $\mathbf{H}$ 对应不同本征值的两个本征向量是正交的（见 *Strang*, Section 5.5）。对于对应同一本征值的 $\mathbf{H}$ 的本征向量，可以取它们的线性组合，这些线性组合将成为 $\mathbf{H}$ 的正交本征向量。此外，本征向量的元素可以乘以一个常数，使本征向量归一化。因此，可以选择厄米矩阵的本征向量为正交向量，那么 (8.86) 中的本征向量矩阵 $\mathbf{C}$ 是酉矩阵，则 $\mathbf{C}^{-1} = \mathbf{C}^\dagger$ 。因此，(8.88) 可以写成

$$\mathbf{C}^\dagger \mathbf{H} \mathbf{C} = \mathbf{W} \quad \text{若 } \mathbf{H} \text{ 是厄米矩阵} \quad (8.94)$$

对于 $\mathbf{H}$ 是实厄米矩阵（ $\mathbf{H}$ 是实对称矩阵）的常见情况，(8.79a) 中的 c 都是实数（由于 $\mathbf{W}$ 和 H_{ij} 都是实数）， $\mathbf{C}$ 是实酉矩阵，即 $\mathbf{C}^{-1} = \mathbf{C}^T$ ，则 $\mathbf{C}$ 是正交的。那么 (8.94) 可以写成

$$\mathbf{C}^T \mathbf{H} \mathbf{C} = \mathbf{W} \quad \text{若 } \mathbf{H} \text{ 是实对称矩阵} \quad (8.95)$$

可以证明，厄米矩阵的本征值是实数（*Strang*, Section 5.5）。

例题：通过求解代数方程，求以下厄米矩阵的本征值和归一化本征向量。并证明 $\mathbf{C}^\dagger \mathbf{A} \mathbf{C}$ 是对角矩阵，其中 $\mathbf{C}$ 是本征向量矩阵。

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 2i \\ -2i & 0 \end{pmatrix}$$

求本征值 λ 的特征方程 (8.81) 为 $\det(a_{ij} - \delta_{ij}\lambda) = 0$ ，带入，有

$$\begin{vmatrix} 3 - \lambda & 2i \\ -2i & 0 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\lambda^2 - 3\lambda - 4 = 0$$

$$\lambda_1 = 4, \quad \lambda_2 = -1$$

检查本征值计算的一个有用定理如下（*Strang*, Exercise 5.1.9）： n 阶方阵 $\mathbf{A}$ 的本征值 λ_i 之和等于对角元素之和，即 $\sum_{i=1}^n \lambda_i = \sum_{i=1}^n a_{ii}$ 。在本例中， $\sum_i a_{ii} = 3 + 0$ 等于本征值的和 $4 - 1 = 3$ 。

对于 $\lambda_1 = 4$, 联立方程组 (8.82), 得到

$$\begin{aligned}(3 - \lambda_1) c_1^{(1)} + 2ic_2^{(1)} &= 0 \\ -2ic_1^{(1)} - \lambda_1 c_2^{(1)} &= 0\end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned}-c_1^{(1)} + 2ic_2^{(1)} &= 0 \\ -2ic_1^{(1)} - 4c_2^{(1)} &= 0\end{aligned}$$

将这些方程的任意一个删去, 我们得到

$$c_1^{(1)} = 2ic_2^{(1)}$$

根据归一化条件, 有

$$\begin{aligned}1 &= |c_1^{(1)}|^2 + |c_2^{(1)}|^2 = 4|c_2^{(1)}|^2 + |c_2^{(1)}|^2 \\ |c_2^{(1)}|^2 &= 1/\sqrt{5}, \quad c_2^{(1)} = 1/\sqrt{5} \\ c_1^{(1)} &= 2ic_2^{(1)} = 2i/\sqrt{5}\end{aligned}$$

其中我们选择 $c_2^{(1)}$ 的相位为零。

同样地, 对于 $\lambda_2 = -1$, 我们得到 (问题 8.49):

$$c_1^{(2)} = -i/\sqrt{5}, \quad c_2^{(2)} = 2/\sqrt{5}$$

归一化本征向量为

$$\mathbf{c}^{(1)} = \begin{pmatrix} 2i/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{c}^{(2)} = \begin{pmatrix} -i/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \end{pmatrix}$$

由于厄米矩阵的两个本征值 λ_1 和 λ_2 不同, 因此它们的本征向量 $\mathbf{c}^{(1)}$ 和 $\mathbf{c}^{(2)}$ 是正交的 (需要你证明)。同样, $\mathbf{c}^{(1)}$ 和 $\mathbf{c}^{(2)}$ 是归一化的。因此, $\mathbf{C}$ 是酉矩阵, $\mathbf{C}^{-1} = \mathbf{C}^\dagger$ 。构造 $\mathbf{C}$ 及其共轭转置, 我们有

$$\begin{aligned}\mathbf{C}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{C} &= \mathbf{C}^\dagger\mathbf{A}\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 2i/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2i \\ -2i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2i/\sqrt{5} & -i/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2i/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} \\ i/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8i/\sqrt{5} & i/\sqrt{5} \\ 4/\sqrt{5} & -2/\sqrt{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

这是本征向量的对角矩阵。

我们已经证明: 若 $\mathbf{H}$ 是实对称矩阵, 本征值为 W_i , 正交本征向量为 $\mathbf{c}^{(i)}$ (即 $\mathbf{H}\mathbf{c}^{(i)} = W_i\mathbf{c}^{(i)}$, $i = 1, 2, \dots, n$), 则 $\mathbf{C}^T\mathbf{H}\mathbf{C} = \mathbf{W}$ [式 (8.95)], 其中 $\mathbf{C}$ 是实正交矩阵, 其列为 $\mathbf{c}^{(i)}$, $\mathbf{W}$ 是本征值 W_i 的对角矩阵。该定理的逆定理很容易证明: 若 $\mathbf{H}$ 是实对称矩阵, $\mathbf{B}$ 是实正交阵, 且 $\mathbf{B}^T\mathbf{H}\mathbf{B} = \mathbf{\Lambda}$, 则 $\mathbf{B}$ 的列是 $\mathbf{H}$ 的本征向量, $\mathbf{\Lambda}$ 的对角元素是 $\mathbf{H}$ 的本征值。

为了求 n 阶厄米矩阵的本征值和本征向量, 我们可以使用以下任一步骤: (1) 求特征方程 $\det(H_{ij} - \delta_{ij}W) = 0$ [式 (8.81)], 得到本征值 $W_1, \dots, W_n$ 。然后将每个 W_k 带入代数方程组 (8.79a), 解出第 k 个本征向量的元素 $c_1^{(k)}, c_2^{(k)}, \dots, c_n^{(k)}$ 。(2) 寻找酉矩阵 $\mathbf{C}$, 使得 $\mathbf{C}^\dagger\mathbf{H}\mathbf{C}$ 成为对角矩阵。 $\mathbf{C}^\dagger\mathbf{H}\mathbf{C}$ 的对角元素是 $\mathbf{H}$ 的本征值, $\mathbf{C}$ 的列是 $\mathbf{H}$ 的正交本征向量。对于量子化学中出现的大型矩阵, 步骤 (2) [称为**矩阵对角化** (matrix diagonalization)] 的计算速度比 (1) 快得多。

展开特征行列式并求解特征方程不是求大矩阵本征值的好方法，原因之一是，对于大矩阵，特征多项式中一个系数的极小变化可能会导致本征值的巨大变化（见问题 8.54）。因此，我们可能需要将特征多项式中的系数计算到小数点后几百或几千位，才能得到精确到小数点后几位的本征值。虽然对于某些矩阵来说，矩阵元素值的微小变化可能会导致本征值的巨大变化，但我们可以证明：对于厄米矩阵来说，矩阵元素的微小变化始终只会导致本征值的微小变化。因此，上一段的方法（2）是获得准确本征值的正确方法。

实对称矩阵 $\mathbf{H}$ 对角化的系统方法如下。构造一个正交阵 $\mathbf{O}_1$ 使得矩阵 $\mathbf{H}_1 \equiv \mathbf{O}_1^T \mathbf{H} \mathbf{O}_1$ 在 $\mathbf{H}$ 的 H_{12} 和 H_{21} 的对角元素为零。（由于 $\mathbf{H}$ 是对称的，我们有 $H_{12} = H_{21}$ 。同样地，变换后的矩阵 $\mathbf{H}_1, \mathbf{H}_2, \dots$ 也是对称的。）然后构造一个正交阵 $\mathbf{O}_2$ 使得矩阵 $\mathbf{H}_2 \equiv \mathbf{O}_2^T \mathbf{H}_1 \mathbf{O}_2$ 在 $\mathbf{H}_1 = \mathbf{O}_2^T \mathbf{O}_1^T \mathbf{H} \mathbf{O}_1 \mathbf{O}_2$ 的 $\mathbf{H}_1$ 对角元素 $(\mathbf{H}_1)_{13}$ 和 $(\mathbf{H}_1)_{31}$ 为零，以此类推。不幸的是，当某对角元素在某一步中归零后，在前一步中归零的一些对角元素很可能会变成非零，因此我们必须返回并反复循环对角元素。一般来说，要使所有非对角元素都等于零，需要无限多的步骤。在实际操作中，如果在该步骤中归零的非对角元素的绝对值小于某个极小数，则跳过该步骤；如果所有非对角元素的绝对值都小于某个极小数，则停止该步骤。本征值就是变换后的矩阵 $\dots \mathbf{O}_3^T \mathbf{O}_2^T \mathbf{O}_1^T \mathbf{H} \mathbf{O}_1 \mathbf{O}_2 \mathbf{O}_3 \dots$ 的对角元素，本征向量矩阵是乘积 $\mathbf{O}_1 \mathbf{O}_2 \mathbf{O}_3 \dots$ 。该方法 [称为循环雅可比法 (cyclic Jacobi method)]，在串行计算机上运行时，它处理大型矩阵的效率不高，但在并行计算机上运行时效率很高。

与雅可比方法相比，更有效的实对称矩阵对角化方法首先是进行一系列正交变换，将原始矩阵 $\mathbf{H}$ 变换为对称三对角矩阵 $\mathbf{T}$ 。三对角矩阵是指除了主对角线上的元素（元素 t_{ii} ）和主对角线上下对角线上的元素（分别为元素 $t_{i-1,i}$ 和 $t_{i+1,i}$ ）外，其他元素均为零的矩阵。 $\mathbf{T}$ 与 $\mathbf{H}$ 之间的关系为 $\mathbf{T} = \mathbf{O}^T \mathbf{H} \mathbf{O}$ ，其中 $\mathbf{O}$ 是实正交矩阵，是从 $\mathbf{H}$ 到 $\mathbf{T}$ 的各个步骤中使用的正交矩阵的乘积。求对称三对角矩阵本征值的有效方法是 **QR** 法。在这里， $\mathbf{T}$ 表示为正交矩阵 $\mathbf{Q}$ 和上三角矩阵 $\mathbf{R}$ （主对角线以下元素均为零）的乘积。通过一系列迭代步骤，矩阵收敛到一个对角矩阵，其对角元素是 $\mathbf{T}$ 的本征值，等于 $\mathbf{H}$ 的本征值（问题 8.55）。经过一定的改进，**QR** 方法是一种非常有效的寻找本征值和本征向量的方法（详见 *Strang*, Section 5.3 and 7.3）。

有关矩阵对角化程序和计算机程序的详细信息，见 *Press et al.*, Chapter 11 ; *Acton*, Chapters 8 and 13 ; *Shoup*, Chapter 4 .

Press et al. 是科学和工程计算程序和计算机程序的主要汇编；该书旧版本的文本可在线免费阅读，网址是 www.nr.com。有关本书旧版本的评论，见 amath.colorado.edu/computing/Fortran/numrec.html。

数学和科学计算程序可在 www.netlib.org 和 gams.nist.gov 网站上找到。可在 archives.math.utk.edu 下载免费的个人电脑数学软件以及 Mathcad 和 Maple 等商业软件的演示软件。

使用矩阵代数求解非正交基函数时的线性变分方程的步骤见问题 8.57。

Excel 电子表格可用于查找本征值和本征向量；见问题 8.53。

计算机代数系统，如 Maple、Mathematica 和 Mathcad 以及一些电子计算器都有内置命令，可以轻松找到本征值和本征向量。

本节讨论的寻找矩阵本征值和本征向量的方法适用于阶次不超过 10^3 的矩阵。在某些量子化学计算中会出现阶数不超过 10^9 的矩阵，使用特殊方法可以求出这些矩阵的最低几个本征值和相应的本征向量（见第 16.2 节）。

如 (8.80) 之后所述，对于以正交函数 f_i 为基的线性变分函数 $\sum_{i=1}^n c_i f_i$ ，由矩阵元素 $\langle f_i | \hat{H} | f_j \rangle$ 组成的矩阵 $\mathbf{H}$ 的本征值是久期方程的根，对应于本征值 W_m 的本征向量给出了对应于 W_m 的线性变分函数的系数。问题 8.60 至 8.65 将线性变分法应用于双势阱和谐振子等问题，使用箱中粒子波函数作为基函数，并使用 Mathcad 等计算机代数程序求出 $\mathbf{H}$ 矩阵的本征值和本征向量。

我们已经在线性变分法中讨论了矩阵对角化的问题。然而，找到任意厄米算符的本征值 a_k 和本征函数 g_k ($\hat{A}g_k = a_k g_k$) 可以表述为一个矩阵对角化问题。如果我们选择一个完全正交基函数组

$\{f_i\}$, 将本征函数展开为 $g_k = \sum_i c_i^{(k)} f_i$, 则 (问题 8.59) 元素由 $a_{ij} = \langle f_i | \hat{A} | f_j \rangle$ 组成的矩阵 $\mathbf{A}$ 的本征值 a_k 也是算符 $\hat{A}$ 的本征值, $\mathbf{A}$ 的本征向量 $\mathbf{c}^{(k)}$ 的元素 $c_i^{(k)}$ 是本征函数 g_k 在基函数 f_i 上的展开系数。

本节材料进一步强调了线性算符与矩阵之间的对应关系, 以及函数与列向量之间的对应关系 (第 7.10 节)。

谷歌收录的网页的页面排名 (PageRanks) 是由谷歌通过构建某个矩阵 (称为谷歌矩阵) 并找到其对应本征值 1 的本征向量计算得出的。谷歌矩阵的阶数等于被索引网页的数量, 在 2012 年介于 $10^{10.5}$ 和 10^{11} 之间。本征向量的分量为 PageRanks。见 www.ams.org/samplings/featurecolumn/fcarc-pagerank。

总结

习题

Chapter 9

微扰理论

9.1 微扰理论

本章讨论第二种主要的量子力学近似方法——微扰理论。

假设我们有一个系统，其定态哈密顿量为 $\hat{H}$ ，我们无法通过求解薛定谔方程

$$\hat{H}\psi_n = E_n\psi_n \quad (9.1)$$

来获得其束缚态本征函数和本征值。再假设：哈密顿量 $\hat{H}$ 与某一满足以下我们可解的薛定谔方程系统的哈密顿量 $\hat{H}^0$ 之间只存在微小的差异：

$$\hat{H}^0\psi_n^{(0)} = E_n^{(0)}\psi_n^{(0)} \quad (9.2)$$

一维非谐振子的哈密顿量就是一个例子：

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}kx^2 + cx^3 + dx^4 \quad (9.3)$$

其哈密顿量 (9.3) 与以下谐振子的哈密顿量十分接近：

$$\hat{H}^0 = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}kx^2 \quad (9.4)$$

若 (9.3) 中的常数 c 和 d 很小，我们可以预测非谐振子的本征函数和本征值与谐振子的非常接近。

我们称具有哈密顿量 $\hat{H}^0$ 的系统为**无扰系统** (unperturbed system)，具有哈密顿量 $\hat{H}$ 的系统为**受扰系统** (perturbed system)。二哈密顿量之间的不同 $\hat{H}'$ 称为**微扰** (perturbation)，记为：

$$\hat{H}' \equiv \hat{H} - \hat{H}^0 \quad (9.5)$$

$$\boxed{\hat{H} = \hat{H}^0 + \hat{H}'} \quad (9.6)$$

(符号 ' 不表示微分。)对于具有哈密顿量 (9.3) 的非谐振子，对相关的谐振子的微扰为 $\hat{H}' = cx^3 + dx^4$ 。

在 $\hat{H}^0\psi_n^{(0)} = E_n^{(0)}\psi_n^{(0)}$ [式 (9.2)] 中， $E_n^{(0)}$ 和 $\psi_n^{(0)}$ 分别称为状态 n 的**无扰能量** (unperturbed energy) 和**无扰波函数** (unperturbed wave function)。若 $\hat{H}^0$ 为谐振子的哈密顿量 (9.4)，则 $E_n^{(0)} = (n + \frac{1}{2})\hbar\nu$ [式 (4.45)]，其中的 n 是非负整数。(我们使用 n 代替 v 为了与微扰理论符号保持一致。)上标 $^{(0)}$ 不表示基态。微扰理论可以应用于任何状态。下标 n 表示我们正在处理的状态。而上标 $^{(0)}$ 表示无扰系统的状态。

我们的目标是将受扰系统位置的本征函数和本征值与无扰系统已知的本征函数和本征值联系起来。为此，我们假定微扰是逐渐增加的，从无扰系统到受扰系统的变化是连续的。在数学上，这相当于在哈密顿量中插入了一个参数 λ ，使得

$$\hat{H} = \hat{H}^0 + \lambda \hat{H}' \quad (9.7)$$

当 λ 为零时，系统为无扰系统。随着 λ 的增加，微扰逐渐变大，在 $\lambda = 1$ 时，微扰完全“被打开”。我们插入 λ 是为了将受扰本征函数和无扰本征函数关联起来，最终设定 $\lambda = 1$ 并删去它。

第 9.1-9.7 节处理定态哈密顿量和定态系统，第 9.8 节处理含时微扰理论。

9.2 非简并微扰理论

微扰理论处理简并和非简并能级的方式不同。本节将研究微扰对非简并能级的影响。若某无扰系统的能级是简并的，而另一些是非简并的，那么本节的处理方法将只适用于非简并能级。

非简并微扰理论

令 $\psi_n^{(0)}$ 为能量为 $E_n^{(0)}$ 的某个非简并无扰系统的波函数。再令 ψ_n 为受扰系统的波函数，在施加微扰后， $\psi_n^{(0)}$ 变为 ψ_n 。由 (9.1) 和 (9.7)，受扰态的薛定谔方程为

$$\hat{H}\psi_n = (\hat{H}^0 + \lambda \hat{H}')\psi_n = E_n\psi_n \quad (9.8)$$

由于 (9.8) 中的哈密顿量与参数 λ 有关，本征函数 ψ_n 和本征值 E_n 也将与 λ 有关：

$$\psi_n = \psi_n(\lambda, q), \quad E_n = E_n(\lambda)$$

其中 q 表示粒子的坐标。我们现在使用 λ 的 Taylor 级数（问题 4.1）展开 ψ_n 和 E_n ：

$$\psi_n = \psi_n|_{\lambda=0} + \left. \frac{\partial \psi_n}{\partial \lambda} \right|_{\lambda=0} \lambda + \left. \frac{\partial^2 \psi_n}{\partial \lambda^2} \right|_{\lambda=0} \frac{\lambda^2}{2!} + \dots \quad (9.9)$$

$$E_n = E_n|_{\lambda=0} + \left. \frac{dE_n}{d\lambda} \right|_{\lambda=0} \lambda + \left. \frac{d^2 E_n}{d\lambda^2} \right|_{\lambda=0} \frac{\lambda^2}{2!} + \dots \quad (9.10)$$

根据假设，当 $\lambda \rightarrow 0$ 时， ψ_n 和 E_n 分别趋近于 $\psi_n^{(0)}$ 和 $E_n^{(0)}$ ：

$$\psi_n|_{\lambda=0} = \psi_n^{(0)}, \quad E_n|_{\lambda=0} = E_n^{(0)} \quad (9.11)$$

我们引入以下缩写：

$$\psi_n^{(k)} \equiv \left. \frac{1}{k!} \frac{\partial^k \psi_n}{\partial \lambda^k} \right|_{\lambda=0}, \quad E_n^{(k)} \equiv \left. \frac{1}{k!} \frac{d^k E_n}{d\lambda^k} \right|_{\lambda=0}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (9.12)$$

则 (9.9) 和 (9.10) 变为

$$\psi_n = \psi_n^{(0)} + \lambda \psi_n^{(1)} + \lambda^2 \psi_n^{(2)} + \dots + \lambda^k \psi_n^{(k)} + \dots \quad (9.13)$$

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \dots + \lambda^k E_n^{(k)} + \dots \quad (9.14)$$

对于 $k = 1, 2, 3, \dots$ ，我们称 $\psi_n^{(k)}$ 和 $E_n^{(k)}$ 分别为波函数和能量的 k 级校正 (k th-order correction)。我们假设级数 (9.13) 和 (9.14) 在 $\lambda = 1$ 处收敛，我们希望，对于小微扰，只取级数的前几项就能很

好地逼近真实的能量和波函数。(通常, 微扰理论的级数并不收敛, 尽管如此, 不收敛级数的前几项也能给出有用的近似值。)

令 $\psi_n^{(0)}$ 归一化: $\langle \psi_n^{(0)} | \psi_n^{(0)} \rangle = 1$ 。与令 ψ_n 归一化不同, 我们要求 ψ_n 满足

$$\langle \psi_n^{(0)} | \psi_n \rangle = 1 \quad (9.15)$$

若 ψ_n 不满足该方程, 则将常数 $1/\langle \psi_n^{(0)} | \psi_n \rangle$ 乘到 ψ_n 上, 得到一个满足该性质的微扰波函数。条件 (9.15), 称为**中间归一化** (intermediate normalization), 它简化了推导过程。注意: 将 ψ_n 与一个常数相乘并不会改变薛定谔方程 $\hat{H}\psi_n = E_n\psi_n$ 中的能量, 所以应用中间归一化不会影响能量校正的结果。如果需要, 在计算结束时, 可以将中间归一化的 ψ_n 乘以一个常数, 使其在通常意义上归一化。

将 (9.13) 代入 $1 = \langle \psi_n^{(0)} | \psi_n \rangle$ [式 (9.15)], 得到

$$1 = \langle \psi_n^{(0)} | \psi_n^{(0)} \rangle + \lambda \langle \psi_n^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle + \lambda^2 \langle \psi_n^{(0)} | \psi_n^{(2)} \rangle + \dots$$

由于该方程对介于 0 和 1 之间的任意 λ 都成立, 如 (4.11) 之后所证明的, 方程两边 λ 同次幂的系数必须相等。令 λ^0 的系数相等, 我们有 $1 = \langle \psi_n^{(0)} | \psi_n^{(0)} \rangle$, 由于 $\psi_n^{(0)}$ 归一化, 上式显然成立。令 λ^1 、 λ^2 等的系数相等, 我们有

$$\langle \psi_n^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle = 0, \quad \langle \psi_n^{(0)} | \psi_n^{(2)} \rangle = 0, \quad \text{etc.} \quad (9.16)$$

使用中间归一化时, 波函数的校正与 $\psi_n^{(0)}$ 正交。

将 (9.13) 和 (9.14) 代入薛定谔方程 (9.8), 得到

$$\begin{aligned} (\hat{H}^0 + \lambda \hat{H}') (\psi_n^{(0)} + \lambda \psi_n^{(1)} + \lambda^2 \psi_n^{(2)} + \dots) \\ = (E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \dots) (\psi_n^{(0)} + \lambda \psi_n^{(1)} + \lambda^2 \psi_n^{(2)} + \dots) \end{aligned}$$

将 λ 的同次幂进行归并, 我们得到

$$\begin{aligned} \hat{H}^0 \psi_n^{(0)} + \lambda (\hat{H}' \psi_n^{(0)} + \hat{H}^0 \psi_n^{(1)}) + \lambda^2 (\hat{H}^0 \psi_n^{(2)} + \hat{H}' \psi_n^{(1)}) + \dots \\ = E_n^{(0)} \psi_n^{(0)} + \lambda (E_n^{(1)} \psi_n^{(0)} + E_n^{(0)} \psi_n^{(1)}) + \lambda^2 (E_n^{(2)} \psi_n^{(0)} + E_n^{(1)} \psi_n^{(1)} + E_n^{(0)} \psi_n^{(2)}) + \dots \end{aligned} \quad (9.17)$$

现在 (假设收敛性合适), 要使 (9.17) 两边的两个级数对所有 λ 值都相等, 两个级数中 λ 的同次幂的系数必须相等。

令 λ^0 项的系数相等, 我们得到 $\hat{H}^0 \psi_n^{(0)} = E_n^{(0)} \psi_n^{(0)}$, 这是无扰系统的薛定谔方程 (9.2), 没有给我们有用的信息。

令 λ^1 项的系数相等, 我们得到

$$\begin{aligned} \hat{H}' \psi_n^{(0)} + \hat{H}^0 \psi_n^{(1)} &= E_n^{(1)} \psi_n^{(0)} + E_n^{(0)} \psi_n^{(1)} \\ \hat{H}^0 \psi_n^{(1)} - E_n^{(0)} \psi_n^{(1)} &= E_n^{(1)} \psi_n^{(0)} - \hat{H}' \psi_n^{(0)} \end{aligned} \quad (9.18)$$

一级能量校正

为了求出 $E_n^{(1)}$, 我们将 (9.18) 两边乘以 $\psi_n^{(0)*}$ 并对全空间积分, 有

$$\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H} | \psi_n^{(1)} \rangle - E_n^{(0)} \langle \psi_m^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle = E_n^{(1)} \langle \psi_m^{(0)} | \psi_n^{(0)} \rangle - \langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle \quad (9.19)$$

其中用到了狄拉克符号 [式 (7.1) 和 (7.3)]。\$\hat{H}^0\$ 是厄米算符，使用厄米算符的性质 (7.12)，(9.19) 左侧的第一项变为

$$\begin{aligned}\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}^0 | \psi_n^{(1)} \rangle &= \langle \psi_m^{(1)} | \hat{H}^0 | \psi_n^{(0)} \rangle^* = \langle \psi_m^{(1)} | \hat{H}^0 \psi_n^{(0)} \rangle^* \\ &= \langle \psi_m^{(1)} | E_n^{(0)} \psi_n^{(0)} \rangle^* = E_n^{(0)*} \langle \psi_n^{(1)} | \psi_m^{(0)} \rangle^* = E_m^{(0)} \langle \psi_m^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle\end{aligned}\quad (9.20)$$

其中我们用到了无扰薛定谔方程 \$\hat{H}^0 \psi_m^{(0)} = E_m^{(0)} \psi_m^{(0)}\$、\$E_m^{(0)}\$ 是实数以及 (7.4)。将 (9.20) 代入 (9.19)，对无扰本征函数使用正交方程 \$\langle \psi_m^{(0)} | \psi_n^{(0)} \rangle = \delta_{mn}\$，我们得到

$$(E_m^{(0)} - E_n^{(0)}) \langle \psi_m^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle = E_n^{(1)} \delta_{mn} - \langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle \quad (9.21)$$

若 \$m = n\$，则 (9.21) 的左侧为零，(9.21) 变为

$$E_n^{(1)} = \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle = \int \psi_n^{(0)*} \hat{H}' \psi_n^{(0)} d\tau \quad (9.22)$$

通过对作用于适当无扰波函数的微扰 \$\hat{H}'\$ 求平均值，可以求出能量的一级校正。

在 (9.14) 中令 \$\lambda = 1\$，我们得到

$$E_n \approx E_n^{(0)} + E_n^{(1)} = E_n^{(0)} + \int \psi_n^{(0)*} \hat{H}' \psi_n^{(0)} d\tau \quad (9.23)$$

例题：对于具有哈密顿量 (9.3) 的非谐振子，若无扰系统取为谐振子，求基态的 \$E^{(1)}\$。

微扰由 (9.3) 至 (9.5) 给出：

$$\hat{H}' = \hat{H} - \hat{H}^0 = cx^3 + dx^4$$

具有量子数为 \$v\$ 状态的一级能量校正由 (9.22) 给出：\$E_v^{(1)} = \langle \psi_v^{(0)} | cx^3 + dx^4 | \psi_v^{(0)} \rangle\$，其中 \$\psi_v^{(0)}\$ 是状态 \$v\$ 的谐振子波函数。对于 \$v = 0\$ 的基态，使用式 \$\psi_0^{(0)} = (\alpha/\pi)^{1/4} e^{-\alpha x^2/2}\$ [式 (4.53)]，有

$$E_0^{(1)} = \langle \psi_0^{(0)} | cx^3 + dx^4 | \psi_0^{(0)} \rangle = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2} (cx^3 + dx^4) dx$$

从 \$-\infty\$ 到 \$\infty\$ 对奇函数 \$cx^3 e^{-\alpha x^2}\$ 积分为零。使用附录 (A.10) 中的积分，令 \$n = 2\$；再对 \$\alpha\$ 使用 (4.31)，得到

$$E_0^{(1)} = 2d \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/2} \int_0^{\infty} e^{-\alpha x^2} x^4 dx = \frac{3d}{4\alpha^2} = \frac{3dh^2}{64\pi^4 \nu^2 m^2}$$

无扰基态能量为 \$E_0^{(0)} = \frac{1}{2}h\nu\$，\$E_0^{(0)} + E_0^{(1)} = \frac{1}{2}h\nu + \frac{3dh^2}{64\pi^4 \nu^2 m^2}\$。

练习：考虑一个单粒子一维系统，其势能函数满足

$$V = \begin{cases} \infty, & x < 0 \\ V = cx, & 0 \leq x < l \\ \infty, & x \geq l \end{cases}$$

其中 \$c\$ 是常数。

(a) 当 \$c > 0\$ 时，画出 \$V\$ 的图象。

(b) 将该系统看作箱中粒子系统的微扰，求量子数为 \$n\$ 状态的 \$E_n^{(1)}\$。使用式 (3.88) 说明得到的答案是符合预期的。

(部分答案：(b) \$\frac{1}{2}cl\$。)

一级波函数校正

对于 $m \neq n$, 式 (9.21) 为

$$(E_m^{(0)} - E_n^{(0)}) \langle \psi_m^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle = - \langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle, \quad m \neq n \quad (9.24)$$

为了求出 $\psi_n^{(1)}$, 我们将其用厄米算符 $\hat{H}^0$ 的无扰本征函数 $\psi_m^{(0)}$ 完整正交集展开:

$$\psi_n^{(1)} = \sum_m a_m \psi_m^{(0)}, \quad \text{其中} \quad a_m = \langle \psi_m^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle \quad (9.25)$$

其中 (7.41) 用于计算展开系数 a_m 。在 (9.24) 中使用 $a_m = \langle \psi_m^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle$, 我们得到

$$(E_m^{(0)} - E_n^{(0)}) a_m = - \langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle, \quad m \neq n$$

根据假设, 能级 $E_n^{(0)}$ 是非简并的, 因此若 $m \neq n$, 有 $E_m^{(0)} - E_n^{(0)} \neq 0$ 。两边同除以 $(E_m^{(0)} - E_n^{(0)})$, 我们得到

$$a_m = \frac{\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}, \quad m \neq n \quad (9.26)$$

除了 $\psi_n^{(0)}$ 的系数 a_n 外, $\psi_n^{(1)}$ 展开式 (9.25) 的系数 a_m 都可以用 (9.26) 求出。根据 (9.25) 的第二个方程, $a_n = \langle \psi_n^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle$ 。回忆我们为 ψ_n 选择的中间归一化条件使得 $\langle \psi_n^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle = 0$ [式 (9.16)]。因此 $a_n = \langle \psi_n^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle = 0$, 方程 (9.25) 和 (9.26) 给出了波函数的一级校正:

$$\psi_n^{(1)} = \sum_{m \neq n} \frac{\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)} \quad (9.27)$$

符号 $\sum_{m \neq n}$ 表示对所有无扰的状态求和, 除了状态 n 。

在 (9.13) 中令 $\lambda = 1$, 仅使用波函数的一级校正, 我们得到了微扰波函数的近似:

$$\psi_n \approx \psi_n^{(0)} + \sum_{m \neq n} \frac{\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)} \quad (9.28)$$

有关 $\psi_n^{(2)}$ 及 ψ 的归一化, 见 *Kemble*, Chapter XI。

二级能量校正

令 λ^2 项的系数相等, 我们得到

$$\hat{H}^0 \psi_n^{(2)} - E_n^{(0)} \psi_n^{(2)} = E_n^{(2)} \psi_n^{(0)} + E_n^{(1)} \psi_n^{(1)} - \hat{H}' \psi_n^{(1)} \quad (9.29)$$

乘以 $\psi_m^{(0)*}$ 并对全空间积分, 我们得到

$$\begin{aligned} \langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}^0 | \psi_n^{(2)} \rangle - E_n^{(0)} \langle \psi_m^{(0)} | \psi_n^{(2)} \rangle \\ = E_n^{(2)} \langle \psi_m^{(0)} | \psi_n^{(0)} \rangle + E_n^{(1)} \langle \psi_m^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle - \langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(1)} \rangle \end{aligned} \quad (9.30)$$

该方程中的积分 $\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}^0 | \psi_n^{(2)} \rangle$ 与 (9.20) 中的积分相同, 除了 $\psi_n^{(2)}$ 代替了 $\psi_n^{(1)}$ 。在 (9.20) 中用 $\psi_n^{(2)}$ 代替 $\psi_n^{(1)}$, 我们得到

$$\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}^0 | \psi_n^{(2)} \rangle = E_m^{(0)} \langle \psi_m^{(0)} | \psi_n^{(2)} \rangle \quad (9.31)$$

利用 (9.31) 和 (9.30) 中无扰函数的正交性, 可以得出

$$(E_m^{(0)} - E_n^{(0)}) \langle \psi_m^{(0)} | \psi_n^{(2)} \rangle = E_n^{(2)} \delta_{mn} + E_n^{(1)} \langle \psi_m^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle - \langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(1)} \rangle \quad (9.32)$$

若 $m = n$ ，则 (9.32) 的左侧为零，得到

$$\begin{aligned} E_n^{(2)} &= -E_n^{(1)} \langle \psi_n^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle + \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(1)} \rangle \\ E_n^{(2)} &= \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(1)} \rangle \end{aligned} \quad (9.33)$$

因为 $\langle \psi_n^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle = 0$ [式 (9.16)]。从 (9.33) 可知，要找到能量的二级校正，我们只需要直到波函数的一级校正。事实上，可以证明：知道 $\psi_n^{(1)}$ 也足以确定 $E_n^{(3)}$ 。

一般地，可以证明：若我们知道波函数的 k 级校正，则可以确定能量的 $2k+1$ 级校正。（见 *Bates*, Vol. I, p. 184。）

将 (9.27) 中的 $\psi_n^{(1)}$ 代入 (9.33)，我们得到

$$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_m^{(0)} \rangle \quad (9.34)$$

由于展开系数 a_m [式 (9.26)] 是常数，可以提到积分外面。由于 $\hat{H}'$ 是厄米算符，我们有

$$\begin{aligned} \langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_m^{(0)} \rangle &= \langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle \langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle^* \\ &= |\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle|^2 \end{aligned}$$

则 (9.34) 变为

$$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \quad (9.35)$$

这正是我们需要的，用无扰波函数和能量表示的 $E_n^{(2)}$ 。

将 $E_n^{(2)}$ 和 $\lambda = 1$ 代入 (9.14)，可以得到微扰态能量的近似值为

$$E_n \approx E_n^{(0)} + H'_{nn} + \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \quad (9.36)$$

其中的积分是对无扰归一化波函数的积分。

有关高阶能量修正的公式，请参见 *Bates*, Volume I, pages 181-185。本节提出的微扰理论形式称为瑞利-薛定谔微扰理论 (Rayleigh-Schrödinger perturbation theory)；还存在其他方法。

讨论

方程 (9.28) 表明：作用在波函数 $\psi_n^{(0)}$ 上的微扰相当于“掺和”进了其他状态 $\psi_m^{(0)}$, $m \neq n$ 的贡献。由于因子 $1/(E_n^{(0)} - E_m^{(0)})$ ，对微扰波函数最重要的贡献来源于（除了 $\psi_n^{(0)}$ 之外）能量最接近 n 的状态。

要计算能量的一级校正，我们必须只计算单积分 H'_{nn} ，而要计算能量的二级校正，我们必须计算第 n 个状态和所有其他状态 m 之间的 $\hat{H}'$ 矩阵元素，然后执行 (9.35) 中的无限求和。在很多情况下，二级校正难以准确计算。处理三级和更高的就更难了。

(9.28) 和 (9.36) 中的和是不同状态的和，而不是不同能量值的和。如果某些能级（第 n 个能级除外）是简并的，我们必须在总和中为简并能级对应的每个线性无关波函数加入某个项。

我们在 (9.28) 和 (9.36) 中对状态求和，是因为我们需要一组完整的函数来展开 (9.25)，因此我们必须在求和中包含所有线性无关的波函数。如果无扰问题具有连续的波函数（例如氢原子），我们

还必须对连续波函数进行积分，这样才能得到一组完整的波函数。若 $\psi_E^{(0)}$ 是能量为 E 的无扰连续波函数，则 (9.27) 和 (9.35) 变为

$$\begin{aligned}\psi_n^{(1)} &= \sum_{m \neq n} \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)} + \int \frac{H'_{E,n}}{E_n^{(0)} - E^{(0)}} \psi_E^{(0)} dE^{(0)} \\ E_n^{(2)} &= \sum_{m \neq n} \frac{|H'_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} + \int \frac{|H'_{E,n}|^2}{E_n^{(0)} - E^{(0)}} dE^{(0)}\end{aligned}\quad (9.37)$$

其中 $H'_{E,n} = \langle \psi_E^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle$ 。这些方程中的积分是在连续态能量范围内进行的（例如，氢原子的能量从零到无穷大）。无扰问题中连续态的存在使得 $E_n^{(2)}$ 的计算变得更加困难。

变分法和微扰法的比较

微扰法适用于系统的所有束缚态。虽然第 8.1 节所述的变分原理只适用于给定对称性的最低态，但我们可以用线性变分法来处理束缚激发态。

由于需要计算二级和高级能量校正中出现的离散态的无限和以及连续态的积分，微扰计算通常很难进行。

在微扰法中，能量的计算（ $2k+1$ 级）比波函数的计算（ k 级）要精确得多。在变分法中也存在同样的情况，我们可以用一个相当不准确的波函数得到一个相当好的能量。如果计算能量以外的其他性质，结果通常不如计算出的能量可靠。

变分-微扰法

通过变分-微扰法，我们可以精确地估算出系统基态的 $E^{(2)}$ 和高级微扰理论能量校正，而无需计算 (9.36) 中的无限和。该方法基于以下不等式：

$$\langle u | \hat{H}^0 - E_g^{(0)} | u \rangle + \langle u | \hat{H}' - E_g^{(1)} | \psi_g^{(0)} \rangle + \langle \psi_g^{(0)} | \hat{H}' - E_g^{(1)} | u \rangle \geq E_g^{(2)} \quad (9.38)$$

其中 u 是任意满足定解条件的品优函数，下标 g 表示基态。(9.38) 的证明，参见 *Hameka*, Section 7-9。把 u 看作一个试探函数，我们改变参数，使 (9.38) 左侧最小化，就可以估算出 $E_g^{(2)}$ 。函数 u 原来就是 $\psi_g^{(1)}$ 的近似——基态波函数的一级校正， u 还可以用来估算 $E_g^{(3)}$ 。类似的变分法可用于找到对基态能量和波函数的高级校正。

9.3 微扰理论求解基态氦原子

氦原子有两个电子，其原子核带 $+2e$ 的电荷。我们将认为原子核处于静止状态（第 6.6 节），并将坐标系的原点放在原子核上。电子 1 和 2 的坐标分别为 (x_1, y_1, z_1) 和 (x_2, y_2, z_2) ；见图 9.1。

如果我们把核电荷数记为 $+Ze$ 而不是 $+2e$ ，就能处理类氦离子 H^- 、 Li^+ 和 Be^{2+} 。哈密顿算符为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_2^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_2} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \quad (9.39)$$

其中 m_e 是电子的质量， r_1 和 r_2 分别是电子 1 和电子 2 到原子核的距离， r_{12} 是两个电子之间的距离。前两项为电子动能的算符 [式 (3.48)]。第三项和第四项是电子与原子核之间的吸引势。最后一项是电子间的排斥势 [式 (6.58)]。请注意，相互作用粒子系统的势能不能写成单个粒子的势能之和。势能是整个系统的属性。

薛定谔方程涉及六个独立变量，每个电子有三个坐标。在球坐标系中， $\psi = \psi(r_1, \theta_1, \phi_1, r_2, \theta_2, \phi_2)$ 。




图 9.1: 氦原子中的粒子间距。

算符 ∇_1^2 由将 (6.6) 中的 r, θ, ϕ 替换为 r_1, θ_1, ϕ_1 给出。变量 r_{12} 为 $r_{12} = [(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2]^{1/2}$ ，使用球坐标系和直角坐标系之间的关系，我们可以用 $r_1, r_2, \theta_1, \theta_2, \phi_1, \phi_2$ 来表示 r_{12} 。

由于 $e^2/4\pi\epsilon_0 r_{12}$ 项的存在，氦原子的薛定谔方程在任何坐标系中都无法分离变量，因此我们必须使用近似方法。微扰法将哈密顿算符 (9.39) 分为两个部分， $\hat{H}^0$ 和 $\hat{H}'$ ，其中 $\hat{H}^0$ 是一个可精确求解系统的哈密顿算符。若我们选择 s

$$\hat{H}^0 = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_1^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_2^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_2} \quad (9.40)$$

$$\hat{H}' = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \quad (9.41)$$

那么 $\hat{H}^0$ 是两个类氢哈密顿算符的加和，每个算符各有一个电子：

$$\hat{H}^0 = \hat{H}_1^0 + \hat{H}_2^0 \quad (9.42)$$

$$\hat{H}_1^0 \equiv -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_1^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_1}, \quad \hat{H}_2^0 \equiv -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_2^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_2} \quad (9.43)$$

未受微扰的系统是两个电子互不施力的氦原子。虽然这样的系统并不存在，但这并不妨碍我们将微扰理论应用于这一系统。

由于无扰哈密顿算符 (9.42) 是两个独立粒子的哈密顿算符之和，我们可以利用公式 (6.18) 至 (6.24) 的变量分离结果得出结论：无扰波函数的形式为

$$\psi^{(0)}(r_1, \theta_1, \phi_1, r_2, \theta_2, \phi_2) = F_1(r_1, \theta_1, \phi_1) F_2(r_2, \theta_2, \phi_2) \quad (9.44)$$

无扰能量为

$$E^{(0)} = E_1 + E_2 \quad (9.45)$$

$$\hat{H}_1^0 F_1 = E_1 F_1, \quad \hat{H}_2^0 F_2 = E_2 F_2 \quad (9.46)$$

由于 $\hat{H}_1^0$ 和 $\hat{H}_2^0$ 是类氢哈密顿算符，(9.46) 的解为类氢本征函数和本征值。根据 (6.94)，我们有

$$E_1 = -\frac{Z^2}{n_1^2} \frac{m_e e^4}{8\pi^2 \epsilon_0 a_0}, \quad E_2 = -\frac{Z^2}{n_2^2} \frac{m_e e^4}{8\pi^2 \epsilon_0 a_0} \quad (9.47)$$

$$E^{(0)} = -Z^2 \left(\frac{1}{n_1^2} + \frac{1}{n_2^2} \right) \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a_0}, \quad \begin{matrix} n_1 = 1, 2, 3, \dots \\ n_2 = 1, 2, 3, \dots \end{matrix} \quad (9.48)$$

其中 a_0 是玻尔半径。公式 (9.48) 给出了两个电子都与原子核结合的状态的零级能量。He 原子也有连续态。

最低能级满足 $n_1 = 1, n_2 = 1$, 其零级波函数 [式 (6.104)] 为

$$\psi_{1s^2}^{(0)} = \frac{1}{\pi^{1/2}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} e^{-Zr_1/a_0} \cdot \frac{1}{\pi^{1/2}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} e^{-Zr_2/a_0} = 1s(1)1s(2) \quad (9.49)$$

其中 $1s(1)1s(2)$ 表示电子 1 和 2 的类氢 $1s$ 波函数的乘积, 下标表示两个电子都在类氢 $1s$ 轨道中。(请注意, 将电子分配到轨道并将原子波函数写成单电子轨道函数的乘积的过程只是一种近似。)该无扰基态能量为

$$E_{1s^2}^{(0)} = -Z^2(2) \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a_0} \quad (9.50)$$

$-e^2/8\pi\epsilon_0 a_0$ 是氢原子的基态能量 (假设原子核无限重) 等于 213.606 eV [式 (6.105)-(6.108)]。若 a_0 中电子的质量 m_e 被替换为 He 原子的折合质量, 则 $-e^2/8\pi\epsilon_0 a_0$ 的值变为 -13.604 eV, 我们将用这个数字来 (部分地) 校正 He 中的核运动。对于氦原子, $Z = 2$, (9.50) 为 $-8(13.604 \text{ eV}) = -108.83 \text{ eV}$:

$$E_{1s^2}^{(0)} = -108.83 \text{ eV} \quad (9.51)$$

这个零级能量与真正的氦原子基态能量相比如何? He 原子第一电离能的实验值为 24.587 eV。He 的第二电离能很容易从理论上计算出来, 因为它是类氢离子 He^+ 的电离能, 等于 $2^2(13.604 \text{ eV}) = 54.416 \text{ eV}$ 。如果我们选择完全电离原子的能量为零 [这一选择隐含在 (9.39) 中], 那么氦原子的基态能量为 $-(24.587 + 54.416) \text{ eV} = -79.00 \text{ eV}$ 。零级能量 (9.51) 的误差为 38%。我们本应预料到如此大的误差, 因为微扰项 $e^2/4\pi\epsilon_0 r_{12}$ 并不小。

下一步是计算能量的一级微扰校正。无扰基态是非简并的, 使用 (9.22) 和 (9.49), 得到

$$E^{(1)} = \langle \psi^{(0)} | \hat{H}' | \psi^{(0)} \rangle$$

$$E^{(1)} = \frac{Z^6 e^2}{(4\pi\epsilon_0) \pi^2 a_0^6} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-2Zr_1/a_0} e^{-2Zr_2/a_0} \frac{1}{r_{12}} r_1^2 \sin \theta_1 \times r_2^2 \sin \theta_2 dr_1 dr_2 d\theta_1 d\theta_2 d\phi_1 d\phi_2 \quad (9.52)$$

这个双电子问题的体积微元包含两个电子的坐标; $d\tau \equiv d\tau_1 d\tau_2$ 。(9.52) 中的积分可以用球谐函数对 $1/r_{12}$ 进行展开来计算, 如问题 9.14 所述。可以发现,

$$E^{(1)} = \frac{5Z}{8} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0} \right) \quad (9.53)$$

回忆一下, 当我们使用 He 的折合质量时, $\frac{1}{2}e^2/4\pi\epsilon_0 a_0$ 的值为 13.604 eV, 再令 $Z = 2$, 我们得到了氦原子基态能量的一级校正:

$$E^{(1)} = \frac{10}{4} (13.604 \text{ eV}) = 34.01 \text{ eV}$$

现在能量的近似值为

$$E^{(0)} + E^{(1)} = -108.83 \text{ eV} + 34.01 \text{ eV} = -74.82 \text{ eV} \quad (9.54)$$

与实验值 -79.00 eV 相比, 误差为 5.3%。

要计算对波函数的一级校正和对能量的高级校正, 需要计算无扰的基态和所有激发态 (包括连续态) 之间的 $1/r_{12}$ 矩阵元素, 并进行适当的求和与积分。目前还没有人知道如何直接计算 $E^{(1)}$ 的所有贡献。请注意, $\psi^{(1)}$ 的作用是将 $1s^2$ 以外其他构型的贡献混入波函数。对氦的真实基态波函数贡献最大的是 $1s^2$ 构型, 即无扰 (零阶) 波函数。

氦原子基态的 $E^{(2)}$ 值已使用变分-微扰法 (9.38) 得到计算结果。Scherr 和 Knight 使用 100 项的试探函数, 得到了六级波函数校正极其精确的近似值, 从而得到了十三级能量校正的近似值 [C.

W. Scherr and R. E. Knight, *Rev. Mod. Phys.*, **35**, 436 (1963)]. 有关计算 401 级能量校正, 见 J. D. Baker et al., *Phys. Rev. A*, **41**, 1247 (1990)。二级校正 $E^{(2)}$ 的值为 -4.29 eV , $E^{(3)}$ 为 $+0.12 \text{ eV}$ 。根据三级校正, 我们得到基态能量为

$$E \approx -108.83 \text{ eV} + 34.01 \text{ eV} - 4.29 \text{ eV} + 0.12 \text{ eV} = -78.99 \text{ eV}$$

与实验值 -79.00 eV 很接近了。通过引入十三级校正, Scherr 和 Knight 得到了基态氦原子能量为 $-2.90372433 (e^2/4\pi\epsilon_0 a_0)$, 与将在下一节讲述的纯变分计算获得的结果 $-2.90372438 (e^2/4\pi\epsilon_0 a_0)$ 非常接近。

可以证明氦原子能量的微扰理论级数展开是收敛的。见 [R. Ahlrichs, *Phys. Rev. A*, **5**, 605 (1972)]。

我们无法找到双电子基态 He 原子的精确波函数和能量, 但值得注意的是, 我们已经找到了双电子问题的薛定谔方程的基态精确解。这是一个假想原子 [称为胡克定律原子或谐波原子 (Hooke's-law atom or harmonium)], 其哈密顿算符为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_2^2 + \frac{1}{2}k(r_1^2 + r_2^2) + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}}$$

其中 r_1 和 r_2 是电子到原点的距离。对于力常数 k 的特定值, 可以精确解得基态波函数和能量。见 en.wikipedia.org/wiki/Hooke's_atom。

9.4 变分法求解基态氦

在上节中, 我们将氦原子的哈密顿算符写作 $\hat{H} = \hat{H}^0 + \hat{H}'$, 其中 $\hat{H}^0$ 的基态本征函数 $\psi_g^{(0)}$ 由 (9.49) 给出。若我们在变分积分中, 用零级微扰理论基态波函数 $\psi_g^{(0)}$ 作为变分函数 ϕ 会发生什么呢? 变分积分 $\langle \phi | \hat{H} | \phi \rangle = \langle \phi | \hat{H} \phi \rangle$ 将变为

$$\begin{aligned} \langle \phi | \hat{H} | \phi \rangle &= \langle \psi_g^{(0)} | \hat{H}^0 + \hat{H}' | \psi_g^{(0)} \rangle = \langle \psi_g^{(0)} | \hat{H}^0 \psi_g^{(0)} + \hat{H}' \psi_g^{(0)} \rangle \\ &= \langle \psi_g^{(0)} | E_g^{(0)} \psi_g^{(0)} \rangle + \langle \psi_g^{(0)} | \hat{H}' \psi_g^{(0)} \rangle = E_g^{(0)} + E_g^{(1)} \end{aligned} \quad (9.55)$$

因为 $\hat{H} \psi_g^{(0)} = E_g^{(0)} \psi_g^{(0)}$ 、 $\langle \psi_g^{(0)} | \psi_g^{(0)} \rangle = 1$, 以及 $E_g^{(1)} = \langle \psi_g^{(0)} | \hat{H}' | \psi_g^{(0)} \rangle$ [式 (9.22)]。使用 $\psi_g^{(0)}$ 作为变分函数得到了与一级变分理论相同的结果。

现在, 考虑氦原子基态的变分函数。如果我们使用 $\psi_n^{(0)}$ [式 (9.49)] 作为试探函数, 会得到一级微扰结果 -74.82 eV 。为了改进这一结果, 我们在 (9.49) 中引入一个变分参数。我们尝试归一化函数

$$\phi = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\zeta}{a_0} \right)^3 e^{-\zeta r_1/a_0} e^{-\zeta r_2/a_0} \quad (9.56)$$

该函数通过将 (9.49) 中真实核电荷数 Z 替换为试探参数 ζ (Zeta) 而得。 ζ 有一个简单的物理解释。由于一个电子往往会将另一个电子屏蔽在原子核之外, 因此每个电子所带的有效核电荷略小于全核电荷 Z 。如果一个电子将另一个电子完全屏蔽在原子核之外, 我们就会得到 $Z - 1$ 的有效核电荷。由于两个电子位于同一轨道, 它们只能部分地相互屏蔽。因此, 我们希望 ζ 介于 $Z - 1$ 和 Z 之间。

现在我们来计算变分积分。为了方便起见, 我们将氦哈密顿算符 (9.39) 重写为

$$\hat{H} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_1^2 - \frac{\zeta e^2}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_2^2 - \frac{\zeta e^2}{4\pi\epsilon_0 r_2} \right] + (\zeta - Z) \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_1} + (\zeta - Z) \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_2} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \quad (9.57)$$

其中涉及 ζ 的项被相加和相减。(9.57) 中括号内的项是有效核电荷 ζ 的两个类氢哈密顿量的总和。此外, 试探函数 (9.56) 是核电荷 ζ 的两个类氢 $1s$ 函数的乘积。因此, 当这些项作用于 ϕ 时, 我们

就得到了一个本征方程，本征值是核电荷 ζ 的两个类氢 $1s$ 的能量之和：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_1^2 - \frac{\zeta e^2}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_2^2 - \frac{\zeta e^2}{4\pi\epsilon_0 r_2} \right] \phi = -\zeta^2 (2) \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a_0} \phi \quad (9.58)$$

使用 (9.57) 和 (9.58)，我们可以计算变分积分

$$\begin{aligned} \int \phi^* \hat{H} \phi \, d\tau &= -\zeta^2 \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0} \int \phi^* \phi \, d\tau + \frac{(\zeta - Z) e^2}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\phi^* \phi}{r_1} \, d\tau \\ &\quad + \frac{(\zeta - Z) e^2}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\phi^* \phi}{r_2} \, d\tau + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\phi^* \phi}{r_{12}} \, d\tau \end{aligned} \quad (9.59)$$

设 f_1 表示核电荷为 ζ 的类氢 $1s$ 轨道，由电子 1 占据。设 f_2 为电子 2 的类似函数，则

$$f_1 = \frac{1}{\pi^{1/2}} \left(\frac{\zeta}{a_0} \right)^{3/2} e^{-\zeta r_1/a_0}, \quad f_2 = \frac{1}{\pi^{1/2}} \left(\frac{\zeta}{a_0} \right)^{3/2} e^{-\zeta r_2/a_0} \quad (9.60)$$

注意到 $\phi = f_1 f_2$ ，现在我们来计算积分 (9.59)：

$$\begin{aligned} \int \phi^* \phi \, d\tau &= \int \int f_1^* f_2^* f_1 f_2 \, d\tau_1 \, d\tau_2 = \int f_1^* f_1 \, d\tau_1 \int f_2^* f_2 \, d\tau_2 = 1 \\ \int \frac{\phi^* \phi}{r_1} \, d\tau &= \int \frac{f_1^* f_1}{r_1} \, d\tau_1 \int f_2^* f_2 \, d\tau_2 = \int \frac{f_1^* f_1}{r_1} \, d\tau_1 \\ &= \frac{1}{\pi} \frac{\zeta^3}{a_0^3} \int_0^\infty e^{-2\zeta r_1/a_0} \frac{r_1^2}{r_1} \, dr_1 \int_0^\pi \sin \theta_1 \, d\theta_1 \int_0^{2\pi} d\phi_1 = \frac{\zeta}{a_0} \end{aligned}$$

其中用到了附录中的积分 (A.8)。同样地，

$$\int \frac{\phi^* \phi}{r_2} \, d\tau = \int \frac{f_2^* f_2}{r_2} \, d\tau_2 = \int \frac{f_1^* f_1}{r_1} \, d\tau_1 = \frac{\zeta}{a_0}$$

因为在定积分中，虚拟变量的下标是 1 还是 2 并不重要。最终，我们必须计算积分 $(e^2/4\pi\epsilon_0) \int (\phi^* \phi / r_{12}) \, d\tau$ 。除了 Z 被替换为 ζ 外，该积分与微扰法处理中的积分 (9.52) 相同。因此，根据 (9.53)，我们有

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\phi^* \phi}{r_{12}} \, d\tau = \frac{5\zeta e^2}{32\pi\epsilon_0 a_0}$$

因此，变分积分 (9.59) 的值为

$$\int \phi^* \hat{H} \phi \, d\tau = \left(\zeta^2 - 2Z\zeta + \frac{5}{8}\zeta \right) \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0} \quad (9.61)$$

检查一下，如果我们在 (9.61) 中令 $\zeta = Z$ ，就会得到一级微扰结果，即 (9.50) 加上 (9.53)。

现在我们来改变 ζ 的值，使得变分积分最小化：

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \zeta} \int \phi^* \hat{H} \phi \, d\tau &= \left(2\zeta - 2Z + \frac{5}{8} \right) \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0} = 0 \\ \zeta &= Z - \frac{5}{16} \end{aligned} \quad (9.62)$$

正如预期的那样，有效核电荷介于 Z 和 $Z - 1$ 之间。使用 (9.62) 和 (9.61)，我们得到：

$$\int \phi^* \hat{H} \phi \, d\tau = \left(-Z^2 + \frac{5}{8}Z - \frac{25}{256} \right) \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0} = - \left(Z - \frac{5}{16} \right)^2 \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0} \quad (9.63)$$

令 $Z = 2$ ，我们得到氮原子基态能量的近似值 $-(27/16)^2 (e^2/4\pi\epsilon_0 a_0) = -(729/256) 2 (13.604 \text{ eV}) = -77.48 \text{ eV}$ ，与实验值 -79.00 eV 相比。使用 ζ 代替 Z 将误差从 5.3% 减少到 1.9%。与变分原理一致，基态能量的真实值小于变分积分。

如何改进我们的变分结果？我们可以试试具有 (9.56) 一般形式的函数，即两个函数的乘积，每个电子一个函数：

$$\phi = u(1)u(2) \quad (9.64)$$

不过，我们可以尝试在 (9.64) 中使用各种函数 u ，而不是 (9.56) 中使用的单一指数函数。我们将在第 11.1 节中讨论如何系统地找到能给出最小变分值的函数 u 。这一过程表明，在 (9.64) 中选择最佳 u 时，变分积分等于 -77.86 eV ，误差仍为 1.5%。我们可能会问，无论我们用什么形式来表示 u ，为什么 (9.64) 不能给出真正的基态能量。答案是：当我们把试探函数写成每个电子的单独函数的乘积时，我们是在做近似计算。由于哈密顿算符中的 $e^2/4\pi\epsilon_0 r_{12}$ 项，氦原子薛定谔方程无法分离变量，则基态波函数不能写成每个电子单独函数的乘积。要获得真正的基态能量，我们必须超越形式为 (9.64) 的函数。

玻尔模型给出了氢原子的正确能量，但应用于氦原子时却失败了。因此，在量子力学的早期，证明新理论能够准确地处理氦原子是非常重要的。关于氦基态的开创性工作是由 Hylleraas 在 1928-1930 年间完成的。为了考虑一个电子对另一个电子运动的影响，Hylleraas 使用了包含电子间距 r_{12} 的变分函数。他使用的其中一个函数为

$$\phi = N [e^{-\zeta r_1/a_0} e^{-\zeta r_2/a_0} (1 + br_{12})] \quad (9.65)$$

其中 N 是归一化常数， ζ 和 b 是变分参数。由于

$$r_{12} = [(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2]^{1/2} \quad (9.66)$$

函数 (9.65) 超越了简单的乘积形式 (9.64)。对含参数的变分积分求最小值，得到 $\zeta = 1.849$ ， $b = 0.364/a_0$ ，基态能量为 -78.7 eV ，误差为 0.3 eV 。 $1 + br_{12}$ 项的引入使得波函数的值在大 r_{12} 值时变大。这是理所应当的，因为电子之间的斥力使得电子在能量上更有利于避开对方。使用包含 r_{12} 的更复杂的六项试探函数，Hylleraas 得到的能量仅比真实的基态能量高出 0.01 eV 。

其他人对 Hylleraas 的工作进行了扩展。Pekeris 使用 1078 项的变分函数，求出基态能量为 $-2.903724375 (e^2/4\pi\epsilon_0 a_0)$ [C. L. Pekeris, *Phys. Rev.*, **115**, 1216 (1959)]。加上相对论修正和核运动修正，得出了氦的电离能 E_i ， $E_i/hc = 198310.69 \text{ cm}^{-1}$ ，与实验值 $E_i/hc = 198310.67 \text{ cm}^{-1}$ 相比较。通过获得能量为 $-2.90372437703 (e^2/4\pi\epsilon_0 a_0)$ ，Frankowski 和 Pekeris 改进了 Pekeris 的结果 [K. Frankowski and C. L. Pekeris, *Phys. Rev.*, **146**, 46 (1966)]。Drake 和 Yan 使用含有 r_{12} 的线性变分函数计算了 He 的基态能量和许多激发态能量，其精确度被认为可以达到 $1/10^{14}$ 或更高 [G. W. F. Drake and Z-C. Yan, *Chem. Phys. Lett.*, **229**, 486 (1994); *Phys. Rev. A*, **46**, 2378 (1992)]。这些工作者同样计算出了 Li 基态和两个激发态的变分能量，精确度达到或超过 $1/10^9$ [Z-C. Yan and G. W. F. Drake, *Phys. Rev. A*, **52**, 3711 (1995)]。加上相对论和核运动修正，Drake 和 Yan 发现理论计算和实验光谱之间的氦和锂转变频率非常吻合。通过对变分函数中不断增加的项数进行一系列变分计算，并推导到无限项数的极限，Drake 和合作者发现了以下非相对论、无限核质量 He 的基态能量： $-2.90372437703411959831 (e^2/4\pi\epsilon_0 a_0)$ ，据信精确到 21 位有效数字 [G. W. F. Drake et al., *Phys. Rev. A*, **65**, 054501 (2002)]。

9.5 简并能级的微扰理论

我们现在考虑对简并度为 d 的能级进行微扰处理。我们有 d 个线性无关的无扰本征函数对应于简并能级。使用标签 $1, 2, \dots$ 来标记这些简并态，但这并不意味着它们是能量最低的状态。无扰薛定谔方程为

$$\hat{H}^0 \psi_n^{(0)} = E_n^{(0)} \psi_n^{(0)} \quad (9.67)$$

其中

$$E_1^{(0)} = E_2^{(0)} = \dots = E_d^{(0)} = E_d^{(0)} \quad (9.68)$$

围绕问题为

$$\hat{H}\psi_n = E_n\psi_n \quad (9.69)$$

$$\hat{H} = \hat{H}^0 + \lambda\hat{H}' \quad (9.70)$$

随着 λ 趋于零, (9.69) 的本征值趋于 (9.67) 的本征值, 我们有 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} E_n = E_n^{(0)}$ 。图9.2显示了一个假设的, 具有六种状态和三重简并的无扰系统。注意: 微扰会导致简并能级的分裂。在某些情况下, 微扰可能对简并没有影响, 或只能部分消除简并现象。




图 9.2: 微扰对能级的作用。

随着 $\lambda \rightarrow 0$, 满足 (9.69) 的本征函数逐渐靠近满足 (9.67) 的本征函数。这是否意味着 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \psi_n = \psi_n^{(0)}$? 不一定。若 $E_n^{(0)}$ 是非简并的, 则只有唯一的 $\hat{H}^0$ 的归一化本征函数, 其本征值为 $E_n^{(0)}$, 我们可以断定 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \psi_n = \psi_n^{(0)}$ 。然而, 当 $E_n^{(0)}$ 是 d 重简并时, 任何线性组合 (第3.6节)

$$c_1\psi_1^{(0)} + c_2\psi_2^{(0)} + \dots + c_d\psi_d^{(0)} \quad (9.71)$$

都是 (9.67) 的解, 本征值也为 (9.68)。线性无关的归一化函数集 $\psi_1^{(0)}, \psi_2^{(0)}, \dots, \psi_d^{(0)}$ (我们将其用作对应于简并能级的本征函数) 并不是唯一的。利用 (9.71), 我们可以为简并能级构造出无穷多组由 d 个线性无关的归一化特征函数构成的函数组。就无扰问题而言, 这样的集合与其他集合一样好。例如, 对于氢原子三重简并的 $2p$ 态, 我们可以使用 $2p_1$ 、 $2p_0$ 和 $2p_{-1}$ 作为基态函数, 也可以使用 $2p_x$ 、 $2p_y$ 和 $2p_z$, 或其他一些由三个线性无关的函数组成的集合, 这些函数是由前述集合的元素线性组合而成的。对于与 d 重简并无扰能级相对应的微扰本征函数, 我们只能说, 当 λ 接近零时, 它们各自接近无扰本征函数的线性组合:

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \psi_n = \sum_{i=1}^d c_i \psi_i^{(0)}, \quad 1 \leq n \leq d \quad (9.72)$$

因此, 我们第一个任务是确定微扰项 $\hat{H}'$ 的校正零级波函数 (9.72) (correct zeroth-order wave functions)。回忆这些校正零级波函数 $\phi_n^{(0)}$, 我们有

$$\phi_n^{(0)} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \psi_n = \sum_{i=1}^d c_i \psi_i^{(0)}, \quad 1 \leq n \leq d \quad (9.73)$$

每个不同的 $\phi_n^{(0)}$ 在 (9.73) 中都有一种不同的系数。校正零级波函数组取决于微扰项 $\hat{H}'$ 的形式。

$$H'_{mi} \equiv \langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_i^{(0)} \rangle$$

若该线性齐次方程组有非平凡解，则系数行列式必须为零 (第8.4节):

$$\det [\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_i^{(0)} \rangle - E_n^{(1)} \delta_{mi}] = 0 \quad (9.82)$$

$$\begin{vmatrix} H'_{11} - E_n^{(1)} & H'_{12} & \cdots & H'_{1d} \\ H'_{21} & H'_{22} - E_n^{(1)} & \cdots & H'_{2d} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H'_{d1} & H'_{d2} & \cdots & H'_{dd} - E_n^{(1)} \end{vmatrix} = 0 \quad (9.83)$$

久期方程 (9.83) (secular equation) 是关于 $E_n^{(1)}$ 的 d 次代数方程。它有 d 个根, $E_1^{(1)}, E_2^{(1)}, \dots, E_d^{(1)}$, 是对 d 重简并无扰能级能量的一级校正。如果所有根都不同, 那么微扰的一级校正就把 d 重简并的无扰能级分成了 d 个不同的受扰能级 (通过一级校正):

$$E_d^{(0)} + E_1^{(1)}, \quad E_d^{(0)} + E_2^{(1)}, \quad \dots, \quad E_d^{(0)} + E_d^{(1)}$$

如果久期方程的两个或更多根是相等的, 则一级中简并能级未完全消除。在本节的剩余部分中, 我们假设 (9.83) 的所有根都是不同的。

找到 d 个一级能量校正后, 我们回到方程组 (9.81) 来求未知数 c_i , 它决定了校正零级波函数。为了找到与根 $E_n^{(1)}$ 相对应的校正零级波函数

$$\phi_n^{(0)} = c_1 \psi_1^{(0)} + c_2 \psi_2^{(0)} + \dots + c_d \psi_d^{(0)} \quad (9.84)$$

我们用 c_1 求解 (9.81) 中的 $c_2, c_3, \dots, c_d$, 随后通过归一化确定 c_1 。在 (9.79) 中使用 $\langle \phi^{(0)} | \phi^{(0)} \rangle = 1$, 我们得到 (问题 9.21)

$$\sum_{k=1}^d |c_k|^2 = 1 \quad (9.85)$$

对于每个根 $E_n^{(1)}$, $n = 1, 2, \dots, d$, 我们有一组不同的系数组 $c_1, c_2, \dots, c_d$, 得到不同的校正零级波函数。

在下一节中, 我们将证明

$$E_n^{(1)} = \langle \phi_n^{(0)} | \hat{H}' | \phi_n^{(0)} \rangle, \quad n = 1, 2, \dots, d \quad (9.86)$$

与非简并态的公式 (9.22) 类似, 不过需要使用校正零级波函数。

利用与非简并情况类似的步骤, 我们现在可以找到对校正零阶波函数的一级校正和二级能量校正。结果见 *Bates, Volume I, pages 197–198; Hamerka, pages 230–231*。

举一个例子, 考虑微扰项 $\hat{H}'$ 作用于立方势箱中粒子最低的简并能级。我们三个状态与该能级相对应: $\psi_{211}^{(0)}$ 、 $\psi_{121}^{(0)}$ 和 $\psi_{112}^{(0)}$ 。这些无扰波函数是正交的, 久期方程 (9.83) 为

$$\begin{vmatrix} \langle 211 | \hat{H}' | 211 \rangle - E_n^{(1)} & \langle 211 | \hat{H}' | 121 \rangle & \langle 211 | \hat{H}' | 112 \rangle \\ \langle 121 | \hat{H}' | 211 \rangle & \langle 121 | \hat{H}' | 121 \rangle - E_n^{(1)} & \langle 121 | \hat{H}' | 112 \rangle \\ \langle 112 | \hat{H}' | 211 \rangle & \langle 112 | \hat{H}' | 121 \rangle & \langle 112 | \hat{H}' | 112 \rangle - E_n^{(1)} \end{vmatrix} = 0 \quad (9.87)$$

解出该方程, 我们得到一级能量校正: $E_1^{(1)}$ 、 $E_2^{(1)}$ 和 $E_3^{(1)}$ 。三重简并的无扰能级分裂为三个不同的能级 (通过第一顺序): $(6h^2/8ma^2) + E_1^{(1)}$ 、 $(6h^2/8ma^2) + E_2^{(1)}$ 、 $(6h^2/8ma^2) + E_3^{(1)}$ 。分别使用根 $E_1^{(1)}$ 、 $E_2^{(1)}$ 和 $E_3^{(1)}$, 我们可以得到不同的方程组 (9.81)。求出每个方程, 我们得到三组系数, 它们决定了三个校正零级波函数。

如果您对矩阵代数比较熟悉, 可以注意到: 求解 (9.83) 和 (9.81) 等价于求元素为 $\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_i^{(0)} \rangle$ 的矩阵的本征值和本征向量。

9.6 久期方程的简化

若久期行列式的某些非对角元素为零, 则久期方程 (9.83) 可以简化。在最有利情况下, 所有非对角元素都为零, 久期方程变为

$$\begin{vmatrix} H'_{11} - E_n^{(1)} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & H'_{22} - E_n^{(1)} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & H'_{dd} - E_n^{(1)} \end{vmatrix} = 0 \quad (9.88)$$

$$\begin{aligned} (H'_{11} - E_n^{(1)}) (H'_{22} - E_n^{(1)}) \cdots (H'_{dd} - E_n^{(1)}) &= 0 \\ E_1^{(1)} = H'_{11}, \quad E_2^{(1)} = H'_{22}, \quad \dots, \quad E_d^{(1)} = H'_{dd} \end{aligned} \quad (9.89)$$

现在我们想知道零级校正波函数。假设 (9.89) 的根都是不同的。对于根 $E_n^{(1)} = H'_{11}$ 方程组 (9.81) 为

$$\begin{aligned} 0 &= 0 \\ (H'_{22} - H'_{11}) c_2 &= 0 \\ \dots &\dots \dots \dots \\ (H'_{dd} - H'_{11}) c_d &= 0 \end{aligned}$$

由于我们假设所有根都不相等, 则 $H'_{22} - H'_{11}, H'_{33} - H'_{11}, \dots, H'_{dd} - H'_{11}$ 都不为零, 因此 $c_2 = c_3 = \dots = c_d = 0$ 。归一化条件 (9.85) 给出 $c_1 = 1$ 。对应于能量一级微扰校正 H'_{11} 的零级校正波函数为 [式 (9.73)] $\phi_1^{(0)} = \psi_1^{(0)}$ 。对于根 H'_{22} , 同样的理由给出 $\phi_2^{(0)} = \psi_2^{(0)}$ 。若久期行列式为对角行列式, 则最初假设的波函数 $\psi_1^{(0)}, \psi_2^{(0)}, \dots, \psi_d^{(0)}$ 就是微扰 $\hat{H}'$ 的零级校正波函数。

反之亦然。若最初假设的波函数是零级校正波函数, 则久期行列式的非对角元素为零。具体情况如下。由 $\phi_1^{(0)} = \psi_1^{(0)}$ 我们得知, 展开式 $\phi_1^{(0)} = \sum_{i=1}^d c_i \psi_i^{(0)}$ 中, $c_1 = 1, c_2 = c_3 = \dots = c_d = 0$, 所以若 $n = 1$, 则方程组 (9.81) 变为

$$H'_{11} c_1 - E_1^{(1)} = 0, \quad H'_{21} = 0, \quad \dots, \quad H'_{d1} = 0$$

将同样地推理应用于剩余的函数 $\phi_n^{(0)}$, 得出对 $i \neq m$, 有 $H'_{mi} = 0$ 。因此, 零级校正波函数的使用使得久期行列式得以对角化。还需要注意的是, 通过对零级校正波函数的微扰求平均值, 可以得到能量的一级校正:

$$E_n^{(1)} = H'_{nn} = \langle \phi_n^{(0)} | \hat{H}' | \phi_n^{(0)} \rangle \quad (9.90)$$

通常, 久期行列式不是对角形式, 而是块对角形式。例如, 我们可能有

$$\begin{vmatrix} H'_{11} - E_n^{(1)} & H'_{12} & 0 & 0 \\ H'_{21} & H'_{22} - E_n^{(1)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & H'_{33} - E_n^{(1)} & H'_{34} \\ 0 & 0 & H'_{43} & H'_{44} - E_n^{(1)} \end{vmatrix} = 0 \quad (9.91)$$

(9.91) 中的久期行列式与带有 $S_{ij} = \delta_{ij}$ 的线性变分久期方程 (8.65) 中久期行列式的形式相同。根据同样的推理过程, 可以得出: 两个变分函数是 f_1 和 f_2 的线性组合, 两个是 f_3 和 f_4 的线性组合, 因此两个零级校正波函数是 $\psi_1^{(0)}$ 和 $\psi_2^{(0)}$ 的线性组合, 另两个是 $\psi_3^{(0)}$ 和 $\psi_4^{(0)}$ 的线性组合:

$$\begin{aligned} \phi_1^{(0)} &= c_1 \psi_1^{(0)} + c_2 \psi_2^{(0)}, & \phi_2^{(0)} &= c'_1 \psi_1^{(0)} + c'_2 \psi_2^{(0)} \\ \phi_3^{(0)} &= c_3 \psi_3^{(0)} + c_4 \psi_4^{(0)}, & \phi_4^{(0)} &= c'_3 \psi_3^{(0)} + c'_4 \psi_4^{(0)} \end{aligned}$$

其中'符号用于表示不同的系数。

当简并微扰理论的久期行列式为块对角形式时，久期方程会分解为两个或多个较小的久期方程，系数 c_i 的联立方程组 (9.81) 也会分解为两个或多个较小的联立方程组。

相反地，如果我们有一个四重简并的无扰能级，且恰好知道 $\phi_1^{(0)}$ 和 $\phi_2^{(0)}$ 都只是 $\psi_1^{(0)}$ 和 $\psi_2^{(0)}$ 的线性组合，而 $\phi_3^{(0)}$ 和 $\phi_4^{(0)}$ 只是 $\psi_3^{(0)}$ 和 $\psi_4^{(0)}$ 的线性组合，则我们处理的是两个二阶久期行列式，而不是一个四阶久期行列式。

如何事先选择正确的零级波函数，从而简化久期方程？假设有一算符 $\hat{A}$ 同时与 $\hat{H}^0$ 和 $\hat{H}'$ 对易。我们可以选择无扰波函数为 $\hat{A}$ 的本征函数。由于 $\hat{A}$ 与 $\hat{H}^0$ 对易，若 $\psi_i^{(0)}$ 和 $\psi_j^{(0)}$ 对应于算符 $\hat{A}$ 的不同本征值 [见式 (7.50)]，则无扰函数的选择将使积分 H'_{ij} 消失。因此，若 $\hat{A}$ 的本征函数 $\psi_1^{(0)}, \psi_2^{(0)}, \dots, \psi_d^{(0)}$ 对应于不同的本征值，则久期行列式为对角形式，我们就得到了正确的零级波函数。若 $\hat{A}$ 的某些本征值是相同的，我们就得到了块对角而不是纯对角形式的久期行列式。一般来说，正确的零级函数将是具有相同 $\hat{A}$ 本征值的无扰函数的线性组合。（这是意料之中的，因为 $\hat{H}$ 与 $\hat{H} = \hat{H}^0 + \lambda \hat{H}'$ 对易，所以 $\hat{H}$ 的微扰本征函数可以选择成为 $\hat{A}$ 的本征函数。）例子见问题 9.23。

9.7 微扰理论处理氦原子第一激发态

第9.3节中，我们已经使用微扰理论处理了氦原子基态。现在我们将处理氦原子第一激发态。无扰能量由 (9.48) 给出。最低无扰激发态满足 $n_1 = 1, n_2 = 2$ 或 $n_1 = 2, n_2 = 1$ ，带入 (9.48)，我们得到

$$E_n^{(0)} = -\frac{5Z^2}{8} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0} \right) = -\frac{20}{8} 2 \left(\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a_0} \right) = -5 (13.606 \text{ eV}) = -68.03 \text{ eV} \quad (9.92)$$

回忆：类氢原子的 $n = 2$ 能级是四重简并的， $2s$ 和三个 $2p$ 态都具有相同的能量值。He 原子第一无扰激发态的能级是八重简并的。八个无扰波函数为 [式 (9.44)]：

$$\begin{aligned} \psi_1^{(0)} &= 1s(1)2s(2), & \psi_2^{(0)} &= 2s(1)1s(2), & \psi_3^{(0)} &= 1s(1)2p_x(2), & \psi_4^{(0)} &= 2p_x(1)1s(2) \\ \psi_5^{(0)} &= 1s(1)2p_y(2), & \psi_6^{(0)} &= 2p_y(1)1s(2), & \psi_7^{(0)} &= 1s(1)2p_z(2), & \psi_8^{(0)} &= 2p_z(1)1s(2) \end{aligned} \quad (9.93)$$

其中 $1s(1)2s(2)$ 表示电子 1 的类氢函数 $1s$ 和电子 2 的类氢函数 $2s$ 的乘积。例如 $\psi_8^{(0)}$ 的显式形式如下 (表6.2)：

$$\psi_8^{(0)} = \frac{1}{4(2\pi)^{1/2}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{5/2} r_1 e^{-Zr_1/2a_0} \cos\theta_1 \cdot \frac{1}{\pi^{1/2}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} r_2^2 e^{-Zr_2/a_0}$$

我们选择使用实 $2p$ 类氢轨道，而不是其他复函数轨道。

由于无扰能级是简并的，我们必须求解久期方程。久期方程 (9.83) 假设函数 $\psi_1^{(0)}, \psi_2^{(0)}, \dots, \psi_8^{(0)}$ 是正交的。该条件已经满足。例如，

$$\begin{aligned} \int \psi_1^{(0)*} \psi_1^{(0)} d\tau &= \int \int 1s(1)^* 2s(2)^* 1s(1) 2s(2) d\tau_1 d\tau_2 \\ &= \int |1s(1)|^2 d\tau_1 \int |2s(2)|^2 d\tau_2 = 1 \cdot 1 = 1 \\ \int \psi_3^{(0)*} \psi_5^{(0)} d\tau &= \int |1s(1)|^2 d\tau_1 \int 2p_x(2)^* 2p_y(2) d\tau_2 = 1 \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

其中用到了类氢轨道的正交性。

久期行列式包含 $8^2 = 64$ 个元素。算符 $\hat{H}'$ 是厄米算符， $H'_{ij} = (H'_{ji})^*$ 。同样地，由于 $\hat{H}'$ 是实算符， $\psi_1^{(0)}, \dots, \psi_8^{(0)}$ 是实函数，我们有 $(H'_{ji})^* = H'_{ij}$ ，即 $H'_{ij} = H'_{ji}$ 。久期行列式关于主对角线对称。这样一来，求积分的工作量几乎就减少了一半。

考虑使用宇称，可以证明：大部分的积分 H'_{ij} 为零。首先，考虑 H'_{13} ：

$$H'_{13} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} 1s(1) 2s(2) \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} 1s(1) 2p_x(2) dx_1 dy_1 dz_1 dx_2 dy_2 dz_2$$

类氢函数 s 只依赖于 $r = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$ ，因此是偶函数。 $2p_x(2)$ 是 x_2 的奇函数 [式 (6.119)]。 r_{12} 由 (9.66) 给出，如果我们将六个坐标反转， r_{12} 保持不变：

$$r_{12} \rightarrow [(-x_1 + x_2)^2 + (-y_1 + y_2)^2 + (-z_1 + z_2)^2]^{1/2} = r_{12}$$

因此，反转六个坐标，积分 H'_{13} 变为其相反数。那么 [式 (7.74)]， $H'_{13} = 0$ 。同样地， $H'_{14} = H'_{15} = H'_{16} = H'_{17} = H'_{18} = 0$ ； $H'_{23} = H'_{24} = H'_{25} = H'_{26} = H'_{27} = H'_{28} = 0$ 。现在考虑 H'_{35} ：

$$H'_{35} = \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} 1s(1) 2p_x(2) \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} 1s(1) 2p_y(2) dx_1 \dots dz_2$$

假设我们反转 x 坐标： $x_1 \rightarrow -x_1$ ， $x_2 \rightarrow -x_2$ 。该操作未改变 r_{12} ， $1s(1)$ 和 $2p_y(2)$ 也不受影响。然而， $2p_x(2)$ 变为其相反数，因此，净效果是将 H'_{35} 变为其相反数。所以 (问题 7.30)， $H'_{35} = 0$ 。同样地， $H'_{36} = H'_{37} = H'_{38} = 0$ ； $H'_{45} = H'_{46} = H'_{47} = H'_{48} = 0$ 。同样反转 $y_1 \rightarrow -y_1$ 和 $y_2 \rightarrow -y_2$ ，我们得到 $H'_{57} = H'_{58} = H'_{67} = H'_{68} = 0$ 。久期方程变为

$$\begin{vmatrix} b_{11} & H'_{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ H'_{12} & b_{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b_{33} & H'_{34} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & H'_{34} & b_{44} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b_{55} & H'_{56} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & H'_{56} & b_{66} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b_{77} & H'_{78} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & H'_{78} & b_{88} \end{vmatrix} = 0$$

$$b_{ii} \equiv H'_{ii} - E^{(1)}, \quad i = 1, 2, \dots, 8$$

久期行列式为块对角行列式，可以分解为四个行列式，每个二阶。可以得出零级校正波函数具有如下形式：

$$\begin{aligned} \phi_1^{(0)} &= c_1 \psi_1^{(0)} + c_2 \psi_2^{(0)}, & \phi_2^{(0)} &= \bar{c}_1 \psi_1^{(0)} + \bar{c}_2 \psi_2^{(0)} \\ \phi_3^{(0)} &= c_3 \psi_3^{(0)} + c_4 \psi_4^{(0)}, & \phi_4^{(0)} &= \bar{c}_3 \psi_3^{(0)} + \bar{c}_4 \psi_4^{(0)} \\ \phi_5^{(0)} &= c_5 \psi_5^{(0)} + c_6 \psi_6^{(0)}, & \phi_6^{(0)} &= \bar{c}_5 \psi_5^{(0)} + \bar{c}_6 \psi_6^{(0)} \\ \phi_7^{(0)} &= c_7 \psi_7^{(0)} + c_8 \psi_8^{(0)}, & \phi_8^{(0)} &= \bar{c}_7 \psi_7^{(0)} + \bar{c}_8 \psi_8^{(0)} \end{aligned} \quad (9.94)$$

其中，未加横杠的系数对应于每个二阶行列式的一个根，加横杠的系数对应于第二个根。

第一个行列式为

$$\begin{vmatrix} H'_{11} - E^{(1)} & H'_{12} \\ H'_{21} & H'_{22} - E^{(1)} \end{vmatrix} = 0 \quad (9.95)$$

我们有

$$\begin{aligned} H'_{11} &= \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} 1s(1) 2s(2) \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} 1s(1) 2s(2) dx_1 \dots dz_2 \\ H'_{11} &= \int \int [1s(1)]^2 [2s(2)]^2 \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} d\tau_1 d\tau_2 \\ H'_{22} &= \int \int [1s(2)]^2 [2s(1)]^2 \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} d\tau_1 d\tau_2 \end{aligned}$$

积分变量是虚拟变量，可以用任何符号表示。我们使用如下方法标记 H'_{22} 中的积分：交换 x_1 和 x_2 ， y_1 和 y_2 ， z_1 和 z_2 。该过程没有改变 r_{12} [式 (9.66)]，因此

$$H'_{22} = \int [1s(1)]^2 [2s(2)]^2 \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} d\tau_2 d\tau_1 = H'_{11} \quad (9.96)$$

同样的论证表明 $H'_{33} = H'_{44}$ ， $H'_{55} = H'_{66}$ ， $H'_{77} = H'_{88}$ 。

我们使用符号 J_{1s2s} 表示积分 H'_{11} ：

$$H'_{11} = J_{1s2s} = \int [1s(1)]^2 [2s(2)]^2 \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} d\tau_1 d\tau_2 \quad (9.97)$$

这是一个**库仑积分** (Coulomb integral) 的例子，之所以叫库仑积分，是因为 J_{1s2s} 等于概率密度函数为 $[1s]^2$ 的电子和概率密度函数为 $[2s]^2$ 的电子之间的静电排斥能。

积分 H'_{12} 用 K_{1s2s} 表示：

$$H'_{12} = K_{1s2s} = \int 1s(1) 2s(2) \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} 2s(1) 1s(2) d\tau_1 d\tau_2 \quad (9.98)$$

这是一个**交换积分** (exchange integral)： $\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}}$ 左右两侧的积分之间的区别在于电子 1 和电子 2 的交换。

库仑积分 J_{mn} 和交换积分 K_{mn} 的一般定义如下：

$$J_{mn} \equiv \langle f_m(1) f_n(2) | e^2 / 4\pi\epsilon_0 r_{12} | f_m(1) f_n(2) \rangle \quad (9.99)$$

$$K_{mn} \equiv \langle f_m(1) f_n(2) | e^2 / 4\pi\epsilon_0 r_{12} | f_n(1) f_m(2) \rangle \quad (9.100)$$

其中的积分是对电子 1 和 2 的全空间坐标进行积分， f_m 和 f_n 是空间轨道。

将 (9.96) 到 (9.98) 代入 (9.95)，我们得到

$$\begin{vmatrix} J_{1s2s} - E^{(1)} & K_{1s2s} \\ K_{1s2s} & J_{1s2s} - E^{(1)} \end{vmatrix} = 0 \quad (9.101)$$

$$\begin{aligned} (J_{1s2s} - E^{(1)})^2 &= K_{1s2s}^2 \\ E_1^{(1)} &= J_{1s2s} - K_{1s2s}, \quad E_2^{(1)} = J_{1s2s} + K_{1s2s} \end{aligned} \quad (9.102)$$

现在我们寻找对应于这两个根的零级校正波函数的系数。在 (9.81) 中使用 $E_1^{(1)}$ ，得到

$$\begin{aligned} K_{1s2s} c_1 + K_{1s2s} c_2 &= 0 \\ K_{1s2s} c_1 + K_{1s2s} c_2 &= 0 \end{aligned}$$

因此 $c_2 = -c_1$ 。根据归一化条件，有

$$\begin{aligned} \langle \phi_1^{(0)} | \phi_1^{(0)} \rangle &= \langle c_1 \psi_1^{(0)} - c_1 \psi_2^{(0)} | c_1 \psi_1^{(0)} - c_1 \psi_2^{(0)} \rangle = |c_1|^2 + |c_1|^2 = 1 \\ c_1 &= 2^{-1/2} \end{aligned}$$

其中我们用到了 $\psi_1^{(0)}$ 和 $\psi_2^{(0)}$ 的正交性。对应于 $E_1^{(1)}$ 的零级校正波函数为

$$\phi_1^{(0)} = 2^{-1/2} (\psi_1^{(0)} - \psi_2^{(0)}) = 2^{-1/2} [1s(1)2s(2) - 2s(1)1s(2)] \quad (9.103)$$

同样地，我们可以得到对应于 $E_2^{(1)}$ 的零级校正波函数：

$$\phi_2^{(0)} = 2^{-1/2} (\psi_1^{(0)} + \psi_2^{(0)}) = 2^{-1/2} [1s(1)2s(2) + 2s(1)1s(2)] \quad (9.104)$$

我们还有三个二阶行列式需要处理：

$$\begin{vmatrix} H'_{33} - E^{(1)} & H'_{34} \\ H'_{34} & H'_{44} - E^{(1)} \end{vmatrix} = 0 \quad (9.105)$$

$$\begin{vmatrix} H'_{55} - E^{(1)} & H'_{56} \\ H'_{56} & H'_{66} - E^{(1)} \end{vmatrix} = 0 \quad (9.106)$$

$$\begin{vmatrix} H'_{77} - E^{(1)} & H'_{78} \\ H'_{78} & H'_{88} - E^{(1)} \end{vmatrix} = 0 \quad (9.107)$$

考虑 H'_{33} 和 H'_{55} ：

$$H'_{33} = \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} 1s(1)2p_x(2) \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} 1s(1)2p_x(2) dx_1 \cdots dz_2$$

$$H'_{55} = \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} 1s(1)2p_y(2) \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} 1s(1)2p_y(2) dx_1 \cdots dz_2$$

这两个积分是相等的——它们唯一的区别是将 $2p_x(2)$ 替换为 $2p_y(2)$ ——这两个轨道只是空间取向不同。更正式地说，如果我们根据方案 $x_2 \rightarrow y_2, y_2 \rightarrow x_2, x_1 \rightarrow y_1, y_1 \rightarrow x_1$ 对 H'_{33} 中的虚拟积分变量进行重新标注，那么 r_{12} 保持不变，则 H'_{33} 变为 H'_{55} 。同样地理由表明 $H'_{77} = H'_{33}$ 。在这些库仑积分中引入符号 J_{1s2p} ，我们有：

$$H'_{33} = H'_{55} = H'_{77} = J_{1s2p} = \int \int 1s(1)2p_z(2) \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} 1s(1)2p_z(2) d\tau_1 d\tau_2$$

同样地，有关 $2p$ 轨道的交换积分也相等：

$$H'_{34} = H'_{56} = H'_{78} = K_{1s2p} = \int \int 1s(1)2p_z(2) \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} 2p_z(1)1s(2) d\tau_1 d\tau_2$$

因此，(9.105) 至 (9.107) 三个行列式完全相同，其形式为

$$\begin{vmatrix} J_{1s2p} - E^{(1)} & K_{1s2p} \\ K_{1s2p} & J_{1s2p} - E^{(1)} \end{vmatrix} = 0$$

该行列式与 (9.101) 相似，类比 (9.102)-(9.104) 可得

$$E_3^{(1)} = E_5^{(1)} = E_7^{(1)} = J_{1s2p} - K_{1s2p} \quad (9.108)$$

$$E_4^{(1)} = E_6^{(1)} = E_8^{(1)} = J_{1s2p} + K_{1s2p} \quad (9.109)$$

$$\begin{aligned} \phi_3^{(0)} &= 2^{-1/2} [1s(1)2p_x(2) - 1s(2)2p_x(1)] \\ \phi_4^{(0)} &= 2^{-1/2} [1s(1)2p_x(2) + 1s(2)2p_x(1)] \\ \phi_5^{(0)} &= 2^{-1/2} [1s(1)2p_y(2) - 1s(2)2p_y(1)] \\ \phi_6^{(0)} &= 2^{-1/2} [1s(1)2p_y(2) + 1s(2)2p_y(1)] \\ \phi_7^{(0)} &= 2^{-1/2} [1s(1)2p_z(2) - 1s(2)2p_z(1)] \\ \phi_8^{(0)} &= 2^{-1/2} [1s(1)2p_z(2) + 1s(2)2p_z(1)] \end{aligned} \quad (9.110)$$

电子间排斥势 $e^2/4\pi\epsilon_0 r_{12}$ 部分消除了简并的现象。假设的八重简并无扰能级裂分为与组态 $1s2s$ 相关的两个非简并能级和两个与组态 $2s2p$ 相关的三重简并能级。人们可能认为，高级能量校正会进一步解决简并问题。事实上，要完全消除简并，需要施加外磁场。由于微扰 $e/4\pi\epsilon_0 a_0$ 项未完全消除

简并，任何 $\phi_3^{(0)}, \phi_5^{(0)}, \phi_7^{(0)}$ 的归一化线性组合和 $\phi_4^{(0)}, \phi_6^{(0)}, \phi_8^{(0)}$ 的归一化线性组合都可以是零级校正波函数。

为了计算 (9.102) 和 (9.108) 中的库仑积分和交换积分，我们使用问题 9.14 中给出的 $1/r_{12}$ 的展开式。结果为

$$\begin{aligned} J_{1s2s} &= \left(\frac{17}{81}\right) \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 a_0} = 11.42 \text{ eV}, & J_{1s2p} &= \left(\frac{59}{243}\right) \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 a_0} = 13.21 \text{ eV} \\ K_{1s2s} &= \left(\frac{16}{729}\right) \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 a_0} = 1.19 \text{ eV}, & K_{1s2p} &= \left(\frac{112}{6561}\right) \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 a_0} = 0.93 \text{ eV} \end{aligned} \quad (9.111)$$

其中 $Z = 2$, $e^2/4\pi\epsilon_0 a_0 = 13.606 \text{ eV}$ 。回忆 $E^{(0)} = -68.03 \text{ eV}$ ，我们得到 (图9.3)：




图 9.3: 氦原子第一激发态。


$$\begin{aligned} E^{(0)} + E_1^{(1)} &= E^{(0)} + J_{1s2s} - K_{1s2s} = -57.8 \text{ eV} \\ E^{(0)} + E_2^{(1)} &= E^{(0)} + J_{1s2s} + K_{1s2s} = -55.4 \text{ eV} \\ E^{(0)} + E_3^{(1)} &= E^{(0)} + J_{1s2p} - K_{1s2p} = -55.75 \text{ eV} \\ E^{(0)} + E_4^{(1)} &= E^{(0)} + J_{1s2p} + K_{1s2p} = -53.9 \text{ eV} \end{aligned}$$

能量的一级校正似乎表明：组态 $1s2p$ 的两个较低的能级能量比 $1s2s$ 组态两个较高能级的能量低。对氦光谱的研究表明，事实并非如此。该误差由忽略能量的高级微扰校正造成。

Knight 和 Scherr 使用变分-微扰法（第 9.2 节）计算了这四个激发水平的二级和三级校正 $E^{(2)}$ 和 $E^{(3)}$ 。[R. E. Knight and C. W. Scherr, *Rev. Mod. Phys.*, **35**, 431 (1963). 十七级能量校正见 F. C. Sanders and C. W. Scherr, *Phys. Rev.*, **181**, 84 (1969).] 图9.4展示了他们的成果（与实验值相差 0.1 eV）。图9.4表明图9.3并不准确。因为微扰项 $e^2/4\pi\epsilon_0 r_{12}$ 并不真的很小，只包含 $E^{(1)}$ 校正的微扰处理无法给出准确的结果。

波函数的一级校正 $\psi^{(1)}$ 引入了其他组态的贡献（组态相互作用）。当我们说某个能级属于组态 $1s2s$ 时，我们指出的是对真实波函数贡献最大的组态。

我们从八个简并的零级波函数 (9.93) 开始。这些函数有三种兼并方式。一是具有相同 n 但不同 l 值的类氢函数之间的简并， $2s$ 和 $2p$ 函数具有相同的能量。二是相同 n 和 l 但不同 m 值之间的简并， $2p_1, 2p_0, 2p_{-1}$ 函数具有相同的能量。（方便起见，我们使用实际波函数 $2p_{x,y,z}$ ，但是我们可以从函数 $2p_{1,0,-1}$ 开始。）最后，是仅在轨道间两个电子的交换上不同的函数之间的简并（全同粒子，译者注）；函数 $\psi_1^{(0)} = 1s(1)2s(2)$ 和 $\psi_2^{(0)} = 1s(2)2s(1)$ 有相同的能量。最后一种简并形式称为交换



He 第一激发态的 $E^{(0)} + E_{(1)} + E_{(2)} + E_{(3)}$

图 9.4: 能量。同时展示了 $1s2s$ 能级的零级校正波函数。

简并 (exchange degeneracy)。当我们引入电子间斥力 $e^2/4\pi\epsilon_0 r_{12}$ 作为微扰时，交换简并和与量子数 l 有关的简并不再存在。然而，与 m 有关的简并依然存在，每个氦 $1s2p$ 能级是三重简并的，在构建零级校正波函数时，我们完全可以使用 $2p_1$ 、 $2p_0$ 和 $2p_{-1}$ 轨道，而不是实际轨道。让我们来思考消除 l 简并和交换简并的理由。

He 中的电子间斥力使得 $2s$ 轨道能量低于 $2p$ 轨道。图 6.9 和 6.8 显示， $2s$ 电子比 $2p$ 电子更有可能比 $1s$ 电子更靠近原子核。 $2s$ 电子不会像 $1s$ 电子那样有效地屏蔽原子核，因此其能量低于 $2p$ 电子。[根据式 (6.94)，核电荷越高，能量越低。] 数学上来说， $1s2s$ 比 $1s2p$ 能量更低，导致了库仑积分 J_{1s2s} 小于 J_{1s2p} 。这些库仑积分表示适当电荷分布之间的静电斥力。当 $2s$ 电子穿透 $1s$ 电子的电荷分布时，它只受到 $1s$ 电荷分布中未穿透部分的斥力。因此， $1s - 2s$ 电子间斥力小于 $1s - 2p$ 电子间斥力，则 $1s2s$ 能级能量比 $1s2p$ 能级能量低。多电子原子中的电子间斥力消除了 l 的简并性，相同 n 值的轨道能量随着 l 的增加而增加。

现在考虑消除交换简并。我们开始进行微扰处理时使用的函数 (9.93) 将每个电子分配到一个确定的轨道上。例如，函数 $\psi_1^{(0)} = 1s(1)2s(2)$ 将电子 1 分配到 $1s$ 轨道，将电子 2 分配到 $2s$ 轨道。而 $\psi_2^{(0)}$ 恰好相反。久期行列式不是对角行列式，则最初的函数不是零级校正波函数。正确的零级函数不会将电子分配到一个确定的轨道上。因此前两个零级校正波函数为

$$\phi_1^{(0)} = 2^{-1/2} [1s(1)2s(2) - 1s(2)2s(1)], \quad \phi_2^{(0)} = 2^{-1/2} [1s(1)2s(2) + 1s(2)2s(1)]$$

我们无法确定电子 1 在 $\phi_1^{(0)}$ 或 $\phi_2^{(0)}$ 中处于哪个轨道。包含一个以上电子的系统波函数的这一特性源于量子力学中相同粒子的不可区分性 (全同粒子)，将在第 10 章中进一步讨论。由于函数 $\phi_1^{(0)}$ 和 $\phi_2^{(0)}$ 的能量不同，当使用零级校正波函数时，交换简并就被消除了。

9.8 含时微扰理论

在光谱学中，我们从一个处于某种定态的系统开始，将其置于电磁辐射 (光) 之下，然后观察该系统是否过渡到了另一定态。辐射会在哈密顿中引入一个随时间变化的势能项，因此我们必须使用含时薛定谔方程。这里最方便的方法是一种近似方法，称为含时微扰理论。

令系统 (原子或分子) 在没有辐射 (或其他随时间变化的微扰) 的情况下具有定态哈密顿量 $\hat{H}^0$ ，视 $\hat{H}'(t)$ 为含时微扰。无扰系统的定态薛定谔方程为

$$\hat{H}^0 \psi_k^0 = E_k^0 \psi_k^0 \quad (9.112)$$

其中 E_k^0 和 ψ_k^0 分别是无扰系统的能量和波函数。无辐射作用下的含时薛定谔方程 (7.97) 为

$$-\frac{\hbar}{i} \frac{\partial \Psi}{\partial t} = (\hat{H}^0 + \hat{H}') \Psi \quad (9.113)$$

其中态函数 Ψ 取决于与时间相关的空间坐标和自旋坐标 (用 q 表示): $\Psi = \Psi(q, t)$ 。(见第10章, 关于自旋的讨论。)

首先, 我们不考虑 $\hat{H}'(t)$ 。无扰含时薛定谔方程为

$$-(\hbar/i) \partial \Psi^0 / \partial t = \hat{H}^0 \Psi^0 \quad (9.114)$$

系统可能的定态函数由 (7.99) 给出: $\Psi_k^0 = \exp(-iE_k^0 t/\hbar) \psi_k^0$, 其中 ψ_k^0 是算符 $\hat{H}^0$ 的本征函数 [式 (9.112)]。每个 Ψ_k^0 都是 (9.114) 的解。此外, 线性组合

$$\Psi^0 = \sum_k c_k \Psi_k^0 = \sum_k c_k \exp(-iE_k^0 t/\hbar) \psi_k^0 \quad (9.115)$$

(其中 c_k 是任意与时间无关的常数) 也是含时薛定谔方程 (9.114) 的解, 正如导出 (7.100) 时的讨论。函数组 Ψ_k^0 构成一个完备集 (因为它们是厄米算符 $\hat{H}^0$ 的本征函数), 因此任何 (9.114) 的解都可以写成 (9.115) 的形式。那么 (9.115) 就是 (9.114) 的通解, 其中 $\hat{H}^0$ 与时间无关。

现在, 我们引入 $\hat{H}'(t)$ 。则 (9.115) 不再是含时薛定谔方程的解了。然而, 由于无扰函数组 Ψ_k^0 构成一个完备集, 在任意时刻的真实态函数 Ψ 可以根据 $\Psi = \sum_k b_k \Psi_k^0$ 来展开为 Ψ_k^0 函数组的线性组合。因为 $\hat{H}$ 与时间无关, Ψ 随时间变化, 那么展开系数 b_k 也会随时间变化。因此,

$$\Psi = \sum_k b_k(t) \exp(-iE_k^0 t/\hbar) \psi_k^0 \quad (9.116)$$

在极限 $\hat{H}'(t) \rightarrow 0$ 时, 展开式 (9.116) 退化为 (9.115)。

将 (9.116) 代入含时薛定谔方程 (9.113), 并使用式 (9.112), 我们得到

$$\begin{aligned} & -\frac{\hbar}{i} \sum_k \frac{db_k}{dt} \exp(-iE_k^0 t/\hbar) \psi_k^0 + \sum_k E_k^0 b_k \exp(-iE_k^0 t/\hbar) \psi_k^0 \\ & = \sum_k b_k \exp(-iE_k^0 t/\hbar) E_k^0 \psi_k^0 + \sum_k b_k \exp(-iE_k^0 t/\hbar) \hat{H}' \psi_k^0 \\ & -\frac{\hbar}{i} \sum_k \frac{db_k}{dt} \exp(-iE_k^0 t/\hbar) \psi_k^0 = \sum_k b_k \exp(-iE_k^0 t/\hbar) \hat{H}' \psi_k^0 \end{aligned}$$

将其乘以 ψ_m^{0*} 并对空间和自旋坐标全部积分。使用正交方程 $\langle \psi_m^0 | \psi_k^0 \rangle = \delta_{mk}$, 我们得到

$$-\frac{\hbar}{i} \sum_k \frac{db_k}{dt} \exp(-iE_k^0 t/\hbar) \delta_{mk} = \sum_k b_k \exp(-iE_k^0 t/\hbar) \langle \psi_m^0 | \hat{H}' | \psi_k^0 \rangle$$

由于因子 δ_{mk} , 左侧求和中只有一项不为零, 其他都为零, 左侧等于 $-(\hbar/i) (db_m/dt) \exp(-iE_m^0 t/\hbar)$ 。因此, 我们得到

$$\frac{db_m}{dt} = -\frac{i}{\hbar} \sum_k b_k \exp[i(E_m^0 - E_k^0)t/\hbar] \langle \psi_m^0 | \hat{H}' | \psi_k^0 \rangle \quad (9.117)$$

假设在 $t = 0$ 时刻应用微扰 $\hat{H}'(t)$, 在微扰作用于系统之前, 系统处于状态 n , 能量为 $E_n^{(0)}$ 。则 $t = 0$ 时刻的态函数为 $\Psi = \exp\{(-iE_n^0 t/\hbar)\} \psi_n^0$ [式 (7.99)], 因此, $t = 0$ 时刻 (9.116) 的展开系数为 $b_n(0) = 1$, $k \neq n$ 的其他系数为零:

$$b_k(0) = \delta_{kn} \quad (9.118)$$

我们假设微扰项 $\hat{H}'$ 很小, 且作用时间很短。在这些条件下, 在施加微扰时, 展开系数 b_k 与其初始值相比的变化将很小。近似地, 我们可以将 (9.117) 右侧的膨胀系数替换为它们的初始值 (9.118)。由此得出

$$\frac{db_m}{dt} \approx 2\frac{i}{\hbar} \exp[i(E_m^0 - E_n^0)t/\hbar] \langle \psi_m^0 | \hat{H}' | \psi_n^0 \rangle \quad (9.119)$$

令微扰 $\hat{H}'$ 从 $t = 0$ 时刻开始作用到 $t = t'$ 时刻。将 (9.119) 两侧对 t 从 0 到 t' 积分, 我们得到

$$b_m(t') \approx \delta_{mn} - \frac{i}{\hbar} \int_0^{t'} \exp[i(E_m^0 - E_n^0)t/\hbar] \langle \psi_m^0 | \hat{H}' | \psi_n^0 \rangle dt \quad (9.120)$$

如果在 $t = 0$ 时对处于定态 n 的系统施加含时微扰 $\hat{H}'$, 使用 (9.120) 的近似结果可以得到 (9.116) 中展开系数在 t' 时刻的态函数近似值。[与定态微扰理论一样, 我们也可以采用高阶近似方法。(见 Fong, pp. 234-244)。]

在 t' 时刻以后, 微扰的作用停止, 即 $\hat{H}' = 0$ 。对于 $t > t'$, 方程 (9.117) 给出 $db_m/dt = 0$, 所以在 $t \geq t'$ 时, $b_m = b_m(t')$ 。因此, 微扰作用后, 态函数 Ψ 为 [式 (9.116)]:

$$\Psi = \sum_m b_m(t') \exp(-iE_m^0 t/\hbar) \psi_m^0, \quad t \geq t' \quad (9.121)$$

其中 $b_m(t')$ 由 (9.120) 给出。在 (9.121) 中, Ψ 是能量算符 $\hat{H}^0$ 本征函数组 ψ_m^0 的态叠加, 展开系数为 $b_m \exp(-iE_m^0 t/\hbar)$ 。[将 (9.121) 与 (7.66) 相比较。] 第 7.4 节的工作告诉我们, 在 t' 时刻后对系统能量进行的测量将得到能量函数 $\hat{H}^0$ 的本征值之一 E_m^0 , 概率等于与 ψ_m^0 相关的展开系数的绝对值的平方, 即 $|b_m(t') \exp(-iE_m^0 t/\hbar)|^2 = |b_m(t')|^2$ 。

含时微扰将系统的态函数从 $\exp(-iE_n^0 t/\hbar) \psi_n^0$ 变为叠加态 (9.121)。对能量的测量将 Ψ 变为能量本征函数之一 $\exp(-iE_m^0 t/\hbar) \psi_m^0$ (波函数的坍缩, 第 7.9 节)。净结果是将系统从状态 n 跃迁到 m , 发生这样跃迁的概率为 $|b_m(t')|^2$ 。

9.9 辐射和物质的相互作用

我们现在考虑电磁辐射和原子或分子之间的相互作用。正确的量子力学方法会对原子和辐射都进行量子力学处理, 但我们将简化处理, 把光作为由振荡电场和磁场组成的电磁波的经典图景。

我们省略的一项详细研究表明, 辐射磁场与原子电荷之间的相互作用通常比辐射电场与电荷之间的相互作用要弱得多, 因此我们将只考虑后一种相互作用 (在 NMR 谱图中, 重要的相互作用是原子核的磁偶极矩与辐射磁场之间的相互作用。我们将忽略这种情况。)

令电磁波的电场 $\mathcal{E}$ 只指向 x 方向。(称为平面偏振辐射。) 电场的定义为单位电荷所受的力, 则电荷 Q_i 所受的力为 $F = -Q_i \mathcal{E}_x = -dV/dx$, 其中用到了 (4.24)。积分后, 辐射电场与电荷之间的相互作用势为 $V = -Q_i \mathcal{E}_x x$, 我们把任意积分常量定为零。对于有多个电荷的系统, $V = -\sum_i Q_i x_i \mathcal{E}_x$ 。这是含时微扰项 $\hat{H}'(t)$ 。波长为 λ 、频率为 ν 的电磁波沿 z 方向传播时, 其电场随空间和时间变化的函数由 $\mathcal{E}_x = \mathcal{E}_0 \sin(2\pi\nu t - 2\pi z/\lambda)$ 给出 (见一年级物理课本), 其中 $\mathcal{E}_0$ 是电场 $\mathcal{E}_x$ 的最大值 (振幅)。因此,

$$\hat{H}'(t) = -\mathcal{E}_0 \sum_i Q_i x_i \sin(2\pi\nu t - 2\pi z/\lambda)$$

其中的求和包括原子或分子的所有电子和原子核。

定义 ω 和 ω_{mn} 为

$$\omega = 2\pi\nu, \quad \omega_{mn} = (E_m^0 - E_n^0)/\hbar \quad (9.122)$$

将 $\hat{H}'(t)$ 代入 (9.120), 我们得到态函数 Ψ 展开式 (9.116) 中展开系数的近似值:

$$b_m \approx \delta_{mn} + \frac{i\mathcal{E}_0}{\hbar} \int_0^{t'} \exp(i\omega_{mn}t) \left\langle \psi_m^0 \left| \sum_i Q_i x_i \sin(\omega t - 2\pi z/\lambda) \right| \psi_n^0 \right\rangle dt$$

该方程中的积分 $\langle \psi_m^0 | \sum_i \dots | \psi_n^0 \rangle$ 是对全空间积分, 但是只有 ψ_m^0 和 ψ_n^0 大小相当的区域才会对该积分值产生较大影响。在原子或分子以外的区域, ψ_m^0 和 ψ_n^0 的值都非常小, 这些区域可以忽略不

计。我们将坐标原点放置在原子或分子内部。由于原子以外的区域可以忽略，可以认为坐标 z_i 最大值的数量级约为 1 nm 。对于紫外光，其波长 λ 的数量级为 10^2 nm 。对于可见、红外、微波、射频辐射，其波长甚至更长。因此 $2\pi z_i/\lambda$ 很小，可以忽略不计，积分中只剩下了 $\sum_i Q_i x_i \sin \omega t$ 。

使用性质（问题 1.29） $\sin \omega t = (e^{i\omega t} - e^{-i\omega t})/2i$ ，我们得到

$$b_m(t') \approx \delta_{mn} + \frac{\mathcal{E}_0}{2\hbar} \left\langle \psi_m^0 \left| \sum_i Q_i x_i \right| \psi_n^0 \right\rangle \int_0^{t'} [e^{i(\omega_{mn}+\omega)t} - e^{i(\omega_{mn}-\omega)t}] dt$$

使用 $\int_0^{t'} e^{at} dt = a^{-1} (e^{at'} - 1)$ ，我们得到

$$b_m(t') \approx \delta_{mn} + \frac{\mathcal{E}_0}{2\hbar i} \left\langle \psi_m^0 \left| \sum_i Q_i x_i \right| \psi_n^0 \right\rangle \left[\frac{e^{i(\omega_{mn}+\omega)t'} - 1}{(\omega_{mn} + \omega)} - \frac{e^{i(\omega_{mn}-\omega)t'} - 1}{(\omega_{mn} - \omega)} \right] \quad (9.123)$$

若 $m \neq n$ ，则 δ_{mn} 一项为零。

如第9.8节的末尾所述， $|b_m(t')|^2$ 给出了系统从状态 n 跃迁到状态 m 的概率。在两种情况下，这种概率会变得很大。若 $\omega_{mn} = \omega$ ，则括号中第二个分式的分母为零，该分式的绝对值很大（不是无穷，见问题 9.27）。若 $\omega_{mn} = -\omega$ ，则第一个分式的分母为零，绝对值很大。

若 $\omega_{mn} = \omega$ ，方程 (9.122) 给出了 $E_m^0 - E_n^0 = h\nu$ 。给原子施加频率为 ν 的辐射使得系统从状态 n 跃迁到 m ，其中（因为 ν 是正数） $E_m^0 > E_n^0$ 。我们假设该跃迁的能量来源于系统吸收了一个能量为 $h\nu$ 的光子。这一推测得到了完全量子力学处理方法 [称为量子场论 (quantum field theory)] 的证实，在量子场论中，辐射被量子力学而非经典地处理。因此，系统吸收 (absorption) 辐射，能量随之增加。

若 $\omega_{mn} = -\omega$ ，则 $E_n^0 - E_m^0 = h\nu$ 。暴露于频率为 ν 的辐射使得系统从状态 n 跃迁到 m ，其中（因为 ν 是正数） $E_n^0 > E_m^0$ 。系统到了一个更低的能级，量子场理论处理表明：在该过程中系统发射了一个能量为 $h\nu$ 的光子。这就是辐射的受激发射 (stimulated emission)。受激发射发生在激光中。

我们的处理方法有一个缺陷，那就是它无法预测自发发射 (spontaneous emission)，即一个系统在没有受到辐射的情况下发射出光子，系统在此过程中下降到一个较低的能级。量子场论的确可以预测自发发射。

由 (9.123) 可知，吸收的概率与 $|\langle \psi_m^0 | \sum_i Q_i x_i | \psi_n^0 \rangle|^2$ 成正比。量 $\sum_i Q_i x_i$ 称为系统电偶极矩算符 $\hat{\mu}$ 的 x 分量（详见第14.2节），它们是 [式 (14.14) 和 (14.15)] $\hat{\mu} = \mathbf{i} \sum_i Q_i x_i + \mathbf{j} \sum_i Q_i y_i + \mathbf{k} \sum_i Q_i z_i = \mathbf{i} \hat{\mu}_x + \mathbf{j} \hat{\mu}_y + \mathbf{k} \hat{\mu}_z$ ，其中 $\mathbf{i}$ 、 $\mathbf{j}$ 和 $\mathbf{k}$ 是三个坐标轴方向上的单位向量， $\hat{\mu}_x$ 、 $\hat{\mu}_y$ 和 $\hat{\mu}_z$ 是 $\hat{\mu}$ 的分量。我们假设电场的偏振辐射只在 x 方向。如果辐射在 y 和 z 方向也有电场分量，那么吸收概率将与以下公式成正比

$$|\langle \psi_m^0 | \hat{\mu}_x | \psi_n^0 \rangle|^2 + |\langle \psi_m^0 | \hat{\mu}_y | \psi_n^0 \rangle|^2 + |\langle \psi_m^0 | \hat{\mu}_z | \psi_n^0 \rangle|^2 = |\langle \psi_m^0 | \hat{\mu} | \psi_n^0 \rangle|^2$$

其中用到了方程 (5.25)。积分 $\langle \psi_m^0 | \hat{\mu} | \psi_n^0 \rangle = \mu_{mn}$ 称为跃迁 (偶极) 矩 (transition dipole moment)。

当 $\mu_{mn} = 0$ 时，状态 m 和 n 之间通过吸收或发射辐射的跃迁称为禁阻的 (forbidden)。允许的 (allowed) 跃迁是指 $\mu_{mn} \neq 0$ 的跃迁。由于在推导 (9.123) 时采用了近似的计算，禁阻的跃迁会有小概率发生。

例如，考虑一维势箱中的粒子（第2.2节）。其跃迁偶极矩为 $\langle \psi_m^0 | Qx | \psi_n^0 \rangle$ ，其中 Q 是粒子的电荷， x 是其坐标， $\psi_m^0 = (2/l)^{1/2} \sin(m\pi x/l)$ 和 $\psi_n^0 = (2/l)^{1/2} \sin(n\pi x/l)$ 。计算该积分（问题 9.28）表明：只有 $m - n = \pm 1, \pm 3, \pm 5, \dots$ 时不为零，而在 $m - n = 0, \pm 2, \dots$ 是零。一维势箱中带电粒子跃迁的选律 (selection rule) 为吸收或发射辐射时，量子数的变化必须为奇数。

计算谐振子的跃迁偶极矩，得出双粒子的刚性转子模型选律为 $\Delta v = \pm 1$ ， $\Delta J = \pm 1$ ，在第4.3和第6.4节中已有说明。

(9.123) 中的量 $|b_m|^2$ 在 $\omega = \omega_{mn}$ 和 $\omega = -\omega_{mn}$ 处急剧达到峰值, 但当 ω 和 $|\omega_{mn}|$ 并不精确相等时, 发生跃迁的概率也不为零, 即 $h\nu$ 不和 $|E_m^0 - E_n^0|$ 完全相等。这一事实与能量-时间不确定性关系 (5.15) 有关。寿命有限的状态, 其能量具有不确定性。

辐射并不是导致能级跃迁的唯一含时微扰。当一个原子或分子接近另一个原子或分子时, 会受到含时微扰, 从而改变其状态。针对辐射跃迁的选律不一定适用于碰撞过程, 因为两过程的 $\hat{H}'(t)$ 不同。

总结

习题

Chapter 10

电子自旋和自旋-统计定理

10.1 电子自旋

所有化学家都熟悉钠原子在火焰中呈现的黄色。事实上，钠原子光谱中最强的黄色线（D 线）是两条间隔很近的线。钠的 D 谱线由激发态 $1s^2 2s^2 2p^6 3p$ 到基态的跃迁产生。Na 光谱中这条线和其他线的双线性性质表明，价电子可用的预期状态数增加了一倍。

为了解释原子光谱的这种微观结构，Uhlenbeck 和 Goudsmit 于 1925 年提出，除了电子围绕原子核运动所产生的轨道角动量之外，电子还具有一种内禀（内在）角动量。如果我们把电子想象成一个围绕其直径之一旋转的电荷球，我们就能明白这种内禀角动量是如何产生的。因此，我们得到了术语**自旋角动量**（spin angular momentum），或更简单地，**自旋**（spin）。然而，电子“自旋”并不是一种经典效应，电子绕轴旋转的图景并不符合物理现实。内禀角动量是真实存在的，但没有一个容易又直观模型能够正确解释它的起源。我们不能指望根据宏观世界的经验来理解微观粒子。除了电子，其他基本粒子也有自旋角动量。

1928 年，狄拉克提出了电子相对论量子力学，在他的研究中，电子自旋自然而然地产生了。

在我们所局限的非相对论量子力学中，电子自旋必须作为附加假设引入。我们已经了解到，在量子力学中，每种物理属性都有其对应的线性厄米算符。对于轨道角动量等性质，我们可以用相应的算符代替 p_x 、 p_y 和 p_z ，从经典表达式中构造出量子力学算符。微观粒子固有的自旋角动量在经典力学中没有类似的表达式，因此我们不能用这种方法来构造自旋的算符。为了我们的目的，我们将只使用符号来表示自旋算符，而不给出它们的明确形式。

与轨道角动量算符 $\hat{L}^2, \hat{L}_x, \hat{L}_y, \hat{L}_z$ 类似，自旋算符也有对应的形式 $\hat{S}^2, \hat{S}_x, \hat{S}_y, \hat{S}_z$ ，假设它们是线性厄米算符。 $\hat{S}^2$ 是粒子总自旋角动量大小平方的算符。 $\hat{S}_z$ 是自旋角动量在 z 方向上的分量算符。我们有

$$\hat{S}^2 = \hat{S}_x^2 + \hat{S}_y^2 + \hat{S}_z^2. \quad (10.1)$$

假设自旋角动量算符遵循轨道角动量算符相同的对易关系。与 $[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z$ ， $[\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar\hat{L}_x$ ， $[\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar\hat{L}_y$ [式 (5.46) 和 (5.48)]，我们有

$$[\hat{S}_x, \hat{S}_y] = i\hbar\hat{S}_z, \quad [\hat{S}_y, \hat{S}_z] = i\hbar\hat{S}_x, \quad [\hat{S}_z, \hat{S}_x] = i\hbar\hat{S}_y. \quad (10.2)$$

根据 (10.1) 和 (10.2)，通过求得 (5.49) 和 (5.50) 时所用的算符代数，可以得出

$$[\hat{S}^2, \hat{S}_x] = [\hat{S}^2, \hat{S}_y] = [\hat{S}^2, \hat{S}_z] = 0 \quad (10.3)$$

由于公式 (10.1) 和 (10.2) 是公式 (5.107) 和 (5.108) 的形式，根据第 5.4 节的工作（只取决于对易

关系，而不取决于算符的具体形式)，可以得出 $\hat{S}^2$ 的本征值为 [式 (5.142)]

$$s(s+1)\hbar^2, \quad s = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots \quad (10.4)$$

以及 $\hat{S}_z$ 的本征值为 [式 (5.141)]

$$m_s\hbar, \quad m_s = -s, -s+1, \dots, s-1, s \quad (10.5)$$

量子数 s 称为粒子的**自旋量子数** (spin quantum number)。尽管第 5.4 节中并没有限制电子的 s 值只能是单一的，但实验表明，所有电子的 s 值都是单一的，即 $s = \frac{1}{2}$ 。质子和中子同样有 $s = \frac{1}{2}$ 。离子有 $s = 0$ 。光子则有 $s = 1$ 。然而，公式 (10.5) 对光子并不成立。光子在真空中以 c 的速度传播。由于其相对论性质，光子可以有以下两种情况： $m_s = +1$ 或 $m_s = -1$ ，但不具有 $m_s = 0$ (见 Merzbacher, Chapter 22)。这两个 m_s 值分别对应左旋圆偏振光和右旋圆偏振光。

有了 $s = \frac{1}{2}$ ，电子总自旋角动量的值由 (10.4) 的平方根给出：

$$\left[\frac{1}{2} \left(\frac{3}{2} \right) \hbar^2 \right]^{1/2} = \frac{1}{2} \sqrt{3} \hbar \quad (10.6)$$

对于 $s = \frac{1}{2}$ ，式 (10.5) 给出了电子 $\hat{S}_z$ 的可能本征值为 $+\frac{1}{2}\hbar$ 和 $-\frac{1}{2}\hbar$ 。因对应于这些 $\hat{S}_z$ 本征值的电子自旋本征函数由 α 和 β 给出：


$$\hat{S}_z \alpha = +\frac{1}{2} \hbar \alpha \quad (10.7)$$

$$\hat{S}_z \beta = -\frac{1}{2} \hbar \beta \quad (10.8)$$

由于 $\hat{S}_z$ 和 $\hat{S}^2$ 可对易，我们可以将 $\hat{S}_z$ 的本征函数变为 $\hat{S}^2$ 的本征函数，有了 $s = \frac{1}{2}$ 和 (10.4) 给出的本征值，我们有

$$\hat{S}^2 \alpha = \frac{3}{4} \hbar^2 \alpha, \quad \hat{S}^2 \beta = \frac{3}{4} \hbar^2 \beta \quad (10.9)$$

$\hat{S}_z$ 和 $\hat{S}_x$ 、 $\hat{S}_y$ 不可对易，所以 α 和 β 不是 $\hat{S}_x$ 和 $\hat{S}_y$ 的本征函数。术语自旋向上 (spin up) 和自旋向下 (spin down) 分别指的是 $m_s = +\frac{1}{2}$ 和 $m_s = -\frac{1}{2}$ 。见图 10.1。稍后我们将证明，量子数 m_s 的两种可能性会使碱金属光谱中的谱线条数加倍。



电子自旋矢量相对于 z 轴的可能方向。

图 10.1: 在每种情况下， $\mathbf{S}$ 都位于以 z 轴为轴的圆锥表面上。

我们之前讨论过的波函数是粒子空间坐标的函数： $\psi = \psi(x, y, z)$ 。我们可能想问：自旋本征函数 α 和 β 的变量是什么呢？有时，人们在谈论自旋坐标 ω 时，并没有明确说明这个坐标是什么。通常情况下，人们把自旋量子数 m_s 作为自旋特征函数所依赖的变量。与空间波函数相比，这种程序

很不寻常；但因为我们只有两种可能的电子自旋特征函数和本征值，所以这是一种方便的选择。我们有

$$\alpha = \alpha(m_s), \quad \beta = \beta(m_s) \quad (10.10)$$

像往常一样，我们希望对本征函数进行归一化处理。单粒子空间波函数的三个变量范围在 $-\infty$ 到 $+\infty$ 之间连续变化，则归一化条件意味着

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x, y, z)|^2 dx dy dz = 1$$

电子自旋本征函数的变量 m_s 只有 $+\frac{1}{2}$ 和 $-\frac{1}{2}$ 两个离散值。因此，对单粒子自旋本征函数的归一化意味着

$$\sum_{m_s=-1/2}^{1/2} |\alpha(m_s)|^2 = 1, \quad \sum_{m_s=-1/2}^{1/2} |\beta(m_s)|^2 = 1 \quad (10.11)$$

因为本征函数 α 和 β 对应于厄米算符 $\hat{S}_z$ 的不同本征值，所以它们是正交的：

$$\sum_{m_s=-1/2}^{1/2} \alpha^*(m_s) \beta(m_s) = 0 \quad (10.12)$$

令 $\alpha(m_s) = \delta_{m_s, 1/2}$, $\beta(m_s) = \delta_{m_s, -1/2}$ ，其中 δ_{jk} 是 Kronecker δ 函数，我们就满足了 (10.11) 和 (10.12)。

当我们考虑电子的完全波函数（包括空间和自旋变量）时，我们将根据以下公式对其进行归一化处理

$$\sum_{m_s=-1/2}^{1/2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x, y, z, m_s)|^2 dx dy dz = 1 \quad (10.13)$$

符号

$$\int |\psi(x, y, z, m_s)|^2 d\tau$$

表示对自旋变量求和，对空间变量全范围积分，如 (10.13) 所示。符号 $\int dv$ 表示对系统空间变量全范围的积分。

电子目前被认为是一种没有子结构的点状基本粒子。高能电子-正电子碰撞实验表明，没有证据表明电子的大小不为零，并将电子半径的上限为 $3 \times 10^{-19} \text{ m}$ [D. Bourilkov, *Phys. Rev. D*, **62**, 076005 (2020); arxiv.org/abs/hep-ph/0002172]。质子和中子是由夸克构成的，因此不是基本粒子。质子的均方根电荷半径为 $0.88 \times 10^{-15} \text{ m}$ 。

10.2 自旋和氢原子

具体说明电子状态的波函数不仅取决于 x 、 y 和 z 坐标，还取决于电子的自旋状态。这对氢原子的波函数和能级有什么影响？

在很好的近似条件下，电子系统的哈密顿算符不涉及自旋变量，而只是空间坐标和关于空间坐标的导数的函数。因此，我们可以将单个电子的定态波函数分离为空间和自旋部分的乘积：

$$\psi(x, y, z) g(m_s)$$

其中的 $g(m_s)$ 是 α 或 β 的其中之一，取决于 $m_s = +\frac{1}{2}$ 或 $m_s = -\frac{1}{2}$ 。[更一般地， $g(m_s)$ 可以是 α 和 β 的线性组合； $g(m_s) = c_1\alpha + c_2\beta$ 。] 由于哈密顿算符对自旋波函数没有作用，我们有

$$\hat{H}[\psi(x, y, z) g(m_s)] = g(m_s) \hat{H}\psi(x, y, z) = E[\psi(x, y, z) g(m_s)]$$

我们得到了与之前未考虑自旋时相同的能量。引入自旋唯一的不同是使得可能的状态数翻倍。与状态 $\psi(x, y, z)$ 不同，我们有两个可能的状态 $\psi(x, y, z)\alpha$ 和 $\psi(x, y, z)\beta$ 。当我们考虑自旋时，氢原子能级的简并度是 $2n^2$ 而不是 n^2 。

10.3 自旋-统计定理

假设我们有一个由多个全同粒子组成的系统。在经典力学中，粒子的全同性不会导致特殊的后果。例如，考虑一下在台球桌上滚动的完全相同的台球。我们可以跟踪任何一个球的运动，比如通过拍摄系统的运动图像。我们可以说，一号球沿着某条轨迹运动，二号球沿着另一条确定的轨迹运动，以此类推，这些轨迹是由牛顿运动定律决定的。因此，虽然这些球是相同的，但我们可以通过指定每个球的运动轨迹来区分它们。球的特性对它们的运动没有特殊的影响。

在量子力学中，不确定性原理告诉我们，我们无法追踪微观“粒子”的确切路径。如果系统中的微观粒子都具有不同的质量、电荷或自旋，我们就可以利用其中的一个特性来区分粒子。但如果它们都是相同的，那么我们在经典力学中区分它们的一种方法——即指定它们的路径——在量子力学中就会因为不确定性原理而丧失。因此，由相互作用的全同粒子组成的系统的波函数一定无法区分不同的粒子。例如，在第9章微扰理论处理氦原子激发态时，我们看见函数 $1s(1)2s(2)$ （说明电子 1 在 $1s$ 轨道而电子 2 在 $2s$ 轨道）不是一个正确的零级波函数。相反地，我们不得不使用函数 $2^{-1/2}[1s(1)2s(2) \pm 1s(2)2s(1)]$ ，它无法指明电子在哪个轨道上。（如果相同的粒子彼此分离得很好，使它们的波函数不重叠，它们就可以被视为是可区分的。）

现在，我们来推导量子力学中全同粒子的不可区分性对波函数的限制。由 n 个相同微观粒子组成的系统的波函数取决于粒子的空间变量和自旋变量。对于粒子 1，这些变量为 x_1, y_1, z_1 和 m_{s1} 。令 q_1 表示所有这四个变量。则 $\psi = \psi(q_1, q_2, \dots, q_n)$ 。

我们定义交换两个粒子 1 和 2 所有坐标的算符 $\hat{P}_{12}$ 为**交换算符**或**置换算符**（exchange or permutation operator）：

$$\hat{P}_{12}f(q_1, q_2, q_3, \dots, q_n) = f(q_2, q_1, q_3, \dots, q_n) \quad (10.14)$$

例如，对某表示电子 1 在 $1s$ 轨道自旋向上而电子 2 在 $3s$ 轨道自旋向下的函数，算符 $\hat{P}_{12}$ 的作用为

$$\hat{P}_{12}[1s(1)\alpha(1)3s(2)\beta(2)] = 1s(2)\alpha(2)3s(1)\beta(1) \quad (10.15)$$

$\hat{P}_{12}$ 的本征函数是什么？将 $\hat{P}_{12}$ 作用两次，我们得到了原函数：

$$\hat{P}_{12}\hat{P}_{12}f(q_1, q_2, \dots, q_n) = \hat{P}_{12}f(q_2, q_1, \dots, q_n) = f(q_1, q_2, \dots, q_n)$$

因此， $\hat{P}_{12}^2 = \hat{1}$ 。设 $\hat{P}_{12}$ 的本征函数和本征值分别为 w_i 和 c_i 。我们有 $\hat{P}_{12}w_i = c_i w_i$ 。作用两次后，我们得到 $\hat{P}_{12}^2 w_i = c_1 P_{12} w_i$ 。将 $\hat{P}_{12}^2 = \hat{1}$ 和 $\hat{P}_{12} w_i = c_i w_i$ 代入 $\hat{P}_{12}^2 w_i = c_1 P_{12} w_i$ ，我们得到 $w_i = c_i^2 w_i$ 。由于零不能作为本征函数，我们可以在两边同时除以 w_i ，得到 $c_i^2 = 1$ 。因此， $c_i = \pm 1$ 。 $\hat{P}_{12}$ （以及任何平方为单位算符的线性算符）的本征值是 $+1$ 和 -1 。

若 w_+ 是 $\hat{P}_{12}$ 的本征函数，对应于本征值 $+1$ ，则

$$\begin{aligned} \hat{P}_{12}w_+(q_1, q_2, \dots, q_n) &= (+1)w_+(q_1, q_2, \dots, q_n) \\ w_+(q_2, q_1, \dots, q_n) &= w_+(q_1, q_2, \dots, q_n) \end{aligned} \quad (10.16)$$

当粒子 1 和粒子 2 相互交换时，具有不变性质 (10.16) 的函数（如 w_+ ）被称为与粒子 1 和粒子 2 相互交换**对称**（symmetric）的函数。对于本征值 -1 ，我们有

$$w_-(q_2, q_1, \dots, q_n) = -w_-(q_1, q_2, \dots, q_n) \quad (10.17)$$

(10.17) 的函数 (如 w_-) 被称为与粒子 1 和粒子 2 相互交换**反对称** (antisymmetric) 的函数, 这意味着将 w_- 乘以 -1 会得到交换后的函数。任意函数 $f(q_1, q_2, \dots, q_n)$ 对粒子 1 和 2 交换对称或是交换反对称无关紧要。

不要混淆粒子互换的对称或非对称性质与空间反转的偶函数或奇函数性质。对于粒子 1 和 2 的交换, 函数 $x_1 + x_2$ 是交换对称的, 它是 x_1 和 x_2 的奇函数。函数 $x_1^2 + x_2^2$ 是交换对称的, 但它是 x_1 和 x_2 的偶函数。

算符 $\hat{P}_{ik}$ 定义为

$$\hat{P}_{ik}f(q_1, \dots, q_i, \dots, q_k, \dots, q_n) = f(q_1, \dots, q_k, \dots, q_i, \dots, q_n) \quad (10.18)$$

与 $\hat{P}_{12}$ 类似, $\hat{P}_{ik}$ 的本征值为 $+1$ 和 -1 。

现在我们来看看由 n 个相同的微观粒子组成的系统的波函数。由于粒子是无法区分的, 我们给它们贴标签的方式不会影响系统的状态。因此, 两个波函数

$$\psi(q_1, \dots, q_i, \dots, q_k, \dots, q_n) \quad \text{和} \quad \psi(q_1, \dots, q_k, \dots, q_i, \dots, q_n)$$

必须对应于系统的相同状态。对应同一状态的两个波函数最多只能相差一个乘法常数。因此

$$\begin{aligned} \psi(q_1, \dots, q_k, \dots, q_i, \dots, q_n) &= c\psi(q_1, \dots, q_i, \dots, q_k, \dots, q_n) \\ \hat{P}_{ik}\psi(q_1, \dots, q_i, \dots, q_k, \dots, q_n) &= c\psi(q_1, \dots, q_i, \dots, q_k, \dots, q_n) \end{aligned}$$

最后一个方程表明 ψ 是算符 $\hat{P}_{ik}$ 的本征函数。但是我们知道 $\hat{P}_{ik}$ 的本征值只能是 $+1$ 或 -1 。我们得出结论: 由 n 个全同粒子组成的系统, 其波函数必须与任意两个全同粒子 i 和 k 的互换对称或反对称。由于 n 个粒子都是相同的, 我们不可能让波函数与某些互换对称, 而与其他互换反对称。因此, n 个完全相同的粒子的波函数必须要么与每一种可能的交换对称, 要么与两个粒子的每一种可能的交换反对称。[刚才的论证并不严谨。完全相同的粒子系统的波函数对于两个粒子的互换必须是完全对称或完全反对称的说法称为对称化假设 (symmetrization postulate)。]

我们已经看到, 全同粒子系统的波函数有两种可能的情况, 即对称和非对称情况。实验证据 (如稍后讨论的元素周期表) 表明, 对于电子来说, 只有反对称情况才会出现。因此, 我们有了量子力学的另一个假设, 即电子系统的波函数在任意两个电子互换时必须是反对称的。

1926 年, 狄拉克根据理论研究和实验数据得出结论: 电子要求反对称波函数, 光子要求对称波函数。然而, 狄拉克和其他物理学家在 1926 年错误地认为所有物质粒子都要求反对称波函数。1930 年, 实验数据表明, α 粒子 ($s = 0$) 要求对称波函数; 物理学家最终认识到, 决定一个全同粒子系统要求对称波函数还是反对称波函数的是粒子的自旋性质。具有半整数自旋量子数 ($s = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \dots$) 的粒子要求反对称波函数, 而具有整数自旋量子数 ($s = 0, 1, 2, \dots$) 的粒子要求对称波函数。1940 年, 物理学家沃尔夫冈·泡利 (Wolfgang Pauli) 利用相对论量子场论证明了这一结果。要求反对称波函数的粒子, 如电子, 被称为**费米子** (fermions) (以 E. Fermi 命名), 而要求对称波函数的粒子, 如光子, 则被称为**玻色子** (bosons) (以 S. N. Bose 命名)。在非相对论量子力学中, 我们必须假设, 如果粒子具有半整数自旋量子数, 则全同粒子系统的波函数在任意两个粒子互换时必须是反对称的; 如果粒子具有整数自旋量子数, 则波函数在互换时必须是对称的。这句话被称为**自旋-统计定理** (spin-statistics theorem) (因为玻色子系统的统计力学与费米子系统的统计力学不同)。

自旋统计定理有许多不同有效性的证明; 见 I. Duck and E. C. G. Sudurshan, *Pauli and the Spin-Statistics Theorem*, World Scientific, 1997; *Am. J. Phys.*, **66**, 284 (1998); Sudurshan and Duck, *Pramana-J. Phys.*, **61**, 645 (2003) (见 www.ias.ac.in/pramana/v61/p645/fulltext.pdf)。一些实验以极高的精度证实了自旋统计定理的有效性; 见 G. M. Tino, *Fortschr. Phys.*, **48**, 537 (2000) (可查阅 arxiv.org/abs/quant-ph/9907028)。

自旋-统计定理对完全相同的费米子系统有一个重要的影响。反对称要求意味着

$$\psi(q_1, q_2, q_3, \dots, q_n) = -\psi(q_2, q_1, q_3, \dots, q_n) \quad (10.19)$$

考虑当电子 1 和 2 有相同坐标时 ψ 的值, 即 $x_1 = x_2$, $y_1 = y_2$, $z_1 = z_2$, $m_{s1} = m_{s2}$ 。在 (10.19) 中令 $q_2 = q_1$, 我们得到

$$\begin{aligned} \psi(q_1, q_1, q_3, \dots, q_n) &= -\psi(q_1, q_1, q_3, \dots, q_n) \\ 2\psi &= 0 \\ \psi(q_1, q_1, q_3, \dots, q_n) &= 0 \end{aligned} \quad (10.20)$$

因此, 两个自旋相同的电子在三维空间的同一点出现的概率为零。“自旋相同”意味着 m_s 值相等。) 由于 ψ 是连续函数, 方程 (10.20) 说明在空间中发现两个自旋相同的电子彼此靠近的概率非常小。因此, 反对称要求迫使自旋相同的电子彼此分开。为了描述这一点, 人们常说这种电子之间存在**泡利斥力** (Pauli repulsion)。这种“斥力”并不是一种真正的物理力, 而是电子波函数在交换时必须是反对称的这一事实的反映。

对称或反对称波函数的要求也适用于两个或多个全同复合粒子的系统。例如, 考虑分子 $^{16}\text{O}_2$ 。 ^{16}O 的核由 8 个质子和 8 个中子组成。每个质子和中子都满足 $s = \frac{1}{2}$, 都是费米子。因此, 交换两个 O 原子核相当于交换 16 个费米子的坐标, 需要将分子的波函数乘以 $(-1)^{16} = 1$ 。因此, 分子 $^{16}\text{O}_2$ 的波函数在核坐标交换时是对称的。对相同原子核交换对称性或反对称性的要求会影响分子波函数的简并性, 并导致转动配分函数中的对称数 [见 *McQuarrie* (2000), pp. 104-105]。

对于包含 m 个全同玻色子和 n 个全同费米子的两个相同复合粒子的交换, 波函数需乘以 $(+1)^m (-1)^n = (-1)^n$ 。

因此, 如果复合粒子包含奇数个费米子, 那么它就是费米子, 否则就是玻色子。

当使用变分原理 (第 8.1 节) 来获取原子和分子的近似电子波函数时, 要求试探函数具有良好的稳定性, 其中包括要求它具有反对称性。

10.4 氦原子

现在, 我们从电子自旋和反对称要求的角度重新考虑氦原子。在第 9.3 节对氦原子进行微扰处理时, 我们发现基态的零级波函数为 $1s(1)1s(2)$ 。为了引入自旋, 我们必须将该空间波函数与自旋本征函数相乘。因此, 我们考虑两个电子可能的自旋本征函数。使用符号 $\alpha(1)\alpha(2)$ 表示电子 1 和电子 2 的自旋向上状态, $\alpha(1)$ 代表了 $\alpha(m_{s1})$ 。因为每个电子都有两种可能的自旋状态, 因此我们一眼就能看到四种可能的自旋函数:

$$\alpha(1)\alpha(2), \quad \beta(1)\beta(2), \quad \alpha(1)\beta(2), \quad \alpha(2)\beta(1)$$

前两个函数没有任何问题, 但第三和第四个函数违反了全同粒子不可区分的原则。例如, 第三个函数表明电子 1 自旋向上而电子 2 自旋向下, 这确实区分了电子 1 和 2。更正式的说法是, 如果我们将 $\hat{P}_{12}$ 作用于这些函数, 会发现前两个函数满足交换对称的要求, 而后两个既不满足交换对称也不满足交换反对称, 因此是不可接受的。

现在怎么办? 回想一下, 我们在处理氦激发态时也遇到了基本相同的情况 (第 9.7 节), 我们从函数 $1s(1)2s(2)$ 和 $2s(1)1s(2)$ 开始。我们发现这些区分了电子 1 和 2 的函数不是零级校正波函数, 正确的零级校正波函数为 $2^{-1/2}[1s(1)2s(2) \pm 2s(1)1s(2)]$ 。这一结果强烈表明, 我们需要用下式来代替 $\alpha(1)\beta(2)$ 和 $\beta(1)\alpha(2)$:

$$2^{-1/2}[\alpha(1)\beta(2) \pm \beta(1)\alpha(2)] \quad (10.21)$$

这些函数是 $\alpha(1)\beta(2)$ 和 $\beta(1)\alpha(2)$ 的归一化线性组合, 也是 $\hat{P}_{12}$ 的本征函数。它们是交换对称或反对称的。当电子 1 和电子 2 交换时, $2^{-1/2}[\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)]$ 变为了 $2^{-1/2}[\alpha(2)\beta(1) + \beta(2)\alpha(1)]$, 与原函数一致。相反地, $2^{-1/2}[\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)]$ 变为 $-2^{-1/2}[\alpha(2)\beta(1) - \beta(2)\alpha(1)]$, 等于 -1 与原函数相乘。为了证明 (10.21) 是归一化的, 我们有

$$\begin{aligned} & \sum_{m_{s1}} \sum_{m_{s2}} \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha(1)\beta(2) \pm \beta(1)\alpha(2)]^* \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha(1)\beta(2) \pm \beta(1)\alpha(2)] \\ &= \frac{1}{2} \sum_{m_{s1}} |\alpha(1)|^2 \sum_{m_{s2}} |\beta(2)|^2 \pm \frac{1}{2} \sum_{m_{s1}} \alpha^*(1)\beta(1) \sum_{m_{s2}} \beta^*(2)\alpha(2) \\ & \pm \frac{1}{2} \sum_{m_{s1}} \beta^*(1)\alpha(1) \sum_{m_{s2}} \alpha^*(2)\beta(2) + \frac{1}{2} \sum_{m_{s1}} |\beta(1)|^2 \sum_{m_{s2}} |\alpha(2)|^2 = 1 \end{aligned}$$

其中我们用到了正交关系 (10.11) 和 (10.12)。

因此, 具有正确交换性质的四个归一化双电子自旋本征函数是

$$\begin{aligned} \text{对称: } & \begin{cases} \alpha(1)\alpha(2) \\ \beta(1)\beta(2) \\ [\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)]/\sqrt{2} \end{cases} \end{aligned} \quad \begin{aligned} (10.22) \\ (10.23) \\ (10.24) \end{aligned}$$

$$\text{反对称: } [\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)]/\sqrt{2} \quad (10.25)$$

我们现在将自旋引入 He 的基态零级校正波函数中。函数 $1s(1)1s(2)$ 满足交换对称。包括自旋在内的完全电子波函数必须是交换反对称的。因此, 我们必须将某个交换反对称的自旋波函数与交换对称的空间波函数 $1s(1)1s(2)$ 相乘。只有一个反对称双电子自旋函数, 因此氮原子的基态零阶波函数 (包括自旋) 为

$$\psi^{(0)} = 1s(1)1s(2) \cdot 2^{-1/2} [\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)] \quad (10.26)$$

$\psi^{(0)}$ 是 $\hat{P}_{12}$ 的本征函数, 对应于本征值 -1 。

在很好的近似条件下, 哈密顿量不包含自旋项, 因此在基态波函数中引入自旋因子不会影响能量。而且, 当考虑自旋时, 氮的基态仍然是非简并的。

为了进一步证明自旋因子并不影响能量, 我们假设正在使用试探函数 $\phi = f(r_1, r_2, r_{12}) 2^{-1/2} [\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)]$ 对 He 的基态进行变分计算, 其中 f 是满足两电子坐标交换对称的归一化函数。变分积分为

$$\begin{aligned} \int \phi^* \hat{H} \phi d\tau &= \sum_{m_{s1}} \sum_{m_{s2}} \int \int f^*(r_1, r_2, r_{12}) \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)]^* \\ & \times \hat{H} f(r_1, r_2, r_{12}) \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)] dv_1 dv_2 \end{aligned}$$

因为 $\hat{H}$ 对自旋波函数没有作用, 所以变分积分变为

$$\int \int f^* \hat{H} f dv_1 dv_2 \sum_{m_{s1}} \sum_{m_{s2}} \frac{1}{2} [\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)]^2$$

又因为自旋函数 (10.25) 是归一化的, 所以变分积分简化为 $\int \int f^* \hat{H} f dv_1 dv_2$, 这就是我们引入自旋之前的变分积分。

现在, 我们来考虑 He 的激发态。我们知道, 最低激发态的零级空间波函数为 $2^{-1/2} [1s(1)2s(2) - 2s(1)1s(2)]$ [式 (9.103)]。因为空间函数是交换反对称的, 我们必须乘上一个交换对称的自旋函数。

我们可以使用三个交换对称的双电子自旋函数中的任意一个，因此我们得到的不是之前发现的非简并能级，而是一个具有三个零级波函数的三重简并能级

$$2^{-1/2} [1s(1)2s(2) - 2s(1)1s(2)] \alpha(1)\alpha(2) \quad (10.27)$$

$$2^{-1/2} [1s(1)2s(2) - 2s(1)1s(2)] \beta(1)\beta(2) \quad (10.28)$$

$$2^{-1/2} [1s(1)2s(2) - 2s(1)1s(2)] 2^{-1/2} [\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)] \quad (10.29)$$

对于下一个激发态，由于要求完全波函数具有交换反对称性，因此会产生零阶波函数

$$2^{-1/2} [1s(1)2s(2) + 2s(1)1s(2)] 2^{-1/2} [\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)] \quad (10.30)$$

同样的考虑也适用于 $1s2p$ 状态。

10.5 泡利不相容原理

到目前为止，我们还没有看到电子自旋和不对称要求带来任何非常惊人的后果。在氢原子和氦原子中，波函数中的自旋因子和不对称性要求只是影响了能级的简并性，而不会（除了稍后要考虑的非常小的影响）影响之前得到的能量。锂的情况则完全不同。

假设我们把锂原子中的电子间斥力看作是对哈密顿其余项的微扰。按照处理氦的相同步骤，无扰波函数是三个类氢函数的乘积。对于基态

$$\psi^{(0)} = 1s(1)1s(2)1s(3) \quad (10.31)$$

零级（无扰）能量为 [方程 (9.48) 及 (9.50) 之后的段落]

$$E^{(0)} = -\left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{1^2}\right) \left(\frac{Z^2 e^2}{8\pi\epsilon_0 a_0}\right) = -27 \left(\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a_0}\right) = -27(13.606 \text{ eV}) = -367.4 \text{ eV}$$

能量的一级校正为 $E^{(1)} = \langle \psi^{(0)} | \hat{H}' | \psi^{(0)} \rangle$ ，其中微扰项 $\hat{H}'$ 包含了电子间斥力，则

$$E^{(1)} = \int |1s(1)|^2 |1s(2)|^2 |1s(3)|^2 \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} dv + \int |1s(1)|^2 |1s(2)|^2 |1s(3)|^2 \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{23}} dv \\ + \int |1s(1)|^2 |1s(2)|^2 |1s(3)|^2 \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{13}} dv$$

在这些定积分中，我们给虚拟积分变量贴标签的方式不会影响它们的值。如果我们互换第二个积分中变量的标号 1 和 3，它就会转换成第一个积分。因此，这两个积分相等。将第三个积分中的标号 2 和 3 互换后，它也等于第一个积分。因此

$$E^{(1)} = 3 \int \int |1s(1)|^2 |1s(2)|^2 \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} dv_1 dv_2 \int |1s(3)|^2 dv_3$$

对电子 3 积分的值为 1（归一化）。电子 1 和电子 2 的积分是在氦的微扰处理中计算得到的，以及 [式 (9.52) 和 (9.53)]

$$E^{(1)} = 3 \left(\frac{5Z}{4}\right) \left(\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a_0}\right) = \frac{45}{4} (13.606 \text{ eV}) = 153.1 \text{ eV}$$

$$E^{(0)} + E^{(1)} = -214.3 \text{ eV}$$

因为我们可以把零级受扰波函数作为试探函数（回顾第 9.4 节开头的讨论），根据变分原理， $E^{(0)} + E^{(1)}$ 等于或大于真实基态能量。锂基态能量的实验值通过将第一、第二和第三电离能相加得

到, 即 [C. E. Moore, “Ionization Potentials and Ionization Limits,” publication NSRDS-NBS 34 of the National Bureau of Standards (1970); available at www.nist.gov/data/nsrds/NSRDSNBS34.pdf]

$$-(5.39 + 75.64 + 122.45) \text{ eV} = -203.5 \text{ eV}$$

因此, 此时我们的 $E^{(0)} + E^{(1)}$ 比基态能量真实值低, 这违反了变分原理。例外, 假设的锂原子基态组态 $1s^3$ 与第一电离势的低值和所有化学证据不符。如果我们继续这样做, 原子序数为 Z 的元素就会出现 $1s^Z$ 基态构型。我们不会得到众所周知的元素周期性行为。

当然, 我们的错误在于没有考虑自旋和反对称要求。假设的零级波函数 $1s(1)1s(2)1s(3)$ 对于任意两个电子的互换是对称的。如果我们要有一个反对称函数 $\psi^{(0)}$, 我们必须将该空间交换对称函数与一个交换反对称自旋函数相乘。为三个电子构建完全对称的自旋函数非常容易, 例如 $\alpha(1)\alpha(2)\alpha(3)$ 。然而, 要为三个电子构建一个完全反对称的自旋函数是不可能的。

让我们考虑一下如何系统地构建三个电子的反对称函数。我们将使用 f 、 g 和 h 来表示电子坐标的三个函数, 但并不指明我们考虑的是空间坐标还是自旋坐标, 抑或两者兼而有之。我们从以下函数开始:

$$f(1)g(2)h(3) \quad (10.32)$$

这显然不满足交换反对称。我们想要的反对称函数必须通过每一个置换算符 $\hat{P}_{12}$ 、 $\hat{P}_{13}$ 和 $\hat{P}_{23}$ 转换成它的负值。将每个算符轮流作用到 $f(1)g(2)h(3)$ 上, 我们得到

$$f(2)g(1)h(3), \quad f(3)g(2)h(1), \quad f(1)g(3)h(2) \quad (10.33)$$

我们可以尝试将反对称函数构造四个函数 (10.32) 和 (10.33) 的线性组合, 但这一尝试会失败。将 $\hat{P}_{12}$ 作用于 (10.33) 中的后两个函数, 得到

$$f(3)g(1)h(2) \quad \text{和} \quad f(2)g(3)h(1) \quad (10.34)$$

它不在 (10.32) 和 (10.33) 中。因此, 我们必须将所有六个函数 (10.32) 至 (10.34) 纳入所需的反对称线性组合中。这六个函数是三个电子在 f 、 g 和 h 三个函数中的六 $(3 \cdot 2 \cdot 1)$ 种可能排列。若 $f(1)g(2)h(3)$ 是薛定谔方程的解, 本征值为 E , 那么由于粒子的特性, (10.32) 至 (10.34) 的每个函数都是薛定谔方程的解, 本征值相同 (交换简并), 以及这些函数的任意线性组合也是本征值为 E 的本征函数。

反对称线性组合应具有如下形式:

$$\begin{aligned} c_1 f(1)g(2)h(3) + c_2 f(2)g(1)h(3) + c_3 f(3)g(2)h(1) + c_4 f(1)g(3)h(2) \\ + c_5 f(3)g(1)h(2) + c_6 f(2)g(3)h(1) \end{aligned} \quad (10.35)$$

因为 $f(2)g(1)h(3) = \hat{P}_{12}f(1)g(2)h(3)$, 为了使得 (10.35) 成为 $\hat{P}_{12}$ 的本征值为 -1 的本征函数, 我们必须有 $c_2 = -c_1$ 。同样地, $f(3)g(2)h(1) = \hat{P}_{13}f(1)g(2)h(3)$ 以及 $f(1)g(3)h(2) = \hat{P}_{23}f(1)g(2)h(3)$, 因此 $c_3 = -c_1$ 和 $c_4 = -c_1$ 。又因为 $f(3)g(1)h(2) = \hat{P}_{12}f(1)g(3)h(2)$, 我们必须有 $c_5 = -c_3 = c_1$ 。同样地, 有 $c_6 = c_1$ 。因此, 我们得出了线性组合

$$\begin{aligned} c_1 [f(1)g(2)h(3) - f(2)g(1)h(3) - f(3)g(2)h(1) - f(1)g(3)h(2) \\ + f(3)g(1)h(2) + f(2)g(3)h(1)] \end{aligned} \quad (10.36)$$

容易证明, 上式在交换 $1-2$ 、 $1-3$ 或 $2-3$ 时都满足交换反对称。[将 (10.36) 中的所有符号都变为 $+$ 号, 我们将得到一个完全对称的函数。]

假设 f 、 g 和 h 互相正交，选择 c_1 的合适值使得 (10.36) 归一化。将 (10.36) 与其复共轭相乘，我们得到了很多项，但由于假设的正交性，涉及 (10.36) 中两个不同项的所有乘积的积分都消失了。例如，

$$\begin{aligned} \int [f(1)g(2)h(3)]^* f(2)g(1)h(3) d\tau \\ = \int f^*(1)g(1) d\tau_1 \int g^*(2)f(2) d\tau_2 \int h^*(3)h(3) d\tau_3 = 0 \cdot 0 \cdot 1 = 0 \end{aligned}$$

由于 f 、 g 和 h 已归一化，因此涉及 (10.36) 项与其自身复共轭的乘积的积分等于 1。因此，

$$1 = \int |10.36|^2 d\tau = |c_1|^2 (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1)$$

$$c_1 = 1/\sqrt{6}$$

我们可以按原样处理 (10.36)，但如果我们将其视为以下三阶行列式的展开式 [式 (8.24)]，则最容易发现其性质：

$$\frac{1}{\sqrt{6}} \begin{vmatrix} f(1) & g(1) & h(1) \\ f(2) & g(2) & h(2) \\ f(3) & g(3) & h(3) \end{vmatrix} \quad (10.37)$$

(另见问题 8.22)。反对称性质在 (10.37) 中成立，因为交换两个电子相当于交换行列式的两行，行列式乘以 -1 。

现在我们利用 (10.37) 来证明不可能为三个电子构建一个反对称自旋函数。函数 f 、 g 和 h 可能是 α 或 β 。若我们取 $f = \alpha$ 、 $g = \beta$ 和 $h = \alpha$ ，则 (10.37) 变为

$$\frac{1}{\sqrt{6}} \begin{vmatrix} \alpha(1) & \beta(1) & \alpha(1) \\ \alpha(2) & \beta(2) & \alpha(2) \\ \alpha(3) & \beta(3) & \alpha(3) \end{vmatrix} \quad (10.38)$$

虽然 (10.38) 是一个反对称函数，但它的值为零，我们必须舍去它。行列式的第一列和第三列相同，所以 (第 8.3 节) 行列式的值为零。无论我们怎么取 f 、 g 和 h ，行列式至少有两列是相同的，所以我们无法构建一个非零的三电子交换反对称自旋函数。

现在我们利用 (10.37) 来构建锂的零级基态波函数，包括空间和自旋变量。函数 f 、 g 和 h 将同时涉及空间变量和自旋变量。我们选择

$$f(1) = 1s(1)\alpha(1) \quad (10.39)$$

我们称具有 (10.39) 形式的函数**自旋轨道** (spin-orbital)。自旋轨道是单电子空间轨道和单电子自旋函数的乘积。

若我们取 $g(1) = 1s(1)\alpha(1)$ ，这使得 (10.37) 的第一列和第二列相同，因此行列式的值为零。这是**泡利不相容原理** (Pauli Exclusion Principle) 的一个特例：两个电子不能占据同一个自旋轨道。另一种说法是，原子中不可能有两个电子的所有量子数具有相同的值。泡利不相容原理是由相同的自旋 $-\frac{1}{2}$ 粒子组成的系统的波函数的更一般的反对称要求的结果，它不如反对称声明令人满意，因为不相容原理是基于近似（零阶）波函数的。

因此，我们取 $g(1) = 1s(1)\beta(1)$ ，从而使得 $1s$ 轨道中的两个电子自旋相反。对于自旋轨道 h ，我们既不能取 $1s(1)\alpha(1)$ ，也不能取 $1s(1)\beta(1)$ ，因为这些选择会使行列式的值为零。我们取

$h(1) = 2s(1)\alpha(1)$ ，从而得到了熟悉的Li 基态组态 $1s^2 2s$ ，零级波函数为

$$\psi^{(0)} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{vmatrix} 1s(1)\alpha(1) & 1s(1)\beta(1) & 2s(1)\alpha(1) \\ 1s(2)\alpha(2) & 1s(2)\beta(2) & 2s(2)\alpha(2) \\ 1s(3)\alpha(3) & 1s(3)\beta(3) & 2s(3)\alpha(3) \end{vmatrix} \quad (10.40)$$

特别要注意的是，(10.40) 并不是简单的空间和自旋部分的乘积（就像我们发现的 H 和 He 一样），而是多个项的线性组合，每个项都是空间和自旋部分的乘积。

同样地，我们也可以取 $h(1) = 2s(1)\beta(1)$ ，那么与氢一样，锂的基态是二重简并的，对应于 $2s$ 电子自旋的两种可能方向。我们可以使用轨道图来表明这点：

$$\begin{array}{cc} 1s & 2s \\ \uparrow\downarrow & \uparrow \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{cc} 1s & 2s \\ \uparrow\downarrow & \downarrow \end{array}$$

每个空间轨道，例如 $1s$ 或 $2p_0$ ，可以容纳两个自旋相反的电子。一个自旋轨道，例如 $2s\alpha$ ，只能容纳一个电子。

虽说组态 $1s^2 2p$ 与 $1s^2 2s$ 具有相同的无扰能量 $E^{(0)}$ ，但我们在计算 $E^{(1)}$ 以及更高级的校正时引入了电子斥力，就会发现 $1s^2 2s$ 组态的能量较低，原因与氮的情况相同。

考虑一下关于泡利不相容原理的一些观点，我们重述如下：在一个由相同费米子组成的系统中，没有两个粒子可以占据相同的状态。如果我们有一个由 n 个相互作用粒子组成的系统（例如原子），那么整个系统只有一个波函数（涉及 $4n$ 个变量）。由于粒子间的相互作用，波函数不能写成单个粒子波函数的乘积。因此，严格来说，我们不能谈论单个粒子的状态，只能谈论整个系统的状态。不过，如果粒子之间的相互作用不太大，那么作为初始近似，我们可以忽略它们，将系统的零阶波函数写成单个粒子波函数的乘积。在这个零阶波函数中，没有两个费米子的波函数（状态）是相同的。

由于玻色子要求一个交换对称波函数，因此对给定状态下的玻色子数量没有限制。

1925 年，爱因斯坦证明，在非相互作用玻色子的理想气体中，存在一个非常低的温度 T_c （称为凝结温度），高于这个温度时，基态玻色子的分数 f 可以忽略不计，但低于这个温度时， f 会变得可观，并随着绝对温度 T 变为 0 而变为 1。立方体中非相互作用玻色子的 f 满足的方程为 $f = 1 - (T/T_c)^{3/2}$ ， $T < T_c$ [McQuarrie (2000), Section 10-4]。大量玻色子落入基态的现象被称为玻色-爱因斯坦凝聚 (Bose-Einstein condensation)。玻色-爱因斯坦凝聚对于确定超流体液体（其原子是玻色子）的性质非常重要，但液体 He 中的原子间相互作用使理论分析变得困难。

1995 年，物理学家成功地在气体中产生了玻色-爱因斯坦凝聚 [Physics Today, August 1995, p. 17; C. E. Wieman, Am. J. Phys., 64, 847 (1996)]。他们使用了 ^{87}Rb 原子的气体。一个 Rb 原子含有 87 个核子和 37 个电子，由于它具有偶数 (124) 个费米子，因此是玻色子。在激光、外加不均匀磁场和外加射频辐射的共同作用下，样品中的 10^4 ^{87}Rb 原子被冷却到 10^{-7} K，从而使相当一部分原子凝结成基态。然后，利用射频辐射去除大部分处于激发态的原子，留下由 2000 个原子组成的凝聚态，其中几乎所有原子都处于基态。实验中的每个 Rb 都受到原子总自旋磁矩与外加磁场相互作用产生的势能函数 $V(x, y, z)$ 的影响（第 6.8 节和第 10.9 节）。不均匀的外加磁场使得势能 V 为三维谐振子（见问题 4.20）的势能加上一个常数。玻色-爱因斯坦凝聚态中的 Rb 原子处于这个谐振子势能的基态。

10.6 斯莱特行列式

斯莱特 (Slater) 在 1929 年指出，形式为 (10.40) 的行列式满足多电子原子的反对称要求。类似 (10.40) 的行列式称为**斯莱特行列式** (Slater Determinants)。斯莱特行列式的某一列中的所有元

素都涉及相同的自旋轨道，而同一行中的所有元素都涉及相同的电子。（由于交换行列并不影响行列式的值，我们可以用另一种等价形式来书写斯莱特行列式）。

考虑一下我们之前导出的零级氦波函数如何写成斯莱特行列式。对于基态组态 $1s^2$ ，我们有自旋轨道 $1s\alpha$ 和 $1s\beta$ 。因此，斯莱特行列式为

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} 1s(1)\alpha(1) & 1s(1)\beta(1) \\ 1s(2)\alpha(2) & 1s(2)\beta(2) \end{vmatrix} = 1s(1)1s(2) \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)] \quad (10.41)$$

与 (10.26) 一致。对于与激发构型 $1s2s$ 相对应的态，我们有以下可能的自旋轨道 $1s\alpha$ 、 $1s\beta$ 、 $2s\alpha$ 和 $2s\beta$ 。因此，斯莱特行列式为

$$\begin{aligned} D_1 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} 1s(1)\alpha(1) & 2s(1)\alpha(1) \\ 1s(2)\alpha(2) & 2s(2)\alpha(2) \end{vmatrix} & D_2 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} 1s(1)\alpha(1) & 2s(1)\beta(1) \\ 1s(2)\alpha(2) & 2s(2)\beta(2) \end{vmatrix} \\ D_3 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} 1s(1)\beta(1) & 2s(1)\alpha(1) \\ 1s(2)\beta(2) & 2s(2)\alpha(2) \end{vmatrix} & D_4 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} 1s(1)\beta(1) & 2s(1)\beta(1) \\ 1s(2)\beta(2) & 2s(2)\beta(2) \end{vmatrix} \end{aligned}$$

与 (10.27) 至 (10.30) 的比较表明， $1s2s$ 零阶波函数与这四个斯莱特行列式的关系如下：

$$2^{-1/2} [1s(1)2s(2) - 2s(1)1s(2)] \alpha(1)\alpha(2) = D_1 \quad (10.42)$$

$$2^{-1/2} [1s(1)2s(2) - 2s(1)1s(2)] \beta(1)\beta(2) = D_4 \quad (10.43)$$

$$2^{-1/2} [1s(1)2s(2) - 2s(1)1s(2)] 2^{-1/2} [\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)] = 2^{-1/2} (D_2 + D_3) \quad (10.44)$$

$$2^{-1/2} [1s(1)2s(2) + 2s(1)1s(2)] 2^{-1/2} [\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)] = 2^{-1/2} (D_2 - D_3) \quad (10.45)$$

（要得到一个自旋和轨道角动量算子的特征函数的零级函数，我们有时必须对组态的斯莱特行列式进行线性组合；见第 11 章。）

接下来，我们来看看斯莱特行列式的一些符号。与用 α 和 β 表示自旋函数不同，人们通常在空间函数上加一横杠，表示自旋函数 β ，而没有横杠的空间函数则表示自旋因子 α 。根据这种符号，(10.40) 可以写成

$$\psi^{(0)} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{vmatrix} 1s(1) & \overline{1s}(1) & 2s(1) \\ 1s(2) & \overline{1s}(2) & 2s(2) \\ 1s(3) & \overline{1s}(3) & 2s(3) \end{vmatrix} \quad (10.46)$$

有了电子占据的自旋轨道，我们就可以很容易地构建斯莱特行列式。因此，斯莱特行列式通常使用简记符号，只需指定自旋轨道即可。在这种符号中，(10.46) 通常写为

$$\boxed{\psi^{(0)} = |1s\overline{1s}2s|} \quad (10.47)$$

其中竖线表示行列式并乘以 $1/\sqrt{6}$ 。

我们已经证明，因子 $1/\sqrt{6}$ 使由正交函数构成的三阶斯莱特行列式归一化。 n 阶行列式的展开式有 $n!$ 项（问题 8.20）。对于由正交轨道构成的 n 阶斯莱特行列式，与三阶行列式相同的推理表明：归一化常数为 $1/\sqrt{n!}$ 。因此，在定义 n 阶斯莱特行列式时，我们总是加上因子 $1/\sqrt{n!}$ 。

10.7 微扰理论处理基态锂原子

让我们对锂原子的基态进行微扰处理。定义 $e' \equiv e/4\pi\epsilon_0$ ，我们有

$$\hat{H}^0 = \frac{-\hbar^2}{2m_e} \nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_2^2 - \frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_3^2 - \frac{Ze'^2}{r_1} - \frac{Ze'^2}{r_2} - \frac{Ze'^2}{r_3}, \quad \hat{H}' = \frac{e'^2}{r_{12}} + \frac{e'^2}{r_{13}} + \frac{e'^2}{r_{23}}$$

在10.5节中, 我们已经知道: 为了满足反对称要求, 基态组态必须为 $1s^2 2s$ 。零级校正波函数为 (10.40):

$$\begin{aligned}\psi^{(0)} = & 6^{-1/2} [1s(1) 1s(2) 2s(3) \alpha(1) \beta(2) \alpha(3) - 1s(1) 2s(2) 1s(3) \alpha(1) \alpha(2) \beta(3) \\ & - 1s(1) 1s(2) 2s(3) \beta(1) \alpha(2) \alpha(3) + 1s(1) 2s(2) 1s(3) \beta(1) \alpha(2) \alpha(3) \\ & + 2s(1) 1s(2) 1s(3) \alpha(1) \alpha(2) \beta(3) - 2s(1) 1s(2) 1s(3) \alpha(1) \beta(2) \alpha(3)]\end{aligned}\quad (10.48)$$

$E^{(0)}$ 是什么? $\psi^{(0)}$ 中的每一项都是两个 $1s$ 类氢函数、一个 $2s$ 类氢函数与一个自旋因子的乘积。 $\hat{H}^0$ 是三个类氢哈密顿量之和, 每个电子一个, 且不包含自旋。则 $\psi^{(0)}$ 是本征值为 $E_{1s}^{(0)} + E_{1s}^{(0)} + E_{2s}^{(0)}$ 的本征函数的线性组合, 其中这些能量是类氢能量。那么 $\psi^{(0)}$ 是 $\hat{H}^0$ 的本征函数, 其本征值为 $E^{(0)} = 2E_{1s}^{(0)} + E_{2s}^{(0)}$ 。则 [式 (6.94)]

$$E^{(0)} = -\left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2}\right) \left(\frac{Z^2 e'^2}{2a_0}\right) = -\frac{81}{4} (13.606 \text{ eV}) = -275.5 \text{ eV} \quad (10.49)$$

$E^{(1)} = \langle \psi^{(0)} | \hat{H}' | \psi^{(0)} \rangle$ 的计算概述于问题 10.15。可以得出:

$$\begin{aligned}E^{(1)} = & 2 \int \int 1s^2(1) 2s^2(2) \frac{e'^2}{r_{12}} dv_1 dv_2 + \int \int 1s^2(1) 1s^2(2) \frac{e'^2}{r_{12}} dv_1 dv_2 \\ & - \int \int 1s(1) 2s(2) 1s(2) 2s(1) \frac{e'^2}{r_{12}} dv_1 dv_2\end{aligned}\quad (10.50)$$

这些积分是库仑积分和交换积分:

$$E^{(1)} = 2J_{1s2s} + J_{1s1s} - K_{1s2s} \quad (10.51)$$

我们有 [式 (9.52)、(9.53) 和 (9.111)]:

$$\begin{aligned}J_{1s1s} &= \frac{5}{8} \frac{Ze'^2}{a_0}, \quad J_{1s2s} = \frac{17}{81} \frac{Ze'^2}{a_0}, \quad K_{1s2s} = \frac{16}{729} \frac{Ze'^2}{a_0} \\ E^{(1)} &= \frac{5965}{972} \left(\frac{e'^2}{2a_0}\right) = 83.5 \text{ eV}\end{aligned}$$

一级微扰能量为 -192.0 eV , 与 Li 基态真实值 -203.5 eV 相比较。为了改进该结果, 我们可以计算更高级的波函数和能量校正。这将混入涉及 $1s^2 2s$ 以外组态的斯莱特行列式的波函数贡献中 (组态相互作用)。

10.8 变分法处理基态锂原子

零级校正微扰波函数 (10.40) 使用了 Li $1s$ 和 $2s$ 轨道的完整核电荷 ($Z = 3$)。我们预计, 被两个 $1s$ 电子部分屏蔽在原子核外的 $2s$ 电子的有效核电荷将远小于 3。即使是 $1s$ 电子也会部分地相互屏蔽 (回顾一下氦基态的处理)。根据这一推理, 可以在 (10.40) 中引入两个变分参数 b_1 和 b_2 。

不使用表 6.2 中 $Z = 3$ 的 $1s$ 函数, 我们令

$$f \equiv \frac{1}{\pi^{1/2}} \left(\frac{b_1}{a_0}\right)^{3/2} e^{-b_1 r/a_0} \quad (10.52)$$

其中, b_1 是一个变分参数, 代表 $1s$ 电子的有效核电荷。不使用表 6.2 中 $Z = 3$ 的 $2s$ 函数, 我们令

$$g = \frac{1}{4(2\pi)^{1/2}} \left(\frac{b_2}{a_0}\right)^{3/2} \left(2 - \frac{b_2 r}{a_0}\right) e^{-b_2 r/2a_0} \quad (10.53)$$

则我们的试探变分函数为

$$\phi = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{vmatrix} f(1)\alpha(1) & f(1)\beta(1) & g(1)\alpha(1) \\ f(2)\alpha(2) & f(2)\beta(2) & g(2)\alpha(2) \\ f(3)\alpha(3) & f(3)\beta(3) & g(3)\alpha(3) \end{vmatrix} \quad (10.54)$$

由于我们对 $1s$ 和 $2s$ 轨道的电荷进行了 b_1 和 b_2 的修改, 则它们不再正交, 因此 (10.54) 尚未归一化。变分参数的最佳值通过令 $\partial W/\partial b_1 = 0$ 和 $\partial W/\partial b_2 = 0$ 来确定, 其中变分积分 W 由 (8.9) 的左侧给出。结果为 [E. B. Wilson, Jr., *J. Chem. Phys.*, **1**, 210 (1933)] $b_1 = 2.686, b_2 = 1.776, W = -201.2 \text{ eV}$ 。与上一节的结果 -192.0 eV 相比, 这个变分结果更接近锂基态的真实能量 -203.5 eV 。 b_2 的值表明 $1s$ 电子对 $2s$ 电子的屏蔽作用很强, 但并不完全。

除了 (10.52) 和 (10.53) 之外, 我们还可以尝试其他形式的轨道来改进试探函数。然而, 无论我们尝试何种轨道函数, 如果我们将自己限制在 (10.54) 形式的试探函数中, 我们就永远无法得到真正的基态能量。为此, 我们可以在试函数中引入 r_{12} 、 r_{23} 和 r_{13} , 或者使用与各种构型相对应的几个斯莱特行列式的线性组合 (组态相互作用)。

10.9 自旋磁矩

回忆: 电子的轨道角动量 $\mathbf{L}$ 有一磁矩 $-(e/2m_e)\mathbf{L}$ 与之相关联 [式 (6.128)], 其中 $-e$ 是电子的电荷。我们很自然地假设也有磁矩 $\mathbf{m}_S$ 与电子的自旋 $\mathbf{S}$ 相关联。猜测 $\mathbf{m}_S$ 为 $-(e/2m_e)$ 乘以 $\mathbf{S}$ 。然而, 自旋是一个相对论现象, 我们不能希望 $\mathbf{m}_S$ 与 $\mathbf{S}$ 的关系和 $\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{S}$ 的关系完全一致。事实上, 狄拉克对电子的相对论处理得出了以下结果 (使用 SI 单位制)

$$\mathbf{m}_S = -g_e \frac{e}{2m_e} \mathbf{S} \quad (10.55)$$

对于电子的 g 因子 g_e , 狄拉克得出 $g_e = 2$ 。在狄拉克的研究之后, 理论和实验研究表明 g_e 实际上略大于 2, $g_e = 2(1 + \alpha/2\pi + \dots) = 2.0023$, 其中的省略表示含 α 更高次幂的项, 其中精细结构常数 (fine-structure constant) α 为

$$\alpha \equiv \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} = 0.00729735257 \quad (10.56)$$

对 g_e 的测量结果异常精确 [D. Hanneke et al., *Phys. Rev. A*, **83**, 052122 (2011); available at arxiv.org/abs/1009.4831]: $g_e = 2.002319304361$ 。[有些工作者倾向于省略 (10.55) 中的负号, 而采用 g_e 为负数的惯例; 见 www.stanford.edu/group/Zarelab/publinks/zarepub642.pdf。]

电子自旋磁矩的大小为 (采用 SI 单位制)

$$|\mathbf{m}_S| = g_e \frac{e}{2m_e} |\mathbf{S}| = g_e \sqrt{\frac{3}{4}} \frac{e\hbar}{2m_e} \quad (10.57)$$

铁的铁磁性是由电子的磁矩引起的。

在外加磁场中, 电子自旋及其相关自旋磁矩相对于轴的两种可能取向会产生两种能级。在电子自旋共振 (ESR) 光谱学中, 人们可以观察到这两个能级之间的跃迁。ESR 光谱法适用于自由基和过渡金属离子等具有一个或多个非配对电子自旋的物质, 因此它们的总电子自旋和自旋磁矩都不为零。

核磁共振 (NMR) 谱

许多原子核具有不为零的自旋角动量 $\mathbf{I}$ 。与 (10.4) 和 (10.5) 类似, $\mathbf{I}$ 的模为 $[I(I+1)]^{1/2}\hbar$, 其中核自旋量子数 I 可以为 $0, \frac{1}{2}, 1$ 等; $\mathbf{I}$ 的 z 方向分量为 $M_I\hbar$, 其中 $M_I = -I, -I+1, \dots, I$ 。一些

I 值如下：质子数和中子数为偶数的核为零（例如 $^{16}_8\text{O}$ 和 $^{12}_6\text{C}$ ）； H 、 $^{13}_6\text{C}$ 、 $^{19}_9\text{F}$ 、 $^{31}_{15}\text{P}$ 为 $\frac{1}{2}$ ； ^2_1H 和 $^{14}_7\text{N}$ 为 1； $^{11}_5\text{B}$ 、 $^{23}_{11}\text{Na}$ 、 $^{35}_{17}\text{Cl}$ 为 $\frac{3}{2}$ 。若 $I \neq 0$ ，则原子核的自旋磁矩 $\mathbf{m}_I$ 由与 (10.55) 类似的关系给出：

$$\mathbf{m}_I = g_N (e/2m_p) \mathbf{I} \equiv \gamma \mathbf{I} \quad (10.58)$$

其中 m_p 是质子质量，核的 g 因子 g_N 的值与核有关。 γ 称为**磁旋比** (magnetogyric ratio)，定义为 $\gamma \equiv \mathbf{m}_I/\mathbf{I} = g_N e/2m_p$ 。某些核的 I 、 g_N 和 γ 值如下表所示：

核	^1H	^{12}C	^{13}C	^{15}N	^{19}F	^{31}P
I	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
g_N	5.58569		1.10482	-0.56638	5.25773	2.2632
$\gamma/(\text{MHZ/T})$	267.522		67.283	-27.126	251.815	108.39

在核磁共振 (NMR) 光谱学中，人们可以观察到外加磁场中核自旋能级之间的跃迁。将样品（最常见的是所研究化合物的稀释溶液）置于强磁铁的两极之间。孤立的核自旋磁矩 $\mathbf{m}_I$ 在外部磁场 $\mathbf{B}$ 中的相互作用能量由公式 (6.131) 得出为 $E = -\mathbf{m}_I \cdot \mathbf{B}$ 。将 $\mathbf{m}_I$ 用 (10.58) 代替，并取 $\mathbf{B}$ 沿 z 轴方向，则能量为

$$E = -\mathbf{m}_I \cdot \mathbf{B} = -\gamma (I_x \mathbf{i} + I_y \mathbf{j} + I_z \mathbf{k}) \cdot (B \mathbf{k}) = -\gamma B I_z$$

我们将经典量 I_z 替换为 $\hat{I}_z$ ，从而将这一经典能量表达式转换为哈密顿算符。因此， $\hat{H} = -\gamma B \hat{I}_z$ 。令 $|M_I\rangle$ 表示同时是算符 $\hat{I}^2$ （为核自旋角动量大小的平方）和 $\hat{I}_z$ 的本征函数。我们有

$$\hat{H} |M_I\rangle = -\gamma B \hat{I}_z |M_I\rangle = -\gamma B M_I \hbar |M_I\rangle \quad (10.59)$$

因此，(10.59) 得出外加磁场中孤立核自旋的能级为

$$E = -\gamma \hbar B M_I, \quad M_I = -I, -I+1, \dots, I$$

在 NMR 光谱中，样品暴露在电磁辐射下，电磁辐射会诱导核自旋能级之间的跃迁。选律为 $\Delta M_I = \pm 1$ 。因此，NMR 的跃迁频率如下所示：

$$h\nu = |\Delta E| = |\gamma| \hbar B |\Delta M_I| = |\gamma| \hbar B$$

$$\nu = (|\gamma|/2\pi) B = |g_N| (e/4\pi m_p) B \quad (10.60)$$

γ 的值因核的不同而异，而在任何一次实验中，人们研究的都是一种原子核的核磁共振谱。研究最广泛的核是质子 ^1H 。第二广泛的是 ^{13}C 。 ^{13}C 同位素在碳元素中的丰度约为 1%。

公式 (10.60) 适用于除外部磁场 $\mathbf{B}$ 存在外与外界隔绝的原子核。对于分子中的原子核，我们还必须考虑分子电子对每个原子核所受到的磁场的贡献。在大多数基态分子中，电子自旋都是成对的，没有电子轨道角动量。由于没有电子自旋或轨道角动量，电子不会对每个原子核受到的磁场产生影响。然而，外部外加磁场 $\mathbf{B}$ 会扰动分子电子波函数，从而对每个原子核的磁场产生电子贡献。这种电子贡献与外部磁场 B 的大小成正比，方向通常与 B 相反。因此，核 i 受到分子中磁场的贡献为 $B - \sigma_i B = (1 - \sigma_i) B$ ，其中比例常数 σ_i 称为核 I 的**屏蔽常数** (screening constant or shielding constant)，且远小于 1。对于分子中的原子核，公式 (10.60) 变为

$$\nu_i = (|\gamma_i|/2\pi) (1 - \sigma_i) B \quad (10.61)$$

分子中电子环境相同核的 σ_i 值相同。例如，在分子 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ 中， CH_3 中的三个质子有相同的 σ_i 值， CH_2 中的两个质子有相同的 σ_i 值。（乙烷交叉构象的 Newman 投影式表明： CH_3 中有两个氢原子比另一个更接近官能团 OH ，但乙醇内旋转能垒较低，因此三个甲基氢可以在室温下迅速转换，从而使这三个氢的电子环境相同。）

因此，我们希望乙烷的 ^1H NMR 谱图有三个峰——一个是 CH_3 中的三个质子的峰，一个是 CH_2 中的两个质子的峰，还有一个是 OH 中的一个质子的峰，这些峰的相对强度为 3:2:1。然而，还存在一种称为自旋-自旋耦合（spin-spin coupling）的额外效应，其中一个碳原子上的质子核自旋会影响相邻碳原子上质子受到的磁场。一个碳原子上质子自旋的不同可能取向会在相邻碳原子上的质子处产生不同的磁场，从而使相邻碳原子上质子的核磁共振（NMR）跃迁发生分裂。例如，两个 CH_2 质子有以下四种可能的核自旋方向：

$$\uparrow\uparrow \quad \uparrow\downarrow \quad \downarrow\uparrow \quad \downarrow\downarrow \quad (10.62)$$

其中向上和向下的箭头分别表示 $M_I = \frac{1}{2}$ 和 $M_I = -\frac{1}{2}$ 。[实际上，由于全同粒子的不可区分性，式 (10.62) 中的中间两个自旋态必须用这两个态的线性组合来替换，从而得到与电子自旋函数 (10.22) 至 (10.25) 相似的核自旋态。] 式 (10.62) 中的中间两个自旋态对 CH_3 质子所感受到的磁场具有相同的影响，因此式 (10.62) 中的四个自旋态在 CH_3 质子处产生三个不同的磁场，从而将 CH_3 质子的 NMR 谱线裂分为三条相对强度为 1:2:1 的紧密相邻谱线，这对应于产生每个磁场的 CH_2 质子自旋态的数量。人们可能会预测 CH_2 质子也会使 OH 质子的核磁共振吸收线发生分裂。然而，即使乙醇中存在微量水分，也会催化 OH 质子在不同乙醇分子间快速交换，从而消除 OH 吸收线的分裂现象。

对 CH_3 质子可能的取向进行类似分析（问题 10.22）表明， CH_3 质子将乙醇 CH_2 质子的 NMR 谱线裂分为四条谱线，相对强度比为 1:3:3:1。一般规则是，原子上的一组 n 个等价质子会将相邻原子上质子的 NMR 谱线裂分为 $n+1$ 条谱线。自旋-自旋裂分（通过化学键传递）过于微弱，无法影响与分裂质子相隔超过三个化学键的质子的 NMR 谱线。在 $\text{CH}_3\text{CH}_2(\text{O})\text{H}$ 的 ^1H NMR 谱中， CH_3 质子将 CH_2 质子谱线裂分为 4 条，而每条谱线又被 $\text{C}(\text{O})\text{H}$ 质子裂分为两条，因此 CH_2 核磁共振谱线最终裂分为 8 条。（乙醇中分子间质子交换阻止了 OH 质子对 CH_2 质子 NMR 吸收的分裂作用。）

$I = 0$ 的核（例如 ^{14}C ， ^{16}O ）不会裂分 ^1H NMR 谱线。可以证明 $I > \frac{1}{2}$ 的核（例如 ^{35}Cl ， ^{37}Cl 核 ^{14}N ）一般也不会裂分 ^1H NMR 谱线。核 ^{19}F 满足 $I = \frac{1}{2}$ 但会导致谱线裂分。此外，量子力学分析表明，等价质子之间的自旋-自旋相互作用不会影响 NMR 谱。

刚才进行的处理（称为一阶分析）实际上是一种近似方法，其有效性取决于自旋-自旋裂分能远小于所有化学非等价核之间的 NMR 频率差。在非常大的分子中，可能会存在化学非等价核，它们处于略有不同的电子环境中，因此它们之间的 NMR 频率差将非常小，一阶分析将不再成立。通过增强施加的磁场强度，可以增大化学上不等价核之间的 NMR 频率差，从而使谱图趋于二阶分析，这更便于分析。此外，随着磁场强度的增加，信号强度也会增强。因此，人们尽量使用尽可能高的磁场。当前 NMR 研究谱仪的磁场强度对应于 ^1H NMR 频率在 300 至 1000 MHz 的范围。

NMR 光谱学是有机化学中首屈一指的结构研究工具，而特殊 NMR 技术则能够借助 NMR 技术确定小分子蛋白质的结构。

10.10 电子自旋的梯度算符

自旋角动量算符满足第 5.4 节中给出的角动量对易关系，且常使用自旋角动量阶梯算符进行计算。

根据式 (5.110) 和 (5.111)，自旋角动量算符的阶梯算符为

$$\hat{S}_+ = \hat{S}_x + i\hat{S}_y, \quad \hat{S}_- = \hat{S}_x - i\hat{S}_y \quad (10.63)$$

再根据式 (5.112) 和 (5.113), 有

$$\hat{S}_+ \hat{S}_- = \hat{S}^2 - \hat{S}_z^2 + \hbar \hat{S}_z \quad (10.64)$$

$$\hat{S}_- \hat{S}_+ = \hat{S}^2 - \hat{S}_z^2 - \hbar \hat{S}_z \quad (10.65)$$

自旋函数 α 和 β 是 $\hat{S}_z$ 的本征函数, 其本征值分别为 $+\frac{1}{2}\hbar$ 和 $-\frac{1}{2}\hbar$ 。由于 $\hat{S}_+$ 是升算符, 则函数 $\hat{S}_+\beta$ 是 $\hat{S}_z$ 的本征函数, 本征值为 $+\frac{1}{2}\hbar$ 。具有该本征值的 $\hat{S}_z$ 最一般的本征函数为任意常数乘以 α 。因此,

$$\hat{S}_+\beta = c\alpha \quad (10.66)$$

其中 c 是任意常数。为了求出 c , 我们使用归一化条件 [式 (10.11)]:

$$\begin{aligned} 1 &= \sum_{m_s} [\alpha(m_s)]^* \alpha(m_s) = \sum (\hat{S}_+\beta/c)^* (\hat{S}_+\beta/c) \\ |c|^2 &= \sum (\hat{S}_+\beta)^* (\hat{S}_+\beta) = \sum (\hat{S}_+\beta)^* (\hat{S}_x + i\hat{S}_y) \beta \\ |c|^2 &= \sum (\hat{S}_+\beta)^* \hat{S}_x \beta + i \sum (\hat{S}_+\beta)^* \hat{S}_y \beta \end{aligned} \quad (10.67)$$

我们现在使用算符 $\hat{S}_x$ 和 $\hat{S}_y$ 的厄米性。对于作用在任意连续变量 x 上的算符 $\hat{A}$, 厄米性为

$$\int_{-\infty}^{\infty} f^*(x) \hat{A}g(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) [\hat{A}f(x)]^* dx$$

对于作用于具有离散值的变量 m_s 的算符, 例如 $\hat{S}_x$, 则厄米性为

$$\sum_{m_s} f^*(m_s) \hat{S}_x g(m_s) = \sum_{m_s} g(m_s) [\hat{S}_x f(m_s)]^* \quad (10.68)$$

令 $f = \hat{S}_+\beta$ 和 $g = \beta$, 则我们将 (10.67) 写作

$$c^*c = \sum \beta(\hat{S}_x \hat{S}_+\beta)^* + i \sum \beta(\hat{S}_y \hat{S}_+\beta)^*$$

取该方程的复共轭, 使用 (10.63) 和 (10.65), 我们得到

$$\begin{aligned} cc^* &= \sum \beta^* \hat{S}_x \hat{S}_+\beta - i \sum \beta^* \hat{S}_y \hat{S}_+\beta \\ |c|^2 &= \sum \beta^* (\hat{S}_x - i\hat{S}_y) \hat{S}_+\beta = \sum \beta^* \hat{S}_- \hat{S}_+\beta \\ |c|^2 &= \sum \beta^* (\hat{S}^2 - \hat{S}_z^2 - \hbar \hat{S}_z) \beta \\ |c|^2 &= \sum \beta^* \left(\frac{3}{4}\hbar^2 - \frac{1}{4}\hbar^2 + \frac{1}{2}\hbar^2 \right) \beta = \hbar^2 \sum \beta^* \beta = \hbar^2 \sum \beta^* \beta = \hbar \\ |c| &= \hbar \end{aligned}$$

令 c 的相位为零, 我们有 $c = \hbar$, 则 (10.66) 变为

$$\hat{S}_+\beta = \hbar\alpha \quad (10.69)$$

相似的计算给出

$$\hat{S}_-\alpha = \hbar\beta \quad (10.70)$$

因为 α 是具有最大 m_s 可能值的本征函数, 所以 $\hat{S}_+$ 作用于 α 时应得零 [式 (5.135)]:

$$\hat{S}_+\alpha = 0$$

同样地,

$$\hat{S}_-\beta = 0$$

根据最后这四个方程, 我们得到

$$(\hat{S}_+ + \hat{S}_-)\beta = \hbar\alpha, \quad (\hat{S}_+ + \hat{S}_-)\alpha = \hbar\beta \quad (10.71)$$

将 (10.63) 代入 (10.71), 得到

$$\hat{S}_x\beta = \frac{1}{2}\hbar\alpha, \quad \hat{S}_x\alpha = \frac{1}{2}\hbar\beta \quad (10.72)$$

同样地, 有

$$\hat{S}_x\alpha = \frac{1}{2}\hbar\beta, \quad \hat{S}_y\alpha = \frac{1}{2}i\hbar\beta \quad (10.73)$$

自旋算符的矩阵表示在问题 10.28 中讨论。

总结

习题

Chapter 11

多电子原子

11.1 Hartree-Fock 自洽场方法

对于氢原子,其精确波函数是已知的。对于氦和锂,通过在变分函数中引入电子间距离,已经计算出了非常精确的波函数。对于原子序数较高的原子,找到精确波函数的一种方法是首先使用 Hartree-Fock 方法找到一个近似波函数,我们将在本节中概述该方法。Hartree-Fock 方法是多电子系统中使用原子和分子轨道的基础。

n 电子原子的哈密顿算符为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \sum_{i=1}^n \nabla_i^2 - \sum_{i=1}^n \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_i} + \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} \quad (11.1)$$

其中假设存在一个质量无限大的点状原子核 (第6.6节)。(11.1) 中的第一个求和包含了 n 个电子的动能算符。第二个求和为电子和核电荷 Ze 之间的吸引势 (6.58)。对于中性原子,有 $Z = n$ 。最后一个求和为电子排斥势。限制 $j > i$ 避免了重复计算电子间排斥力,且舍去了如 $e^2/4\pi\epsilon_0 r_{ii}$ 这样的项。哈密顿算符 (11.1) 是不完整的,因为它忽略了自旋轨道和其他相互作用。略去的项较小 (除了具有高 Z 值的原子,它们将在第11.6和11.7节中讨论)。

Hartree 自洽场方法

由于电子间排斥项 $e^2/4\pi\epsilon_0 r_{ij}$ 的存在,单原子的薛定谔方程无法分离变量。回忆处理氢原子的微扰法 (第9.3节),通过忽略这些排斥项,我们可以得到零级波函数。那么薛定谔方程就可以分离成 n 个单电子类氢方程。零级波函数就是 n 个类氢 (单电子) 轨道的乘积:

$$\psi^{(0)} = f_1(r_1, \theta_1, \phi_1) f_2(r_2, \theta_2, \phi_2) \cdots f_n(r_n, \theta_n, \phi_n) \quad (11.2)$$

其中类氢轨道为

$$f = R_{nl}(r) Y_l^m(\theta, \phi) \quad (11.3)$$

对于原子的基态,我们将两个自旋相反的电子放入最低能级轨道中,这符合泡利不相容原理,从而得到基态组态。虽然近似波函数 (11.2) 在定性上很有用,但在定量精度方面却存在严重缺陷。首先,所有轨道都使用了完整的核电荷数 Z 。回顾我们对氦和锂的变分处理,我们知道可以通过为不同轨道使用不同的有效原子数来考虑电子的屏蔽效应,从而获得更好的近似。使用有效原子数会带来显著的改进,但我们与获得一个准确的波函数仍相去甚远。下一步是使用与 (11.2) 形式相同的变分函

数，但不限于类氢原子或其他特定轨道形式。因此，我们采用

$$\phi = g_1(r_1, \theta_1, \phi_1) g_2(r_2, \theta_2, \phi_2) \cdots g_n(r_n, \theta_n, \phi_n) \quad (11.4)$$

并寻找能使变分积分 $\langle \phi | \hat{H} | \phi \rangle / \langle \phi | \phi \rangle$ 最小化的函数组 $g_1, g_2, \dots, g_n$ 。我们的任务比之前的变分计算更为困难，因为在之前的变分计算中，我们是先假设一个包含某些参数的试探函数，然后对这些参数进行调整。而在 (11.4) 中，我们必须调整函数 g_i 。【找到最合适的函数组 g_i 后，方程 (11.4) 仍只是一个近似波函数。多电子原子的薛定谔方程无法分离变量，那么真实波函数无法写成 n 个单电子函数的乘积。】

为了简化问题，我们将最佳可能的原子轨道近似为径向因子与球谐函数的乘积形式：

$$g_i = h_i(r_i) Y_{l_i}^{m_i}(\theta_i, \phi_i) \quad (11.5)$$

这种近似通常在原子计算中使用。

寻找函数 g_i 的程序由 Hartree 于 1928 年提出，被称为 **Hartree 自洽场 (SCF) 方法** (Hartree self-consistent field method)。Hartree 通过直观的物理论证得出了 SCF 程序。Hartree 方法能得到形式为 (11.4) 的最佳可能变分函数的证明，由 Slater 和 Fork 于 1930 年给出。【For the proof and a review of the SCF method, see S. M. Blinder, *Am. J. Phys.*, **33**, 431 (1965).】

Hartree 的过程如下所述。我们首先假设一个波函数的乘积

$$\phi_0 = s_1(r_1, \theta_1, \phi_1) s_2(r_2, \theta_2, \phi_2) \cdots s_n(r_n, \theta_n, \phi_n) \quad (11.6)$$

其中每个 s_i 都是一个关于 r 的已归一化函数与球谐函数的乘积。合理假设 ϕ_0 是一系列具有有效原子数的类氢轨道的乘积。对于函数 (11.6)，电子 i 的概率密度为 $|s_i|^2$ 。我们现在只关注电子 1，将电子 2, 3, ..., n 看作一个电荷的固定分布，电子 1 在该分布中运动。因此，我们实际上是在平均电子 1 与其他电子之间的瞬时相互作用。点电荷 Q_1 和 Q_2 之间相互作用势为 $V_{12} = Q_1 Q_2 / 4\pi\epsilon_0 r_{12}$ 【式 (6.58)】。我们将 Q_2 展开为一个连续的电荷分布，使得 ρ_2 是电荷密度，即单位体积内的电荷量。则体积微元 dv_2 中的元电荷为 $\rho_2 dv_2$ ，再对 Q_1 和元电荷之间的相互作用求和，我们有

$$V_{12} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho_2}{r_{12}} dv_2$$

对于电子 2（电荷为 $-e$ ），假设电子云的电荷密度为 $\rho_2 = -e |s_2|^2$ ；对于电子 1， $Q_1 = -e$ 。那么

$$V_{12} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{|s_2|^2}{r_{12}} dv_2$$

考虑与其他电子的相互作用，我们得到

$$V_{12} + V_{13} + \cdots + V_{1n} = \sum_{j=2}^n \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{|s_j|^2}{r_{1j}} dv_j$$

则电子 1 和其他电子以及原子核之间相互作用势为

$$V_1(r_1, \theta_1, \phi_1) = \sum_{j=2}^n \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{|s_j|^2}{r_{1j}} dv_j - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_1} \quad (11.7)$$

我们现在进一步假设，波函数不仅是单电子轨道的乘积。我们假设作用于原子中电子的有效势可以仅用 r 的函数来近似描述。这种中心场近似 (central-field approximation) 被证明在一般情况下是准确的。因此，我们将 $V_1(r_1, \theta_1, \phi_1)$ 对所有角度求平均，得到只与 r_1 有关的势能表达式：

$$V_1(r_1) = \frac{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi V_1(r_1, \theta_1, \phi_1) \sin \theta_1 d\theta_1 d\phi_1}{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin \theta d\theta d\phi} \quad (11.8)$$

我们现在使用 $V_1(r_1)$ 作为单电子薛定谔方程中的势能项：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_1^2 + V_1(r_1) \right] t_1(1) = \varepsilon_1 t_1(1) \quad (11.9)$$

求出 $t_1(1)$ ，这将是一个改进的轨道，适用于电子 1。在 (11.9) 中， ε_1 是电子 1 在该近似阶段的轨道能量。因为 (11.9) 中的势能为球对称的，那么 $t_1(1)$ 中的角向因子也是球对称的，设计量子数 l_1 和 m_1 (第 6.1 节)。 t_1 中的径向因子 $R_1(1)$ 是形式为 (6.17) 的一维薛定谔方程的解。我们得到一组解 $R_1(1)$ ，当能量从最低值开始时，边界点 ($r = 0$ 和 ∞) 内部的节点数 k 从零开始，并随着能量的增加而每次增加 1 (第 4.2 节)。我们现在定义量子数 n 为 $n \equiv l + 1 + k$ ，其中 $k = 0, 1, 2, \dots$ 。因此，我们得到了 $1s, 2s, 2p$ 等，轨道 (轨道能量 ε 随着 n 的增加而增加) 与类氢原子一样，内部径向节点数 ($n - l - 1$) 也与类氢原子一致 (第 6.6 节)。然而，因为 $V_1(r_1)$ 不是简单的库仑势，那么径向因子 $R_1(r_1)$ 也不是类氢函数。在解集 $R_1(r_1)$ 中，我们选择与正在优化的轨道对应的那个解。例如，若电子 1 为铍原子组态 $1s^2 2s^2$ 中的一个 $1s$ 电子，那么 $V_1(r_1)$ 是根据一个 $1s$ 电子和两个 $2s$ 电子的猜测轨道计算得出的，我们使用式 (11.9) 的径向解 ($k = 0$) 来确定一个改进的 $1s$ 轨道。

现在来计算电子 2，将其视为在由其他电子产生的电子云中运动，该电子云的密度为

$$-e \left[|t_1(1)|^2 + |s_3(3)|^2 + |s_4(4)|^2 + \dots + |s_n(n)|^2 \right]$$

我们计算有效势能 $V_2(r_2)$ ，求解电子 2 的单电子薛定谔方程来得到改进的轨道 $t_2(2)$ 。我们继续这个过程，直到为所有 n 个电子得到一组改进的轨道。然后我们回到电子 1 并重复该过程。我们继续计算改进的轨道，直到从一次迭代到下一次迭代不再有变化。最终得到的轨道集给出了 Hartree 自洽场波函数。

如何得到在自洽场近似下原子的能量？似乎自然而然地要将电子的轨道能之和求和， $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \dots + \varepsilon_n$ ，但这是错误的。在计算轨道能量 ε_1 时，我们使用了迭代法求解单电子薛定谔方程 (11.9)。式 (11.9) 中的势能包含了电子 1 与 2、1 与 3、...、1 与 n 之间排斥能的平均值。当求解 ε_2 时，我们求解了势能包括电子 2 和 1、2 和 3、...、2 和 n 之间排斥势的单电子薛定谔方程。若我们直接取 $\sum_i \varepsilon_i$ ，则每个电子的排斥能被计算了两次。为了的大原子总能量 E 正确值，我们必须令

$$E = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i - \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \iint \frac{e^2 |g_i(i)|^2 |g_j(j)|^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} dv_i dv_j \quad (11.10)$$

$$E = \sum_i \varepsilon_i - \sum_i \sum_{j>i} J_{ij}$$

其中，(11.4) 式中 Hartree 轨道中电子的平均排斥势被从轨道能量之和减去，且符号 J_{ij} 用于表示库仑积分【式 (9.99)】。

属于给定主量子数 n 的轨道集合构成一个壳层 (shell)。 $n = 1, 2, 3, \dots$ 壳层分别为 $K, L, M, \dots$ 壳层。属于给定 n 和给定 l 的轨道构成一个亚壳层 (亚层) (subshell)。考虑一个全满亚层中电子的 Hartree 概率密度之和。使用 (11.5)，我们有

$$2 \sum_{m=-l}^l |h_{n,l}(r)|^2 |Y_l^m(\theta, \phi)|^2 = 2 |h_{n,l}(r)|^2 \sum_{m=-l}^l |Y_l^m(\theta, \phi)|^2 \quad (11.11)$$

其中的因子 2 来自每个轨道中的电子对。球谐函数加法定理 (Merzbacher, Section 9.7) 表明，式 (11.11) 右侧的和等于 $(2l + 1)/4\pi$ 。因此，概率密度的和为 $[(2l + 1)/2\pi] |h_{n,l}(r)|^2$ ，与角向部分无关。闭合亚层具有球对称的概率密度，这一结果被称为 Unsöld 定理。对于半满的亚层，式 (11.11) 中的系数 2 被省略，此时同样得到球对称的概率密度。

Hartree-Fock 自洽场方法

敏锐的读者可能已经意识到, Hartree 乘积波函数 (11.4) 存在根本性的错误。尽管我们通过将每个空间轨道中的电子数限制在两个以内, 对自旋和泡利不相容原理给予了一定程度的关注, 但任何对真实波函数的近似都应明确包括自旋, 并满足电子交换反对称 (第 10 章)。因此, 我们必须使用自旋轨道, 并采用自旋轨道乘积的反对称线性组合。这一观点由 Fock (及 Slater) 于 1930 年提出, 而使用反对称自旋轨道的 SCF 计算被称为 **Hartree-Fock 计算** (Hartree-Fock calculation)。我们已经看到, 自旋轨道函数的 Slater 行列式提供了正确的反对称性。例如, 要对锂的基态进行 Hartree-Fock 计算, 我们从函数 (10.54) 开始, 其中 f 和 g 是 $1s$ 和 $2s$ 轨道的初始估计值。然后我们进行 SCF 迭代过程, 直到 f 和 g 不再进一步改善。这给出了锂基态的 Hartree-Fock 波函数。

求解 Hartree-Fock 轨道方程的微分方程与 (11.9) 具有相同的通式:

$$\hat{F}u_i = \varepsilon_i u_i, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (11.12)$$

其中 u_i 是第 i 个自旋轨道, 算符 $\hat{F}$ 称为 **Fock 算符**或 **Hartree-Fock 算符** (Fock or Hartree-Fock operator), 是有效 Hartree-Fock 哈密顿算符, 本征值 ε_i 为自旋轨道 i 的**轨道能量** (orbital energy)。然而, Hartree-Fock 算符 $\hat{F}$ 与式 (11.9) 中括号内的有效 Hartree 哈密顿算符相比, 还包含额外的项。Hartree-Fock 方程中原子总能量的表达式除了包含 (11.10) 式中的库仑积分外, 还涉及交换积分 K_{ij} Hartree 表达式。【实际上, 式 (11.12) 仅适用于 Hartree-Fock 波函数可表示为单个 Slater 行列式的情况, 例如闭壳层原子和仅有一个电子位于闭壳层外的原子。当 Hartree-Fock 波函数包含多个 Slater 行列式时, Hartree-Fock 方程比 (11.12) 更为复杂。】

Hartree-Fock 方程 (11.12) 中的轨道能量 ε_i 可以证明是闭壳层原子通过从自旋轨道 i 移除一个电子所需电离能负值的良好近似 (Koopman's theorem; 第 15.5 节)。

最初, Hartree-Fock 原子计算是通过使用数值方法来求解 Hartree-Fock 微分方程 (11.12) 进行的, 所得轨道以各种 r 值的径向函数表的形式给出。【Numerov 方法 (第 4.4 和 6.9 节) 可用于求解 Hartree-Fock 轨道中径向因子的径向 Hartree-Fock 方程; 角向因子为球谐函数。参见 D. R. Hartree, *The Calculation of Atomic Structures*, Wiley, 1957; C. Froese Fischer, *The Hartree-Fock Method for Atoms*, Wiley, 1977。】

1951 年, Roothaan 提出将 Hartree-Fock 轨道表示为一组已知函数【称为**基函数** (basis functions)】的线性组合。因此, 对于锂, 我们将 Hartree-Fock $1s$ 和 $2s$ 空间轨道写为

$$f = \sum_i b_i \chi_i, \quad g = \sum_i c_i \chi_i \quad (11.13)$$

其中函数 χ_i 是某些函数的完备集, b_i 和 c_i 是展开系数, 通过 SCF 迭代计算程序求出。由于 χ_i 构成一个完备集, 那么这些展开是成立的。Roothaan 展开程序允许使用矩阵代数找到 Hartree-Fock 波函数 (详细信息参见第 14.3 节)。Roothaan 程序很容易在计算机上实现, 通常用于寻找原子 Hartree-Fock 波函数, 几乎总是用于寻找分子 Hartree-Fock 波函数。

原子 Hartree-Fock 计算中常用的基函数集是 **Slater 型轨道 (STO)** (Slater-type Orbitals), 其归一化形式为

$$\frac{(2\zeta/a_0)^{n+1/2}}{[(2n)!]^{1/2}} r^{n-1} e^{-\zeta r/a_0} Y_l^m(\theta, \phi) \quad (11.14)$$

所有满足 $\zeta(6.96)-(6.98)$ 且 n, l, m 为整数, 但具有所有可能正值的函数构成了一个完备集。参数 ζ 被称为**轨道指数** (orbital exponent)。为了获得真正准确的 Hartree-Fock 轨道表示, 我们必须在展开式中包括无限数量的 Slater 轨道。实际上, 只需使用几个精心选择的 Slater 轨道, 就可以获得非常准确的结果。(另一种可能是使用 Gaussian 基函数; 参见第 15.4 节。)

Clementi 和 Roetti 对元素周期表前 54 种元素的基态和一些激发态进行了 Hartree-Fock 计算【E. Clementi and C. Roetti, *At. Data Nucl. Data Tables*, **14**, 177 (1974); Bunge and co-workers have recalculated these wave functions; C. F. Bunge et al., *At. Data Nucl. Data Tables*, **53**, 113 (1993); *Phys. Rev. A*, **46**, 3691 (1992); these atomic wave functions can be found at www.ccl.net/cca/data/atomic-RHF-wavefunctions/index.shtml】。例如，考虑氦的基态 Hartree-Fock 波函数，其形式为【见式 (10.41)】

$$f(1)f(2) \cdot 2^{-1/2} [\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1)]$$

Clementi 和 Roetti 将 1s 轨道函数 f 表示为以下五个 1s Slater 型轨道的组合：

$$f = \pi^{-1/2} \sum_{i=1}^5 c_i \left(\frac{\zeta_i}{a_0} \right)^{3/2} e^{-\zeta_i r/a_0}$$

其中展开系数 c_i 为 $c_1 = 0.76838$, $c_2 = 0.22346$, $c_3 = 0.04082$, $c_4 = -0.00994$, $c_5 = 0.00230$ ；轨道指数 ζ_i 为 $\zeta_1 = 1.41714$, $\zeta_2 = 2.37682$, $\zeta_3 = 4.39628$, $\zeta_4 = 6.52699$, $\zeta_5 = 7.94252$ 。【展开式中最大项的轨道指数与简单试探函数 (9.56) 的轨道指数 (9.62) 相似。】Hartree-Fock 能量为 -77.9 eV，与非相对论真实能量 -79.0 eV 相比较。求得与 f 对应的 1s 轨道能量为 -25.0 eV，与氦原子电离能实验值 24.6 eV 相比较。

对于锂原子基态，Clementi 和 Roetti 使用一组包含两个 1s Slater 型轨道（轨道指数不同）和四个 2s Slater 型轨道（轨道指数不同）的基函数。锂原子 1s 和 2s Hartree-Fock 轨道分别用这六个基函数的线性组合来表示。Hartree-Fock 能量为 -202.3 eV，与非相对论真实能量 -203.5 eV 相比较。

从 Hartree-Fock 波函数计算出的电子密度非常准确。图 11.1 比较了用 Hartree-Fock 方法计算出的氩的径向分布函数（通过将电子云密度对角向 θ 和 ϕ 积分并乘以 r^2 得到）与通过电子衍射得出的实验径向分布函数。（回顾第 6.6 节，径向分布函数与在距离原子核 r 处的薄球壳中找到一个电子的概率成正比。）注意图 11.1 中的电子壳层结构。Ar 的高核电荷值使得其 1s 电子离原子核的距离远小于 H 或 He。因此，当我们在元素周期表中向下移动一个给定族时，原子尺寸只会略微增加。计算表明，包含 98% Hartree-Fock 电子概率密度的球体的半径与经验确定的范德华半径非常吻合。【见 C. W. Kammeyer and D. R. Whitman, *J. Chem. Phys.*, **56**, 4419 (1972)。】

准确表示一个多电子原子轨道 (AO) 需要多个 Slater 型轨道的线性组合。对于粗略计算，使用简单的近似值来表示 AO 会更方便。我们可以使用具有有效核电荷的类氢轨道，但 Slater 提出了一种更简单的方法：用形式为 (11.14) 的单一函数来近似 AO，其中轨道指数 ζ 取为


$$\zeta = (Z - s)/n \quad (11.15)$$

其中 Z 为原子序数， n 为轨道总量子数， s 为屏蔽常数，可通过一组规则求得（见问题 15.62）。Slater 轨道用 r 的单次幂替换类氢轨道中 r 的多项式。因此，单个 Slater 轨道不具备正确的径向节点数，无法很好地表示轨道的内层部分。

对多电子原子进行 Hartree-Fock SCF 计算 (calculation) 需要大量计算 (computation)。在 20 世纪 30 年代，电子计算机尚未出现，Hartree 进行了多次 SCF 计算。幸运的是，Hartree 的父亲是一位退休工程师，他喜欢数字计算，并帮助了儿子。如今，计算机已经取代了 Hartree 的父亲。

11.2 轨道和元素周期表

轨道概念和泡利不相容原理使我们能够理解元素周期表。轨道是一个电子的空间波函数。我们使用轨道来获得多电子原子的近似波函数，将波函数写成一个电子自旋轨道的 Slater 行列式。在最



Ar 中径向分布函数与 r 的函数关系。虚线是 Hartree-Fock 计算的结果。实线是电子衍射数据的结果。

图 11.1: [Reprinted figure with permission from L.S. Bartell and L. O. Brockway, *Physical Review Series II*, Vol 90, 833, 1953. Copyright 1953 by the American Physical Society.]

粗略的近似中，我们忽略了所有电子之间的排斥力，得到了类氢轨道。最好的轨道是 Hartree-Fock SCF 函数。我们通过将电子填入这些轨道来构建元素周期表，每个轨道都可以容纳一对自旋相反的电子。

Latter 【R. Latter, *Phys. Rev.*, **99**, 510 (1955)】通过用 Thomas-Fermi-Dirac 方法获得的一个更简单的函数代替 Hartree-Fock 径向方程中 Hartree-Fock 势能的复杂表达式，计算出了周期表中原子的大致轨道能。Thomas-Fermi-Dirac 方法利用统计力学原理，获得电子和原子中电子密度函数的有效势能函数的近似值 (*Bethe and Jackiw*, Chapter 5)。图 11.2 显示了 Latter 计算出的中性基态原子的轨道能量。这些 AO 能量与 Hartree-Fock 以及实验得出的轨道能量非常吻合 (见 J. C. Slater, *Quantum Theory of Matter*, 2nd ed., McGraw-Hill, 1968, pp. 146, 147, 325, 326)。


轨道能量随原子序数 Z 的变化而变化。随着 Z 的增加，轨道能量会降低，这是因为原子核与电子之间的吸引力增强。这种降低在内层轨道中最为显著，因为这些轨道受到原子核的屏蔽作用较弱。

若 $Z > 1$ ，则具有相同 n 但不同 l 值的轨道能量不同。例如，对于 $n = 3$ 轨道能量，我们有当 $Z > 1$ 时 $\varepsilon_{3s} < \varepsilon_{3p} < \varepsilon_{3d}$ 。这些在氢原子中简并的能级的裂分，来自电子间排斥势。(回忆第 9.7 节中对氦的微扰处理。)在极限 $Z \rightarrow \infty$ 时，具有相同 n 值轨道又是简并的，因为与核-电子吸引势相比，电子间排斥势就显得微不足道了。

随着原子序数 Z 的变化，某些轨道的位置也会发生变化。因此，在氢原子中， $3d$ 轨道位于 $4s$ 轨道下方，但对于原子序数在 7 到 20 之间的元素， $4s$ 轨道位于 $3d$ 轨道下方。当原子序数较大时， $3d$ 轨道又会位于下方。当 $Z = 19$ 时， $4s$ 轨道能量更低，因此 ${}_{19}\text{K}$ 的基态组态为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s$ 。需要指出的是， s 轨道比 p 轨道或 d 轨道具有更强的穿透力；这使得在某些原子序数 (Z) 的值下， $4s$ 轨道位于 $3d$ 轨道之下。注意 $3d$ 能级在 $Z = 21$ 处突然下降，此时 $3d$ 轨道开始被填充。 $3d$ 轨道中的电子彼此屏蔽作用不强，因此 $3d$ 轨道的能量突然下降。其他轨道也出现类似的能量下降现象。

为了帮助解释过渡元素及其离子的电子配置，Vanquickenborne 及其同事计算了 $Z = 1$ 到 $Z = 29$ 的原子和离子的 Hartree-Fock $3d$ 和 $4s$ 轨道能 【L. G. Vanquickenborne et al., *Inorg. Chem.*, **28**, 1805 (1989); *J. Chem. Educ.*, **71**, 469 (1994)】。

一个复杂之处在于，给定的电子组态可能产生多种状态。【例如，回顾氦原子 $1s2s$ 和 $1s2p$ 组态的多个状态 (第 9.7 节和第 10.4 节)。】为了避免这种复杂情况，Vanquickenborne 及其同事通过最小化给定电子组态状态的平均能量 E_{av} 来计算 Hartree-Fock 轨道和轨道能量，而不是通过最小化



原子轨道能作为原子序数的中性原子的函数，由 Latter 计算得出。

[Reprinted figure with permission from R. Latter, redrawn by M. Kasha, Physical Review Series II, 90, 510, 1955. Copyright 1955 by the American Physical Society.] Note the logarithmic scales. E_H is the ground-state hydrogen-atom energy, -13.6 eV.

图 11.2:

组态的每个单独状态的能量来计算。获得的平均轨道与给定组态状态的真实 Hartree-Fock 轨道只有微小的差异。

对于从 ${}^1\text{H}$ 到 ${}_{19}\text{K}$ 的每个原子, Vanquickenborne 及其同事计算了将一个电子从基态电子组态中最高占据轨道移出并置于 $3d$ 轨道时的 $3d$ 平均轨道能 ε_{3d} ; 他们以类似的方式计算了这些原子的 ε_{4s} 。他们发现: 若中性原子满足 $Z < 6$ 时, 有 $\varepsilon_{3d} < \varepsilon_{4s}$; 而当 Z 介于 7 和 19 之间时, 有 $\varepsilon_{4s} < \varepsilon_{3d}$, 与图11.2一致。

对于讨论原子序数从 21 到 29 的过渡元素, 图11.2是不够的, 因为它只给出了每个元素的 ε_{3d} 的单一值, 而对于给定的原子, ε_{3d} (和 ε_{4s}) 取决于哪些轨道被占据。这是因为电子受到的电场取决于哪些轨道被占据。Vanquickenborne 及其同事计算了每个价电子配置 $3d^n 4s^2$ 、 $3d^{n+1} 4s^1$ 和 $3d^{n+2} 4s^0$ 的 ε_{3d} 和 ε_{4s} 的值, 发现这些过渡元素 ${}_{21}\text{Sc}$ 至 ${}_{29}\text{Cu}$ (即图11.2中所示的顺序)的中性原子与 +1 和 +2 价离子的每个组态都满足 $\varepsilon_{3d} < \varepsilon_{4s}$ 。

Z 大于 20 时, 因为 $3d$ 能级能量低于 $4s$ 能级, 所以我们可能想知道如 ${}_{21}\text{Sc}$ 的基态组态为什么是 $3d^1 4s^2$ 而不是 $3d^3$ 。虽然这些每个组态都满足 $\varepsilon_{3d} < \varepsilon_{4s}$, 但这并不意味着 $3d^3$ 组态的轨道总能量之和更低。当一个电子从 $4s$ 轨道移动到 $3d$ 轨道时, ε_{4s} 和 ε_{3d} 都增加了。轨道能是通过求解单电子 Hartree-Fock 方程得出的, 该方程包含轨道 i 中的电子与原子中其他电子之间的平均排斥势能项, 因此 ε_i 取决于这些排斥势的值, 从而取决于哪些轨道被占据。对于第一过渡系元素, $4s$ 轨道能量比 $3d$ 轨道高得多。例如, Vanquickenborne 及其同事计算了 Sc 中如下的 $\langle r \rangle$ 值: 对于组态 $3d^1 4s^2$, $\langle r \rangle_{3d} = 0.89 \text{ \AA}$, $\langle r \rangle_{4s} = 2.09 \text{ \AA}$; 对于组态 $3d^2 4s^1$, $\langle r \rangle_{3d} = 1.11 \text{ \AA}$, $\langle r \rangle_{4s} = 2.29 \text{ \AA}$ 。由于这种尺寸差异, 涉及 $4s$ 电子的排斥作用远小于涉及 $3d$ 电子的排斥作用, 因此, 我们有 $(4s, 4s) < (4s, 3d) < (3d, 3d)$, 其中 $(4s, 3d)$ 表示分布于 $3d$ 轨道电子与 $4s$ 轨道电子之间的平均排斥势。(这些排斥势可以用库仑积分和交换积分给出。) 当一个电子从 $4s$ 轨道移动到 $3d$ 轨道时, 由上述不等式导致的电子间排斥力增大, 使得轨道能 ε_{3d} 和 ε_{4s} 升高。例如, 对于 ${}_{21}\text{Sc}$ 的组态 $3d^1 4s^2$ 有 $\varepsilon_{3d} = -9.35 \text{ eV}$, $\varepsilon_{4s} = -5.72 \text{ eV}$; 而组态 $3d^2 4s^1$ 则有 $\varepsilon_{3d} = -5.23 \text{ eV}$, $\varepsilon_{4s} = -5.06 \text{ eV}$ 。对于组态 $3d^1 4s^2$, 价电子能量之和为 $-9.35 \text{ eV} + 2(-5.72 \text{ eV}) = -20.79 \text{ eV}$, 而组态 $3d^2 4s^1$ 的能量之和为 $2(-5.23 \text{ eV}) - 5.06 \text{ eV} = -15.52 \text{ eV}$ 。因此, 尽管每个组态都满足 $\varepsilon_{3d} < \varepsilon_{4s}$, 但将电子从 $4s$ 转移到 $3d$ 使得 Sc 中价电子轨道能量总和升高。【正如我们在方程 (11.10) 中看到 Hartree 方法, 以及将在第 14.3 节中看到的 Hartree-Fock 方法一样, Hartree 和 Hartree-Fock 方法对原子能量的表达式除了轨道能量之和之外还包含其他项, 因此我们必须考虑轨道能量之和之外的因素, 才能确定哪种组态最稳定。】

对于过渡金属的 +2 价离子, 由于屏蔽效应的减弱, 价电子 ($3d$ 和 $4s$ 电子) 所受到的有效核电荷 Z_{eff} 比中性原子的更大。类比氢原子方程 $E = -(Z^2/n^2)(e^2/8\pi\epsilon_0 a)$ 【式 (6.94)】, 轨道能量 ε_{3d} 和 ε_{4s} 都大致与 Z_{eff}^2 成正比, 能级差 $\varepsilon_{4s} - \varepsilon_{3d}$ 也大致与 Z_{eff}^2 成正比。所以过渡金属离子的能级差 $\varepsilon_{4s} - \varepsilon_{3d}$ 远大于中性原子; 价电子排斥力的增加已不足以使 $4s$ 到 $3d$ 的转移在能量上变得不利; +2 价离子具有没有 $4s$ 电子的基态组态。

关于电子组态的进一步讨论, 请参阅 W. H. E. Schwarz, *J. Chem. Educ.*, **87**, 444 (2010); Schwarz and R. L. Rich, *ibid.*, **87**, 435。

图11.2显示, ns 轨道与 np 轨道之间的间隔远小于 np 轨道与 nd 轨道之间的间隔, 从而形成了熟悉的 $ns^2 np^6$ 八电子稳定结构。

轨道概念是大多数关于原子和分子化学的定性讨论的基础。然而, 轨道的使用是一种近似。要得到真正的波函数, 我们必须超越自旋轨道的 Slater 行列式。

11.3 电子相关

用 Hartree-Fock 方法计算的能量对于轻原子来说，通常会有大约 $\frac{1}{2}\%$ 的误差。从绝对值来看，这并不算大，但对于化学家来说这个误差太大了。例如，碳原子的总能量约为 -1000 eV ，其 $\frac{1}{2}\%$ 为 5 eV 。化学单键能量约为 5 eV 。通过计算 Hartree-Fock 分子能与原子能之间的差值来计算键能，对于轻原子而言，这种计算方法会产生几电子伏特的误差，因此不可靠。我们必须寻找一种方法来改进 Hartree-Fock 波函数和能量。（我们的讨论将适用于分子和原子。）

Hartree-Fock SCF 波函数仅以平均方式考虑了电子之间的相互作用。实际上，我们必须考虑电子之间的瞬时相互作用。由于电子相互排斥，它们往往会相互避让。例如，在氦中，如果一个电子在给定时刻靠近原子核，那么另一个电子在该时刻远离原子核在能量上更有利。人们有时会提到原子中每个电子周围存在一个库仑空穴（Coulomb hole）。这是一个找到另一个电子的概率较小的区域。电子的运动是相互关联的，我们称之为**电子相关**（electron correlation）。我们必须找到一种方法，将瞬时电子相关引入波函数中。

实际上，Hartree-Fock 波函数确实具有一些瞬时电子相关性。Hartree-Fock 函数满足反称性要求。因此【方程 (10.20)】，当两个自旋相同的电子具有相同的空间坐标时，它就会消失。对于 Hartree-Fock 函数，在同一空间区域找到自旋相同的电子的概率很小，因此 Hartree-Fock 函数具有自旋相同的电子运动的一些相关性。这使得 Hartree-Fock 能量低于 Hartree 能量。人们有时会提到 Hartree-Fock 波函数中每个电子周围的费米空穴，以此来表示找到另一个具有相同自旋的电子的概率很小的区域。

关联能 E_{corr} (correlation energy) 是非相对论能量精确值 E_{normal} 与（非相对论）Hartree-Fock 能量 E_{HF} 之间的差值：

$$E_{\text{corr}} \equiv E_{\text{normal}} - E_{\text{HF}} \quad (11.16)$$

其中 E_{normal} 和 E_{HF} 都应同时包含对核运动的校正或同时省略这些校正。对于 He 原子，未校正核运动（非相对论）Hartree-Fock 能量为 $-2.86168 (e^2/4\pi\epsilon_0 a_0)$ 【E. Clementi and C. Roetti, *At. Data Nucl. Data Tables*, **14**, 177 (1974)】，使用变分计算（第9.4节）可以得到未校正核运动的非相对论能量精确值为 $-2.90372 (e^2/4\pi\epsilon_0 a_0)$ 。因此， $E_{\text{corr, He}} = -2.90372 (e^2/4\pi\epsilon_0 a_0) + 2.86168 (e^2/4\pi\epsilon_0 a_0) = -0.04204 (e^2/4\pi\epsilon_0 a_0) = -1.14\text{ eV}$ 。对 E_{normal} 无法精确计算的原子和分子来说，我们可以将实验能量与相对论和核运动修正的估计值相结合，得到 E_{normal} 。对于中性基态原子， $|E_{\text{corr}}|$ 被发现与电子数 n 呈近似线性关系：

$$E_{\text{corr}} \approx -0.0170n^{1.31} (e^2/4\pi\epsilon_0 a_0) = -0.0170n^{1.31} (27.2\text{ eV})$$

【E. Clementi and G. Corongiu, *Int. J. Quantum Chem.*, **62**, 571 (1997)】。百分比 $(E_{\text{corr}}/E_{\text{normal}}) \times 100\%$ 随着原子序数的增加而减小。一些值如下：Li 为 0.6%，C 为 0.2%，Na 为 0.2% 以及 K 为 0.1%。

我们已经指出了两种实现瞬时电子相关的方法。一种方法是将电子间距离 r_{ij} 引入波函数（第9.4节）。

另一种方法是组态相互作用。我们发现，（第9.3和9.4节）氦原子 $1s^2$ 基态的零级波函数为 $1s(1)1s(2)[\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)]/\sqrt{2}$ 。我们指出，波函数的一阶和高阶修正将混合来自激发组态的贡献，产生**组态相互作用**（configuration interaction, CI），也称为**组态混合**（configuration mixing, CM）。

对原子或分子进行组态相互作用计算最常见的方法是使用变分法。首先选择一个电子函数 χ_i 的基函数集。原则上，该基函数集应该是完备的。但在实践中，基函数集的大小是有限的。人们希望，选

择合适的基函数能够很好地近似完备的基函数集。对于原子计算，常选择 STO 基函数【式 (11.14)】作为基函数。

SCF 原子（或分子）轨道 ϕ_i 写成基函数集元素的线性组合【参见 (11.13)】，并求解 Hartree-Fock 方程 (11.12) 以得出这些线性组合中的系数。获得的原子（或分子）轨道数等于所用基函数的数量。能量最低的轨道是基态的占据轨道。剩余的未占据轨道称为**虚轨道**（virtual orbitals）。

使用一组被占用的和虚自旋轨道，可以形成具有不同轨道占用的反对称多电子函数。例如，对于氦，我们可以构造与电子组态 $1s^2$ 、 $1s2s$ 、 $1s2p$ 、 $2s^2$ 、 $2s2p$ 、 $2p^2$ 、 $1s3s$ 等相对应的函数。此外，一个给定的电子组态可以对应多个函数。回顾一下与氦 $1s2s$ 组态相对应的函数 (10.27) 至 (10.30) 多电子函数 Φ_i 。每个函数都是 Slater 行列式或几个 Slater 行列式的线性组合。某些开壳层函数【如 (10.44) 和 (10.45)】需要使用多个 Slater 行列式。每个 Φ_i 称为**组态状态函数**（configuration state function, CSF）或**组态函数**（configuration function）或简单的“组态”。（最后这个名字不太好，因为它会让人把电子组态如 $1s^2$ 和组态函数如 $|1s\bar{1}s|$ 搞混。）

正如我们在微扰理论中看到的那样，原子（或分子）的真实波函数 ϕ 包含除对 ϕ 有主要贡献的组态之外的其他组态的贡献，所以我们将 ϕ 表示为组态函数 Φ_i 的线性组合：

$$\phi = \sum_i c_i \Phi_i \quad (11.17)$$

然后，我们将 (11.17) 视作线性变分函数（第 8.5 节）。通过调整系数 c_i 使得变分积分最小化，得到方程

$$\det(H_{ij} - ES_{ij}) = 0 \quad (11.18)$$

其中 $H_{ij} \equiv \langle \Phi_i | \hat{H} | \Phi_j \rangle$ ， $S_{ij} \equiv \langle \Phi_i | \Phi_j \rangle$ 。一般来说， Φ_i 是正交归一的；若它们不正交，可以使用 Schmidt 法使其正交化。【只有角动量本征值与状态 ψ 相同的组态函数才在展开式 (11.17) 中出现，见第 11.5 节。】

因为多电子组态函数 Φ_i 最终基于形成完备集的单电子基函数组，所以所有可能组态函数的集合是多电子问题的完备集：任何反对称多电子函数（包括精确波函数）都可以表示为 Φ_i 函数的线性组合。（证明见 Szabo and Ostlund, Section 2.2.7.）因此，如果从完整的单电子基函数集开始，并包括所有可能的组态函数，则组态相互作用计算将给出所考虑状态的精确原子（或分子）波函数 ψ 。实际上，人们只能使用有限的、不完整的基函数集，而不是无限的、完整的基函数集。此外，即使使用中等大小的基函数集，可能的组态函数的数量也非常庞大，人们通常不会包括所有可能的组态函数。组态相互作用方法的一部分“艺术”在于选择那些贡献最大的组态。

由于通常需要许多组态函数才能得到真正准确的波函数，因此，即使使用超级计算机，对电子数超过少数几个的系统进行组态相互作用计算也非常耗时。第 16 章讨论了其他考虑电子相关性的方法。

总之，为了进行组态相互作用计算，我们选择一组单电子基函数 χ_i ，通过迭代法求解 Hartree-Fock 方程 (11.12)，将单电子原子（或分子）轨道的 ϕ_i 表示为基函数的线性组合，再使用轨道 ϕ_i 构造多电子组态函数 Φ_i ，将波函数 ψ 表示为这些组态函数的线性组合，通过求解 (11.18) 确定能量，并通过求解关联线性方程组求出 (11.17) 中的系数 c_i 。【在实际应用中，(11.18) 及其关联方程组通常通过矩阵方法求解；详见第 8.6 节。】

以铍的基态为例。Hartree-Fock SCF 方法将找到 Slater 行列式 $|1s\bar{1}s2s\bar{2}s|$ 中 $1s$ 和 $2s$ 轨道的最佳形式，并将其用于基态波函数。【我们使用方程 (10.47) 的符号。】超越 Hartree-Fock 方法，我们将激发组态函数（例如 $|1s\bar{1}s3s\bar{3}s|$ ）对基态线性变化函数的贡献也包括在内。Bunge 使用 650 个组态函数的线性组合对铍基态进行了组态相互作用计算。【C. F. Bunge, *Phys. Rev. A*, **14**, 1965 (1976)】。Hartree-Fock 能量为 $-14.5730 (e^2/4\pi\epsilon_0 a_0)$ ，Bunge 的组态相互作用计算结果为

$-14.6669 (e^2/4\pi\epsilon_0 a_0)$, 非相对论能量真实值为 $-14.5730 (e^2/4\pi\epsilon_0 a_0)$ 。Bunge 获得了 99.5% 的相关能。

第 16.2 节详细介绍了氮原子的组态相互作用计算。

11.4 角动量的叠加

对于多电子原子, 电子的各个角动量算符与哈密顿算符不可对易, 但它们的和却可对易。因此, 我们需要学习如何将角动量相加。

假设我们有一个系统, 包含两个角动量矢量 $\mathbf{M}_1$ 和 $\mathbf{M}_2$ 。它们可能是某原子中两个电子的轨道角动量矢量, 也可能是两个电子的自旋角动量矢量, 还可能一个是自旋角动量, 另一个是单电子的轨道角动量。 $\hat{M}_1^2$ 、 $\hat{M}_2^2$ 、 $\hat{M}_{1z}$ 和 $\hat{M}_{2z}$ 的本征值分别为 $j_1(j_1+1)\hbar^2$ 、 $j_2(j_2+1)\hbar^2$ 、 $m_1\hbar$ 和 $m_2\hbar$, 其中的量子数遵循一般的限制。 $\hat{\mathbf{M}}_1$ 和 $\hat{\mathbf{M}}_2$ 遵循角动量对易关系【式 (5.46)、(5.48) 和 (5.107)】

$$[\hat{M}_{1x}, \hat{M}_{1y}] = i\hbar\hat{M}_{1z}, \text{ etc. } [\hat{M}_{2x}, \hat{M}_{2y}] = i\hbar\hat{M}_{2z}, \text{ etc.} \quad (11.19)$$

我们定义系统的**总轨道角动量** (total angular momentum) $\mathbf{M}$ 为矢量和

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}_1 + \mathbf{M}_2 \quad (11.20)$$

矢量 $\mathbf{M}$ 有三个分量:

$$\mathbf{M} = M_x\mathbf{i} + M_y\mathbf{j} + M_z\mathbf{k} \quad (11.21)$$

矢量方程 (11.20) 等价于三个标量方程:

$$M_x = M_{1x} + M_{2x}, \quad M_y = M_{1y} + M_{2y}, \quad M_z = M_{1z} + M_{2z} \quad (11.22)$$

对于算符 $\hat{M}^2$, 我们有

$$\hat{M}^2 = \hat{\mathbf{M}} \cdot \hat{\mathbf{M}} = \hat{M}_x^2 + \hat{M}_y^2 + \hat{M}_z^2 \quad (11.23)$$

$$\begin{aligned} \hat{M}^2 &= (\hat{\mathbf{M}}_1 + \hat{\mathbf{M}}_2) \cdot (\hat{\mathbf{M}}_1 + \hat{\mathbf{M}}_2) \\ \hat{M}^2 &= \hat{M}_1^2 + \hat{M}_2^2 + \hat{\mathbf{M}}_1 \cdot \hat{\mathbf{M}}_2 + \hat{\mathbf{M}}_2 \cdot \hat{\mathbf{M}}_1 \end{aligned} \quad (11.24)$$

若 $\hat{\mathbf{M}}_1$ 和 $\hat{\mathbf{M}}_2$ 指的是不同的电子, 则它们可对易, 因为每个算符仅影响一个电子的坐标函数, 而不影响另一个电子的坐标函数。即使 $\hat{\mathbf{M}}_1$ 和 $\hat{\mathbf{M}}_2$ 指的是同一个电子的自旋和轨道角动量, 它们也可对易, 因为其中一个只影响坐标函数, 而另一个只影响自旋函数。则 (11.24) 变为

$$\hat{M}^2 = \hat{M}_1^2 + \hat{M}_2^2 + 2\hat{\mathbf{M}}_1 \cdot \hat{\mathbf{M}}_2 \quad (11.25)$$

$$\hat{M}^2 = \hat{M}_1^2 + \hat{M}_2^2 + 2(\hat{M}_{1x}\hat{M}_{2x} + \hat{M}_{1y}\hat{M}_{2y} + \hat{M}_{1z}\hat{M}_{2z}) \quad (11.26)$$

我们现在证明, 总角动量的各分量满足一般的角动量对易关系。我们有【式 (5.4)】

$$\begin{aligned} [\hat{M}_x, \hat{M}_y] &= [\hat{M}_{1x} + \hat{M}_{2x}, \hat{M}_{1y} + \hat{M}_{2y}] \\ &= [\hat{M}_{1x}, \hat{M}_{1y} + \hat{M}_{2y}] + [\hat{M}_{2x}, \hat{M}_{1y} + \hat{M}_{2y}] \\ &= [\hat{M}_{1x}, \hat{M}_{1y}] + [\hat{M}_{1x}, \hat{M}_{2y}] + [\hat{M}_{2x}, \hat{M}_{1y}] + [\hat{M}_{2x}, \hat{M}_{2y}] \end{aligned}$$

由于 $\hat{\mathbf{M}}_1$ 的所有分量和 $\hat{\mathbf{M}}_2$ 均可对易, 我们有

$$[\hat{M}_x, \hat{M}_y] = [\hat{M}_{1x}, \hat{M}_{1y}] + [\hat{M}_{2x}, \hat{M}_{2y}] = i\hbar\hat{M}_{1z} + i\hbar\hat{M}_{2z}$$

$$[\hat{M}_x, \hat{M}_y] = i\hbar \hat{M}_z \quad (11.27)$$

对 x 、 y 和 z 进行循环置换得到

$$[\hat{M}_y, \hat{M}_z] = i\hbar \hat{M}_x, \quad [\hat{M}_z, \hat{M}_x] = i\hbar \hat{M}_y \quad (11.28)$$

用于推导 (5.109) 的同一交换子代数给出

$$[\hat{M}^2, \hat{M}_x] = [\hat{M}^2, \hat{M}_y] = [\hat{M}^2, \hat{M}_z] = 0 \quad (11.29)$$

因此，我们可以同时确定 M^2 及其一个分量，例如 M_z 。由于总角动量的各分量满足角动量对易关系，第5.4节的推导表明， $\hat{M}^2$ 的本征值为

$$J(J+1)\hbar^2, \quad J = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \dots \quad (11.30)$$

以及 $\hat{M}_z$ 的本征值为

$$M_J \hbar, \quad M_J = -J, -J+1, \dots, J-1, J \quad (11.31)$$

我们希望找到：总角动量量子数 J 和 M_J 是如何与我们在 (11.20) 中添加的两个角动量对应的量子数 j_1 、 j_2 、 m_1 和 m_2 关联起来的。我们也想知道 $\hat{M}^2$ 和 $\hat{M}_z$ 的本征函数是什么。这些本征函数由量子数 J 和 M_J 来描述，使用 ket 符号 (第7.3节)，我们将它们记作 $|JM_J\rangle$ 。同样地，令 $|j_1 m_1\rangle$ 表示 $\hat{M}_1^2$ 和 $\hat{M}_{1z}$ 的本征函数， $|j_2 m_2\rangle$ 表示 $\hat{M}_2^2$ 和 $\hat{M}_{2z}$ 的本征函数。现在，很容易证明 (问题 11.10)

$$[\hat{M}_x, \hat{M}_1^2] = [\hat{M}_y, \hat{M}_1^2] = [\hat{M}_z, \hat{M}_1^2] = [\hat{M}^2, \hat{M}_1^2] = 0 \quad (11.32)$$

将 $\hat{M}_1^2$ 替换为 $\hat{M}_2^2$ 可以得到类似的方程。因此，我们有了同时是四个算符 $\hat{M}_1^2$ 、 $\hat{M}_2^2$ 、 $\hat{M}^2$ 和 $\hat{M}_z$ 的本征函数集合，本征函数 $|JM_J\rangle$ 可以写作 $|j_1 j_2 JM_J\rangle$ 。然而，可以发现 $\hat{M}^2$ 不与 $\hat{M}_{1z}$ 或 $\hat{M}_{2z}$ 对易 (问题 11.12)，所以本征函数 $|j_1 j_2 JM_J\rangle$ 不一定是 $\hat{M}_{1z}$ 和 $\hat{M}_{2z}$ 的本征函数。

如果我们取离子 1 的函数 $|j_1 m_1\rangle$ 完备集，和离子 2 的 $|j_2 m_2\rangle$ 完备集，构造形式为 $|j_1 m_1\rangle |j_2 m_2\rangle$ 的所有可能乘积，我们将得到两个粒子的函数完备集。每个未知的本征函数 $|j_1 j_2 JM_J\rangle$ 可以用该完备集展开：

$$|j_1 j_2 JM_J\rangle = \sum C(j_1 j_2 JM_J; m_1 m_2) |j_1 m_1\rangle |j_2 m_2\rangle \quad (11.33)$$

其中的展开系数为 $C(j_1 \dots m_2)$ 。函数 $|j_1 j_2 JM_J\rangle$ 是对易算符 $\hat{M}_1^2$ 、 $\hat{M}_2^2$ 、 $\hat{M}^2$ 和 $\hat{M}_z$ 的本征函数，本征值如下：

$\hat{M}_1^2$	$\hat{M}_2^2$	$\hat{M}^2$	$\hat{M}_z$
$j_1(j_1+1)\hbar^2$	$j_2(j_2+1)\hbar^2$	$J(J+1)\hbar^2$	$M_J \hbar$

而函数 $|j_1 m_1\rangle |j_2 m_2\rangle$ 是对易算符 $\hat{M}_1^2$ 、 $\hat{M}_2^2$ 、 $\hat{M}_{1z}$ 和 $\hat{M}_{2z}$ 的本征函数，本征值如下：

$\hat{M}_1^2$	$\hat{M}_{1z}$	$\hat{M}_2^2$	$\hat{M}_{2z}$
$j_1(j_1+1)\hbar^2$	$m_1 \hbar$	$j_2(j_2+1)\hbar^2$	$m_2 \hbar$

因为展开为 (11.33) 的函数 $|j_1 j_2 JM_J\rangle$ 是 $\hat{M}_1^2$ 的本征函数，本征值为 $j_1(j_1+1)\hbar^2$ ，所以我们可以求和中只留下与函数 $|j_1 j_2 JM_J\rangle$ 相同 j_1 值的项 (见第7.3节最后的定理 3)。同样地，只有与 $|j_1 j_2 JM_J\rangle$ 相同 j_2 值的项才会出现在求和中。因此，求和就只包含了所有的 m_1 和 m_2 的值。同样地，使用 $\hat{M}_z = \hat{M}_{1z} + \hat{M}_{2z}$ ，我们可以证明 (问题 11.11)：除非 m_1 和 m_2 满足下式，否则系数 C 为零：

$$m_1 + m_2 = M_J \quad (11.34)$$

为了找到总角动量本征函数，我们必须计算 (11.33) 中的系数。这些系数称为 *Clebsch-Gordan or Wigner or vector addition coefficients*。对于它们的计算，见 *Merzbacher*, Section 16.6。

所以，每个总角动量本征函数 $|j_1 j_2 J M_J\rangle$ 都可以用 m 值满足 $m_1 + m_2 = M_J$ 的乘积函数 $|j_1 m_1\rangle |j_2 m_2\rangle$ 的线性组合来表示。

我们现在确定总角动量量子数 J 的可能取值，这些取值来源于具有各自角动量量子数 j_1 和 j_2 的角动量的叠加。

在考虑一般情况之前，先考虑一个 $j_1 = 1$ 和 $j_2 = 2$ 的例子。 m_1 的可能值为 $-1, 0, 1$ ， m_2 的可能值为 $-2, -1, 0, 1, 2$ 。如果我们使用量子数 j_1 、 j_2 、 m_1 和 m_2 来描述这个系统，那么共有 15 种可能的状态，对应于 m_1 的三个不同值和 m_2 的五个不同值。相反，我们可以使用量子数 j_1 、 j_2 、 J 和 M_J 来描述该系统，并且在这种描述中必须具有相同数量的状态。我们将 M_J 的 15 种取值用 (11.34) 列成表格：

$m_1 = -1$	0	1	
-3	-2	-1	$-2 = m_2$
-2	-1	0	1
-1	0	1	0
0	1	2	1
1	2	3	2

表中每个 M_J 的值都是第一行 m_1 的值和第四列 m_2 的值之和。每个 M_J 值出现的次数为

M_J 的值	3	2	1	0	-1	-2	-3
出现的次数	1	2	3	3	3	2	1

M_J 最大值为 +3。由于 M_J 的值介于 $-J$ 和 $+J$ 之间，因此 J 的最大值为 3。与 $J = 3$ 对应，有 7 个介于 -3 和 $+3$ 之间的 M_J 值。将这 7 个值删去，留下

M_J 的值	2	1	0	-1	-2
出现的次数	1	2	2	2	1

剩余 M_J 的最大值为 2，对应于 $J = 2$ 。对于 $J = 2$ ，有 5 个可能的 M_J 值。将这 5 个值删去，留下

M_J 的值	1	0	-1
出现的次数	1	1	1

显然，剩余的 M_J 值对应于 $J = 1$ 。因此，对于独立的角动量量子数 $j_1 = 1$ 和 $j_2 = 2$ ，总角动量量子数 J 的可能取值为 3, 2, 1。

现在，我们来考虑一般的情况。假设 m_1 有 $2j_1 + 1$ 个值（从 $-j_1$ 到 j_1 ）， m_2 有 $2j_2 + 1$ 个值（从 $-j_2$ 到 j_2 ）。因此，对给定的 j_1 和 j_2 值，有 $(2j_1 + 1)(2j_2 + 1)$ 个可能的状态 $|j_1 m_1\rangle |j_2 m_2\rangle$ 。 m_1 和 m_2 的最大值分别为 j_1 和 j_2 。因此， $M_J = m_1 + m_2$ 的最大值为 $j_1 + j_2$ 【式 (11.34)】。因为 M_J 的值介于 $-J$ 和 $+J$ 之间，所以总角动量量子数 J 的最大值为 $j_1 + j_2$ ：

$$J_{\max} = j_1 + j_2 \quad (11.35)$$

M_J 第二高的值为 $j_1 + j_2 - 1$ ，可以由两种方式得到： $m_1 = j_1 - 1, m_2 = j_2$ 或 $m_1 = j_1, m_2 = j_2 - 1$ 。这两种状态的线性组合一定会给出两种状态，其一满足 $J = j_1 + j_2$ ， $M_J = j_1 + j_2 - 1$ ，其二满足

$J = j_1 + j_2 - 1, M_J = j_1 + j_2 - 1$ 。按照这种方式继续, 我们发现 J 的可能取值为

$$j_1 + j_2, \quad j_1 + j_2 - 1, \quad j_1 + j_2 - 2, \quad \dots, \quad J_{\min}$$

其中 $J_{\min}$ 为 J 的最小值。

我们使用总状态数为 $(2j_1 + 1)(2j_2 + 1)$ 的要求来确定 $J_{\min}$ 。对于一个给定的 J 值, 有 $2J + 1$ 个可能的 M_J 值, 那么有 $2J + 1$ 个状态与每个 J 值对应。对于给定的 j_1 和 j_2 , 状态 $|j_1 j_2 J M_J\rangle$ 的总数通过将 J 从 $J_{\min}$ 到 $J_{\max}$ 的所有可能状态数 $2J + 1$ 相加得到:

$$\text{状态数} = \sum_{J=J_{\min}}^{J_{\max}} (2J + 1) \quad (11.36)$$

该求和从 $J_{\min}$ 到 $J_{\max}$ 。现在, 我们将求和下限取为 $J = 0$ 而不是 $J_{\min}$ 。这个变化在求和中添加了 J 值为 $0, 1, 2, \dots, J_{\min} - 1$ 的项。为了弥补, 我们必须减去从 $J = 0$ 到 $J = J_{\min} - 1$ 的对应的求和。因此, (11.36) 变为

$$\text{状态数} = \sum_{J=0}^{J_{\max}} (2J + 1) - \sum_{J=0}^{J_{\min}-1} (2J + 1)$$

根据问题 6.16, 我们有 $\sum_{l=0}^{n-1} (2l + 1) = n^2$ 。将 $n-1$ 替换为 b , 我们得到了 $\sum_{j=0}^b (2J + 1) = (b + 1)^2$ 。因此,

$$\text{状态数} = (J_{\max} + 1)^2 - J_{\min}^2 = J_{\max}^2 + 2J_{\max} + 1 - J_{\min}^2$$

将 $J_{\max}$ 替换为 $j_1 + j_2$ 【式 (11.35)】, 令状态数等于 $(2j_1 + 1)(2j_2 + 1) = 4j_1 j_2 + 2j_1 + 2j_2 + 1$, 我们有

$$\begin{aligned} (j_1 + j_2)^2 + 2(j_1 + j_2) + 1 - J_{\min}^2 &= 4j_1 j_2 + 2j_1 + 2j_2 + 1 \\ J_{\min}^2 &= j_1^2 - 2j_1 j_2 + j_2^2 = (j_1 - j_2)^2 \\ J_{\min} &= \pm(j_1 - j_2) \end{aligned} \quad (11.37)$$

若 $j_1 = j_2$, 则 $J_{\min} = 0$ 。若 $j_1 \neq j_2$, 则 (11.37) 中的一个值为负, 应舍去 【式 (11.30)】。因此,

$$J_{\min} = |j_1 - j_2| \quad (11.38)$$

综上所述, 我们已经证明: 两个由量子数 j_1 和 j_2 描述的角动量相加, 会产生一个总角动量, 其量子数 J 可能取以下值:

$$J = j_1 + j_2, j_1 + j_2 - 1, \dots, |j_1 - j_2| \quad (11.39)$$

例题: 求解角动量子数为 $j_1 = 2$ 和 $j_2 = 3$ 的角动量相加所得的总角动量子数的可能值。

J 的最大和最小值由 (11.39) 给出, 有 $j_1 + j_2 = 5$ 和 $|j_1 - j_2| = |2 - 3| = 1$ 。因此, J 的可能取值 (11.39) 为 $J = 5, 4, 3, 2, 1$ 。

练习: 求解角动量子数为 $j_1 = 3$ 和 $j_2 = \frac{3}{2}$ 的角动量相加所得的总角动量子数的可能值。(答案: $J = \frac{9}{2}, \frac{7}{2}, \frac{5}{2}, \frac{3}{2}$ 。)

例题: 求解角动量子数为 $j_1 = 1$ 、 $j_2 = 2$ 和 $j_3 = 3$ 的角动量相加所得的总角动量子数的可能值。

为了将大于两个角动量相加，我们重复使用 (11.39)。将 $j_1 = 1$ 和 $j_2 = 2$ 叠加，得到量子数可能值为 3、2 和 1。将 j_3 加到每个值上，得到总角动量量子数为

$$6, 5, 4, 3, 2, 1, 0; \quad 5, 4, 3, 2, 1; \quad 4, 3, 2 \quad (11.40)$$

我们有一组总角动量量子数为 6 的状态，两组 $J = 5$ 的状态，以及三组 $J = 4$ 的状态，以此类推。

练习：求解角动量量子数为 $j_1 = 1$ 、 $j_2 = 1$ 和 $j_3 = 1$ 的角动量相加所得的总角动量量子数的可能值。（答案： $J = 3, 2, 2, 1, 1, 1, 0$ 。）

11.5 多电子原子的角动量

电子总轨道和自旋角动量

n 电子原子的**电子总轨道角动量** (total electronic orbital angular momentum) 定义为各个电子轨道角动量的矢量和：

$$\mathbf{L} = \sum_{i=1}^n \mathbf{L}_i \quad (11.41)$$

虽然独立的轨道角动量算符 $\hat{\mathbf{L}}_i$ 与原子哈密顿算符 (11.1) 不可对易，但可以证明 (Bethe and Jackiw, pp. 102-103) $\hat{\mathbf{L}}_i$ 与原子哈密顿算符可对易【在忽略自旋-轨道耦合 (第11.6节) 的情况下】。因此，我们可以使用量子数 L 来描述一个原子状态，其中 $L(L+1)\hbar^2$ 为电子总轨道角动量大小的平方。原子的电子波函数 ψ 满足 $\hat{L}^2\psi = L(L+1)\hbar^2\psi$ 。原子的电子总轨道角动量量子数 L 由一个代码字母表示，具体如下：

L	0	1	2	3	4	5	6	7	8
字母	S	P	D	F	G	H	I	K	L

(11.42)

总轨道角动量用大写字母表示，而单个电子的轨道角动量则用小写字母表示。

例题：找出电子组态为 $1s^2 2s^2 2p 3d$ 的碳原子状态的量子数 L 的可能值。

s 电子的轨道角动量为零，因此对总轨道角动量没有贡献。 $2p$ 电子有 $l = 1$ ， $3d$ 电子有 $l = 2$ 。根据角动量叠加规则 (11.39)，总轨道角动量量子数介于 $1 + 2 = 3$ 和 $|1 - 2| = 1$ 之间，因此 L 的可能值为 $L = 3, 2, 1$ 。组态 $1s^2 2s^2 2p 3d$ 对应于状态 P, D, F 。【Hartree-Fock 中心场近似认为每个电子都在中心场势能中运动， $V = V(r)$ 。因此，在这种近似情况下，各个电子轨道角动量是恒定的，从而产生了一个由指定各个轨道角动量的单一组态组成的波函数。当我们超越 SCF 中心场近似时，我们会混合其他组态，因此不再精确指定各个轨道角动量。即使如此，我们仍然可以使用规则 (11.39) 来找出总轨道角动量的可能值。】

练习：找出电子组态为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p 4p$ 状态的量子数 L 的可能值。（答案： $2, 1, 0$ 。）

原子的**电子总自旋角动量** (total electronic spin angular momentum) $\mathbf{S}$ 定义为各电子自旋的矢量和：

$$\mathbf{S} = \sum_{i=1}^n \mathbf{S}_i \quad (11.43)$$

(11.1) 的原子哈密顿量（忽略了自旋-轨道耦合）不包含自旋，因此与总自旋算符 $\hat{S}^2$ 和 $\hat{S}_z$ 可对易。 $\hat{S}^2$ 与 $\hat{H}$ 可对易的事实并不足以证明原子波函数 ψ 就是 $\hat{S}^2$ 的本征函数。波函数交换反对称的要求表明每个 ψ 必须是交换算符 $\hat{P}_{ik}$ 的本征函数，本征值为 -1 （第10.3节）。因此，若我们想找到 $\hat{H}$ 、 $\hat{S}^2$ 和 $\hat{P}_{ik}$ 的共同本征函数， $\hat{S}^2$ 与 $\hat{P}_{ik}$ 必须可对易。问题 11.19 证明了 $[\hat{S}^2, \hat{P}_{ik}] = 0$ ，则原子波函数是 $\hat{S}^2$ 的本征函数。我们有 $\hat{S}^2\psi = S(S+1)\hbar^2\psi$ ，原子的每个状态都可以用一个电子总自旋量子数 S 来指定。

例题：找出电子组态 $1s^2 2s^2 2p 3d$ 对应状态的量子数 S 的可能值。

首先，考虑两个 $1s$ 电子。为了满足不相容原理，其中一个电子必须满足 $m_s = \frac{1}{2}$ 而另一个满足 $m_s = -\frac{1}{2}$ 。如果 M_S 是指定 $1s$ 电子总自旋 z 分量的量子数，那么 M_S 的唯一可能值为 $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$ 【式 (11.34)】。 M_S 值的唯一性清楚表明两个 $1s$ 电子的总自旋角动量为零。因此，尽管在一般情况下，当我们根据规则 (11.39) 将两个电子的自旋 $s_1 = \frac{1}{2}$ 和 $s_2 = \frac{1}{2}$ 相加时，我们得到了两个可能值 $S = 0$ 和 $S = 1$ ，然而泡利原理引入的限制在该例子中舍去了 $S = 1$ ，只留下了 $S = 0$ 。同样地， $2s$ 电子的总自旋角动量为零不相容原理未限制 $2p$ 和 $3d$ 电子的 m_s 值。对 $2p$ 和 $3d$ 电子的自旋 $s_1 = \frac{1}{2}$ 和 $s_2 = \frac{1}{2}$ 使用规则 (11.39)，得到 $S = 0$ 和 $S = 1$ 。这些是总自旋量子数的可能取值，因为 $1s$ 和 $2s$ 电子不参与 S 的贡献。

练习：找出电子组态 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p 4p$ 对应状态的量子数 S 的可能值。（答案：0 和 1。）

原子光谱项

给定的电子组态通常会产生几种不同的原子态，有些具有相同的能量，有些具有不同的能量，这取决于这些态之间的电子间斥力是否相同或不同。例如，氮的 $1s^2 2s$ 组态会产生四种状态：三个具有零级波函数 (10.27) 至 (10.29) 的状态都具有相同的能量；单个状态 (10.30) 具有不同的能量。电子组态 $1s^2 2p$ 会产生 12 种状态：其中九种通过将 (10.27) 至 (10.29) 中的 $2s$ 替换为 $2p_x$ 、 $2p_y$ 和 $2p_z$ 而获得，且具有相同能量；另外三个通过将 (10.30) 中的 $2s$ 替换为 $2p_x$ 、 $2p_y$ 和 $2p_z$ 而获得，也具有相同能量，但与前九个不同。

因此，由给定电子组态产生的原子态可以分为具有相同能量的态组。可以证明，由相同电子组态产生且具有相同能量（忽略自旋-轨道耦合）的态将具有相同的 L 值和相同的 S 值（参见 Kemble, Section 63a）。由相同的电子组态产生、具有相同 L 值和 S 值的一组等能原子态构成一个**原子（光谱）项** (atomic term)。对于一个给定的 L 值，量子数 M_L （其中 $M_L\hbar$ 是电子总轨道角动量在 z 方向的分量）从 $-L$ 到 $+L$ 可以取 $2L+1$ 个值。对于一个给定的 S 值， M_S 有 $2S+1$ 个可能值。原子能量不取决于 M_L 和 M_S ，则每个项包含 $(2L+1)(2S+1)$ 个等能原子态。每个原子光谱项的简并度为 $(2L+1)(2S+1)$ （忽略自旋-轨道耦合）。

每个原子光谱项由一个**谱项符号** (term symbol) 表示，该符号将 $2S+1$ 的数值作为左上标写在表示 L 值的代码字母 (11.42) 上。例如，某谱项满足 $L=2$ 且 $S=1$ ，则其谱项符号为 3D ，因为 $2S+1=3$ 。

例题：求以下电子组态产生的光谱项：

(a) $1s^2 2p$;

(b) $1s^2 2s^2 2p 3d$ 。

并求每项的简并度。

(a) $1s$ 电子满足 $l = 0$ 而 $2p$ 电子满足 $l = 1$ 。叠加规则 (11.39) 给出了唯一的 L 值为 1。 $L = 1$ 对应的谱项为 P 每个电子都有 $s = \frac{1}{2}$ ，由 (11.39)， S 的可能取值为 0 和 1，那么 $2S + 1$ 的取值为 1 和 3。可能的谱项即为 1P 和 3P 。 3P 项的量子数为 $L = 1, S = 1$ ，简并度为 $(2L + 1)(2S + 1) = 3(3) = 9$ 。 1P 项的量子数为 $L = 1, S = 0$ ，简并度为 $(2L + 1)(2S + 1) = 3(1) = 3$ 。【 3P 中的九个状态通过将 (10.27) 至 (10.29) 中的 $2s$ 替换为 $2p_x, 2p_y$ 和 $2p_z$ 而获得。 1P 中的三个状态通过将 (10.30) 中的 $2s$ 替换为 $2p$ 而获得。】

(b) 在本节的前两例中，我们已经知道组态 $1s^2 2s^2 2p 3d$ 的总轨道角动量量子数 L 的可能值为 3, 2, 1, S 的可能值为 0 和 1。与这些 L 值相对应的符号为 F, D, P ，则谱项为

$$^1P, \quad ^3P, \quad ^1D, \quad ^3D, \quad ^1F, \quad ^3F \quad (11.44)$$

简并度采用与 (a) 相同的方式求出，分别为 3, 9, 5, 15, 7, 21。

原子光谱项的导出

现在，我们来探讨如何从给定的电子组态中系统地推导出原子光谱项。

首先，考虑只包含只包含闭壳层的组态。在这些组态中，若有一个电子满足 $m_s = +\frac{1}{2}$ ，则必有另一个电子满足 $m_s = -\frac{1}{2}$ 。将描述电子总自旋角动量在 z 方向分量的量子数设为 M_S 。那么 M_S 的唯一可能值为零 ($M_S = \sum_i m_{si} = 0$)。那么 S 一定为零。对于闭壳层中每个磁量子数为 m 的电子，一定有一个磁量子数为 $-m$ 的电子与它对应。例如，在组态 $2p^6$ 中，两个电子满足 $m = +1$ ，两个 $m = -1$ ，还有两个满足 $m = 0$ 。将描述电子总轨道角动量在 z 方向分量的量子数设为 M_L ，则 $M_L = \sum_i m_{li} = 0$ 。因此， L 为零。总而言之，闭壳层组态只有一个谱项： 1S 。对于同时包含闭壳层和开壳层的组态，闭壳层对 L 和 S 的贡献为零，因此在谱项的导出中可以忽略。

现在，我们来考虑不同壳层中的两个电子，这样的电子称为**非等价电子或非同科电子** (nonequivalent electrons)。非等价电子具有不同的 n 值或 l 值或两者皆有，当我们推导谱项时不需要担心泡利不相容原理的限制。只需按照 (11.39)，从 l_1 和 l_2 的值中找到 L 的可能值，再将 s_1 和 s_2 组合，得到 $S = 0, 1$ 。我们之前已经计算出了 pdf 的情况，得到了 (11.44) 中的项。如果我们有二个以上的非等价电子，我们将各个 l 组合起来找到 L 的值，并将各个 s 组合起来找到 S 的值。例如，考虑一个 pdf 组态。 L 的可能值由 (11.40) 给出。将三个自旋角动量组合起来，每个都为 $\frac{1}{2}$ ，则 $S = \frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ 。(11.40) 中每个 $L = 3$ 的三种可能都可以与 $S = \frac{1}{2}$ 的两种状态相组合，得到六个 2F 谱项。继续这样做，我们发现以下谱项来自 pdf 组态： $^2S(2), ^2P(4), ^2D(6), ^2F(6), ^2G(6), ^2H(4), ^2I(2), ^4S, ^4P(2), ^4D(3), ^4F(3), ^4G(3), ^4H(2), ^4I$ ，每个项出现的次数用括号中的数字表示。

再考虑位于同一壳层中的两个电子，称为**等价电子或同科电子** (equivalent electrons)。等价电子的 n 和 l 值相同，由于必须避免两个电子具有相同的四个量子数，情况变得更加复杂。因此，并非所有针对非等价电子推导出的项都是可取的。以两个等价的 p 电子为例，考虑由它们产生的谱项——一个 np^2 组态。(碳原子基态组态为 $1s^2 2s^2 2p^2$ 。) 两个电子允许的 m 和 m_s 值和导出的 M_L, M_S 列于表 11.1 中。

请注意，此表中缺少某些组合。例如，因为违反了泡利原理，组合 $m_1 = 1, m_{s1} = \frac{1}{2}, m_2 = 1, m_{2s} = \frac{1}{2}$ 是禁止的。另一个缺少的组合是 $m_1 = 1, m_{s1} = -\frac{1}{2}, m_2 = 1, m_{2s} = -\frac{1}{2}$ 。该组合与 $m_1 = 1, m_{s1} = \frac{1}{2}, m_2 = 1, m_{2s} = -\frac{1}{2}$ (第一行) 不同，区别仅在于电子 1 和 2 的交换。表 11.1 中的每一行代表一个 Slater 行列式，展开后包含所有可能的电子在自旋轨道之间的交换项。两行仅因两个电子的交换而不同的情况对应于同一个 Slater 行列式，我们在表中仅列出其中一行。

表 11.1 中 M_L 的最大值为 2，必须对应于 $L = 2$ 的谱项，即 D 项。 $M_L = 2$ 只在 $M_S = 0$ 时出

m_1	m_{s1}	m_2	m_{s2}	$M_L = m_1 + m_2$	$M_S = m_{s1} + m_{s2}$
1	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	2	0
1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	1
1	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	1	0
1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	0
1	$-\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	1	-1
1	$\frac{1}{2}$	-1	$\frac{1}{2}$	0	1
1	$\frac{1}{2}$	-1	$-\frac{1}{2}$	0	0
1	$-\frac{1}{2}$	-1	$\frac{1}{2}$	0	0
1	$-\frac{1}{2}$	-1	$-\frac{1}{2}$	0	-1
0	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	0	0
0	$\frac{1}{2}$	-1	$\frac{1}{2}$	-1	1
0	$\frac{1}{2}$	-1	$-\frac{1}{2}$	-1	0
0	$-\frac{1}{2}$	-1	$\frac{1}{2}$	-1	0
0	$-\frac{1}{2}$	-1	$-\frac{1}{2}$	-1	-1
-1	$\frac{1}{2}$	-1	$-\frac{1}{2}$	-2	0

表 11.1: 两个等价 p 电子的量子数

现, 因此 $S = 0$ 。则我们有对应于五个状态的 1D 谱项

$$\begin{array}{cccccc} M_L = & 2 & 1 & 0 & -1 & -2 \\ M_S = & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \quad (11.45)$$

表11.1中 M_S 的最大值为 1, 即对应于 $S = 1$ 的谱项。 $M_S = 1$ 在 $M_L = 1, 0, -1$ 时出现, 即 P 谱项。因此, 有对应于九个状态的 3P 谱项

$$\begin{array}{ccccccccc} M_L = & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ M_S = & 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & -1 \end{array} \quad (11.46)$$

将 (11.45) 和 (11.46) 包含的状态从表11.1中删去, 只剩下了一个状态, 即 $M_L = 0$ 和 $M_S = 0$ 。这对应于谱项 1S 。因此, 组态 p^2 产生的谱项为 1S 、 3P 和 1D 。(相反地, 两个非等价电子产生六个谱项: 1S 、 3S 、 1P 、 3P 、 1D 和 3D 。)

表 11.2a 列出了等价电子的各种组态所产生的谱项。这些谱项可能可以使用与我们导出 p^2 组态谱项相同的方法导出, 但这一流程可能变得相当复杂。为了求出 f^7 组态的谱项, 我们需要一个 3432 行的表格。更多高效的方法参见【R. F. Curl and J. E. Kilpatrick, *Am. J. Phys.*, **28**, 357 (1960); K. E. Hyde, *J. Chem. Educ.*, **52**, 87 (1975)】。

如表11.2a 所示, 含有 N 个电子的亚层产生的项与缺少 N 个电子而未满的亚层产生的谱项相同。例如, p^2 和 p^4 的谱项相同。我们可以将闭亚壳层的电子分为两组, 并找出每组的谱项。由于闭亚壳层只产生 1S 谱项, 因此这两组的谱项必须相同。表 11.2b 给出了某些非等价电子组态产生的谱项。

为了处理包含等价和非等价电子的组态, 我们首先分别找出非等价电子的谱项和等价电子的谱项。然后, 我们取这两组谱项的 L 和 S 值的所有可能组合。例如, 考虑一个 sp^3 组态。从 s 电子中, 我们得到 2S 谱项, 从三个等价的 p 电子中, 我们得到 2P 、 2D 、 4S 谱项 (表 11.2a)。将这些

组态	谱项
(a) 等价电子	
s^2, p^6, d^{10}	1S
p, p^5	2P
p^2, p^4	$^3P, ^1D, ^1S$
p^3	$^4S, ^2D, ^2P$
d, d^9	2D
d^2, d^8	$^3F, ^3P, ^1G, ^1D, ^1S$
d^3, d^7	$^4F, ^4P, ^2H, ^2G, ^2F, ^2D(2), ^2P$
d^4, d^6	$\begin{cases} ^5D, ^3H, ^3G, ^3F(2), ^3D, ^3P(2) \\ ^1I, ^1G(2), ^1F, ^1D(2), ^1S(2) \end{cases}$
d^5	$\begin{cases} ^6S, ^4G, ^4F, ^4D, ^4P, ^2I, ^2H, ^2G(2) \\ ^1I, ^1G(2), ^1F, ^1D(2), ^1S(2) \end{cases}$
(b) 非等价电子	
ss	$^1S, ^3S$
sp	$^1P, ^3P$
sd	$^1D, ^3D$
pp	$^3D, ^1D, ^3P, ^1P, ^3S, ^1S$

表 11.2: 各种电子组态产生的谱项

谱项的 L 和 S 值组合起来, 我们得到 sp^3 组态的谱项

$$^3P, ^1P, ^3D, ^1D, ^5S, ^3S \quad (11.47)$$

洪特规则

为了确定给定电子组态产生的项中哪个能量最低, 我们使用**洪特经验规则** (Hund's Rule): 对于来自相同电子组态的项, S 值最大的项能量最低。如果有多个 S 值最大的项, 则 S 值和 L 值最大的项能量最低。

例题: 使用表11.2预测以下组态能量最低的谱项:

(a) 碳原子基态 $1s^2 2s^2 2p^2$;

(b) 组态 $1s^2 2s^2 2p^6 3d^2 4s^2$ 。

(a) 表11.2a 给出了由组态 p^2 产生的谱项 3P 、 1D 和 1S 。具有最高 S 值的项, 其上标 $2S+1$ 也最大。洪特规则预测 3P 为能量最低的谱项。

(b) 表11.2a 给出了由组态 $3d^2$ 产生的谱项 3F 、 3P 、 1G 、 1D 和 1S 。在这些谱项中, 3F 和 3P 具有最高的 S 值。由于 3F 的 $L=3$ 大于 3P 的 $L=1$, 因此洪特规则预测 3F 为能量最低的谱项。

练习: 使用 (11.47) 预测组态为 $1s^2 2s^2 2p^3$ 的能量最低的谱项。(答案: 4S 。)

基态组态非常符合洪特规则, 但有时激发态会偏离洪特规则 (问题 11.30)。

洪特规则只给出组态的最低谱项，不适用于决定其余谱项的顺序。例如，对于碳原子的组态 $1s^2 2s 2p^3$ ，观测到的谱项顺序为

$$^5S < ^3D < ^3P < ^1D < ^3S < ^1P$$

3S 谱项高于 1D ，尽管 3S 的自旋 S 值更高。

无需参考表 11.2a 来查找部分填充的亚壳层组态的最低谱项。我们只需将电子放在轨道中，以获得最大的平行自旋数即可。例如，对于组态 d^3 ，我们有

$$m: \quad \begin{array}{ccccc} \uparrow & \uparrow & \uparrow & \overline{} & \overline{} \\ +2 & +1 & 0 & -1 & -2 \end{array} \quad (11.48)$$

因此，最低的谱项有三个自旋平行的电子，那么 $S = \frac{3}{2}$ ，得到 $2S + 1 = 4$ 。 M_L 的最大值为 3，对应于 $L = 3$ ，即谱项 F 。洪特规则预测组态 d^3 的最低谱项为 4F 。

洪特规则的传统解释如下：自旋相同的电子倾向于彼此避开（回想一下费米空穴的概念），从而最大限度地减少它们之间的库仑斥力。因此，平行自旋数量最多（即 S 值最大）的谱项能量最低。例如，氦 $1s2s$ 组态的 3S 谱项具有反对称空间函数，当两个电子的空间坐标相等时，该函数为零。因此， 3S 谱项低于 1S 谱项。

这种传统的解释在大多数情况下都是错误的。的确，对于氦 $^3S 1s2s$ 谱项而言，两个电子非常接近的概率比 $^1S 1s2s$ 谱项要小。然而，使用精确的波函数进行计算表明，两个电子相距很远的概率在 3S 谱项中也较小。最终结果是， 3S 谱项中两个电子之间的平均距离略小于 1S 谱项，而 3S 谱项中的电子间斥力略大于 1S 谱项。计算表明，由于 3S 项中的电子与原子核的吸引力远大于 1S 项，因此 3S 项低于 1S 项。铍和碳原子的谱项也得到了类似的结果。【见 J. Katriel and R. Pauncz, *Adv. Quantum Chem.*, **10**, 143 (1977).】以下是对这些结果的解释。【I. Shim and J. P. Dahl, *Theor. Chim. Acta*, **48**, 165 (1978).】自旋相同的电子之间的泡利“排斥力”使 3S 谱项中两个电子半径向量之间的平均角度大于 1S 谱项中的平均角度。这减少了核的电子屏蔽，使电子在 3S 谱项中更接近核，从而使 3S 谱项中的电子与核的吸引力更大。【另见 R. E. Boyd, *Nature*, **310**, 480 (1984); T. Oyamada et al., *J. Chem. Phys.*, **133**, 164113 (2010).】

双电子自旋函数的本征值

氦原子组态 $1s2s$ 产生简并度为 $(2S + 1)(2L + 1) = 1(3) = 3$ 的 3S 谱项和简并度为 $1(1) = 1$ 的 1S 谱项。三个零级氦波函数 (10.27) 至 (10.29) 必须对应于三重简并的 3S 谱项，单函数 (10.30) 必须对应于 1S 谱项。因为 3S 谱项有 $S = 1$ 和 $M_S = 1, 0, -1$ ，所以 (10.27) 至 (10.29) 的三个自旋函数应是 $\hat{S}^2$ 的本征函数，本征值为 $S(S + 1)\hbar^2 = 2\hbar^2$ ，也是 $\hat{S}_z$ 的本征函数，本征值为 $M_S\hbar = \hbar, 0$ 和 $-\hbar$ 。在本例中，(10.30) 中的自旋函数应也是 $\hat{S}^2$ 和 $\hat{S}_z$ 的本征函数，但本征值为 0，因为 $S = 0$ 和 $M_S = 0$ 。我们现在对这些论点进行验证。

根据式 (11.43)，电子总自旋算符为每个电子自旋算符的和：

$$\hat{S} = \hat{S}_1 + \hat{S}_2 \quad (11.49)$$

取 (11.49) 在 z 方向的分量，我们有

$$\hat{S}_z = \hat{S}_{1z} + \hat{S}_{2z} \quad (11.50)$$

$$\begin{aligned} \hat{S}_z \alpha(1)\alpha(2) &= \hat{S}_{1z} \alpha(1)\alpha(2) + \hat{S}_{2z} \alpha(1)\alpha(2) \\ &= \alpha(2) \hat{S}_{1z} \alpha(1) + \alpha(1) \hat{S}_{2z} \alpha(2) \\ &= \frac{1}{2} \hbar \alpha(1)\alpha(2) + \frac{1}{2} \hbar \alpha(1)\alpha(2) \\ \hat{S}_z \alpha(1)\alpha(2) &= \hbar \alpha(1)\alpha(2) \end{aligned} \quad (11.51)$$

其中用到了式 (10.7)。同样地，我们有

$$\hat{S}_z \beta(1)\beta(2) = -\hbar\beta(1)\beta(2) \quad (11.52)$$

$$\hat{S}_z [\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)] = 0 \quad (11.53)$$

$$\hat{S}_z [\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)] = 0 \quad (11.54)$$

现在考虑 $\hat{S}^2$ ，我们有 【式 (11.26)】

$$\hat{S}^2 = (\hat{S}_1 + \hat{S}_2) \cdot (\hat{S}_1 + \hat{S}_2) = \hat{S}_1^2 + \hat{S}_2^2 + 2(\hat{S}_{1x}\hat{S}_{2x} + \hat{S}_{1y}\hat{S}_{2y} + \hat{S}_{1z}\hat{S}_{2z}) \quad (11.55)$$

$$\begin{aligned} \hat{S}^2 \alpha(1)\alpha(2) &= \alpha(2)\hat{S}_1^2\alpha(1) + \alpha(1)\hat{S}_2^2\alpha(2) + 2\hat{S}_{1x}\alpha(1)\hat{S}_{2x}\alpha(2) \\ &\quad + 2\hat{S}_{1y}\alpha(1)\hat{S}_{2y}\alpha(2) + 2\hat{S}_{1z}\alpha(1)\hat{S}_{2z}\alpha(2) \end{aligned}$$

使用方程 (10.7) 至 (10.9)、(10.72) 和 (10.73)，我们有

$$\hat{S}^2 \alpha(1)\alpha(2) = 2\hbar^2 \alpha(1)\alpha(2) \quad (11.56)$$

因此 $\alpha(1)\alpha(2)$ 是 $\hat{S}^2$ 的本征函数，对应于 $S = 1$ 。同样地，我们有

$$\begin{aligned} \hat{S}^2 \beta(1)\beta(2) &= 2\hbar^2 \beta(1)\beta(2) \\ \hat{S}^2 [\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)] &= 2\hbar^2 [\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)] \\ \hat{S}^2 [\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)] &= 0 \end{aligned}$$

因此，式 (10.27) 至 (10.30) 中的自旋本征函数对应于总自旋量子数以下的值：


	S	M_S	
triplet $\left\{ \begin{array}{l} \alpha(1)\alpha(2) \\ 2^{-1/2}[\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)] \\ \beta(1)\beta(2) \end{array} \right.$	1	1	(11.57)
	1	0	(11.58)
	1	-1	(11.59)

singlet $\{2^{-1/2}[\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)]\}$	0	0	(11.60)
---	---	---	---------

【在第11.4节的记号中，我们正在处理两个量子数分别为 $j_1 = \frac{1}{2}$ 和 $j_2 = \frac{1}{2}$ 的自旋角动量的叠加，从而得到具有量子数 $J = 1$ 和 $J = 0$ 的总角动量本征函数。式 (11.57) 至 (11.60) 中的系数对应于式 (11.33) 中的系数 C ，是 Clebsch-Gordan 系数的例子。】

图11.3展示了矢量 $\mathbf{S}_1$ 与 $\mathbf{S}_2$ 的矢量和 $\mathbf{S}$ 。可能令人惊讶的是，在自旋函数 (11.58) 中，两个电子的自旋的 z 分量指向相反方向，却能够具有总自旋量子数 $S = 1$ 。图11.3展示了这是如何实现的。

一个原子光谱项的每个波函数都是 $\hat{L}^2$ 、 $\hat{S}^2$ 、 $\hat{L}_z$ 和 $\hat{S}_z$ 的本征函数。因此，当我们进行组态相互作用计算时，只有与所考虑的状态具有相同 $\hat{L}^2$ 、 $\hat{S}^2$ 、 $\hat{L}_z$ 和 $\hat{S}_z$ 本征值的组态函数才会在展开式 (11.17) 中出现。例如，氮 $1s^2$ 的基态谱项为 1S ，有 $L = 0$ 和 $S = 0$ 。电子组态 $1s2p$ 产生谱项 1P 和 3P ，仅产生具有 $L = 1$ 的状态。在氮原子基态的组态相互作用波函数 (11.17) 中，不会出现由 $1s2p$ 组态产生的组态相互作用。



两个电子自旋的矢量和。对于 $\alpha(1)\alpha(2)$

图 11.3: 和 $\beta(1)\beta(2)$, $\mathbf{S}_1$ 和 $\mathbf{S}_2$ 在 xOy 平面上的投影彼此成 90° 角 (问题 11.18c)。

原子态的字称

考虑原子哈密顿 (11.1)。在 7.5 节中, 我们已经证明了宇称算符 $\hat{\Pi}$ 与动能算符可对易。(11.1) 中的 $1/r_1$ 为 $r_i^{-1} = (x_i^2 + y_i^2 + z_i^2)^{-1/2}$ 。将每个坐标用其相反数代替, $1/r_1$ 没有变化。以及,

$$r_{ij}^{-1} = [(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 + (z_i - z_j)^2]^{-1/2}$$

反演也对 $1/r_{ij}$ 没有影响。因此 $\hat{\Pi}$ 与原子哈密顿算符可对易, 我们可以选择具有确定宇称的原子波函数。

对于单电子原子, 空间波函数为 $\psi = R(r)Y_l^m(\theta, \phi)$ 。径向因子在反演后保持不变, 而奇偶性由角向因子决定。在问题 7.29 中, 我们已经证明了当 l 为偶数时 Y_l^m 是偶函数, 而当 l 为奇数时 Y_l^m 是奇函数。因此, 单电子原子的能级状态根据 l 为偶数或奇数, 而呈现偶数或奇数的宇称。

现在考虑一个 n 电子原子。在 Hartree-Fock 中心场近似中, 我们将波函数写成自旋轨道的 Slater 行列式 (或 Slater 行列式的线性组合)。波函数是谱项的总和, 每个谱项中的空间因子具有以下形式

$$R_1(r_1) \dots R_n(r_n) Y_{l_1}^{m_1}(\theta_1, \phi_1) \dots Y_{l_n}^{m_n}(\theta_n, \phi_n)$$

该乘积的宇称由球谐函数因子决定。可以看到, 该乘积所得函数的奇偶性由加和 $l_1 + l_2 + \dots + l_n$ 的奇偶性决定。因此, 原子状态的宇称是通过将产生该状态的电子组态中的电子的 l 值相加来确定的: 若 $\sum_i l_i$ 为偶数, 则 ψ 为偶函数; 若 $\sum_i l_i$ 为奇数, 则 ψ 为奇函数。举个例子, 组态 $1s^2 2s 2p^3$ 有 $\sum_i l_i = 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 = 3$, 因此该组态的宇称为奇函数。组态 $1s^2 2s^2 2p^2$ 有 $\sum_i l_i = 0 + 0 + 1 + 1 = 2$, 由此电子组态产生的所有状态均为奇宇称。(我们的讨论基于对 ψ 的 SCF 近似, 但结论对真实 ψ 也成立。)

电子总角动量和原子能级

原子的电子总角动量 J (total electronic angular momentum) 是电子总轨道角动量和总自旋角动量的矢量和:

$$\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S} \quad (11.61)$$

电子总角动量算符 $\hat{\mathbf{J}}$ 与原子哈密顿算符可对易，我们可以用量子数 J 来描述一个原子态，其可能取值为【式 (11.39)】：

$$L + S, \quad L + S - 1, \quad \dots, \quad |L - S| \quad (11.62)$$

我们有 $\hat{J}^2\psi = J(J+1)\hbar^2\psi$ 。

对于原子哈密顿量 (11.17)，属于同一谱项的所有状态具有相同的能量。然而，当我们在 $\hat{H}$ 中引入自旋-轨道耦合 (第11.6节) 后，人们发现，量子数 J 的值会对能量产生微小影响。属于同一谱项且 J 值相同的状态集合构成一个原子**光谱支项** (level)。属于同一谱项的不同能级的能量略有不同。(参见第 11.7 节中的图 11.6。) 为了表示能级，我们将 J 值添加到谱项符号的右下标中。每个能级都是 $(2J+1)$ 重简并的，对应于 M_J 的 $2J+1$ 个值，其中 $M_J\hbar$ 为电子总角动量 $\mathbf{J}$ 在 z 方向的分量。每个能级包含 $2J+1$ 个等能**状态** (states)。

例题：求谱项为 3P 的支项，并给出每个支项的简并度。

对于 3P 谱项， $2S+1=3$ 即 $S=1$ ，同时根据 (11.42)， $L=1$ 。由 (11.62) 可知， $J=2, 1, 0$ 。因此， 3P 的支项为 3P_2 、 3P_1 和 3P_0 。

三个支项 3P_2 、 3P_1 和 3P_0 的总状态数为 $5+3+1=9$ 。当我们忽略自旋-轨道耦合时，我们有一个 3P 谱项，包含 $(2L+1)(2S+1)=3(3)=9$ 个等能原子态。考虑自旋-轨道耦合后，九重简并的谱项裂分为三个空间接近的支项：包含五个状态的 3P_2 、包含三个状态的 3P_1 和只有一个状态的 3P_0 。谱项 3P 的总状态数与该谱项产生的三个支项相同。

练习：求谱项为 3D 的支项，并给出每个支项的简并度。(答案： $^2D_{5/2}$ ， $^2D_{3/2}$ ，简并度分别为 6 和 4。)

$2S+1$ 称为谱项的**电子自旋多重度** (electron-spin multiplicity or *multiplicity*)。若 $L \geq S$ ，则 (11.62) 中 J 值介于 $L+S$ 和 $L-S$ 之间，共有 $2S+1$ 个不同的值。当 $L \geq S$ 时，自旋多重度给出了由给定谱项产生的支项数。若 $L < S$ ，则 (11.62) 中 J 值介于 $L+S$ 和 $S-L$ 之间，共有 $2L+1$ 个不同的值。在这种情况下，自旋多重度大于光谱支项数。例如，若 $L=0$ 而 $S=1$ (3S 谱项)，自旋多重度为 3，但 J 只有一个可能值，即 $J=1$ 。对于 $2S+1=1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots$ ，我们使用**单重、双重、三重、四重、五重、六重** (singlet, doublet, triplet, quartet, quintet, sextet) 等来描述谱项的自旋多重度。光谱支项 3P_1 读作“三重 P 一” (triplet P one)。

对于轻原子，自旋-轨道耦合非常小，光谱支项之间的差异非常小。注意，在第11.7节的图11.6中，氮原子 $1s2p$ 的谱项 3P 所属支项 3P_0 、 3P_1 和 3P_2 之间的差异要远小于 $1s2p$ 组态产生的 1P 和 3P 谱项之间的差异。

氢和氦的原子光谱项与光谱支项

氢原子有一个电子。因此 $L=l$ ， $S=s=\frac{1}{2}$ 。 J 的可能值为 $L+\frac{1}{2}$ 和 $L-\frac{1}{2}$ ，除了 $L=0$ 时，只有唯一的 $J=\frac{1}{2}$ 。每个电子组态只产生一个谱项，若 $L=0$ 则只有一个支项，若 $L \neq 0$ 则有两个支项。基态组态产生的谱项为 2S ，对应于单支项 $^2S_{1/2}$ ；该支项是两重简并的 ($M_J = -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$)。 $2s$ 组态也产生 $^2S_{1/2}$ 支项。 $2p$ 组态产生支项 $^2P_{3/2}$ 和 $^2P_{1/2}$ ，支项 $^2P_{3/2}$ 是四重简并的，而 $^2P_{1/2}$ 是两重简并的。当 $n=2$ 时，有 $2+4+2=8$ 种状态，与我们之前的工作相符。

氮原子基态组态 $1s^2$ 为闭壳层，只产生一个支项 1S_0 ，且是非简并的 ($M_J=0$)。激发态 $1s2s$ 产生两个谱项 1S 和 3S ，每个都有一个支项。支项 1S_0 非简并， 3S_1 为三重简并。 $1s2p$ 组态产生谱

项 1P 和 3P 。 3P 的支项为 3P_2 、 3P_1 和 3P_0 ， 1P 有一个支项 1P_1 。

原子能级表

原子序数小于 90 的原子的能级，其光谱测定值见 C. E. Moore 等人所著的表格中：C. E. Moore, *Atomic Energy Levels*, National Bureau of Standards Circular 467, vols. I, II, and III, 1949, 1952, and 1958, Washington D.C.; these have been reprinted as Natl. Bur. Stand. Publ. NSRDSNBS 35, 1971; W. C. Martin et al., *Atomic Energy Levels—The Rare-Earth Elements*, Natl. Bur. Stand. Publ. NSRDS-NBS 60, Washington, D.C., 1978。Moore 表格及其后续修订版中的原子能级数据，可通过美国国家标准与技术研究院（NIST）原子光谱数据库在线获取，网址为：www.nist.gov/pml/data/asd.cfm。这些表格还列出了许多原子离子的能级。光谱学家使用符号 I 表示中性原子，符号 II 表示一次离子化原子，以此类推。要查看 NIST 在线数据库中 C^{2+} 离子的能级数据，请点击“能级”，然后在“光谱”后输入“C III”。




图 11.4: 碳原子某些谱项的能量。

这些表格以原子的最低能级为基准，将最低能级的能量值设定为零，将支项的能量 E_i 表示为 E_i/hc ，单位为 cm^{-1} ，其中 h 和 c 分别为 Planck 常数和光速。两支项之间 E/hc 值的差异给出了不同支项之间光谱跃迁从波束【式 (4.64)】（假设给定的跃迁允许）。能量 E 为 1 eV 对应于 $E/hc = 8065.544 \text{ cm}^{-1}$ （问题 11.29）。

图 11.4 显示了碳原子的部分谱项能量。由于各谱项支项之间的间隔太小，因此无法在图中看到。

11.6 自旋-轨道耦合

原子哈密顿量 (11.17) 不涉及电子自旋。实际上，自旋的存在为哈密顿量增加了额外的项，通常该项很小。该项被称为**自旋-轨道耦合** (spin-orbit interaction)，将原子谱项裂分为多个支项。自

旋-轨道耦合是一种相对论效应，可使用狄拉克对电子的相对论处理方法正确推导出。本节对自旋轨道耦合的来源进行了定性讨论。

如果我们想象自己骑在原子中的电子上，从我们的角度来看，原子核围绕着电子运动（就像太阳围绕着地球运动一样）。原子核的这种表观运动产生了一个磁场，与电子的固有（自旋）磁矩发生耦合，从而产生了哈密顿量中的自旋-轨道耦合项。磁矩 $\mathbf{m}$ 与磁场 $\mathbf{B}$ 的耦合能由 (6.131) 给出，即 $-\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}$ 。电子的自旋磁矩 $\mathbf{m}_S$ 正比于其自旋角动量 $\mathbf{S}$ 【式 (10.57)】，而由核的视运动产生的磁场与电子的轨道角动量 $\mathbf{L}$ 成正比。因此，自旋-轨道耦合与 $\mathbf{L} \cdot \mathbf{S}$ 成正比。 $\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{S}$ 的数量积取决于这两个矢量的相对方向。而电子总角动量 $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ 也与 $\mathbf{L}$ 和 $\mathbf{S}$ 的相对方向有关，那么自旋-轨道耦合的能量依赖于 J 。【式 (11.67)】

当对原子哈密顿量中的自旋-轨道耦合项 $\hat{H}_{S.O.}$ 进行适当的相对论推导时，会发现对于单电子原子（见 *Bethe and Jackiw*, Chapter 8 and 23）：

$$\hat{H}_{S.O.} = \frac{1}{2m_e^2 c^2} \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}} \quad (11.63)$$

其中 V 是原子中电子受到的势能， c 为光速。一种计算多电子原子 $\hat{H}_{S.O.}$ 的方式是首先忽略 $\hat{H}_{S.O.}$ 项，使用中心场近似来得到把其他电子视为电子云时在原子核产生的场中每个电子 i 的有效势能 $V_i(r_i)$ 【式 (11.7) 和 (11.8)】来进行 SCF 计算（第 11.1 节）。然后将 (11.63) 对电子求和，得到

$$\hat{H}_{S.O.} \approx \frac{1}{2m_e^2 c^2} \sum_i \frac{1}{r_i} \frac{dV_i(r_i)}{dr_i} \hat{\mathbf{L}}_i \cdot \hat{\mathbf{S}}_i = \sum_i \xi_i(r_i) \hat{\mathbf{L}}_i \cdot \hat{\mathbf{S}}_i \quad (11.64)$$

其中 $\xi_i(r_i)$ 的定义不言自明， $\hat{\mathbf{L}}_i$ 和 $\hat{\mathbf{S}}_i$ 分别为电子 i 的轨道和自旋角动量算符。

通过寻找算符 $\hat{H}_{(11.1)} + \hat{H}_{S.O.}$ 的本征函数和本征值，我们可以计算自旋-轨道耦合能 $E_{S.O.}$ ，其中 $\hat{H}_{(11.1)}$ 是 (11.1) 的原子哈密顿量，但这很困难。因此，我们通常使用微扰理论来估计 $E_{S.O.}$ 的值。除了重原子以外，与 $\hat{H}_{(11.1)}$ 的影响相比， $\hat{H}_{S.O.}$ 的影响较小，一级微扰理论足以估计 $E_{S.O.}$ 。

(9.22) 给出了 $E_{S.O.} \approx \langle \psi | \hat{H}_{S.O.} | \psi \rangle$ ，其中 ψ 是 $\hat{H}_{(11.1)}$ 的本征函数。对于单电子原子，有

$$E_{S.O.} \approx \langle \psi | \xi(r) \hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}} | \psi \rangle \quad (11.65)$$

因为无扰 ψ 是 $\hat{L}^2$ 、 $\hat{S}^2$ 和 $\hat{J}^2$ 的本征函数，所以我们有

$$\begin{aligned} \mathbf{J} \cdot \mathbf{J} &= (\mathbf{L} + \mathbf{S}) \cdot (\mathbf{L} + \mathbf{S}) = L^2 + S^2 + 2\mathbf{L} \cdot \mathbf{S} \\ \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} &= \frac{1}{2} (J^2 - L^2 - S^2) \\ (\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}}) \psi &= \frac{1}{2} (\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2) \psi = \frac{1}{2} [J(J+1) - L(L+1) - S(S+1)] \hbar^2 \psi \end{aligned}$$

因此，

$$E_{S.O.} \approx \frac{1}{2} \langle \xi \rangle \hbar^2 [J(J+1) - L(L+1) - S(S+1)] \quad (11.66)$$

对于多电子原子，可以证明，（*Bethe and Jackiw*, p. 164）自旋-轨道耦合能为

$$E_{S.O.} \approx \frac{1}{2} A \hbar^2 [J(J+1) - L(L+1) - S(S+1)] \quad (11.67)$$

其中 A 是给定谱项的常数；也就是说， A 取决于 L 和 S ，但不取决于 J 。方程 (11.67) 表明，当我们考虑自旋-轨道耦合时，原子态的能量取决于其电子总角动量 J 。因此，每个原子谱项被分为多个支项，每个支项都有不同的 J 值。例如，钠原子组态 $1s^2 2s^2 2p^6 3p$ 产生单谱项 2P ，由两个支项 $^2P_{3/2}$ 和 $^2P_{1/2}$ 组成。这些支项的分裂产生了钠 D 线的观测到的精细结构（fine structure）（图 11.5）。给定谱项的支项被认为构成其多重态结构（multiplet structure）。

给定谱项中支项的顺序是什么呢? 因为这些支项的 L 和 S 值相同, 所以根据式 (11.67), 它们的相对能量由 $AJ(J+1)$ 决定。如果 A 为正值, 则 J 值最低的支项能量最低, 该多重态被称为**常规** (regular) 多重态。如果 A 为负值, 则 J 值最高的支项能量最低, 该多重态被称为**反转** (inverted) 多重态。以下规则通常适用于只有一个部分填充的亚壳层的组态: 如果该亚壳层填充量小于一半, 则该多重态为常规多重态; 如果该亚壳层填充量大于一半, 则该多重态为反转多重态。(存在一些例外情况。) 对于半满的情况, 请参阅问题 11.28。




图 11.5: 钠 D 线的精细结构。

例题: 求氧原子的基态光谱支项。

基态电子组态为 $1s^2 2s^2 2p^4$ 。根据表 11.2, 该组态产生谱项 1S 、 1D 和 3P 。根据洪特规则, 3P 是能量最低的谱项。【或者, 可以使用类似 (11.48) 的图表来得出 3P 是最低谱项的结论。】 3P 谱项有 $L=1$ 和 $S=1$, 则 J 的可能值为 2, 1, 0。因此, 基态光谱支项为 3P_2 、 3P_1 和 3P_0 。2p 亚层超过了半满填充, 则预测多重态为反转多重态, 那么 3P_2 为最低的支项。此即为 O 的基态光谱支项。

练习: 求 Cl 原子的基态光谱支项。(答案: $^2P_{3/2}$ 。)

11.7 原子哈密顿算符

原子的哈密顿算符可以分为三部分:

$$\hat{H} = \hat{H}^0 + \hat{H}_{\text{rep}} + \hat{H}_{\text{S.O.}} \quad (11.68)$$

其中 $\hat{H}^0$ 是类氢哈密顿量之和:

$$\hat{H}^0 = \sum_{i=1}^n \left(-\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_i^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_i} \right) \quad (11.69)$$

$\hat{H}_{\text{rep}}$ 是电子间排斥势:

$$\hat{H}_{\text{rep}} = \sum_i \sum_{j>i} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} \quad (11.70)$$

以及 $\hat{H}_{\text{S.O.}}$ 是自旋-轨道耦合项 (11.64):

$$\hat{H}_{\text{S.O.}} = \sum_{i=1}^n \xi_i \hat{\mathbf{L}}_i \cdot \hat{\mathbf{S}}_i \quad (11.71)$$

如果我们只考虑 $\hat{H}^0$, 则所有对应于同一电子组态的原子态都是简并的。引入 $\hat{H}_{\text{rep}}$ 后, 组态之间的简并被打破。引入 $\hat{H}_{\text{rep}}$ 后, 我们消除不同 L 或 S 或两者均不同的状态之间的简并, 从而将每个组态分为多个谱项。随后, 再引入 $\hat{H}_{\text{S.O.}}$ 后, 谱项被分为多个支项。每个支项对应于一个原子能级。每个能级由 J 值相同的状态组成, 且是 $(2J+1)$ 重简并的, 对应于 M_J 的可能取值。

通过施加外磁场 (塞曼效应), 我们可以消除每个支项的简并性。若将施加的磁场设为 $\mathbf{B}$, 则我们在哈密顿量【式 (6.131)】中引入了额外的项:

$$\hat{H}_B = -\hat{\mathbf{m}} \cdot \mathbf{B} = -(\hat{\mathbf{m}}_L + \hat{\mathbf{m}}_S) \cdot \mathbf{B} \quad (11.72)$$

其中包含了轨道角动量和自旋角动量。使用 $\mathbf{m}_L = -(e/2m_e)\mathbf{L}$ 、 $\mathbf{m}_S = -(e/2m_e)\mathbf{S}$ 以及 $\mu_B \equiv e\hbar/2m_e$ 【式 (6.128)、(10.55) 中令 $g_e \approx 2$ 和 (6.130)】, 我们有

$$\hat{H}_B = \mu_B \hbar^{-1} (\hat{\mathbf{L}} + 2\hat{\mathbf{S}}) \cdot \mathbf{B} = \mu_B \hbar^{-1} (\hat{\mathbf{J}} + \hat{\mathbf{S}}) \cdot \mathbf{B} = \mu_B B \hbar^{-1} (\hat{J}_z + \hat{S}_z) \quad (11.73)$$

其中 μ_B 为玻尔磁子, 且 z 轴沿着磁场方向延伸。如果外部磁场强度较弱, 其影响将小于自旋-轨道耦合的影响, 因此可以使用一级微扰理论来计算磁场的影响。因为 $\hat{J}_z \psi = M_J \hbar \psi$, 所以与所施加磁场耦合的能量为

$$E_B = \langle \psi | \hat{H}_B | \psi \rangle = \mu_B B M_J + \mu_B B \hbar^{-1} \langle S_z \rangle$$

计算 $\langle S_z \rangle$ (Bethe and Jackiw, p. 169) 得到弱场的最终结果:

$$E_B = \mu_B g B M_J \quad (11.74)$$

其中的 g (朗德 g 因子, the Landé g factor) 由下式给出:

$$g = 1 + \frac{[J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)]}{2J(J+1)} \quad (11.75)$$

因此, 外加的磁场将每个光谱支项裂分为 $2J+1$ 个状态, 每个状态都有不同的 M_J 值。

图 11.6 以氦的 $1s2p$ 组态为例, 展示了原子中连续耦合的情况。

我们基于以下方案展开讨论: 首先将各电子的轨道角动量相加形成总轨道角动量矢量, 随后对自旋进行同样的操作: $\mathbf{L} = \sum_i \mathbf{L}_i$, $\mathbf{S} = \sum_i \mathbf{S}_i$ 。然后将这两个矢量组合来得到 $\mathbf{J}$ 。该过程称为**拉塞尔-桑德斯耦合** (Russell-Saunders coupling) 或 **LS 耦合** (LS coupling), 当自旋-轨道耦合能与电子间排斥能相比很小时是合适的。算符 $\hat{\mathbf{L}}$ 和 $\hat{\mathbf{S}}$ 与原子哈密顿算符 $\hat{H}^0 + \hat{H}_{\text{rep}}$ 对易, 但当我们在哈密顿中引入 $\hat{H}_{\text{S.O.}}$ 时, $\hat{\mathbf{L}}$ 和 $\hat{\mathbf{S}}$ 不再与 $\hat{H}$ 对易。($\hat{\mathbf{J}}$ 与哈密顿 $\hat{H}^0 + \hat{H}_{\text{rep}} + \hat{H}_{\text{S.O.}}$ 可对易。) 若自旋-轨道耦合项很小, 那么 $\hat{\mathbf{L}}$ 和 $\hat{\mathbf{S}}$ “几乎”与 $\hat{H}$ 可对易, 则 $L-S$ 耦合成立。

随着原子序数的增加, 电子的平均速度 v 也增加。随着 v/c 的增大, 相对论效应 (如自旋-轨道耦合) 增强。对于原子序数非常高的原子, 自旋-轨道耦合超过了电子间排斥势, 我们不能再认为 $\hat{\mathbf{L}}$ 和 $\hat{\mathbf{S}}$ 与 $\hat{H}$ 可对易; 然而, 算符 $\hat{\mathbf{J}}$ 仍与 $\hat{H}$ 可对易。在这种情况下, 我们先引入 $\hat{H}_{\text{S.O.}}$, 然后再引入 $\hat{H}_{\text{rep}}$ 。这对应于首先将每个电子的自旋角动量和轨道角动量相结合, 从而得到每个电子的总角动量 $\mathbf{j}_i = \mathbf{L}_i + \mathbf{S}_i$, 然后将所有电子的总角动量相加得到 $\mathbf{J} = \sum_i \mathbf{j}_i$ 。该过程称为 **$j-j$ 耦合** ($j-j$ coupling)。对于大多数重原子而言, 其情况介于 $j-j$ 耦合与 $L-S$ 耦合之间, 且计算难度较大。

原子哈密顿量中还应包括其他一些效应。原子核的有限尺寸和核运动会略微改变能量 (Bethe and Salpeter, pp. 102, 166, 351)。由于电子自旋磁矩之间的耦合 (自旋-自旋耦合, spin-spin coupling),




图 11.6: 在 $1s2p$ 氦原子组态的原子哈密顿量中加入连续谱项的影响。 $\hat{H}_B$ 不是原子哈密顿量的一部分，而是由施加磁场而产生的。

存在一个微小的相对论项。我们还应考虑电子质量随速度变化的相对论效应。重原子内层电子的这一效应尤为显著，因为其平均电子速度与光速相比已不再可忽略。

如果原子核的自旋不为零，则核自旋磁矩与电子自旋和轨道磁矩发生耦合，从而产生原子超精细结构, *hyperfine structure*。核自旋角动量 $\mathbf{I}$ 与电子总角动量 $\mathbf{J}$ 矢量相加，得到原子的总角动量 $\mathbf{F}$: $\mathbf{F} = \mathbf{I} + \mathbf{J}$ 。例如，考虑氢原子基态。质子的自旋为 $\frac{1}{2}$ ，则 $I = \frac{1}{2}$ ，同样 $J = \frac{1}{2}$ 。那么量子数 F 可以为 0 或 1，对应于质子和电子自旋相同或相反。跃迁 $F = 1 \rightarrow 0$ 发射一条频率为 1420 MHz 的谱线，即氢原子在太空中发出的 21 cm 波长线。Ewen 和 Purcell 将一个喇叭形天线伸出哈佛大学物理实验室的窗外，并检测到了这条谱线。氢原子基态的超精细分裂频率是目前测量精度最高的物理常数之一： $1420.405751768 \pm 0.000000002$ MHz。【S. G. Karshenboim, *Can. J. Phys.*, **78**, 639 (2000); arxiv.org/abs/physics/0008051】。

11.8 康顿-斯莱特规则

在哈特里-福克近似中，原子的波函数（或分子的波函数）是一个斯莱特行列式，或者几个斯莱特行列式的线性组合【例如，式 (10.44)】。(11.17) 类似的组态相互作用波函数是许多斯莱特行列式的线性组合。为了使用哈特里-福克近似或组态相互作用波函数来计算原子或分子的能量以及其他性质，我们必须得以计算形式为 $\langle D' | \hat{B} | D \rangle$ 的积分，其中 D 和 D' 是正交归一的自旋轨道斯莱特行列式，而 $\hat{B}$ 是一个算符。

每个自旋轨道 u_i 都是空间轨道 θ_i 和自旋函数 σ_i 的乘积，其中的 σ_i 是 α 或 β 。我们有 $u_i = \theta_i \sigma_i$ 和 $\langle u_i(1) | u_j(1) \rangle = \delta_{ij}$ 其中 $\langle u_i(1) | u_j(1) \rangle$ 涉及对电子 1 的自旋坐标求和以及对其空间坐标的积分。若 u_i 和 u_j 的自旋函数不同，那么 (10.12) 保证了 u_i 和 u_j 的正交性。若 u_i 和 u_j 的自旋函数相同，则它们的正交性源于空间轨道 θ_i 和 θ_j 的正交性。

对于 n 电子系统, D 为

$$D = \frac{1}{\sqrt{n!}} \begin{vmatrix} u_1(1) & u_2(1) & \cdots & u_n(1) \\ u_1(2) & u_2(2) & \cdots & u_n(2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_1(n) & u_2(n) & \cdots & u_n(n) \end{vmatrix} \quad (11.76)$$

一个 $n = 3$ 的例子是方程 (10.40), D' 与 D 形式一致, 但 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 替换为 $u'_1, u'_2, \dots, u'_n$ 。

我们假设 D 和 D' 的列是这样排列的, 使得它们的左列尽可能多的相互匹配。例如, 假设我们在处理斯莱特行列式 $|1s\bar{1}s2s3p_0|$ 和 $|1s\bar{1}s3p_04s|$, 我们将第一个行列式的第三和第四列进行交换 (乘以 -1), 使得 $D = |1s\bar{1}s3p_02s|$ 和 $D' = |1s\bar{1}s3p_04s|$ 。

算符 $\hat{B}$ 通常具有如下形式:

$$\hat{B} = \sum_{i=1}^n \hat{f}_i + \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j>i} \hat{g}_{ij} \quad (11.77)$$

其中单电子算符 $\hat{f}_i$ 只涉及电子 i 的坐标和动量算符, 而双电子算符 $\hat{g}_{ij}$ 涉及电子 i 和 j 。例如, 若 $\hat{B}$ 是原子哈密顿算符 (11.1), 则 $\hat{f}_i = -(\hbar^2/2m_e)\nabla_i^2 - Ze^2/4\pi\epsilon_0 r_i$, $\hat{g}_{ij} = Ze^2/4\pi\epsilon_0$ 。

康顿和斯莱特证明了: n 电子积分 $\langle D' | \hat{B} | D \rangle$ 可以化简为特定的单电子和双电子积分之和。这些康顿-斯莱特公式的推导采用了问题 8.22 中的行列式表达式, 并结合了自旋轨道函数的正交归一性。(参见 Parr, pp. 23-27 for the derivation.) 表 11.3 给出了康顿-斯莱特公式。

在表 11.3 中, $\hat{g}_{12}$ 的每个矩阵元涉及对电子 1 和电子 2 的自旋坐标进行求和, 并对电子 1 和电子 2 的空间坐标的整个范围进行积分。而 $\hat{f}_i$ 的每个矩阵元涉及对电子 1 的自旋坐标进行求和, 并对电子 i 的空间坐标的整个范围进行积分。在求和与定积分中出现的变量均为虚拟变量。

D 与 D' 的差异	$\left\langle D' \left \sum_{i=1}^n \hat{f}_i \right D \right\rangle$	$\left\langle D' \left \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j>i} \hat{g}_{ij} \right D \right\rangle$
无自旋轨道	$\sum_{i=1}^n \langle u_i(1) \hat{f}_1 u_i(1) \rangle$	$\sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j>1} [\langle u_i(1)u_j(2) \hat{g}_{12} u_i(1)u_j(2) \rangle - \langle u_i(1)u_j(2) \hat{g}_{12} u_j(1)u_i(2) \rangle]$
单自旋轨道 $u'_n \neq u_n$	$\langle u'_n(1) \hat{f}_1 u_n(1) \rangle$	$\sum_{j=1}^{n-1} [\langle u'_n(1)u_j(2) \hat{g}_{12} u_n(1)u_j(2) \rangle - \langle u_n(1)u_j(2) \hat{g}_{12} u_j(1)u_n(2) \rangle]$
双自旋轨道 $u'_n \neq u_n, u'_{n-1} \neq u_{n-1}$	0	$\langle u'_n(1)u_{n-1}(2) \hat{g}_{12} u_n(1)u_{n-1}(2) \rangle - \langle u'_n(1)u'_{n-1}(2) \hat{g}_{12} u_{n-1}(1)u_n(2) \rangle$
三个或更多自旋轨道	0	0

表 11.3: 康顿-斯莱特规则

若算符 $\hat{f}_i$ 和 $\hat{g}_{ij}$ 不涉及自旋坐标, 那么 (11.3) 中的表达式可以进一步简化。我们有 $u_i = \theta_i \sigma_i$, 以及

$$\begin{aligned} \langle u_i(1) | \hat{f}_1 | u_i(1) \rangle &= \int \theta_i^*(1) \hat{f}_1 \theta_i(1) dv_1 \sum_{m_{s1}} \sigma_i^*(1) \sigma_i(1) \\ &= \int \theta_i^*(1) \hat{f}_1 \theta_i(1) dv_1 = \langle \theta_i(1) | \hat{f} | \theta_i(1) \rangle \end{aligned}$$

因为 σ_i 已归一化。使用该结果以及 σ_i 和 σ_j 的正交性, 对于 $D = D'$ 的情况, 我们有 (问题 11.37)

$$\left\langle D \left| \sum_{i=1}^n \hat{f}_i \right| D \right\rangle = \sum_{i=1}^n \langle \theta_i(1) | \hat{f} | \theta_i(1) \rangle \quad (11.78)$$

$$\begin{aligned} \left\langle D \left| \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j>i} \hat{g}_{ij} \right| D \right\rangle = \\ \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j>i} \left[\langle \theta_i(1) \theta_j(2) | \hat{g}_{12} | \theta_i(1) \theta_j(2) \rangle - \delta_{m_{s,i} m_{s,j}} \langle \theta_i(1) \theta_j(2) | \hat{g}_{12} | \theta_j(1) \theta_i(2) \rangle \right] \end{aligned} \quad (11.79)$$

其中, 根据 $m_{s,i} \neq m_{s,j}$ 或 $m_{s,i} = m_{s,j}$ 的情况, $\delta_{m_{s,i} m_{s,j}}$ 的值取为 0 或 1。对于其他积分, 类似的方程也成立。

现在, 我们应用这些方程来计算 $\langle D | \hat{H} | D \rangle$, 其中 $\hat{H}$ 是忽略了自旋-轨道耦合的 n 电子原子哈密顿算符, D 为 n 个自旋轨道的斯莱特行列式。我们有 $\hat{H} = \sum_i \hat{f}_i + \sum_i \sum_{j>i} \hat{g}_{ij}$, 其中 $\hat{f}_i = -(\hbar^2/2m_e) \nabla_i^2 - Ze^2/4\pi\epsilon_0 r_i$, $\hat{g}_{ij} = Ze^2/4\pi\epsilon_0 r_{ij}$ 。引入库仑积分 (9.99) 和交换积分 (9.100), 再使用 (11.78) 和 (11.79), 我们得到

$$\langle D | \hat{H} | D \rangle = \sum_{i=1}^n \langle \theta_i(1) | \hat{f} | \theta_i(1) \rangle + \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j>i} (J_{ij} - \delta_{m_{s,i} m_{s,j}} K_{ij}) \quad (11.80)$$

$$J_{ij} = \langle \theta_i(1) \theta_j(2) | e^2/4\pi\epsilon_0 r_{12} | \theta_i(1) \theta_j(2) \rangle, \quad K_{ij} = \langle \theta_i(1) \theta_j(2) | e^2/4\pi\epsilon_0 r_{12} | \theta_j(1) \theta_i(2) \rangle \quad (11.81)$$

$$\hat{f}_1 = -(\hbar^2/2m_e) \nabla_1^2 - Ze^2/4\pi\epsilon_0 r_1 \quad (11.82)$$

式 (11.80) 中的 Kronecker δ 项源于单电子自旋函数的正交归一性。

例如, 考虑 Li。对基态 ψ 的 SCF 近似为斯莱特行列式 $D = |1s\bar{1}s2s|$ 。自旋轨道为 $u_1 = 1s\alpha$ 、 $u_2 = 1s\beta$ 和 $u_3 = 2s\alpha$ 。空间轨道为 $\theta_1 = 1s$ 、 $\theta_2 = 1s$ 和 $\theta_3 = 2s$ 。我们有 $J_{12} = J_{1s1s}$ 、 $J_{13} = J_{2s} = J_{2s2s}$ 。因为 $m_{s1} \neq m_{s2}$ 以及 $m_{s2} \neq m_{s3}$, 所以能量表达式中唯一不为零的交换积分项为 $K_{13} = K_{1s2s}$ 。我们只得到自旋轨道之间具有相同自旋的交换积分。方程 (11.80) 给出了 SCF 能量为

$$E = \langle D | \hat{H} | D \rangle = 2 \langle 1s(1) | \hat{f}_1 | 1s(1) \rangle + \langle 2s(1) | \hat{f}_1 | 2s(1) \rangle + J_{1s1s} + 2J_{1s2s} - K_{1s2s}$$

包含 $\hat{f}_1$ 的项为类氢能量, 它们的和等于式 (10.49) 中的 $E^{(0)}$ 。剩下的项等于 (10.51) 中的 $E^{(1)}$ 。如第 9.4 节开头所述, $E^{(0)} + E^{(1)}$ 的值等于变分积分 $\langle D | \hat{H} | D \rangle$, 则康顿-斯莱特规则得到了验证。

对于只包含闭壳层的原子 (例如, Be 的 $1s^2 2s^2$ 基态组态), n 个电子处于 $n/2$ 个不同的空间轨道中, 则 $\theta_1 = \theta_2$ 、 $\theta_3 = \theta_4$, 以此类推。令 $\phi_1 \equiv \theta_1 = \theta_2$, $\phi_2 \equiv \theta_3 = \theta_4$, ..., $\phi_{n/2} \equiv \theta_{n-1} = \theta_n$ 。若我们使用 ϕ 而不是 θ 来重写 (11.80), 可以得到 (问题 11.38) 由闭壳层组态产生谱项 1S 的 SCF 能量值为

$$E = \langle D | \hat{H} | D \rangle = 2 \sum_{i=1}^{n/2} \langle \phi_i(1) | \hat{f}_1 | \phi_i(1) \rangle + \sum_{j=1}^{n/2} \sum_{i=1}^{n/2} (2J_{ij} - K_{ij}) \quad (11.83)$$

其中 $\hat{f}_1$ 由 (11.82) 给出, J_{ij} 和 K_{ij} 具有与 (11.81) 中类似的形式, 但 θ_i 和 θ_j 替换为 ϕ_i 和 ϕ_j 。式 (11.83) 中的每一项都遍历了所有 $n/2$ 个不同的空间轨道。

例如, 考虑电子组态 $1s^2 2s^2$, 我们有 $n = 4$, 两个不同的空间轨道为 $1s$ 和 $2s$ 。(11.83) 中的双重求和等于 $2J_{1s1s} - K_{1s1s} + 2J_{1s2s} - K_{1s2s} + 2J_{2s2s} - K_{2s2s}$ 。因为 $K_{1s1s} = J_{1s1s}$ 和 $K_{2s2s} = J_{2s2s}$ 。根据 (11.81) 的定义, 可知 $J_{ii} = K_{ii}$ 。(11.81) 中的第一和第二个变量都是虚拟变量, 将其交换不影响积分的值。在 J_{ij} 中交换 1 和 2, 得到了 J_{ji} ; 因此 $J_{ij} = J_{ji}$ 。同样, $K_{ij} = K_{ji}$ 。则

$$J_{ii} = K_{ii}, \quad J_{ij} = J_{ji}, \quad K_{ij} = K_{ji} \quad (11.84)$$

使用 (11.84) 可以得出 $1s^2 2s^2$ 组态库仑积分和交换积分的表达式为 $J_{1s1s} + J_{2s2s} + 4J_{1s2s} - 2K_{1s2s}$ 。在 $1s$ 轨道的两个电子之间只有一种库仑相互作用，得到 J_{1s1s} 项。每个 $1s$ 电子都和两个 $2s$ 电子之间产生相互作用，因此得到四个 $1s - 2s$ 相互作用。如前所述，交换积分仅出现在具有相同自旋的自旋轨道之间。因此，交换积分只出现在 $1s\alpha$ 和 $2s\alpha$ 之间以及 $1s\beta$ 和 $2s\beta$ 之间，得到 $-2K_{1s2s}$ 项。

交换积分的值通常远小于库仑积分【例如，参见式 (9.111)】。

总结

习题

Chapter 12

分子对称性

12.1 对称元素和对称操作

分子波函数和性质的定性信息通常可通过分子的对称性获得。所谓分子的对称性，指的是由处于平衡位置的核所形成的框架的对称性。(分子量子力学的起点是玻恩-奥本海默近似，该近似在求解电子波函数时将核视为固定；参见第13.1节。)分子的对称性在不同电子态下可能不同。例如，HCN分子在基态下为线性，但在某些激发态下为非线性。除非另有说明，我们将考虑基态的对称性。


对称元素和对称操作

对称操作 (symmetry operation) 是对物体进行的变换，使得最终位置与初始位置在物理上无法区分，且物体中所有点对之间的距离保持不变。例如，考虑三角平面分子 BF_3 (图12.1a)，为了方便起见，我们对氟原子核进行了编号。如果我们以通过硼原子核且垂直于分子平面的轴为旋转轴，将分子逆时针旋转 120° ，则新位置如图12.1b所示。由于实际上氟原子核在物理上无法区分，我们已完成了一次对称变换。我们旋转分子的轴是一个对称元素的例子。对称元素和对称操作是相关但不同的概念，常常被混淆。**对称元素** (symmetry element) 是进行对称操作的几何实体 (点、线或面)。

若将某物体绕某轴旋转 $360/n$ 度 (其中 n 是整数)，得到与原始位置在物理上无法区分的构型，我们说该物体具有 n **重对称轴** (n -fold axis of symmetry) (也称为 n 重主轴或 n 重旋转轴)；其中 n 称为该轴的阶 (order)。例如，分子 BF_3 在有一根三重对称轴垂直于分子所在平面。一般将 n 重旋转轴记作 C_n 。那么 BF_3 中的三重对称轴可记作 C_3 轴。为了表示逆时针旋转 $(360/n)^\circ$ 的操作，我们使用 $\hat{C}_n$ 来表示。“帽子”用于区分对称操作与对称元素。 BF_3 有多于三根旋转轴，每根B-F键的轴都是两重对称轴 (图12.2)。

第二种对称元素是**对称平面** (plane of symmetry)。如果所有原子核通过该平面反映后，其构型与原始构型在物理上无法区分，则该分子具有对称平面。对称平面的符号为 σ (小写希腊字母 sigma)。(Spiegel 是德语中“镜子”的意思。)反映对称操作记为 $\hat{\sigma}$ 。 BF_3 有四个反映面。分子所在平面是一个反映面，因为位于反映面的原子核在进行反映时不会移动。通过B和 F_1 核且与分子所在平面垂直的平面也是一个反映面，因为通过该平面反映仅交换了 F_2 和 F_3 。可能有人认为该反映操作与绕通过B和 F_1 的 C_2 轴旋转 180° (也交换了 F_2 和 F_3) 相同。但事实并非如此。反映将位于分子平面上方的点映射到同样位于分子平面上方的点，而 C_2 旋转则将位于分子平面上方的点映射到位于分子平面下方的点。两个对称操作只有在它们表示三维空间的同一变换时才相等。 BF_3 中剩下的两个反映面为通过B- F_2 和B- F_3 核且与分子所在平面垂直的两个平面。

第三种对称元素是**对称中心** (center of symmetry)，用 i 表示 (与 $\sqrt{-1}$ 没有关系)。如果通过



(a) BF_3 分子。(b) 通过硼原子垂直于分子所在平面的旋转轴旋转 120° 后的分子。




图 12.2: BF_3 分子中的一根 C_2 轴。

对称中心反演所有原子核的操作得出的构型与原始构型无法区分，则该分子具有对称中心。如果建立一个笛卡尔坐标系，则通过原点（用 $\hat{i}$ 表示）进行反演操作将原本位于 (x, y, z) 的原子核转移到 $(-x, -y, -z)$ 。 BF_3 有对称中心吗？以硼原子核为原点，反演过程得到如图 12.3 所示的结果。由于我们得到了与原始构型在物理上截然不同的构型，因此 BF_3 没有对称中心。 SF_6 通过硫原子核的反演过程如图 12.4 所示，可以清楚地看到 SF_6 具有对称中心。（如 $\hat{i}$ 或 $\hat{C}_n$ 的操作可能是也可能不是对称操作。因此， $\hat{i}$ 是 SF_6 中的一个对称操作而不是 BF_3 中的。）







图 12.3: BF_3 的对称中心反演过程。

第四和第五种对称元素为 n 重旋转-反映对称轴 (n -fold rotation-reflection axis) (也称为反常轴或象转轴)，记为 S_n 。若对具有 S_n 轴的物体进行 $(360/n)$ 度的旋转，再通过该轴的垂直平面进行反射，则得到的构型与原始构型在物理上无法区分。显然，若某物体有 C_n 轴，也有与该轴垂直的反映面，那么该 C_n 轴也是一根 S_n 轴。因此， BF_3 中的 C_3 轴也是一根 S_3 轴。但 S_n 轴不一定是 C_n 轴。例如分子 CH_4 。在图 12.5 中，我们首先进行了一次 90° 的正确旋转 ($\hat{C}_4$)，围绕我们所认为的 S_4 轴。如图所示，得到的构型与原构型并不等价。当我们按照 $\hat{C}_4$ 操作，在垂直于轴且通过碳原子的平面上进行反演时，我们确实得到了与旋转和反射之前存在的构型无法区分的构型。因此， CH_4

图 12.4: SF_6 的对称中心反演过程。

有一根 S_4 轴。 S_4 轴不是 C_4 轴，虽然它是一根 C_2 轴。甲烷分子中还有两个 S_4 轴，每条轴都垂直于四面体分子所内切的立方体的两条对边。

图 12.5: CH_4 中的 S_4 轴。图 12.6: $\hat{S}_n$ 操作。

绕轴逆时针旋转 $(360/n)^\circ$ ，再对垂直于此旋转轴的平面反映的操作记为 $\hat{S}_n$ 。 $\hat{S}_1$ 操作为绕该轴旋转 360° 后对垂直于该轴的平面进行反映。由于旋转 360° 回到了原来的位置，所以 $\hat{S}_1$ 操作等价于对平面反映： $\hat{S}_1 = \hat{\sigma}$ 。一个反映面有一根与其垂直的 S_1 轴。

现在来考虑 $\hat{S}_2$ 操作。令 S_2 轴为 z 轴（图12.6）。绕 S_2 轴旋转 180° 使某点坐标 x 和 y 分别变为 $-x$ 和 $-y$ ，但 z 坐标保持不变。再以 xOy 平面作反映，将坐标 z 变为 $-z$ 。 $\hat{S}_2$ 操作的净结果为将坐标为 (x, y, z) 的点变为 $(-x, -y, -z)$ ，相当于以原点为中心进行反演： $\hat{S}_2 = \hat{i}$ 。任何通过对称中心的轴都是一根 S_2 轴。平面反映和反演是 $\hat{S}_n$ 操作的特例。

$\hat{S}$ 操作似乎是一种任意的操作，但必须将其作为对称操作的一种类型包括在内。例如，图 12.5 中 CH_4 从第一构型到第三构型的转换显然符合对称操作的定义，但它既不是正确的旋转，也不是反映或反演。

对分子进行对称操作后，其核构型在物理上与原始构型无法区分。因此，对称操作前后，质心在空间中的位置必须相同。对于操作 $\hat{C}_n$ ，唯一不动的点是位于 C 轴上的点。因此， C_n 对称轴必须通过分子的质心。同样，对称中心必须与质心重合；对称平面和 S_n 对称轴必须通过质心。质心是所有分子对称元素的共同交点。

在讨论分子的对称性时，我们通常将其置于笛卡尔坐标系中，并将分子的质心置于原点。最高阶的旋转轴被设定为 z 轴。包含该轴的对称平面被标记为 σ_v （表示垂直，*vertical*）；与该轴垂直的对称平面被标记为 σ_h （表示水平，*horizontal*）。

对称操作的乘积

对称操作是转换三维空间的算符，与任何算符一样，我们将两个此类算符的乘积（product）定义为连续应用这些算符，乘积右侧的算符先应用。显然，分子中任何两个对称操作的乘积必须是对称操作。

例如，考虑分子 BF_3 。 $\hat{C}_3$ 操作与其自身的乘积 $\hat{C}_3\hat{C}_3 = \hat{C}_3^2$ 将分子逆时针旋转 240° 。若我们取 $\hat{C}_3\hat{C}_3\hat{C}_3 = \hat{C}_3^3$ ，则分子将逆时针旋转 360° ，回到原始位置。我们定义恒等操作（identity operation）为不对物体作任何变换的操作，记为 $\hat{E}$ 。（该符号来自德语词 *Einheit*，意为单位。）

现在再来考虑一个具有六重对称轴的分子，例如 C_6H_6 。 $\hat{C}_6$ 操作将分子逆时针旋转 60° 。 $\hat{C}_6^2$ 将分子逆时针旋转 120° ，因此 $\hat{C}_6^2 = \hat{C}_3$ 。同样地， $\hat{C}_6^3 = \hat{C}_2$ 。因此，一根 C_6 对称轴也同时是一根 C_3 和 C_2 对称轴。

对称算符总是可对易的吗？考虑 SF_6 。我们检查绕 z 轴旋转的 $\hat{C}_4$ 操作和绕 x 轴旋转 $\hat{C}_2$ 操作的乘积。图 12.7 表明 $\hat{C}_4(z)\hat{C}_2(x) \neq \hat{C}_2(x)\hat{C}_4(z)$ 。对称操作并不总是可对易的。请注意，我们描述的是相对于固定坐标系的对称操作，该坐标系在执行对称操作时不会随分子一起移动。因此，当我们进行 $\hat{C}_4(z)$ 操作时， $\hat{C}_2(x)$ 操作的轴并未随分子一起旋转。




图 12.7: SF_6 中两个对称操作的乘积。前三步： $\hat{C}_2(x)\hat{C}_4(z)$ ；后三步： $\hat{C}_4(z)\hat{C}_2(x)$ 。

对称性与偶极矩

作为对称性的应用，我们考虑分子偶极矩。由于对称操作会产生与原始构型在物理上无法区分的构型，因此对称操作后偶极矩矢量的方向必须保持不变。（这是一个不严谨、不复杂的论点。）因此，若我们有一根 C_n 对称轴，则偶极矩矢量必须与该轴重合。如果分子具有两根或更多不重合的对称轴，则该分子不能具有偶极矩，因为偶极矩不能位于两根不同的轴上。具有四根非重合对称轴

的 CH_4 分子就没有偶极矩。若存在反映面,则偶极矩矢量必须位于该反映面上。若有多个反映面,则偶极矩必须位于所有反映面的交线上。在分子 H_2O 中,偶极矩矢量位于 C_2 轴上,该轴也是两个反映面的交线(图12.8)。具有对称中心的分子不能有偶极矩,因为反演操作反转了偶极矩的方向。(该表述有一种例外,见问题14.4。)因此,我们可以使用对称性来判断某分子是否具有偶极矩。在许多情况下,对称性还告诉我们偶极矩沿着哪条直线分布。




图 12.8: H_2O 中的对称元素。

对称性与旋光性

某些分子会使通过它们的平面偏振光的偏振平面发生旋转。实验证据和量子力学处理(Kauzmann, pp. 703-713)表明,两个互为镜像的分子的旋光能力大小相等,符号相反。因此,如果一个分子是其自身的镜像,则它没有旋光性: $\alpha = -\alpha$, $2\alpha = 0$, $\alpha = 0$, 其中 α 为旋光率。如果一个分子不能与它的镜像重合,它可能具有旋光性。如果镜像分子的构象与原分子可以仅通过围绕一根旋转能垒较低的键进行旋转互换,那么该分子将不具有旋光性。

对称性与旋光性之间的关系是什么呢? 考虑 $\hat{S}_n$ 操作。它包含了旋转($\hat{C}_n$)和反映($\hat{\sigma}$)操作。 $\hat{S}_n$ 操作中的反映部分将分子转换为其镜像,若 $\hat{S}_n$ 是该分子的对称操作,则 $\hat{C}_n$ 操作将使分子与其镜像相重合:

$$\text{分子} \xrightarrow{\hat{C}_n} \text{镜像分子} \xrightarrow{\hat{\sigma}} \text{旋转镜像分子}$$

因此,具有 S_n 对称轴的分子不能具有旋光性。若分子没有 S_n 对称轴,则它可能具有旋光性。

因为 $\hat{S}_1 = \hat{\sigma}$ 以及 $\hat{S}_2 = \hat{i}$,所以具有对称中心或反映面的分子不能具有旋光性。然而,具有任意阶的 S_n 轴的分子都不会有旋光性。

一个分子可以具有对称元素,同时仍具有旋光性。如果存在 C_n 轴而没有 S_n 轴,该分子可以具有旋光性。

对称操作与量子力学

分子的对称操作与量子力学之间有什么关系? 为了对量子力学系统的状态进行分类,我们考虑与哈密顿算符以及彼此可对易的算符。例如,我们使用与算符 $\hat{L}^2$ 、 $\hat{S}^2$ 、 $\hat{J}^2$ 、 $\hat{M}_J$ 相对应的量子数 L 、 S 、 J 和 M_J 对多电子原子的状态进行了分类,所有这些算符都互相可对易,也可与哈密顿算符对易(忽略自旋-轨道耦合)。本章讨论的对称操作作用于三维空间中的点,将每个点转换为相应的点。我们讨论过的所有量子力学算符都作用于函数,将每个函数转换为相应的函数。与对称操作 $\hat{R}$

相对应，我们定义一个算符 $\hat{O}_R$ 以如下方式作用于函数。令 $\hat{R}$ 将某点从原来的位置 (x, y, z) 变换到 (x', y', z') ：

$$\hat{R}(x, y, z) \rightarrow (x', y', z') \quad (12.1)$$

算符 $\hat{O}_R$ 定义为函数 $\hat{O}_R f$ 在点 (x', y', z') 的值与函数 f 在点 (x, y, z) 的值相等：

$$\hat{O}_R f(x', y', z') = f(x, y, z) \quad (12.2)$$

例如，设 $\hat{R}$ 为绕 z 轴旋转 90° ： $\hat{R} = \hat{C}_4(z)$ ；设 f 为氢 $2p_x$ 轨道： $f = 2p_x = Nxe^{-k(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}$ 。 $2p_x$ 轨道形状由绕 x 轴旋转的两个扭曲的椭球体组成（第6.7节）。令这些椭球体的以点 $(a, 0, 0)$ 和 $(-a, 0, 0)$ 为“中心”，其中在右椭球中有 $a > 0$ 和 $2p_x > 0$ 。算符 $\hat{C}_4(z)$ 具有如下效果（图12.9）：

$$\hat{C}_4(z)(x, y, z) \rightarrow (-y, x, z) \quad (12.3)$$

例如，原本位于 $(a, 0, 0)$ 的点在 $\hat{C}_4(z)$ 操作后变为 $(0, a, 0)$ ，而 $(-a, 0, 0)$ 变为 $(0, -a, 0)$ 。根据 (12.2)，函数 $\hat{O}_{C_4(z)} 2p_x$ 的轮廓必须分别以 $(0, a, 0)$ 和 $(0, -a, 0)$ 为中心。因此，有（图12.10）：

$$\hat{O}_{C_4(z)} 2p_x = 2p_y \quad (12.4)$$




图 12.9: $\hat{C}_4(z)$ 旋转的作用是将点 (x, y, z) 变为 $(-y, x, z)$ 。使用三角函数可以看出 $x' = -y$, $y' = x$ 。




图 12.10: $\hat{C}_4(z)$ 作用于 p_x 轨道的效果。

对于反演操作，我们有

$$\hat{i}(x, y, z) \rightarrow (-x, -y, -z) \quad (12.5)$$

根据 (12.2)，有

$$\hat{O}_i f(-x, -y, -z) = f(x, y, z)$$

我们现在重新命名变量: $\bar{x} = -x$, $\bar{y} = -y$, $\bar{z} = -z$ 。因此,

$$\hat{O}_i f(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = f(-\bar{x}, -\bar{y}, -\bar{z})$$

点 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ 是空间中的任意一点, 因此我们可以去掉字母上的横杆, 得到

$$\hat{O}_i f(x, y, z) = f(-x, -y, -z)$$

因此, $\hat{O}_i$ 为宇称算符 (第7.5节): $\hat{O}_i = \hat{\Pi}$ 。

n 粒子系统的波函数是 $4n$ 个变量的函数, 我们展开 $\hat{O}_R$ 的定义 (12.2), 得到

$$\hat{O}_R f(x'_1, y'_1, z'_1, m_{s1}, \dots, x'_n, y'_n, z'_n, m_{sn}) = f(x_1, y_1, z_1, m_{s1}, \dots, x_n, y_n, z_n, m_{sn})$$

注意 $\hat{O}_R$ 并不影响自旋坐标。因此, 在第11.5节中讨论原子态的宇称时, 我们考察了斯莱特行列式展开式中各项的空间因子, 而未考虑自旋因子, 因为这些因子不受 $\hat{\Pi}$ 的影响。

若某系统由对称操作 $\hat{R}_1, \hat{R}_2, \dots$ 指定, 则相对应的算符 $\hat{O}_{R_1}, \hat{O}_{R_2}, \dots$ 都与哈密顿算符可对易。(证明见 *Schonland*, Section 7.1-7.3.) 例如, 如果分子的核框架具有对称中心, 则宇称算符 $\hat{\Pi}$ 与电子运动的哈密顿算符可对易。根据 $\hat{\Pi}$ 的本征值, 我们可以选择电子态 (波函数) 为奇函数或偶函数。当然, 并非所有的对称操作都能对易 (图12.7)。因此, 波函数通常不能被选作所有对称算符 $\hat{O}_R$ 的本征函数。(对称算符和分子波函数之间关系的进一步讨论见第15.2节。)

对称性与运动常数之间有着密切的联系 (这些常数是与哈密顿算符 $\hat{H}$ 可对易的属性)。对于哈密顿算符在任何空间坐标平移下都恒定 (即不变) 的系统, 线动量算符 $\hat{p}$ 将与 $\hat{H}$ 可对易, 并且 p 在定态下可以被赋予一个确定的值。自由粒子就是一个例子。对于在任何坐标旋转下 $\hat{H}$ 不变的系统, 角动量分量的算符与 $\hat{H}$ 可对易, 总角动量及其一个分量可以指定。一个例子是原子。线性分子具有轴对称性, 而不是原子的球对称性; 在这里, 只能指定角动量的轴向分量 (第13章)。

矩阵与对称操作

对称操作 $\hat{R}$ 将原来处于 x, y, z 的点移动到新的位置 x', y', z' , 其中每个 x', y', z' 都是 x, y, z 的线性组合 (证明见 *Schonland*, pp. 52-53.):

$$\begin{aligned} x' &= r_{11}x + r_{12}y + r_{13}z \\ y' &= r_{21}x + r_{22}y + r_{23}z \\ z' &= r_{31}x + r_{32}y + r_{33}z \end{aligned} \quad \text{或} \quad \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

其中 $r_{11}, r_{12}, \dots, r_{33}$ 是常数, 其值取决于 $\hat{R}$ 的性质。我们说对称操作 $\hat{R}$ 可以表示 (represented) 成元素为 $r_{11}, r_{12}, \dots, r_{33}$ 的矩阵 $\mathbf{R}$ 。由矩阵 $\mathbf{R}$ 描述变换的函数组 x, y, z 称为该表示的基 (basis)。

例如, 由 (12.3) 和 (12.5), 对于操作 $\hat{C}_4(z)$, 我们有 $x' = -y, y' = x, z' = z$ 。以 x, y, z 为基, $\hat{C}_4(z)$ 和 $\hat{i}$ 的矩阵表示为

$$\mathbf{C}_4(z) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{i} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

若两个对称操作 $\hat{R}\hat{S}$ 的乘积为 $\hat{T}$, 则它们以 x, y, z 为基的矩阵以相同的方式相乘; 即: 若 $\hat{R}\hat{S} = \hat{T}$, 则 $\mathbf{R}\mathbf{S} = \mathbf{T}$ 。(证明见 *Schonland*, pp. 56-57.)

12.2 对称点群

现在, 我们来考虑对称元素可能的组合。分子中不能出现对称元素的任意组合。例如, 假设某分子有且仅有一根 C_3 轴。任何对称操作都必须使该轴保持不变。因此, 该分子不能有与 C_3 轴呈任意角度的反映面, 任何反映面必须包含该轴或与该轴垂直。(BF₃ 中有三个 σ_v 面和一个 σ_h 面。) 某对称轴与 C_3 轴不重合的唯一可能是与 C_3 轴垂直的 C_2 轴。对应的 $\hat{C}_2$ 操作使 C_3 轴保持不变。因为 $\hat{C}_3$ 和 $\hat{C}_3^2$ 是对称操作, 若有一根垂直于 C_3 轴的 C_2 轴, 则必须同时有六根 C_2 轴 (与 BF₃ 中的情况相同)。

分子中所有的对称操作构成一个数学意义上的群。**群 (group)** 是一个由实体【称为群的**元素 (elements)** 或**成员 (members)**】组成的集合, 以及一条将群中的任意两个元素结合以形成这些元素的积的规则, 使得某些要求得到满足。令 $A, B, C, D, \dots$ (假设互不相等) 为某群的元素, 令 $B * C$ 为 B 与 C 的积。乘积 $B * C$ 不一定与 $C * B$ 相等。群的元素必须满足以下要求: (1) 任意两个元素的乘积 (包括某元素与其自身) 都必须是该群的元素之一【**封闭性 (closure)**】; (2) 群中必须存在**恒等元素 (identity element)**, 使得对群中的每个元素 K 都有 $K * I = K$ 和 $I * K = K$; (3) 群中每个元素 K 必须有一个**逆元素 (inverse element)** K^{-1} , 使得 $K * K^{-1} = I$ 和 $K^{-1} * K = I$, 其中 I 为恒等元素; (4) 群的乘积满足**结合律 (associative)**, 即对任意群都有 $(B * D) * G = B * (D * G)$ 。

群中元素的个数称为群的**阶 (order)**。若对群中任意两个元素都有 $B * C = C * B$, 则称该群为**交换群或阿贝尔群 (commutative or Abelian group)**。

群的一个例子是所有整数 (正数、负数和零) 的集合, 其运算规则为普通的加法。因为两个整数的和仍是整数, 所以封闭性成立。其恒等元素是 0。整数 n 的逆元素为 $-n$ 。以及加法满足结合律。该群是一个无穷阶阿贝尔群。

在 $\hat{R}$ 和 $\hat{S}$ 的组合为连续应用 $\hat{R}$ 和 $\hat{S}$ 的规则下, 三维物体的所有对称操作集合构成一个群。因为两个对称操作的乘积一定是对称操作, 则封闭性成立。该群的恒等元素为恒等操作 $\hat{E}$, 即不作任何操作。结合律也满足【式 (3.6)】。对称操作 $\hat{R}$ 的逆元素为撤销 $\hat{R}$ 的操作, 例如, 因为 $\hat{i}\hat{i} = \hat{E}$, 则反演操作 $\hat{i}$ 的逆元素就是它本身。逆时针旋转 120° 操作 $\hat{C}_3$ 的逆元素是顺时针旋转 120° 操作, 等价于逆时针旋转 240°, 则 $\hat{C}_3^{-1} = \hat{C}_3^2$ 以及 $\hat{C}_3\hat{C}_3^2 = \hat{E}$ 。请注意, 该群的成员 (元素) 是分子的对称操作 (而不是对称元素)。我们在第 15.2 节中将使用一些群论知识, 但群论的完整发展及其应用在此省略 (参见 Cotton 或 Schonland)。



对分子所作的任何对称操作, 质心点都保持不变。因此, 孤立分子的对称群被称为**点群 (point group)**。对于无限大的晶体, 我们可以进行对称操作 (例如平移), 但这些操作不会使任何点保持不变, 从而产生**空间群 (space group)**。本书省略了对空间群的讨论。

每个分子都属于我们现在列出的对称点群之一。为了方便起见, 点群已被分为四个类别。花体字母表示点群。

I. 不具有 C_n 轴的点群: $\mathcal{C}_1$ 、 $\mathcal{C}_s$ 和 $\mathcal{C}_i$ 。

1. $\mathcal{C}_1$: 若某分子不具有任何对称元素, 则它属于该点群。唯一的对称操作为 $\hat{E}$ (也是 $\hat{C}_1$ 旋转操作)。分子 CHFCIBr 属于点群 $\mathcal{C}_1$ 。
2. $\mathcal{C}_s$: 具有唯一对称元素为反映面的分子属于该点群。对称操作为 $\hat{E}$ 和 $\hat{\sigma}$ 。一个例子为 HOCl (图 12.11)。
3. $\mathcal{C}_i$: 具有唯一对称元素为对称中心的分子属于该点群。对称操作为 $\hat{E}$ 和 $\hat{i}$ 。

II. 只有一根 C_n 轴的点群: $\mathcal{C}_n$ 、 $\mathcal{C}_{nh}$ 和 $\mathcal{C}_{nv}$ 和 $\mathcal{S}_{2n}$ 。

图 12.11: 不具有 C_n 轴的分子。图 12.12: 只有一根 C_n 轴的分子。

1. $\mathcal{C}_n, n = 2, 3, 4, \dots$: 只具有一根 C_n 旋转轴的分子属于该点群。对称操作为 $\hat{C}_n, \hat{C}_n^2, \dots, \hat{C}_n^{n-1}, \hat{E}$ 。属于 $\mathcal{C}_2$ 点群的分子如图12.12所示。
2. $\mathcal{C}_{nh}, n = 2, 3, 4, \dots$: 若我们添加一个垂直于 C_n 轴的反映面, 则得到了属于该点群的分子。因为 $\hat{\sigma}_h \hat{C}_n = \hat{S}_n$, 所欲对称轴 C_n 也是 S_n 轴。若 n 为偶数, 则 C_n 轴也是 C_2 轴, 分子具有对称操作 $\hat{\sigma}_h \hat{C}_2 = \hat{S}_2 = \hat{i}$ 。因此, 若 n 为偶数, 则属于 $\mathcal{C}_{nh}$ 点群的分子具有对称中心。(群 $\mathcal{C}_{1h}$ 即之前讨论过的群 $\mathcal{C}_s$ 。) 属于点群 $\mathcal{C}_{2h}$ 和 $\mathcal{C}_{3h}$ 的分子如图12.12所示。
3. $\mathcal{C}_{nv}, n = 2, 3, 4, \dots$: 属于该点群的分子有一根 C_n 轴, 以及 n 个通过 C_n 轴的垂直反映面。(群 $\mathcal{C}_{1v}$ 为群 $\mathcal{C}_s$ 。) H_2O 具有一根 C_2 轴和两个通过该轴的反映面, 属于 $\mathcal{C}_{2v}$ 点群。 NH_3 分子属于 $\mathcal{C}_{3v}$ 点群。(见图12.12。)
4. $\mathcal{S}_n, n = 4, 6, 8, \dots$: $\mathcal{S}_n$ 点群是与 S_n 轴有关的点群。首先考虑 n 为级数的情况。我们有 $\hat{S}_n = \hat{\sigma}_h \hat{C}_n$ 。操作 $\hat{C}_n$ 只影响 x 和 y 坐标, 而 $\hat{\sigma}_h$ 操作只影响 z 坐标。因此, 这些操作可以对易, 我们有

$$\hat{S}_n^n = (\hat{\sigma}_h \hat{C}_n)^n = \hat{\sigma}_h \hat{C}_n \hat{\sigma}_h \hat{C}_n \dots \hat{\sigma}_h \hat{C}_n = \hat{\sigma}_h^n \hat{C}_n^n$$

现在 $\hat{C}_n^n = \hat{E}$, 以及对奇数 n , 有 $\hat{\sigma}_h^n = \hat{\sigma}_h$ 。因此对于奇数 n , 对称操作 $\hat{S}_n^n$ 等价于 $\hat{\sigma}_h$, 以及点群 $\mathcal{S}_n$ 具有水平反映面。同样地,

$$\hat{S}_{n+1} = \hat{S}_n \hat{S}_n = \hat{\sigma}_h \hat{S}_n = \hat{\sigma}_h \hat{\sigma}_h \hat{C}_n = \hat{C}_n, \quad n \text{ odd}$$

所以若 n 为奇数, 则分子具有一根 C_2 轴。因此, 若 n 为奇数, $\mathcal{S}_n$ 群等价于 $\mathcal{C}_{nh}$ 群。再考虑 n 为偶数的情况。因为 $\hat{S}_2 = \hat{i}$, 则群 $\mathcal{S}_2$ 等价于 $\mathcal{C}_i$ 。因此只有当 $n = 4, 6, 8, \dots$ 时, $\mathcal{S}_n$ 群才是一个新的点群。 S_{2n} 轴也是 C_n 轴: $\hat{S}_{2n}^2 = \hat{\sigma}_h^2 \hat{C}_{2n}^2 = \hat{E} \hat{C}_n = \hat{C}_n$ 。

III. 具有一根 C_n 轴和 n 个 C_2 轴的点群: $\mathcal{D}_n$ 、 $\mathcal{D}_{nh}$ 和 $\mathcal{D}_{nd}$ 。




图 12.13: 具有一根 C_n 轴和 n 个 C_2 轴的分子。

1. $\mathcal{D}_n$, $n = 2, 3, 4, \dots$: 具有一根 C_n 轴和 n 根与 C_n 轴垂直的 C_2 轴 (不存在反映面) 的分子属于该点群。相邻 C_2 轴之间的夹角为 π/n 弧度。 $\mathcal{D}_2$ 点群有三根互相垂直的 C_2 轴, 对称操作为 $\hat{E}$, $\hat{C}_2(x)$, $\hat{C}_2(y)$, $\hat{C}_2(z)$ 。
2. $\mathcal{D}_{nh}$, $n = 2, 3, 4, \dots$: 具有一根 C_n 轴、 n 根 C_2 轴和一个垂直于 C_n 轴的反映面 σ_h 的分子属于该点群。与 $\mathcal{C}_{nh}$ 一致, C_n 轴也是 S_n 轴。若 n 为偶数, 则 C_n 轴也是 C_2 轴和 S_2 轴, 分子具有对称中心。 $\mathcal{D}_{nh}$ 群中的分子也有 n 个反映面, 每个都穿过 C_n 轴和其中一根 C_2 轴。(证明见问题 12.29。) BF_3 分子属于 $\mathcal{D}_{3h}$ 点群; PtCl_4^{2-} 属于 $\mathcal{D}_{4h}$ 点群; 苯属于 $\mathcal{D}_{6h}$ 点群 (图 12.13)。
3. $\mathcal{D}_{nd}$, $n = 2, 3, 4, \dots$: 具有一根 C_n 轴、 n 根 C_2 轴和 n 个通过 C_n 轴且平分相邻 C_2 轴夹角的反映面的分子属于该点群。 n 个垂直反映面称为**等分** (diagonal) 平面, 用 σ_d 表示。可以证明, C_n 轴也是 S_{2n} 轴。乙烷交叉构象是 $\mathcal{D}_{3d}$ 点群的典型例子 (图 12.13)。【具有内旋转的分子 (例如乙烷) 的对称性实际上需要特别考虑; 见 H. C. Longuet-Higgins, *Mol. Phys.*, **6**, 445 (1963).】

IV. 具有多根 C_n 轴的点群, $n > 2$: $\mathcal{T}_d$, $\mathcal{T}$, $\mathcal{O}_h$, $\mathcal{O}$, $\mathcal{I}_h$, $\mathcal{I}$, $\mathcal{K}_h$ 。

这些立体与柏拉图立体的对称性有关, 即由全等正多边形围成的立体, 且具有全等的多面体角。共有五种这样的立体: 四面体有四个三角形面, 立方体有六个正方形面, 八面体有八个三角形面, 五角十二面体有十二个五边形面, 二十面体有二十个三角形面。

1. $\mathcal{T}_d$: 正四面体的对称操作构成了这个群。最典型的例子是 CH_4 。甲烷的对称元素为四根 C_3 轴 (每根 C-H 键)、三根同时是 C_2 轴的 S_4 轴 (图 12.5) 以及六个反映面, 每个包含两根 C-H 键。(从 4 个事物中每次取 2 个的组合数为 $4!/2!2! = 6$ 。)




图 12.14: 具有多根 C_n 轴的点群, $n > 2$ 。(对于 $B_{12}H_{12}^{2-}$, 为了清晰起见, 氢原子省略了。)

2. O_h : 立方体或正八面体的对称操作构成了这个群。立方体和八面体被称为彼此的对偶 (dual) 体; 如果我们将立方体相邻面的中点连接起来, 就会得到一个八面体, 反之亦然。因此, 立方体和八面体具有相同的对称元素和操作。立方体有六个面、八个顶点和十二条边。它的对称元素如下: 一个对称中心、三根穿过立方体相对两面中心点的 C_4 轴 (同时也是 S_4 和 C_2 轴)、四根穿过立方体对角的 C_3 轴 (同时也是 S_6 轴)、六根连接一对相对边中点的 C_2 轴, 三个与一对相对面平行的反映面以及六个通过一对相对边中点的反映面。八面体分子例如 SF_6 属于 O_h 点群。
3. I_h : 正五角十二面体或正二十面体 (彼此对偶) 的对称操作构成了这个群。离子 $B_{12}H_{12}^{2-}$ 属于点群 I_h 。十二个硼原子位于正二十面体的顶点上 (图 12.14)。足球形状分子 C_{60} (富勒烯) 也属于该点群。其形状为截角二十面体, 通过切除正二十面体 (图 12.14) 的 12 个顶点而成, 从而生成一个具有 12 个五边形面 (每个原二十面体的顶点处有 5 个面相交)、20 个六边形面 (由原正二十面体的 20 个三角形面形成), 以及 $12 \times 5 = 60$ 个顶点 (切除原正二十面体的一个顶点后会产生 5 个新顶点) 的图形。
4. $\mathcal{K}_h$: 这是球体的对称操作群。(Kugel 在德语中“球体”的意思。) 原子属于这个群。

完整起见, 我们提及了与柏拉图立体相关的其他群, 这些群在化学上并不重要。群 T 、 O 和 I 分别是四面体、立方体和二十面体的正旋转对称群。这些群没有这些立体的对称反射和非正常旋转, 也没有立方体和二十面体的反演操作。群 $\mathcal{T}_h$ 包含四面体的对称旋转、反演操作以及某些反射和非正常旋转。

线性分子属于什么群呢? 围绕线性分子的核间轴进行任意角度的旋转是一种对称操作。 n 正多边形具有一根 C_n 轴, 取极限 $n \rightarrow \infty$, 我们就得到了圆, 圆有一根 C_∞ 轴。因此, 线性分子的核间轴为 C_∞ 轴。任何包含此轴的面都是反映面。若线性分子不具有对称中心 (例如 CO, HCN), 它属于点群 $C_{\infty v}$ 。若线性分子具有对称中心 (例如 H_2 , C_2H_2), 则它具有 σ_h 反映面, 即无穷多根垂直于分子主轴的 C_2 轴, 因此属于点群 $D_{\infty h}$ 。

我们如何寻找分子所属点群? 一种方法是找出所有的对称元素, 与上述列出的点群进行比较。另一种更系统的方法如图 12.15 所述。【J. B. Calvert, *Am. J. Phys.*, **31**, 659 (1963)。】该方法基于点群的四个分类。

首先, 判断分子是否为线性分子。根据线性分子是否有对称中心, 可以分为 $\mathcal{D}_{\infty h}$ 和 $\mathcal{C}_{\infty v}$ 两类。若分子不是线性分子, 则寻找是否有大于等于两根的三重或更高阶对称轴。若存在, 该分子被归类于与正多面体对称性相关的点群之一 (第 IV 组)。若这些轴不存在, 我们寻找任意一根 C_n 轴。若不存在任何 C_n 轴, 则分子属于点群 $\mathcal{C}_s$ 、 $\mathcal{C}_i$ 和 $\mathcal{C}_1$ 之一 (第 I 组)。若至少存在一根 C_n 轴, 在进行下一步之前, 先选择最高阶的 C_n 轴为主对称轴。(如果有三根互相垂直的 C_2 轴, 可以任取一根




图 12.15: 确定分子所属点群步骤示意图。

为主轴。) 接下来, 我们检查与主 C_n 轴垂直的 n 根 C_2 副轴。若它们存在, 则分子属于点群组 III; 若不存在, 则属于点群组 II。如果我们找到了 n 根 C_2 轴, 再寻找与主 C_n 轴垂直的反映面。若存在, 则点群为 $\mathcal{D}_{nh}$; 若不存在, 寻找包含主 C_n 轴的 n 个反映面 (若分子有三根互相垂直的 C_2 轴, 那么在寻找两个 σ_v 面时, 我们必须将每根轴作为主轴进行测试; 在点群 $\mathcal{D}_{nh}$ 和 $\mathcal{D}_n$ 中, 这三根 C_2 轴是等价的, 但在 $\mathcal{D}_{nd}$ 中不是。) 若我们找到了 n 个 σ_v 面, 则点群为 $\mathcal{D}_{nd}$; 否则为 $\mathcal{D}_n$ 。若分子不具有与 C_n 轴垂直的 n 根 C_2 副轴, 通过首先寻找 σ_h 反映面, 然后 n 个 σ_v 反映面, 若它们都没有, 那么最终检查 C_n 轴是否也为 S_{2n} 轴, 我们将其分类到点群 $\mathcal{C}_{nh}$ 、 $\mathcal{C}_{nv}$ 、 $\mathcal{S}_{2n}$ 或 $\mathcal{C}_n$ 中。图12.15所示的步骤并不能确定所有对称元素。在对分子进行分类后, 需确认所有必要的对称元素确实存在。尽管上述步骤看似复杂, 但实际上非常简单且易于记忆。

学生在对分子进行归类时最常见的错误是忽略了属于 $\mathcal{D}_{nd}$ 点群分子垂直于 C_n 主轴的 n 根 C_2 副轴。例如, 我们很容易发现, 联烯的 $C=C=C$ 轴是一根 C_2 轴, 但另外两根 C_2 轴却很容易被忽视 (图12.16)。具有两个相等且相互错开的半部分的分子通常属于 $\mathcal{D}_{nd}$ 点群。例如, C_2H_2 分子具有两个 C_2 轴 (图12.16)。模型可能对那些在可视化方面有困难的人有所帮助。




图 12.16: 联烯的两种视图。 $\text{C}=\text{C}=\text{C}$ 轴垂直于图 (a) 中纸张的平面。

总结

习题

Chapter 13

双原子分子的电子结构

13.1 玻恩-奥本海默近似

现在，我们开始学习分子量子力学。如果我们假设原子核和电子是指点，并忽略自旋-轨道耦合和其他相对论相互作用（第 11.6 和 11.7 节），那么分子哈密顿算符为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2} \sum_{\alpha} \frac{1}{m_{\alpha}} \nabla_{\alpha}^2 - \frac{\hbar^2}{2m_e} \sum_i \nabla_i^2 + \sum_{\alpha} \sum_{\beta > \alpha} \frac{Z_{\alpha} Z_{\beta} e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{\alpha\beta}} - \sum_{\alpha} \sum_i \frac{Z_{\alpha} e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{i\alpha}} + \sum_j \sum_{i > j} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} \quad (13.1)$$

其中 α 和 β 代表原子， i 和 j 代表电子。(13.1) 中的第一项为原子核的动能算符。第二项为电子的动能算符。第三项为核间排斥势， $r_{\alpha\beta}$ 为核 α 和 β 之间的距离，核电荷数分别为 Z_{α} 和 Z_{β} 。第四项为核-电子吸引势， $r_{i\alpha}$ 为电子 i 和核 α 之间的距离。最后一项为电子间排斥势， r_{ij} 为电子 i 和 j 之间的距离。对于 (13.1) 式而言，势能的零点对应于所有电荷（电子和原子核）彼此相距无限远的情况。

例如，考虑 H_2 分子。令 α 和 β 分别表示两个质子，1 和 2 表示两个电子， m_p 表示质子的质量。则氢分子 H_2 的哈密顿算符为

$$\begin{aligned} \hat{H} = & -\frac{\hbar^2}{2m_p} \nabla_{\alpha}^2 - \frac{\hbar^2}{2m_p} \nabla_{\beta}^2 - \frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_2^2 \\ & + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{\alpha\beta}} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{1\alpha}} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{1\beta}} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{2\alpha}} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{2\beta}} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \end{aligned} \quad (13.2)$$

分子的波函数和能量可通过薛定谔方程求得：

$$\hat{H}\psi(q_i, q_{\alpha}) = E\psi(q_i, q_{\alpha}) \quad (13.3)$$

其中 q_i 和 q_{α} 分别表示电子和原子核的坐标。分子哈密顿算符 (13.1) 之复杂，足以令任何量子化学家望而生畏。幸运的是，存在一个非常准确且简化的近似方法。因为原子核的质量远大于电子 ($m_{\alpha} \gg m_e$)，则电子的运动速度远大于原子核。因此，就电子而言，我们可以近似地认为原子核是固定的，而电子在运动。从经典力学的角度来看，在电子运动的一个周期内，原子核的组态变化可以忽略不计。因此，将原子核视为固定不动，我们可以在 (13.1) 中忽略原子核的动能项，从而得到描述电子运动的薛定谔方程：

$$\boxed{(\hat{H}_{el} + V_{NN})\psi_{el} = U\psi_{el}} \quad (13.4)$$

其中的纯电子哈密顿算符 (purely electronic Hamiltonian) $\hat{H}_{el}$ 为

$$\hat{H}_{el} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \sum_i \nabla_i^2 - \sum_{\alpha} \sum_i \frac{Z_{\alpha} e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{i\alpha}} + \sum_j \sum_{i > j} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} \quad (13.5)$$

包含了核间排斥势的电子哈密顿量为 $\hat{H}_{\text{el}} + V_{NN}$ 。核间排斥项 V_{NN} 为

$$V_{NN} = \sum_{\alpha} \sum_{\beta > \alpha} \frac{Z_{\alpha} Z_{\beta} e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{\alpha\beta}} \quad (13.6)$$

(13.4) 中的能量 U 为**包含核间排斥势的电子能量** (electronic energy including nuclear repulsion)。 (13.4) 中的核间距 $r_{\alpha\beta}$ 不是变量, 而每个值都为固定的常数。当然, 可能的核组态有无限多种, 对于每一种组态, 我们都可以求解电子薛定谔方程 (13.4) 以得到一组电子波函数及其对应的电子能级。该组中的每个成员对应于不同的分子电子态。因此, 电子波函数和能级在参数上依赖于核坐标:

$$\psi_{\text{el}} = \psi_{\text{el},n}(q_i; q_{\alpha}) \quad \text{以及} \quad U = U_n(q_{\alpha})$$

其中 n 表示电子量子数。

电子薛定谔方程 (13.4) 中的变量为电子的坐标。对于给定的核组态, V_{NN} 与这些坐标无关。现在很容易证明 (问题 4.52): 在哈密顿量中省略常数项 C 不会影响波函数, 而仅仅使每个能量本征值都减小 C 。因此, 若我们在 (13.4) 中省略 V_{NN} , 将得到

$$\hat{H}_{\text{el}}\psi_{\text{el}} = U_{\text{el}}\psi_{\text{el}} \quad (13.7)$$

其中**纯电子能量** (purely electronic energy) $E_{\text{el}}(q_{\alpha})$ (在参数上取决于核坐标 q_{α}) 与包含核间排斥势的电子能量之间关系为

$$U = E_{\text{el}} + V_{NN} \quad (13.8)$$

因此, 我们可以从电子薛定谔方程中省略核间排斥势。通过求解 (13.7), 我们首先确定特定核组态下的电子势能 E_{el} , 随后利用 (13.8) 计算 U , 其中常数项 V_{NN} 可通过假设的核位置从 (13.6) 中轻松得出。

对于具有两个质子和固定核间距 $r_{\alpha\beta}$ 的 H_2 分子, 纯电子能量由 (13.2) 给出, 其中第一、二和第五项被忽略。核间排斥势 V_{NN} 等于 $e^2/4\pi\epsilon_0 R$ 。纯电子哈密顿算符包含作为变量的六个电子坐标 $x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2$, 也包括作为参数的核坐标。

电子薛定谔方程 (13.4) 可通过后文将讨论的近似方法进行处理。若将双原子分子束缚态的电子能 (含核间排斥势) 关于核间距 R 作图, 我们将得到如图 13.1 所示的曲线。当 $R = 0$ 时, 核间排斥势使势能 U 趋于无穷大。该曲线中能量最低点处的核间距离称为**平衡核间距** R_e (equilibrium internuclear distance)。 U 在无限核间距离处的极限值与 R 处的值之差称为**平衡解离能** (equilibrium dissociation energy) (或从势能最低点解离的能量) D_e :

$$D_e \equiv U(\infty) - U(R_e) \quad (13.9)$$

当我们考虑核运动 (第 13.2 节) 时会发现: 平衡核间距 D_e 与分子基态振动解离能 D_0 有差异。核运动最低态具有零转动动能【正如式 (6.47) 所示】和非零振动能——零点能。若我们使用谐振子模型来近似双原子分子的振动 (第 4.3 节), 则该零点能为 $\frac{1}{2}h\nu$ 。该零点能使得核运动基态能量 $\frac{1}{2}h\nu$ 高于 $U(R)$ 曲线中的最小值, 则 D_0 小于 D_e : $D_0 \approx D_e - \frac{1}{2}h\nu$ 。相同分子的不同电子态具有不同的 $U(R)$ 曲线 (图 13.5 和 13.19), 以及不同的 R_e 、 D_e 、 D_0 和 ν 值。

考虑由双原子分子 AB 组成的理想气体。在趋于绝对零度的近似中, 所有的分子 AB 都处于电子和核运动的基态, 则 $D_0 N_A$ (其中 N_A 为阿伏伽德罗常数, D_0 为 AB 分子的基态解离能) 为将 1 摩尔 AB 分子完全解离带来的热力学内能 U 和焓 H 的变化值: $N_A D_0 = \Delta U_0^\circ = \Delta H_0^\circ$, $\text{AB(g)} \longrightarrow \text{A(g)} + \text{B(g)}$ 。




图 13.1: 电子能（包括核间排斥势）为核间距 R 的函数，适用于双原子分子电子束缚态。

对于某些双原子分子的电子态，解电子薛定谔方程得到的 $U(R)$ 曲线没有最小值。此类态不具有束缚性，分子将发生解离。例如图13.5中所示的某些态。

假设我们已经解出了电子薛定谔方程，则下一步该考虑核运动了。根据我们的近似，电子的运动远快于核运动。当核的组态稍微变化时（设为 q'_α 到 q''_α ），电子可以迅速对核组态变化做出响应，其中电子波函数从 $\psi_{\text{el}}(q_i; q'_\alpha)$ 变为 $\psi_{\text{el}}(q_i; q''_\alpha)$ 而电子能量从 $U(q'_\alpha)$ 变为 $U(q''_\alpha)$ 。因此，随着原子核的运动，电子能随着定义核组态参数的函数而连续变化，而 $U(q)$ 实际上成为核运动的势能。电子就像连接原子核的弹簧。随着原子核之间的距离变化，弹簧中储存的能量也会发生变化。因此，描述原子核运动的薛定谔方程是

$$\hat{H}_N \psi_N = E \psi_N \quad (13.10)$$

$$\hat{H}_N = -\frac{\hbar^2}{2} \sum_{\alpha} \frac{1}{m_{\alpha}} \nabla_{\alpha}^2 + U(q_{\alpha}) \quad (13.11)$$

核薛定谔方程中的变量为核坐标，用 q_{α} 表示。因为哈密顿算符 (13.11) 同时包括了核能量和电子能量，所以 (13.10) 中的能量本征值 E 为分子的总能量。 E 仅仅是一个数值，与任何坐标都无关。需要注意的是，对于分子的每个电子态，我们必须求解不同的核薛定谔方程，因为势能 U 在不同态之间是不同的。在本章中，我们将重点讨论电子薛定谔方程 (13.4)。

在13.2节中，我们将证明双原子分子某电子态的总能量近似等于平动能、转动能、振动能和电子能的和： $E \approx E_{\text{elec}} + E_{\text{vib}} + E_{\text{rot}} + E_{\text{tr}}$ ，其中常量 E_{elec} 【不要与 (13.7) 中的 E_{el} 混淆】由 $E_{\text{elec}} = U(R_e)$ 给出。

将电子运动与核运动分离的近似方法称为**玻恩-奥本海默近似** (Born-Oppenheimer approximation)，它是量子化学的基础。【美国物理学家 J·罗伯特·奥本海默 (J. Robert Oppenheimer) (1904–1967) 于 1927 年成为玻恩的研究生。在第二次世界大战期间，奥本海默领导了研发原子弹的洛斯·阿拉莫斯实验室 (Los Alamos laboratory)。】玻恩和奥本海默的数学处理表明，若 $(m_e/m_{\alpha})^{1/4} \ll 1$ ，则分子的真实波函数可以近似表示为

$$\psi(q_i, q_{\alpha}) = \psi_{\text{el}}(q_i; q_{\alpha}) \psi_N(q_{\alpha}) \quad (13.12)$$

玻恩-奥本海默近似对双原子分子的基态电子态引入的误差很小。对激发态电子状态的修正比对基态的修正更大，但与用于求解多电子分子的电子薛定谔方程的近似所引入的误差相比，通常仍然很小。

因此, 我们无需担心对玻恩-奥本海默近似的修正。关于玻恩-奥本海默近似的进一步讨论, 请参见 J. Goodisman, *Diatomic Interaction Potential Theory*, Academic Press, 1973, Volume 1, Chapter 1.

玻恩和奥本海默在 1927 年发表的证明玻恩-奥本海默近似的论文严重缺乏严谨性。随后的研究更好地证明了玻恩-奥本海默近似值的正确性, 但仍然存在重大问题: “核运动和电子运动的耦合问题目前尚无合理的解决方案, ……这是未来可以且必须开展大量研究的一个领域”【B. T. Sutcliffe, *J. Chem. Soc. Faraday Trans.*, **89**, 2321 (1993); see also B. T. Sutcliffe and R. G. Woolley, *Phys. Chem. Chem. Phys.*, **7**, 3664 (2005), and Sutcliffe and Woolley, arxiv.org/abs/1206.4239】。

13.2 双原子分子中的核运动

本章的绝大部分内容都在处理双原子分子的电子薛定谔方程, 但本节将考察双原子分子电子处于束缚态的核运动。根据 (13.10) 和 (13.11), 双原子分子电子束缚态的核运动薛定谔方程为

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_\alpha} \nabla_\alpha^2 - \frac{\hbar^2}{2m_\beta} \nabla_\beta^2 + U(R) \right] \psi_N = E \psi_N \quad (13.13)$$

其中 α 和 β 为原子核, 核运动波函数 ψ_N 为核坐标 $x_\alpha, y_\alpha, z_\alpha, x_\beta, y_\beta, z_\beta$ 的函数。

势能函数 $U(R)$ 只是两核相对坐标的函数, 根据第 6.3 节的工作, 我们知道双粒子薛定谔方程 (13.13) 可以简化为两个单粒子薛定谔方程——一个关于分子整体平动, 而另一个关于核的相对运动, 我们有

$$\psi_N = \psi_{N,\text{tr}} \psi_{N,\text{int}} \quad \text{和} \quad E = E_{\text{tr}} + E_{\text{int}} \quad (13.14)$$

平动能级可视作三维势箱中单粒子的能级, 其中势箱的尺寸与限制双原子分子气体容器的尺寸一致。

$\psi_{N,\text{int}}$ 的薛定谔方程为 【式 (6.43)】:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + U(R) \right] \psi_{N,\text{int}} = E_{N,\text{int}} \psi_{N,\text{int}}, \quad \mu \equiv m_\alpha m_\beta / (m_\alpha + m_\beta) \quad (13.15)$$

其中 $\psi_{N,\text{int}}$ 为一核关于另一核的相对坐标的函数。最佳坐标系应采用一个核相对于另一个核的球坐标系 (图 6.5, 其中用 m_α 取代 m_N , m_β 取代 m_e)。相对球坐标中的半径 r 为核间距 R , 我们将相对角向坐标表示为 θ_N 和 ϕ_N 。因为 (13.15) 中的势能仅依赖于 R , 这是一个中心力问题, 根据第 (6.1) 节的结论, 有

$$\psi_{N,\text{int}} = P(R) Y_J^M(\theta_N, \phi_N), \quad J = 0, 1, 2, \dots, \quad M = -J, \dots, J \quad (13.16)$$

其中函数 Y_J^M 是量子数分别为 J 和 M 的球谐函数。

根据 (6.17) 径向函数 $P(R)$ 通过下式求出:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \left[P''(R) + \frac{2}{R} P'(R) \right] + \frac{J(J+1)\hbar^2}{2\mu R^2} P(R) + U(R) P(R) = E_{\text{int}} P(R) \quad (13.17)$$

通过定义如下函数 $F(R)$, 微分方程可以得到简化:

$$F(R) \equiv R P(R) \quad (13.18)$$

将 $P = F/R$ 代入 (13.17), 我们得到 【式 (6.137)】:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} F''(R) + \left[U(R) + \frac{J(J+1)\hbar^2}{2\mu R^2} \right] F(R) = E_{\text{int}} F(R) \quad (13.19)$$

这是一个有效势能为 $U(R) + J(J+1)\hbar^2/2\mu R^2$ 的单粒子薛定谔方程。

求解 (13.19) 的最基本方法如下所示: (a) 在几个不同的 R 值下求解电子薛定谔方程 (13.7), 获得我们感兴趣的电子态能量 E_{el} ; (b) 将 $Z_\alpha Z_\beta e^2 / 4\pi\epsilon_0 R$ 与 E_{el} 相加, 得到这些 R 值对应的 U ; (c) 设计一个数学函数 $U(R)$, 其参数经过调整, 以使计算得到的 U 值得到良好的拟合; (d) 将 (c) 中得到的函数 $U(R)$ 代入核运动径向薛定谔方程 (13.19), 并采用数值方法求解 (13.19)。

步骤 (c) 中常用的方法是三次样条法 (cubic splines), 已有相应的计算机程序 (见 *Press et al.*, Chapter 3; *Shoup*, Chapter 6)。

至于 (d) 的步骤, 一维薛定谔方程 (13.19) 的数值解法可以采用 *Cooley-Numerov* 法【见 *J. Tellinghuisen, J. Chem. Educ.*, **66**, 51 (1989)】, 这是对 Numerov 方法的改进 (第4.4节和6.9节); 或使用有限元法 (finite-element method)【见 *D. J. Searles and E. I. von Nagy-Felsobuki, Am. J. Phys.*, **56**, 444 (1988)】。

对于给定的 J 值, 径向方程 (13.19) 的解 $F(R)$ 由量子数 v 指定, 其中 v 为 $F(R)$ 中的节点数; $v = 0, 1, 2, \dots$ 。能级 E_{int} 【通过 $P(R) = F(R)/R$ 满足平方可积性求出】依赖于出现在 (13.19) 中的量子数 J 和指定 $F(R)$ 的量子数 v ; $E_{\text{int}} = E_{v,J}$ 。(13.16) 中的角向因子 $Y_J^M(\theta_N, \phi_N)$ 为角度坐标的函数。保持 R 不变而改变 θ_N 和 ϕ_N 对应于双原子分子空间方向的转变, 即转动运动。量子数 J 和 M 为转动量子数。注意 Y_J^M 为双粒子刚性转子波函数【式 (6.46)】。 R 坐标中的变化对应于核间距的变化, 即振动运动, 指定了函数 $F(R)$ 的量子数 v 为振动量子数。

由于精确求解电子薛定谔方程【步骤 (a)】很困难, 我们通常使用简单但精度比步骤 (a) 至 (d) 稍低的方法来求解。最简单的方法是将 $U(R)$ 展开为 R_e 的泰勒级数 (问题 4.1):

$$U(R) = U(R_e) + U'(R_e)(R - R_e) + \frac{1}{2}U''(R_e)(R - R_e)^2 + \frac{1}{6}U'''(R_e)(R - R_e)^3 + \dots \quad (13.20)$$

在平衡核间距 R_e 处, 曲线 $U(R)$ 的斜率为零 (图13.1), 则 $U'(R_e) = 0$ 。我们可以预料到分子在平衡核间距附近振动。对于接近 R_e 的 R 值, $(R - R_e)^3$ 及更高次幂很小, 我们可以忽略它们。定义平衡力常数 (equilibrium force constant) k_e 为 $k_e \equiv U''(R_e)$, 我们有

$$U(R) \approx U(R_e) + \frac{1}{2}k_e(R - R_e)^2 = U(R_e) + \frac{1}{2}k_e x^2 \quad (13.21)$$

$$k_e \equiv U''(R_e) \quad \text{以及} \quad x \equiv R - R_e$$

我们通过一个抛物线来近似 $U(R)$ 【图4.6, 其中 $V \equiv U(R) - U(R_e)$, $x \equiv R - R_e$ 】。

随着自变量 $x \equiv R - R_e$ 的变化, (13.19) 变为

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}S''(x) + \left[U(R_e) + \frac{1}{2}k_e x^2 + \frac{J(J+1)\hbar^2}{2\mu(x+R_e)^2} \right] S(x) \approx E_{\text{int}}S(x) \quad (13.22)$$

$$\text{其中 } S(x) \equiv F(R) \quad (13.23)$$

将 $1/(x+R_e)^2$ 展开为泰勒级数, 我们有 (问题 13.7)

$$\frac{1}{(x+R_e)^2} = \frac{1}{R_e^2(1+x/R_e)^2} = \frac{1}{R_e^2} \left(1 - 2\frac{x}{R_e} + 3\frac{x^2}{R_e^2} - \dots \right) \approx \frac{1}{R_e^2} \quad (13.24)$$

我们假设与 R_e 相比, $R - R_e = x$ 足够小, 使得 (13.24) 中 1 之后的项都可以被忽略。将 (13.24) 代入 (13.22) 并整理, 得

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}S''(x) + \frac{1}{2}k_e x^2 S(x) \approx \left[E_{\text{int}} - U(R_e) - \frac{J(J+1)\hbar^2}{2\mu R_e^2} \right] S(x) \quad (13.25)$$

方程 (13.25) 与坐标为 x 、质量为 μ 、势能函数为 $\frac{1}{2}k_e x^2$ 以及能量本征值为 $E_{\text{int}} - U(R_e) - J(J+1)\hbar^2 / 2\mu R_e^2$ 的一维谐振子薛定谔方程一致。【13.25的定解条件与 (4.32) 并不一致, 但区别不重要, 可以

忽略 (Levine, *Molecular Spectroscopy*, p. 147)。**】** 因此, 我们可以令 (13.25) 括号中的项等于谐振子的本征值, 得到

$$\begin{aligned} E_{\text{int}} - U(R_e) - J(J+1)\hbar^2/2\mu R_e^2 &\approx \left(v + \frac{1}{2}\right) h\nu_e \\ E_{\text{int}} &\approx U(R_e) + \left(v + \frac{1}{2}\right) h\nu_e + J(J+1)\hbar^2/2\mu R_e^2 \end{aligned} \quad (13.26)$$

$$\nu_e = (k_e/\mu)^{1/2}/2\pi, \quad v = 0, 1, 2, \dots \quad (13.27)$$

其中用到了 (4.23), ν_e 称为**平衡 (或简谐) 振动频率** (equilibrium or harmonic vibrational frequency)。分子内能 E_{int} 近似等于电子能量之和 $U(R_e) = E_{\text{elec}}$ (与相同分子不同电子态不同), 振动能为 $(v + \frac{1}{2})h\nu_e$, 转动能为 $J(J+1)\hbar^2/2\mu R_e^2$ 。近似 (13.21) 和 (13.14) 分别对应谐振子和刚性转子近似。根据 (13.26) 和 (13.14), 分子能量 $E = E_{\text{tr}} + E_{\text{int}}$ 近似为平动、转动、振动和电子能的和:

$$E \approx E_{\text{tr}} + E_{\text{rot}} + E_{\text{vib}} + E_{\text{elec}}$$

由 (13.14)、(13.16)、(13.18) 以及 (13.23), 核运动波函数为

$$\psi_N \approx \psi_{N,\text{tr}} S_v(R - R_e) R^{-1} Y_J^M(\theta_N, \phi_N) \quad (13.28)$$

其中 $S_v(R - R_e)$ 为 v 量子数的谐振子本征函数。

与实验观测到的双原子分子振动-转动能级相比, 近似式 (13.26) 的吻合性较差。通过引入由 (13.21) 和 (13.24) 中忽略的项带来的一级和二级微扰理论能量校正, 可以改善精度。当我们这么做时, (见 Levine, *Molecular Spectroscopy*, Section 4.2), 能量中包含了额外的项, 对应于非谐性振动**【式 (4.60)】**、振动-转动耦合和旋转离心畸变 (第6.4节), 其中非谐性振动是这些修正项中最大的, 而旋转离心畸变则是最小的。

例题: 一种对双原子分子势能函数的近似表示是莫尔斯 (Morse) 函数

$$U(R) = U(R_e) + D_e [1 - e^{-a(R-R_e)}]^2$$

由 $U''(R_e) = k_e$ **【式 (4.59)】** 和 (13.27) 可得 (见问题 4.29, 因为能量零点的选取不同, 所以问题 4.29 中的莫尔斯函数与本例中不同)

$$a = (k_e/2D_e)^{1/2} = 2\pi\nu_e (\mu/2D_e)^{1/2}$$

使用莫尔斯函数和 Numerov 方法 (第4.4节):

- (a) 求 H_2 分子处于其基态电子态时六个最低的振动能级能量, 已知 $D_e/hc = 38297 \text{ cm}^{-1}$, $\nu_e/c = 4403.2 \text{ cm}^{-1}$, $R_e = 0.741 \text{ \AA}$, 其中 h 和 c 分别为普朗克常数和光速;
(b) 求这些振动态的 $\langle R \rangle$ 。

(a) 振动能级对应于转动量子数 $J = 0$ 的状态。将变量替换为 $x \equiv R - R_e$ 和 $S(x) \equiv F(R)$ **【式 (13.23)】**, 再将莫尔斯函数带入核运动薛定谔方程 (13.19) 中, 对于 $J = 0$, 我们有

$$-(\hbar^2/2\mu) S''(x) + D_e (1 - e^{-ax})^2 S(x) = [E_{\text{int}} - U(R_e)] S(x) = E_{\text{vib}} S(x)$$

因为当 $J = 0$ 时, 有 $E_{\text{int}} = E_{\text{elec}} + E_{\text{vib}} = U(R_e) + E_{\text{vib}}$ **【式 (13.26)】**。与 Numerov 方法中通常的做法一致, 我们转而使用无量纲的约化变量 $E_{\text{vib},r} \equiv E_{\text{vib}}/A$ 而 $x_r \equiv x/B$, 其中 A 和 B 为常数 $\hbar$ 、 μ 和 a 次幂的乘积。第4.4节的过程给出了 (问题 13.8a) $A = \hbar^2 a^2/\mu$ 和 $B = a^{-1}$ 。因此,

$$x_r = x/B = ax, \quad E_{\text{vib},r} = E_{\text{vib}}/A = \mu E_{\text{vib}}/\hbar^2 a^2 = (2D_e/\hbar^2 \nu_e^2) E_{\text{vib}}$$

其中我们用到了 $a = 2\pi\nu_e (\mu/2D_e)^{1/2}$ 。将

$$x = x_r/a, \quad E_{\text{vib}} = \hbar^2 a^2 E_{\text{vib},r}/\mu, \quad D_{e,r} = D_e/(\hbar^2 a^2/\mu), \quad S(x) = S_r(x_r) B^{-1/2}$$

$$S'' = B^{-5/2} S_r'' = B^{-1/2} B^{-2} S_r'' = B^{-1/2} a^2 S_r''$$

【式 (4.78) 和 (4.79)】代入 $S(x)$ 的微分方程中, 得到

$$S_r''(x_r) = 2 \left[2D_{e,r} (1 - e^{-x_r})^2 - 2E_{\text{vib},r} \right] S_r(x_r) \equiv G_r S_r(x_r)$$

最后一个方程具有 (4.82) 的形式, 其中 $G_r \equiv 2D_{e,r} (1 - e^{-x_r})^2 - 2E_{\text{vib},r}$ 。所以我们已经准备好应用第4.4节的 Numerov 方法。对于 H_2 的基态电子态, 我们有 (问题 13.8b)

$$A = \hbar^2 \nu_e^2 / 2D_e = \hbar^2 c^2 (4403.2 \text{ cm}^{-1})^2 / 2hc (38297 \text{ cm}^{-1}) = (253.12_9 \text{ cm}^{-1}) hc$$

$$B = 0.51412 \text{ \AA}, \quad D_{e,r} = D_e/A = 151.29_4$$

我们希望在经典禁区中开始和结束应用 Numerov 方法。若我们使用谐振子来近似振动能级, 则最低六个振动能级的能量为 $(v + \frac{1}{2}) \hbar \nu_e$, $v = 0, 1, \dots, 5$ 。六个谐振子振动能级的约化能量为 $5.5 \hbar \nu_e / A = 5.5 \hbar \nu_e / (253 \text{ cm}^{-1}) hc = 5.5 (4403 \text{ cm}^{-1}) / (253 \text{ cm}^{-1}) = 95.7$ 。由于非谐性振动的存在 (第4.3节), 事实上, 六个振动能级的能量应低于 95.7, 因此我们可以安全地使用 95.7 来确定经典允许区域的边界。我们有 $D_{e,r} (1 - e^{-x_r}) = 95.7$, 以及 $D_{e,r} = 151.29$, 得到约化能量为 95.7 时的经典允许区域边界 $x_r = -0.58$ 和 $x_r = 0.58$ 。将边界两端各延长 1.2, 我们将在 $x_r = -1.8$ 处开始 Numerov 方法, 并在 $x_r = 2.8$ 处结束。然而, $x_r = (R - R_e)/B = (R - 0.741 \text{ \AA}) / (0.514 \text{ \AA})$ 以及核间距 R 的最小可能值为 0, 所以 x_r 的最小可能值为 -1.44。因此, 我们从 $x_r = -1.44$ 开始 Numerov 方法, 并在 $x_r = 2.8$ 处结束。若我们取间隔为 $s_r = 0.04$, 就得到了 106 个点, 这已经很充分了; 但我们希望通过设 $s_r = 0.02$ 得到 212 个点来提高精度。通过这些选择, 我们按照常规方式设置 Numerov 电子表格 (或使用 Mathcad 或表 4.1 中的计算机程序)。得到 (问题 13.9) 以下六个最低的 $E_{\text{vib},r}$ 值: 8.572525, 24.967566, 40.362582, 54.757570, 68.152531, 80.547472。使用 $E_{\text{vib},r} = E_{\text{vib}}/A$, 我们得到六个最低的振动能级为 $E_{\text{vib}}/hc = 2169.95, 6320.01, 10216.94, 13860.73, 17251.38, 20388.90 \text{ cm}^{-1}$ 。注意: 随着振动量子数的变大, 能级间隔逐渐减小。(相比之下, 谐振子近似给出了以下值: 2201.6, 6604.8, 11008.0, 15411.2, 19814.4, 24217.6 cm^{-1} 。)

巧合的是, 莫尔斯函数的薛定谔方程可以几乎精确地解析求解, 而解析解 (问题 13.11) 给出了以下最低本征值: 2169.96, 6320.03, 10216.97, 13860.78, 17251.57, 23889.02 cm^{-1} 。Numerov 莫尔斯函数值与解析莫尔斯函数值之间具有非常良好的一致性。实验观测到的 H_2 最低能级为 2170.08, 6331.22, 10257.19, 13952.43, 17420.44, 20662.00 cm^{-1} 。莫尔斯函数值与实验值的偏差表明, 莫尔斯函数并非对 H_2 基态 $U(R)$ 函数的精确描述。

(b) 我们有

$$\langle x_r \rangle \approx \int_{-1.44}^{2.8} x_r |S_r|^2 dx_r \approx \sum_{x_r=-1.44}^{2.8} x_r |S_r|^2 s_r$$

其中 $s_r = 0.02$ 为间距 (不要与振动波函数 S_r 相混淆), 且振动波函数 S_r 必须归一化。(另见问题 13.12。) 我们按照第4.4节的步骤对 S_r 进行归一化处理, 从而得到一系列 $x_r |S_r|^2 s_r$ 的值。接下来, 我们将这些值相加, 得到以下六个最低振动态的结果 (问题 13.9b): $\langle x_r \rangle = 0.0440, 0.1365, 0.2360, 0.3435, 0.4605, 0.5884$ 。由 $x_r = (R - R_e)/B$, 我们得到了以下值:




图 13.2: 通过 Numerov 方法求出的 H_2 满足 $v = 5$ 的莫尔斯振动波函数。

$\langle R \rangle = 0.763, 0.811, 0.862, 0.918, 1.044 \text{ \AA}$ 。(为了得到准确的 $\langle x_r \rangle$ 值, $E_{\text{vib},r}$ 的计算精度必须远高于 (a) 中所给的精度——精度必须足够高, 以确保波函数在 2.8 处接近于零。如果电子表格不允许输入足够的小数位数来对 $v = 0$ 进行此操作, 则可以将右边界取为 2.5 而不是 2.8。)由于非谐性振动的存在, 当振动量子数增大时, 分子将变大。这种效应对于氢等轻原子来说相当显著。 $v = 5$ 的 Numerov-莫尔斯振动波函数 (图13.2) 显示出以原点 ($x_r = 0$, 对应于 $R = R_e$) 为中心的明显不对称性。关于非谐性对键长影响的典型例子, 请参见第13.7节末尾对 He_2 (世界上最大的双原子分子) 的讨论。

13.3 原子单位制

大多数量子化学家使用原子单位来报告他们的计算结果。

在国际单位制下, 氢原子哈密顿算符 (假设原子核为无限重) 为 $-(\hbar^2/2m_e)\nabla^2 - e^2/4\pi\epsilon_0 r$ 。原子单位系统遵循如下定义。质量、电荷量以及角动量的单位分别定义为电子的质量 m_e 、质子的电荷 e 和 $\hbar$ (而不是千克、库仑和 $\text{kg m}^2/\text{s}$)。介电常数的单位为 $4\pi\epsilon_0$, 而不是 $\text{C}^2 \text{N}^{-1} \text{m}^{-2}$ 。(量子化学中使用的质量原子单位不应与 1 amu 相混淆, 其中 1 amu 为 ^{12}C 原子质量的 1/12。)当我们使用原子单位制时, $\hbar$ 、 m_e 、 e 和 $4\pi\epsilon_0$ 的数值都为 1。因此, 为了将某公式从国际单位制转换为原子单位制, 我们只需令这些量为 1 即可。所以原子单位制下的氢原子哈密顿算符为 $-\frac{1}{2}\nabla^2 - 1/r$, 其中 r 采用原子单位制的长度而不是米。氢原子基态能量由 (6.94) 给出, 为 $-\frac{1}{2}(e^2/4\pi\epsilon_0 a_0)$ 。因为【式 (6.106)】 $a_0 = 4\pi\epsilon_0 \hbar^2/m_e e^2$, 则它 (玻尔半径) 在原子单位下的值为 1, 基态氢原子能量的值 (忽略核运动) 在原子单位制下则为 $-\frac{1}{2}$ 。

能量的原子单位 $e^2/4\pi\epsilon_0 a_0$ 称为**哈特里** (hartree) (记作 E_h):

$$1 \text{ hartree} \equiv E_h \equiv \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0} = \frac{m_e e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} = 27.211385 \text{ eV} = 4.359744 \times 10^{-18} \text{ J} \quad (13.29)$$

若忽略原子核运动, 则基态氢原子能量为 $-\frac{1}{2}$ 。长度的原子单位称为**玻尔** (bohr):

$$1 \text{ bohr} \equiv a_0 \equiv 4\pi\epsilon_0 \hbar^2/m_e e^2 = 0.52917721 \text{ \AA} \quad (13.30)$$

为了求出任何量的原子单位 (例如时间), 我们可以将 $\hbar$ 、 m_e 、 e 和 $4\pi\epsilon_0$ 进行组合, 得出具有目标量纲的量。可以证明 (问题 13.14), 时间的原子单位 $\hbar/E_h = 2.4188843 \times 10^{-17} \text{ s}$, 电偶极矩的单位是 $ea_0 = 8.478353 \times 10^{-30} \text{ C m}$ 。

在第13至17章中, 我们将使用原子单位制。

一种更严格定义原子单位的方法如下所述。从国际单位制下氢原子的电子薛定谔方程开始，我们定义（与第4.4节一致）无量纲的约化变量 $E_r \equiv E/A$, $r_r \equiv r/B$ ，其中 A 和 B 是 $\hbar$ 、 m_e 、 e 和 $4\pi\epsilon_0$ 的组合，使得它们分别具有能量和长度的量纲。第4.4节的过程表明（问题 13.13） $A = m_e e^4 / (4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2 = e^2 / 4\pi\epsilon_0 a_0 \equiv 1 \text{ hartree}$, $B = \hbar^2 4\pi\epsilon_0 / m_e e^2 \equiv 1 \text{ bohr}$ 。对于该三量纲问题，氢原子波函数的量纲为 $L^{3/2}$ ，所以约化无量纲的 ψ_r 定义为 $\psi_r \equiv \psi(r) B^{3/2}$ 。此外，

$$\frac{\partial^2 \psi_r}{\partial r_r^2} = B^{3/2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial r^2} \left(\frac{\partial r}{\partial r_r} \right)^2 = B^{3/2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial r^2} B^2 = B^{3/2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial r^2} a_0^2$$

将约化量引入薛定谔方程后，我们发现（问题 13.13），约化氢原子薛定谔方程为 $-\frac{1}{2} \nabla_r^2 \psi_r - (1/r_r) \psi_r = E_r \psi_r$ ，其中 ∇_r^2 由 (6.6) 给出，但用 r_r 代替 r 。实际上，人们通常不会特意加上下标 r ，而是直接写成 $-\frac{1}{2} \nabla^2 \psi - (1/r) \psi = E \psi$ 。

13.4 氢分子离子

现在，我们开始研究分子的电子能。我们将使用玻恩-奥本海默近似，在求解电子运动的薛定谔方程时，将原子核固定不动。通常情况下，我们将考虑孤立分子，忽略分子间相互作用。我们的结果主要适用于低压气相中的分子。有关溶剂效应的讨论，请参见第15.17节和第17.6节。

首先从双原子分子开始，最简单的为包含两个质子和一个电子的氢分子离子 H_2^+ 。与我们将单电子的氢原子作为多电子原子讨论的起点一致，单电子的 H_2^+ 为讨论多电子双原子分子提供了许多有用的想法。 H_2^+ 的电子薛定谔方程可分离变量，因此我们可以得到本征函数和本征值的精确解。

图13.3展示了 H_2^+ 的结构。两个原子核位于 a 和 b ；核间距为 R ； r_a 和 r_b 分别为电子与核 a 和 b 的距离。由于原子核是固定的，所以这是一个单粒子问题，其纯电子哈密顿算符为【式 (13.5)】

$$\hat{H}_{\text{el}} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_a} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_b} \quad (13.31)$$

第一项为电子的动能算符，第二和第三项为电子与原子核之间的吸引势。在原子单位制下， H_2^+ 纯




图 13.3: H_2^+ 中的粒子间距离。

电子哈密顿算符为

$$\hat{H}_{\text{el}} = -\frac{1}{2} \nabla^2 - \frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \quad (13.32)$$

图13.3中的坐标原点位于核间轴上，处于两个核连线的中点， z 轴沿核间轴方向延伸。在球坐标系下， H_2^+ 的电子薛定谔方程无法分离变量。然而，若我们使用共焦椭圆坐标（confocal elliptic coordinates） ξ 、 η 和 ϕ ，则可以分离变量。坐标 ϕ 为电子绕核间轴（ z 轴）旋转的角度，与球坐标一致。坐标 ξ (xi) 和 η (eta) 定义为

$$\xi \equiv \frac{r_a + r_b}{R}, \quad \eta \equiv \frac{r_a - r_b}{R} \quad (13.33)$$

这些坐标的取值范围是

$$0 \leq \phi \leq 2\pi, \quad 1 \leq \xi < \infty, \quad -1 < \eta < 1 \quad (13.34)$$

我们必须将哈密顿算符 (13.32) 使用的坐标转换为这些坐标。有

$$r_a = \frac{1}{2}R(\xi + \eta), \quad r_b = \frac{1}{2}R(\xi - \eta) \quad (13.35)$$

我们还需要拉普拉斯算符在共焦椭圆坐标中的表达式。一种方法是将 ξ 、 η 和 ϕ 用电子的笛卡尔坐标 x 、 y 和 z 来表示, 再使用链式法则将 $\partial/\partial x$ 、 $\partial/\partial y$ 和 $\partial/\partial z$ 转换为 $\partial/\partial \xi$ 、 $\partial/\partial \eta$ 和 $\partial/\partial \phi$ 。然后构造出 $\nabla^2 \equiv \partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2 + \partial^2/\partial z^2$ 。 ∇^2 表达式的导出此处省略。(讨论见 *Margenau and Murphy*, Chapter 5。)将 ∇^2 和 (13.35) 代入 (13.32), 我们得到 H_2^+ 的 $\hat{H}_{\text{el}}$ 在共焦椭圆坐标下的表达式。结果省略。

对于哈密顿算符为球对称的氢原子, 电子角动量算符为 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$, 都和 $\hat{H}$ 可对易。但 H_2^+ 离子的哈密顿算符并不满足球对称关系, 可以得到对 H_2^+ 有 $[\hat{L}^2, \hat{H}_{\text{el}}] \neq 0$ 。然而, H_2^+ 满足轴对称, 可以证明 $\hat{L}_z$ 和 $\hat{H}_{\text{el}}$ 可对易。因此, 电子波函数可以选为 $\hat{L}_z$ 的本征函数。 $\hat{L}_z$ 的本征函数为【式 (5.81)】

$$\text{常数} \cdot (2\pi)^{-1/2} e^{im\phi}, \quad \text{其中 } m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots \quad (13.36)$$

H_2^+ 中电子轨道角动量在 z 方向分量为 $m\hbar$, 若使用原子单位制则为 m 。 H_2^+ 的电子总轨道角动量不为常数。

仅就 $\partial/\partial \phi$ 而言, 式 (13.36) 中的“常数”是一个常数, 则 H_2^+ 波函数的形式为 $\psi_{\text{el}} = F(\xi, \eta) (2\pi)^{-1/2} e^{im\phi}$ 。现在尝试分离变量:

$$\psi_{\text{el}} = L(\xi) M(\eta) (2\pi)^{-1/2} e^{im\phi} \quad (13.37)$$

将 (13.37) 代入 $\hat{H}_{\text{el}}\psi_{\text{el}} = E_{\text{el}}\psi_{\text{el}}$ 中就得到了可分离变量的方程。得到两个常微分方程, 一个关于 $L(\xi)$, 另一个关于 $M(\eta)$ 。解这些方程, 可以发现若 ψ_{el} 满足品优条件, 则要求对给定的 R 值, 只有某些特定的 E_{el} 值是允许的。这个条件给出了一组不同的电子态。没有 E_{el} 的代数公式, 对于每个状态的 R 的每个期望值, 都必须通过数值计算来确定其大小。除了量子数 m 以外, H_2^+ 的电子波函数还由量子数 n_ξ 和 n_η 指定, 这些量子数给出了 $L(\xi)$ 和 $M(\eta)$ 因子在 ψ_{el} 中产生的节点数。

对于基态电子态, 量子数 m 为零。在 $R = \infty$ 时, H_2^+ 的基态分离成一个质子和一个基态氢原子, 因此 $E_{\text{el}}(\infty) = -\frac{1}{2}$ hartree。当 $R = 0$ 时, 两个质子聚拢, 形成了 He^+ 离子, 基态能量为 $-\frac{1}{2}(2)^2$ hartrees = -2 hartrees。将核间排斥势 $1/R$ (原子单位制) 与 $E_{\text{el}}(R)$ 相加, 得到核运动的势能曲线 $U(R)$ 。从电子薛定谔方程中解得的 $E_{\text{el}}(R)$ 与 $U(R)$ 的图像如图13.4所示。在 $R = \infty$ 处核间排斥势为零, 而 U 为 $-\frac{1}{2}$ hartree。

$U(R)$ 曲线的最小值位于 $R_e = 1.9972$ bohrs = $1.057 \text{ \AA}$ 处, 表明 H_2^+ 的基态电子态为稳定束缚态。1.9972 bohrs 处的 E_{el} 计算值为 -1.1033 hartrees。引入核间排斥势 $1/R$ 后得到 $U(R_e) = -0.6026$ hartree, 与 $R = \infty$ 处的值 -0.5000 hartree 相比。因此, 基态结合能为 $D_e = 0.1026$ hartree = 2.79 eV 。对应于 $64.4 \text{ kcal/mol} = 269 \text{ kJ/mol}$ 。结合能仅占平衡核间距下总能量的 17%。因此, 总能量中的微小误差可能对应于结合能中的较大误差。对于较重的分子, 情况更为严重, 因为大多数双原子分子的化学结合能处于同一数量级, 但较重分子的总电子能会显著增加。

请注意, H_2^+ 中的单个电子足以形成一个稳定的束缚态。

图13.5展示了几个 H_2^+ 电子态的 $U(R)$ 曲线, 这些曲线从电子薛定谔方程中解得。

在 H_2^+ 的 $\hat{H}_{\text{el}}$ 中, 角度 ϕ 只以 $\partial^2/\partial \phi^2$ 的形式出现。当 (13.37) 的 ψ_{el} 满足 $\hat{H}_{\text{el}}\psi_{\text{el}} = E_{\text{el}}\psi_{\text{el}}$ 时, 因子 $e^{im\phi}$ 对消了, 得到了关于 $L(\xi)$ 和 $M(\eta)$ 的两个常微分方程, 其中量子数 m 只以 m^2 的形式出现。因为 E_{el} 是通过 $L(\xi)$ 和 $M(\eta)$ 的解来确定的, 所以 E_{el} 与 m^2 有关, 每个 $m \neq 0$ 的电子能





图 13.4: H_2^+ 基态电子能级中存在 (U) 和不存在 (E_{el}) 核间排斥势的电子能量。



几个 H_2^+ 电子态的 $U(R)$ 曲线。虚线用于帮助区分间隔较近的能级。在本图的尺度上无法观察到第一激发电子能级曲线在 12.5 bohrs 处的一个微小谷值，其势阱深度为 0.00006 hartrees。

级都是二重简并的，对应于量子数为 $+|m|$ 和 $-|m|$ 的两个电子态。在双原子分子的标准表示法中【F. A. Jenkins, *J. Opt. Soc. Am.*, **43**, 425 (1953)】， m 的绝对值称为 λ ：

$$\lambda \equiv |m|$$

(某些教科书将 λ 定义为与 m 相同。) 与描述氢原子状态的 s, p, d, f, g 记号类似，我们用一个大写字母来指定 λ (原子单位制)，即电子轨道角动量沿分子轴向分量绝对值大小：

λ	0	1	2	3	4
字母	σ	π	δ	φ	γ

(13.38)

因此， H_2^+ 的最低电子态为 σ 态。

除了根据 λ 来对 H_2^+ 的状态进行分类以外，我们还可以使用它们的宇称 (第7.5节) 来分类。由图13.12可知，通过原点 O 对电子坐标进行反演会使 ϕ 变为 $\phi + \pi$ ， r_a 变为 r_b 和 r_b 变为 r_a 。该操作未改变电子哈密顿算符 (13.31) 中的势能部分。我们之前已经证明了动能算符在反演下是不变的。因此宇称算符和哈密顿算符 (13.31) 可对易， H_2^+ 的电子波函数可以分为奇函数和偶函数。对于偶函数，我们使用下标 g 来表示 (来自德语词 *gerade*，意为“偶数的”)，对于奇函数，我们使用下标 u 来表示 (来自德语词 *ungerade*，意为“奇数的”)。

图13.5中最低的 σ_g 能级标记为 $1\sigma_g$ ，在小 R 处第二低的能级记为 $2\sigma_g$ ，以此类推。最低的 σ_u 能级记为 $1\sigma_u$ ，以此类推。替代记号 $\sigma_g 1s$ 表明该能级会解离为 $1s$ 氢原子。 $\sigma_u^* 1s$ 中星号的意义稍后将予以说明。

为了完备性的考虑，我们必须考虑自旋，根据电子自旋角动量在核间轴方向的分量为 $+\frac{1}{2}$ 或 $-\frac{1}{2}$ (原子单位制)，我们将每个 H_2^+ 电子空间波函数乘以 α 或 β 。自旋的引入使每个能级的简并度翻倍。

H_2^+ 基态电子态满足 $R_e = 2.00 \text{ bohrs} = 2.00 (4\pi\epsilon_0\hbar^2/m_e e^2)$ 。负的 μ 子 (记为 μ^-) 为存在时间很短 (半衰期为 $2 \times 10^{-6} \text{ s}$) 的基本粒子，其电荷量与电子一致，但其质量 m_μ 为电子质量的 207 倍。当一束负 μ 子束 (由高速加速的离子与普通物质碰撞产生) 进入 H_2 气体时，会形成由两个质子和一个 μ 子组成的 μ 分子离子。这种物质记为 $(p\mu p)^+$ ，为电子被 μ 子取代的 H_2^+ 离子。通过将 R_e 中的 m_e 替换为 m_μ ，可以计算出其 R_e 值：

$$2.00 (4\pi\epsilon_0\hbar^2/m_\mu e^2) = 2.00 (4\pi\epsilon_0\hbar^2/207m_e e^2) = (2.00/207) \text{ bohr} = 0.0051 \text{ \AA}$$

该 μ 离子中的核间距为 H_2^+ 中的 $1/207$ 。(13.28) 中振动波函数因子很小，但与 $R - R_e = -0.0051 \text{ \AA}$ 相比并不完全可忽略，所以在 $(p\mu p)^+$ 中原子核建立联系的可能性不为零，即可能发生核聚变。同位素核 ^2H (氘) 和 ^3H (氚) 比质子更容易发生聚变反应，因此人们通常使用 D_2 和 T_2 的混合气体，而不是 H_2 。聚变发生后， μ 子被释放并可被重新捕获以催化另一次聚变。在适当条件下，一个 μ 子平均可催化 150 次聚变后才衰变。遗憾的是，目前产生 μ 束所需的能量超过融合释放的能量。(See en.wikipedia.org/wiki/Muon-catalyzed_fusion.)

在本章的其余部分，电子波函数、哈密顿算符和能量中的下标 el 将被省略。在第 13 章至第 17 章中，我们将 ψ 理解为 ψ_{el} 。

13.5 H_2^+ 离子基态的近似处理

对于多电子原子，自洽场 (SCF) 方法用于构建近似波函数，该波函数可表示为 (单电子) 自旋轨道函数的斯莱特行列式。自旋轨道函数的单电子空间部分即为原子轨道 (AO)。我们将每个原子轨道视为球谐函数与径向因子的乘积。作为径向因子的初始近似，我们可以使用具有有效核电荷的类氢径向函数。

对于无法精确求解的多电子原子（不像 H_2^+ 那样），我们希望采用自洽场方法处理原子时所采用的许多方法。我们将近似分子电子波函数表示为（单电子）自旋轨道的斯莱特行列式。分子自旋轨道的单电子空间部分为**分子轨道**（molecular orbital, MO）。与原子轨道一致，根据泡利不相容原理，每个分子轨道最多能容纳两个电子。我们使用哪种函数来描述分子轨道？理想情况下，每个分子轨道的解析式可以通过自洽场计算（第14.3节）的方法求出。在本节中，我们寻求对分子轨道的简单近似，以便对化学键的形成有一些定性理解。正如我们把每个原子轨道的角向部分视为与单电子类氢函数一致的同类函数（球谐函数）一样，我们也将每个双原子分子轨道的角向部分记为 $(2\pi)^{-1/2} e^{im\phi}$ ，与 H_2^+ 中一致。然而， H_2^+ 波函数中的 ξ 和 η 因子是复杂函数，不适用于分子轨道计算。因此，我们寻求更简单的函数，这些函数能够提供对 H_2^+ 波函数的合理准确的近似，并且可以用于构建多电子双原子分子的分子轨道。以这一讨论为动机，我们考察了在薛定谔方程可精确求解的情况下对 H_2^+ 的近似处理方法。

我们使用变分法，写出包含几个参数的某些函数，通过调整这些参数使得变分积分最小化。这将得到基态波函数的近似函数以及基态能量的上界。通过在试探函数中使用因子 $e^{im\phi}$ ，我们可以得到在任意给定 m 值下 H_2^+ 最低能级能量的上界（见第8.2节）。通过使用线性变分函数，我们可以得到激发态的近似函数。

H_2^+ 基态满足 $m = 0$ ，波函数只取决于 ξ 和 η 。我们尝试这些坐标的任意品优函数作为试探变分函数。然而，我们将采用一种更系统的方法，基于分子是由原子相互作用形成的这一概念。

考虑当核间距 R 很大时， H_2^+ 波函数会呈现何种形态。当电子靠近原子核 a 时，核 b 处于非常远的位置，以至于我们基本上得到一个以 a 为原点的氢原子。因此，当 r_a 很小时，基态 H_2^+ 电子波函数应具有和氢原子基态波函数(6.104)类似的形式。我们有 $Z = 1$ ，在原子单位制下玻尔半径 a_0 的值为1，因此(6.104)变为

$$\pi^{-1/2} e^{-r_a} \quad (13.39)$$

同样地，我们得出当电子靠近核 b 时， H_2^+ 波函数可用如下函数近似：

$$\pi^{-1/2} e^{-r_b} \quad (13.40)$$

这建议我们可以尝试如下形式的试探函数

$$c_1 \pi^{-1/2} e^{-r_a} + c_2 \pi^{-1/2} e^{-r_b} \quad (13.41)$$

其中 c_1 和 c_2 是变分参数。当电子靠近核 a 时，变量 r_a 很小而 r_b 很大，(13.41)中的第一项占主导地位，得到一个与(13.39)相似的函数。函数(13.41)是一个线性变分函数，我们被引导去求解一个形式为(8.56)的久期方程，其中下标1和2分别对应于函数(13.39)和(13.40)。

我们还可以使用微扰理论来解决这个问题。设无扰系统为 $R = \infty$ 时的 H_2^+ 分子。当 $R = \infty$ 时，电子可以被束缚在核 a 上，其波函数为(13.39)；或者被束缚在核 b 上，其波函数为(13.40)。无论在哪种情况中，能量都为 $-\frac{1}{2}$ hartree，我们有双重简并的无扰能级。将原子核从无限远处引入会引起一种微扰，该微扰将无扰的双重简并能级裂分为两个能级。这可以通过 H_2^+ 分子两个最低电子态的 $U(R)$ 曲线来说明，这两个态均会解离为基态氢原子（见图13.5）。微扰能级的零级校正波函数为(13.41)形式的线性组合，我们被引导去求解一个形式为(8.56)的久期方程，其中 W 用 $E^{(0)} + E^{(1)}$ 代替（见问题9.20）。

在求解(8.56)之前，我们先改进一下试探函数(13.41)。考虑当 R 趋于零时 H_2^+ 的基态电子波函数的极限行为。在该极限中我们得到了 He^+ 离子，其基态波函数为【在(6.104)中令 $Z = 2$ 】：

$$2^{3/2} \pi^{-1/2} e^{-2r} \quad (13.42)$$

由图13.3可知, 当 R 趋于零时, r_a 和 r_b 都趋于 r 。因此当 R 趋于零时, 试探函数 (13.41) 趋于 $(c_1 + c_2)\pi^{-1/2}e^{-r}$ 。与 (13.42) 相对照, 我们发现试探函数在 $R = 0$ 附近的极限是错误的, 它应趋近于 e^{-2r} 而不是 e^{-r} 。我们可以通过将指数中的 r_a 和 r_b 与一个变分参数 k 相乘来解决问题, 该参数 k 将是 R 的某个函数; 即 $k = k(R)$ 。若要修正在 $R = 0$ 和 $R = \infty$ 处的极限行为, 对于 H_2^+ 基态电子态, 我们有 $k(0) = 2$ 和 $k(\infty) = 1$ 。从物理上讲, k 是一种有效核电荷, 随着原子核互相靠近而增加。因此, 我们可以将试探函数改为

$$\phi = c_a 1s_a + c_b 1s_b \quad (13.43)$$

其中 c 是变分参数, 以及

$$1s_a = k^{3/2}\pi^{-1/2}e^{-kr_a}, \quad 1s_b = k^{3/2}\pi^{-1/2}e^{-kr_b} \quad (13.44)$$

因子 $k^{3/2}$ 使得 $1s_a$ 和 $1s_b$ 得以归一化【见 (6.104)】。分子轨道函数 (13.43) 称为**原子轨道线性组合** (linear combination of atomic orbitals, LCAO or LCAO-MO)。试探函数 (13.43) 由芬克尔斯坦 (Finkelstein) 和霍罗威茨 (Horowitz) 于 1928 年首次提出。

对于函数 (13.43), 久期方程 (8.56) 的形式为

$$\begin{vmatrix} H_{aa} - WS_{aa} & H_{ab} - WS_{ab} \\ H_{ba} - WS_{ba} & H_{bb} - WS_{bb} \end{vmatrix} = 0 \quad (13.45)$$

积分 H_{aa} 和 H_{bb} 为

$$H_{aa} = \int 1s_a^* \hat{H} 1s_a dv, \quad H_{bb} = \int 1s_b^* \hat{H} 1s_b dv \quad (13.46)$$

其中 H_2^+ 的电子哈密顿算符 $\hat{H}$ 由 (13.32) 给出。我们可以重新标记定积分中的变量, 而不会影响其值。将 $1s_a$ 和 $1s_b$ 中的 a 换为 b , b 换为 a 并不会影响 $\hat{H}$ 的形式 (对于异核双原子分子而言, 情况并非如此)。因此 $H_{aa} = H_{bb}$ 。我们有

$$H_{ab} = \int 1s_a^* \hat{H} 1s_b dv, \quad H_{ba} = \int 1s_b^* \hat{H} 1s_a dv \quad (13.47)$$

因为 $\hat{H}$ 是厄米算符, 且这些积分中的函数都是实函数, 我们得出 $H_{ab} = H_{ba}$ 。积分 H_{ab} 称为**共振 (或键) 积分** (resonance or bond integral)。因为 $1s_a$ 和 $1s_b$ 是归一化且实的, 我们有

$$S_{aa} = \int 1s_a^* 1s_a dv = 1 = S_{bb}$$

$$\boxed{S_{ab} = \int 1s_a^* 1s_b dv = S_{ba}} \quad (13.48)$$

重叠积分 (overlap integral) S_{ab} 的值介于 0 到 1 之间, 随着两核间距的增加而减小。

久期方程 (13.45) 变为

$$\begin{vmatrix} H_{aa} - W & H_{ab} - S_{ab}W \\ H_{ab} - S_{ab}W & H_{aa} - W \end{vmatrix} = 0 \quad (13.49)$$

$$H_{aa} - W = \pm (H_{ab} - S_{ab}W) \quad (13.50)$$

$$W_1 = \frac{H_{aa} + H_{ab}}{1 + S_{ab}}, \quad W_2 = \frac{H_{aa} - H_{ab}}{1 - S_{ab}} \quad (13.51)$$

这两个根是 H_2^+ 基态和第一激发态电子能量的上界。我们将看到 H_{ab} 为负值, 所以 W_1 是较低能级的根。

我们现在计算 (13.43) 中久期方程每个根的系数。由 (8.54) 可得,

$$(H_{aa} - W) c_a + (H_{ab} - S_{ab}W) c_b = 0 \quad (13.52)$$

从 (13.51) 中将 W_1 带入 【或使用 (13.50)】, 得到

$$c_a/c_b = 1 \quad (13.53)$$

$$\phi_1 = c_a (1s_a + 1s_b) \quad (13.54)$$

再通过归一化条件确定 c_a :

$$|c_a|^2 \int (1s_a^2 + 1s_b^2 + 2 \cdot 1s_a 1s_b) dv = 1 \quad (13.55)$$

$$|c_a| = \frac{1}{(2 + 2S_{ab})^{1/2}} \quad (13.56)$$

因此, 对应于能量 W_1 的归一化试探函数为

$$\phi_1 = \frac{1s_a + 1s_b}{\sqrt{2}(1 + S_{ab})^{1/2}} \quad (13.57)$$

对于根 W_2 , 我们有 $c_b = -c_a$, 因此

$$\phi_2 = \frac{1s_a - 1s_b}{\sqrt{2}(1 - S_{ab})^{1/2}} \quad (13.58)$$

方程 (13.57) 和 (13.58) 的导出一点都不令人惊讶。由于原子核相同, 因此当 a 和 b 互换时, 我们希望 $|\phi|^2$ 保持不变; 换言之, 我们预测该键不具有宇称。

现在我们来考虑计算积分 H_{aa} 、 H_{ab} 和 S_{ab} 。由 (13.44) 和 (13.33), S_{ab} 的被积函数为 $1s_a 1s_b = k^3 \pi^{-1} e^{-k(r_a + r_b)} = k^3 \pi^{-1} e^{-kR\xi}$ 。共焦椭圆坐标系中的体积微元为 (Eyring, Walter and Kimball, Appendix III)

$$dv = e^{-kR} (\xi^2 - \eta^2) d\xi d\eta d\phi \quad (13.59)$$

将这些 $1s_a 1s_b$ 和 dv 的表达式带入 S_{ab} 中, 再使用附录中的积分 (A.11) 来计算 ξ 的积分, 得到 (问题 13.16)

$$S_{ab} = e^{-kR} \left(1 + kR + \frac{1}{2} k^2 R^2 \right) \quad (13.60)$$

H_{aa} 和 H_{ab} 的计算留作习题 13.17。结果为

$$H_{aa} = \frac{1}{2} k^2 - k - R^{-1} + e^{-2kR} (k + R^{-1}) \quad (13.61)$$

$$H_{ab} = -\frac{1}{2} k^2 S_{ab} - k(2 - k)(1 + kR) e^{-kR} \quad (13.62)$$

其中的 $\hat{H}$ 由 (13.32) 给出, 忽略了核间排斥势。

将这些积分值带入 (13.51), 我们得到

$$W_{1,2} = -\frac{1}{2} k^2 + \frac{k^2 - k - R^{-1} + R^{-1} (1 + kR) e^{-2kR} \pm k(k - 2)(1 + kR) e^{-kR}}{1 \pm e^{-kR} (1 + kR + k^2 R^2 / 3)} \quad (13.63)$$

其中 $\pm$ 的“+”号对应 W_1 。因为 (13.32) 中的 $\hat{H}$ 忽略了核间排斥势 $1/R$, 所以 W_1 和 W_2 是纯电子能量 E_{el} 的近似, 当需要求出 $U_{1,2}(R)$ 时, 我们必须把 $W_{1,2}(R)$ 与 $1/R$ 相加 【式 (13.8)】。

最后的任务是对几个给定的 R 值, 通过调整参数 k , 使得 $U_1(R)$ 和 $U_2(R)$ 先后取到最小值。这可以通过计算机进行数值计算 (问题 13.19) 或解析求解。结果如下: 当 R 从 ∞ 减少到 0 时, 对

于 $1s_a + 1s_b$ 函数 (13.57), k 几乎单调地从 1 增加到 2; 而对于 $1s_a - 1s_b$ 函数 (13.58), k 几乎单调地从 1 减少到 0.4。因为 $0 < k \leq 2$ 和 $S_{ab} > 0$, 方程 (13.62) 表明积分 H_{ab} 总为负值。因此, (13.51) 中的 W_1 对应于 H_2^+ 的基态电子态 $\sigma_g 1s$ 。对于基态, 我们得出 $k(R_e) = 1.24$ 。

我们可能想问: 当 R 减小到零时, 为什么 $\sigma_u^* 1s$ 态的变分参数 k 趋于 0.4 而不是 2。答案为 H_2^+ 的该状态当 R 趋于零时并不趋于 He^+ 的基态。 $\sigma_u^* 1s$ 态具有奇宇称, 则必须与 He^+ 的某奇态相关联。 He^+ 的最低奇态为 $2p$ 态 (第 11.5 节); 因为 $\sigma_u^* 1s$ 态的电子轨道角动量在轴向 (z) 方向的分量为零, 所以该态必须跃迁至 $m = 0$ 的原子 $2p$ 态, 即 $2p_0 = 2p_z$ 态。

找到了每个根的 $k(R)$ 值后, 可以通过 (13.63) 计算出 W_1 和 W_2 , 将其与 $1/R$ 相加即可得到 $U(R)$ 曲线。计算得到的基态 $U(R)$ 曲线在 2.00 bohrs 处取到最小值 (问题 13.20), 与 R_e 真实值 2.00 bohrs 相符; 最小值为 $U(R_e) = -15.96 \text{ eV}$, 得到 D_e 的预测值为 2.36 eV, 与真实值 2.79 eV 相比较。(若我们不调整 k 的值, 而是直接将其设为 1, 则得到 $R_e = 2.49 \text{ bohrs}$ 和 $D_e = 1.76 \text{ eV}$ 。)

现在考虑 R 处于中间值时 $\sigma_g 1s$ 和 $\sigma_u^* 1s$ 态的试探函数形式。图 13.6 展示了函数 $(1s_a)^2$ 和 $(1s_b)^2$ 的在核间轴上部分点的图象 (另见图 6.7)。对于 $\sigma_g 1s$ 函数 $1s_a + 1s_b$, 如图 13.7 所示, 原子核之间会形成电子概率密度的聚集现象。特别值得注意的是, 原子核之间的电荷积累量大于单纯将各原子电荷密度相加所得的值。如果我们将 $1s_a$ 原子轨道中半个电子的概率密度与 $1s_b$ 原子轨道中半个电子的概率密度相加, 将得到

$$\frac{1}{2} (1s_a^2 + 1s_b^2) \quad (13.64)$$

然而, 在量子力学中, 我们不将孤立的原子概率密度相加。相反地, 我们将波函数相加, 正如 (13.57)




图 13.6: H_2^+ 的原子概率密度。注意原子核处的尖锐峰。




图 13.7: LCAO-MO 函数 $N(1s_a + 1s_b)$ 沿核间轴的概率密度。

所示。因此， H_2^+ 基态概率密度为

$$\phi_1^2 = \frac{1}{2(1+S_{ab})} [1s_a^2 + 1s_b^2 + 2(1s_a 1s_b)] \quad (13.65)$$

(13.65) 和 (13.64) 之间的不同在于

$$\phi_1^2 - \frac{1}{2}(1s_a^2 + 1s_b^2) = \frac{1}{2(1+S_{ab})} [2(1s_a 1s_b) - S_{ab}(1s_a^2 + 1s_b^2)] \quad (13.66)$$

在 (13.60) 中令 $R = 2.00$ 以及 $k = 1.24$ ，我们得到在 R_e 处有 $S_{ab} = 0.46$ 。(人们可能会认为，由于不同原子轨道之间的正交性，重叠积分 S_{ab} 应为零。然而，原子轨道 $1s_a$ 和 $1s_b$ 是不同哈密顿算符的本征函数——一个对应于位于 a 处的氢原子，另一个对应于位于 b 处的氢原子。因此，正交定理不适用。)

现在考虑式 (13.66) 中括号内两个项的相对大小，对于分子轴上的点而言。在原子核 a 左侧，函数 $1s_b$ 非常小；在原子核 b 右侧，函数 $1s_a$ 非常小。因此，在原子核之间的区域之外， $1s_a 1s_b$ 的乘积很小，式 (13.66) 中括号内的第二项占主导地位。这导致在核间区域外，电子密度小于单个原子的密度之和。现在考虑核间区域。在核间轴的中点（以及在与轴垂直且平分轴的平面上的任何位置），我们有 $1s_a = 1s_b$ ，因此式 (13.66) 中的括号项变为 $2(1s_a)^2 - 0.92(1s_a)^2 \approx 1s_a^2$ ，为正值。因此，分子中的原子核之间会形成电荷密度积累，与各原子单独的电荷密度之和相比。这种原子核之间的电子电荷积累使电子能够同时感受到两个原子核的吸引力，从而降低其势能。形成化学键的原子轨道在原子核之间的重叠程度越大，该区域的电荷积累就越显著。

前文的讨论似乎将 H_2^+ 中的键合主要归因于共用电子与两个核相互作用而非一个核所导致的平均电子势能降低。然而，这只是不完整的描述。Feinberg 和 Ruedenberg 对 H_2^+ 的计算表明，由于电子共用导致的电子势能降低与核间排斥势 $1/R$ 处于同一数量级，因此仅凭电子势能降低不足以形成键合。另外两个效应也对键合有所贡献。原子轨道指数的增加（在 R 处 $k = 1.24$ ，而 ∞ 处为 1.0）导致电荷在核附近（以及核间区域）积累，这进一步降低了电子势能。除此以外，核间区域电子的积累使得在分子轴中点附近有 $\partial\psi/\partial z$ 为零。因此与原子的 $\langle T_z \rangle$ 相比，分子的平均电子动能的 z 方向分量【可表示为 $\frac{1}{2} |\partial\psi/\partial z|^2 d\tau$ ；问题 7.7b】更低。（然而，总平均电子动能增加了，见 14.5 节。）详情请见 M. J. Feinberg and K. Ruedenberg, *J. Chem. Phys.*, **54**, 1495 (1971); M. P. Melrose et al., *Theor. Chim. Acta*, **88**, 311 (1994); see also K. Ruedenberg and M. W. Schmidt, *J. Phys. Chem. A*, **113**, 1954 (2009); *J. Comput. Chem.*, **28**, 391 (2007)。

然而，Bader 对 Feinberg 和 Ruedenberg 的观点提出了批评。Bader 指出（其中包括其他几点）， H_2^+ 和 H_2 是非典型的，而且与 H_2 和 H_2^+ 分子形成过程中核周围电荷密度增加的情况不同，涉及除氢原子以外的其他原子的分子形成通常伴随着核周围电荷密度的显著降低。见 R. F. W. Bader in *The Force Concept in Chemistry*, B. M. Deb, ed., Van Nostrand Reinhold, 1981, pp. 65–67, 71, 95–100, 113–115。在确定共价键的起源之前，还需要进一步的研究。




图 13.8: LCAO-MO 函数 $N'(1s_a - 1s_b)$ 沿核间轴的概率密度。

σ_u^*1s 的试探函数 $1s_a - 1s_b$ 正比于 $e^{-kr_a} - e^{-kr_b}$ 。在与核间轴垂直且通过两个核中点的平面上, $r_a = r_b$, 所以该平面是 σ_u^*1s 函数的节面。对于这种状态, 我们没有观察到核间电荷的积累, 而且 $U(R)$ 曲线也没有最小值。我们称 σ_g1s 轨道为**成键**(bonding)而 σ_u^*1s 轨道为**反键**(antibonding)。(见图13.8。)

将电子坐标对垂直于核间轴且通过核中点的 σ_h 反映面进行反映操作, 将核从 r_a 转换到 r_b , r_b 转换到 r_a 而 ϕ 无变化【式 (13.79)】。则算符 $\hat{O}_{\sigma_h}$ (第12.1节) 与电子哈密顿算符 (13.32) 可对易, 也与宇称 (反演) 算符可对易。因此, 我们选择-1 波函数为该反映算符和宇称算符的本征函数。由于该反映算符的平方为单位算符, 则其本征值一定为 +1 和 -1 (第7.5节)。对于对该平面反映时波函数符号发生变化的 H_2^+ 态 (本征值为 -1), 其对应的波函数在指定 λ 的字母上方以星号标注。而对该平面反映时波函数保持不变的态则不加星号。由于该反射方向下特征值为 -1 的轨道具有核间节面, 因此带星号的轨道为反键轨道。

与其使用图形, 我们可以通过绘制轨道等高线图 (第6.7节) 来表示; 参见图13.9。




图 13.9: 由这些图形绕 z 轴旋转形成的。注意反键轨道等高线与 $2p_z$ 轨道等高线的相似性。

有时, H_2^+ 分子的结合能被归因于共振积分 H_{ab} , 因为在我们给出的近似处理中, 它提供了大部分结合能。这种观点是误导性的。在第13.4节的精确处理中, 并未出现这样的共振积分。共振积分仅源于我们所使用的原子轨道线性组合近似法的本质。

综上所述, 从原子轨道 $1s_a$ 和 $1s_b$ 出发, 我们构建了两个 H_2^+ 分子轨道 (13.57) 和 (13.58), 一个为成键轨道, 另一个则是反键轨道。分子轨道的能量由 (13.51) 给出, 为

$$W_{1,2} = H_{aa} \pm \frac{H_{ab} - H_{aa}S_{ab}}{1 \pm S_{ab}} \quad (13.67)$$

其中 $H_{aa} = \langle 1s_a | \hat{H} | 1s_a \rangle$, $\hat{H}$ 为 H_2^+ 的纯电子哈密顿算符。若电子的波函数在分子中为 $1s_a$, 则积分 H_{aa} 为分子的纯电子能量。从某种意义上说, H_{aa} 是分子中 $1s_a$ 轨道的能量。在极限 $R = \infty$ 中, H_{aa} 变为了氢原子中 $1s$ 原子轨道的能量。在分子中, H_{aa} 远低于氢原子的电子能量, 因为电子同时被两个原子核所吸引。图13.22给出了从原子轨道形成分子轨道的示意图。为了得到包含核间排斥势的电子能量 $U(R)$, 我们必须将 $1/R$ 加到 (13.67) 中。

问题 13.21 介绍了如何使用 Mathcad 创建展示 H_2^+ 的 LCAO-MO (ϕ_1 和 ϕ_2) 等高线随着 R 的变化而变化的图形。

我们根据氢原子在解离时的状态描述了最低的两个 H_2^+ 电子态。即**分离原子描述** (separated-atoms description)。或者, 我们可以使用原子在核间距离趋于零时形成的状态。即**联合原子描述** (united-atom description)。可以看到, H_2^+ 联合原子的最低两个电子态为 He^+ 的 $1s$ 和 $2p_0$ 态。联合原子符号位于 λ 符号的左侧。因此, σ_g1s 态的联合原子符号为 $1s\sigma_g$ 。 σ_u^*1s 态的联合原子符号为 $2p_0\sigma_u^*$ 。没必要将该态写作 $2p_0\sigma_u^*$, 因为它是 σ 态的事实告诉我们它与联合原子 $2p_0$ 态相关联。对于

联合原子描述，下标 g 和 u 是不需要的，因为与 s 、 d 、 g 等原子态相关的分子态必须是 g ，而与 p 、 f 、 h 等原子态相关的分子态必须是 u 。从分离原子态中，我们无法判断分子波函数是 g 还是 u 。因此，从 $1s$ 分离原子态中，我们为 H_2^+ 构造了 g 和 u 两种函数。

在构建 H_2^+ 其他状态的近似分子轨道之前，我们先考虑如何改进试探函数 (13.57)。从微扰理论的角度来看，(13.57) 是零级校正波函数。我们知道，分子形成的微扰会使其他氢原子能级（除了 $1s$ 能级）也参与其中。Dickinson 于 1933 年使用了包含部分 $2p_0$ 特征的试探函数（因为 H_2^+ 基态为 σ 态，掺入 $2p_{\pm 1}$ 函数是错误的）；他取了

$$\phi = [1s_a + c(2p_0)_a] + [1s_b + c(2p_0)_b] \quad (13.68)$$

其中 c 是变分参数，以及 (表 6.2)

$$1s_a = k^{3/2} \pi^{-1/2} e^{-kr_a}, \quad (2p_0)_a = (2p_z)_a = \frac{\beta^{5/2}}{4(2\pi)^{1/2}} r_a e^{-\beta r_a/2} \cos \theta_a$$

k 和 β 是另外两个变分参数。 $1s_b$ 和 $(2p_0)_b$ 的表达式类似。角度 θ_a 和 θ_b 是两组球坐标，每个原子核对应一组；见图 13.10。 θ_a 和 θ_b 的定义对应于在原子 a 上使用右手坐标系，而在原子 b 上使用左手坐标系。系数 c 在 R 趋于零或无穷大时趋于零。




图 13.10: 同核双原子分子的坐标系。

在同一个原子中混合两个或更多原子轨道称为**杂化** (hybridization)。函数 $1s + c2p_0$ 为杂化原子轨道。由于 $2p_0$ 函数在一个半球中为正，在另一个半球中为负，因此引入 $2p_0$ 会导致原子核之间产生额外的电荷积累，从而产生更大的结合能。杂化使 $1s_a$ 和 $1s_b$ 原子轨道在形成分子过程中发生极化。函数 (13.68) 给出了最小值位于 2.01 bohrs 的 $U(R)$ 曲线。在该距离下，变分参数的值分别为 $k = 1.246$, $\beta = 2.965$, $c = 0.138$ 【F. Weinhold, *J. Chem. Phys.*, **54**, 530 (1971)】。 D_e 的计算值为 2.73 eV，与真实值 2.79 eV 非常接近。

H_2^+ 的量子力学与光谱学在 C. A. Leach and R. E. Moss, *Annu. Rev. Phys. Chem.*, **46**, 55 (1995) 中进行了综述。

最后一点。本章中给出的近似波函数均以原子单位表示。当将这些函数转换为普通单位时，必须记住波函数并非无量纲。单电子波函数 ψ 的单位为 长度^{-3/2} (第 3.5 节)。在函数 (13.57) 和 (13.58) 中出现的原子轨道 $1s_a$ 和 $1s_b$ 由 (13.44) 在原子单位制下给出。在普通单位制中， $1s_a = (k/a_0)^{3/2} \pi^{-1/2} e^{-kr_a/a_0}$ 。

13.6 H_2^+ 离子激发态的分子轨道

在前一节中，我们使用函数 (13.57) 和 (13.58) 近似描述了 H_2^+ 最低两个电子态。现在我们构造近似函数以描述更高的激发态，从而建立一组类 H_2^+ 分子轨道。我们将利用这些分子轨道定性地讨

论双原子多电子分子，正如我们利用类氢轨道讨论多电子原子一样。

为了获得对更高 H_2^+ 分子轨道的近似，我们使用线性变分函数法。我们发现，将 H_2^+ 的变分函数表示为氢原子轨道函数的线性组合是自然而然的，从而得到了原子轨道线性组合的分子轨道。为了获得更高能级状态的分子轨道，我们在线性组合中加入更多的原子轨道。因此，为了获得 H_2^+ 最低六个 σ 态的近似波函数，我们使用每个原子上三个最低阶的 $m = 0$ 类氢函数的线性组合：

$$\phi = c_1 1s_a + c_2 2s_a + c_3 (2p_0)_a + c_4 1s_b + c_5 2s_b + c_6 (2p_0)_b$$

如前一节对函数 (13.43) 所示，同核双原子分子的对称性使得原子 b 轨道系数等于原子 a 轨道系数的 ± 1 倍：

$$\phi = [c_1 1s_a + c_2 2s_a + c_3 (2p_0)_a] \pm [c_1 1s_b + c_2 2s_b + c_3 (2p_0)_b] \quad (13.69)$$

其中的“+”号对应于 g 态。

考虑式 (13.69) 中系数的相对大小。对于分解为 $1s$ 氢原子的两个电子态，我们预期 c_1 将远大于 c_2 或 c_3 ，因为 c_2 和 c_3 在 R 趋于无穷大时会消失。因此，Dickinson 函数 (13.68) 在 R_e 处的 $2p_0$ 系数等于 $1s$ 系数的七分之一（该函数不包含 $2s$ 项，但若包含，其系数与 $1s$ 系数相比将很小）。作为第一近似，我们因此将 c_2 和 c_3 设为零，取

$$\phi = c_1 (1s_a \pm 1s_b) \quad (13.70)$$

为这两个状态的近似波函数（正如我们已经做过的那样）。从微扰理论的角度来看，如果我们将分离的原子视为无扰问题，那么式 (13.70) 中的函数就是零级校正波函数。

对于两个分离成 $2s$ 氢原子的状态，相同的论证给出了它们的近似波函数

$$\phi = c_2 (2s_a \pm 2s_b) \quad (13.71)$$

因为对这些状态而言， c_1 和 c_3 很小。(13.71) 仅是对我们通过线性变分处理所能获得结果的近似。要找到这两个 H_2^+ 态能量的严格上界，我们必须使用试探函数(13.69)并求解相应的久期方程(8.58)(或使用矩阵代数——第8.6节)。


总的来说，我们有两个与每个分离原子态相关联的 H_2^+ 状态，以及对这两个态波函数的粗略近似——原子轨道线性组合函数 $f_a + f_b$ 和 $f_a - f_b$ ，其中 f 为类氢波函数。函数 (13.70) 给出了 $\sigma_g 1s$ 和 $\sigma_u^* 1s$ 态。同样地，函数 (13.71) 给出了 $\sigma_g 2s$ 和 $\sigma_u^* 2s$ 态。这些轨道的外轮廓线与由 $1s$ 原子轨道构成的对应分子轨道的轮廓线相似。然而，由于 $2s$ 原子轨道具有球节面而 $1s$ 没有，因此每个分子轨道比对应于 $\sigma_g 1s$ 和 $\sigma_u^* 1s$ 的分子轨道多一个节面。

接下来是给出了 σ_{2p} 和 $\sigma_u^* 2p$ 分子轨道的组合（图13.11）

$$(2p_0)_a \pm (2p_0)_b = (2p_z)_a \pm (2p_z)_b \quad (13.72)$$

这些是 σ 分子轨道，尽管它们与 $2p$ 分离原子轨道相关联，因为它们满足 $m = 0$ 。

前面的讨论过于简化了。对于氢原子， $2s$ 和 $2p$ 轨道是简并的，则我们可以预测 H_2^+ 的 $\sigma_g 2s$ 、 $\sigma_u^* 2s$ 、 $\sigma_u 2p$ 和 $\sigma_u^* 2p$ 对应的零级校正波函数都是 $2s$ 和 $2p$ 原子轨道的混合而不是只包含 $2s$ 或 $2p$ 。【在极限 $R \rightarrow \infty$ 时， H_2^+ 由一个受远距离质子产生的基本均匀电场微扰的氢原子构成。问题 9.23 表明，在 z 方向上均匀电场中，与 H 原子的 $n = 2$ 能级对应的零级校正函数为 $2^{-1/2} (2s + 2p_0)$ 、 $2^{-1/2} (2s - 2p_0)$ 、 $2p_1$ 和 $2p_{-1}$ 。因此，对于 H_2^+ ，(13.71) 和 (13.72) 中的 $2s$ 和 $2p_0$ 应替换为 $2s + 2p_0$ 和 $2s - 2p_0$ 。】对于分解成多电子原子的分子，分离后原子的 $2s$ 和 $2p$ 原子轨道并非简并，但它们的能量非常接近。因此，波函数的一级校正将使 σ_{2p} 分子轨道中混入大量 $2s$ 轨道特征，而 σ_{2s} 分子轨道中则混入大量 $2p$ 轨道特征。因此，将分子轨道标记为 σ_{2s} 或 σ_{2p} 时，不应过于字面化。对于 H_2^+ 和 H_2 ，分子轨道的联合原子描述相对于分离原子描述，前者更可取，但我们主要使用后者。



由 $2p_z$ 原子轨道形成 $\sigma_g 2p$ 和 $\sigma_u^* 2p$ 分子轨道示意图。虚线表示节面。等高线上的符号表示波函数的符号。等高线关于 z 轴对称。(由于 $2s-2p$ 轨道之间存在显著的杂化作用, 这些等高线并非真实分子轨道形状的准确表示。如需准确的等高线, 请参阅图13.20。)

对于其他两个 $2p$ 原子轨道, 我们可是用复轨道 $2p_{+1}$ 和 $2p_{-1}$, 也可使用真是函数 $2p_x$ 和 $2p_y$ 。如果我们希望分子轨道是 $\hat{L}_z$ 的本征函数, 则可以选择复 p 轨道, 得到分子轨道为

$$(2p_{+1})_a + (2p_{+1})_b \quad (13.73)$$

$$(2p_{+1})_a - (2p_{+1})_b \quad (13.74)$$

$$(2p_{-1})_a + (2p_{-1})_b \quad (13.75)$$

$$(2p_{-1})_a - (2p_{-1})_b \quad (13.76)$$

因为 $\phi_a = \phi_b = \phi$, 所以由 (6.114), 我们有

$$(2p_{+1})_a + (2p_{+1})_b = \frac{1}{8}\pi^{-1/2} (r_a e^{-r_a/2} \sin \theta_a + r_b e^{-r_b/2} \sin \theta_b) e^{i\phi} \quad (13.77)$$

因为 $\lambda = |m| = 1$, 所以这是一个 π 轨道。反演操作相当于坐标变换 (图13.12)

$$r_a \rightarrow r_b, \quad r_b \rightarrow r_a, \quad \phi \rightarrow \phi + \pi \quad (13.78)$$

我们有 $e^{i(\phi+\pi)} = (\cos \pi + i \sin \pi) e^{i\phi} = -e^{i\phi}$ 。由图13.12可见, 反演操作将 θ_a 变为 θ_b , 反之亦然。因此, 反演将 (13.77) 转换为其负值, 这意味着它是 u 轨道。对与轴垂直且通过两核连线中点的平面进行反映, 会导致以下变换 (问题 13.24):

$$r_a \rightarrow r_b, \quad r_b \rightarrow r_a, \quad \phi \rightarrow \phi, \quad \theta_a \rightarrow \theta_b, \quad \theta_b \rightarrow \theta_a \quad (13.79)$$

变换后 (13.77) 保持不变, 因此, 我们有一个未被占据 (成键) 的轨道。(13.77) 的描述为 $\pi_u 2p_{+1}$ 。

函数 (13.77) 为复函数。取其绝对值, 我们可以绘制概率密度恒定的轨道轮廓 (第6.7节)。因为 $|e^{i\phi}| = 1$, 所以概率密度与 ϕ 无关, 得到关于 z 轴 (核间轴) 对称的概率密度。图13.13显示了该轨道在包含核的平面上的截面图。绕 z 轴旋转该图, 可以得到其三维形状, 形成一种类似于肥厚甜甜圈的结构。

分子轨道 (13.75) 与 (13.77) 唯一的不同的是 $e^{i\phi}$ 被 $e^{-i\phi}$ 所取代, 因此为 $\pi_u 2p_{-1}$ 轨道。 ϕ 坐标在哈密顿算符中体现为 $\partial^2/\partial\phi^2$ 。因为 $\partial^2 e^{i\phi}/\partial\phi^2 = \partial^2 e^{-i\phi}/\partial\phi^2$, 所以状态 (13.73) 和 (13.75) 具有相




图 13.12: H_2^+ 电子坐标反演示意图, $r'_a = r_b$, $r'_b = r_a$, $\phi' = \phi + \pi$ 。

同的能量。它们是简并的。回忆 (第13.4节), $\lambda = 1$ 的能级为双重简并的, 对应于 $m = \pm 1$ 。因为 $|e^{i\phi}| = |e^{-i\phi}|$, 所以 $\pi_u 2p_{+1}$ 和 $\pi_u 2p_{-1}$ 轨道具有相同的形状, 正如 $2p_{+1}$ 和 $2p_{-1}$ 原子轨道有相同形状。

函数 (13.74) 和 (13.76) 分别为 $\pi_g^* 2p_{+1}$ 和 $\pi_g^* 2p_{-1}$ 分子轨道。这些函数不会在核间产生电荷积累, 参见图13.14。

现在考虑更常见的替代方法, 即使用 $2p_x$ 和 $2p_y$ 原子轨道来构建分子轨道。线性组合

$$(2p_x)_a + (2p_x)_b \quad (13.80)$$

给出了 $\pi_u 2p_x$ 分子轨道 (图13.15)。该分子轨道不具有核间轴对称性, 而是在 yOz 平面上下两个区域中构建概率密度, 其中 yOz 平面是该函数的节面。波函数在该平面的两侧符号相反。线性组合


$$(2p_x)_a - (2p_x)_b \quad (13.81)$$

给出了 $\pi_g^* 2p_x$ 分子轨道 (图13.15)。由于 $2p_y$ 函数与 $2p_x$ 函数唯一的不同仅为绕核间轴旋转了 90° , 因此它们得到的分子轨道与图13.15中的分子轨道相比, 绕 z 轴旋转了 90° 。线性组合

$$(2p_y)_a + (2p_y)_b \quad (13.82)$$

$$(2p_y)_a - (2p_y)_b \quad (13.83)$$

给出了 $\pi_u 2p_y$ 和 $\pi_g^* 2p_y$ 分子轨道。轨道 (13.80) 和 (13.82) 能量相同; 而 (13.81) 和 (13.83) 能量也相同。(注意 $g \pi 2p$ 轨道为反键轨道, 而 $u \pi 2p$ 轨道为成键轨道。)



$\pi_u 2p_{+1}$ (或 $\pi_u 2p_{-1}$) 分子轨道的截面图。要获得图 13.13: 三维轮廓表面, 请绕 z 轴旋转该图形。 z 轴为该分子的节线 (与 $2p_{+1}$ 的原子轨道一致)。




图 13.14: $\pi_g^* 2p_{+1}$ (或 $\pi_g^* 2p_{-1}$) 分子轨道的截面图。要获得三维轮廓表面, 请绕 z 轴旋转该图形。 z 轴和 xOy 平面为节面。




图 13.15: $\pi_u 2p_x$ 和 $\pi_g^* 2p_x$ 分子轨道的形成。因为在 xOz 平面中 $\phi = 0$, 所以这些分子轨道在 xOz 平面给上的节面与对应 $\pi_u 2p_{+1}$ 和 $\pi_g^* 2p_{+1}$ 轨道节面一致。然而, $\pi 2p_x$ 轨道不关于 z 轴对称。实际上, 它们由节点 yOz 平面上方和下方的概率密度团块组成。

与 $2p_x$ 和 $2p_y$ 原子轨道是 $2p_{+1}$ 和 $2p_{-1}$ 的线性组合一致【式 (6.118) 和 (6.120)】, 分子轨道 $\pi_u 2p_x$ 和 $\pi_u 2p_y$ 是 $\pi_u 2p_{+1}$ 和 $\pi_u 2p_{-1}$ 的线性组合。我们可以使用简并能级本征函数的任意线性组合, 仍然得到一个能量本征函数。与原子轨道 $2p_{+1}$ 和 $2p_{-1}$ 是 $\hat{L}_z$ 的本征函数而 $2p_x$ 和 $2p_y$ 不是一致, $\pi_u 2p_{+1}$ 和 $\pi_u 2p_{-1}$ 是 $\hat{L}_z$ 的本征函数而 $\pi_u 2p_x$ 和 $\pi_u 2p_y$ 不是。对于 H_2^+ 的 $\pi_u 2p$ 能级, 我们可以使用实分子轨道对 (13.80) 和 (13.82), 或复分子轨道对 (13.73) 和 (13.75), 或这些函数的任意两个线性无关的线性组合。

我们已经表明了 H_2^+ 分子轨道与分离原子原子轨道之间的关系。我们也可说明它们与联合原子原子轨道之间的关系。随着 R 趋于零, 分子轨道 $\sigma_u^* 1s$ (图13.9) 越来越类似于与其关联的 $2p_z$ 原子轨道。同样地, $\pi_u 2p$ 分子轨道与 p 联合原子态相关, 而 $\pi_g^* 2p$ 分子轨道与 d 联合原子态相关。

H_2^+ 分子轨道的在线模拟可在www.falstad.com/qmomo上进行; 核间距可调整。

13.7 同核双原子分子的分子轨道构型

现在, 我们使用上一节导出的 H_2^+ 分子轨道来讨论多电子同核双原子分子。【同核 (homonuclear) 意为两个原子核相同; 异核 (heteronuclear) 意为两个原子核不同。】若我们忽略核间排斥势, 则零级校正波函数为类 H_2^+ 单电子自旋轨道的斯莱特行列式。我们使用上一节中原子轨道线性组合构建

的分子轨道 (LCAO-MO) 来近似 H_2^+ 自旋轨道的空间部分。

分子轨道的大小和能量会随着每个分子中核间距的变化而变化, 并且不同分子之间也会发生变化。因此, 我们看到了 H_2^+ 试探函数 (13.54) 中的轨道指数 k 是如何随着 R 的变化而变化的。随着分子核电荷数的增加, $\sigma_g 1s$ 分子轨道的参数 k 增加, 给出更紧凑的分子轨道。我们希望考虑分子轨道能级的顺序。由于这些能量随 R 的变化以及分子之间的差异, 会出现大量能级交叉, 与原子轨道能量的情况类似 (图 11.2)。因此, 我们无法给出一个确定的顺序。然而, 以下是随着我们在元素周期表中横向移动时, 分子轨道填充的顺序:

$$\sigma_g 1s < \sigma_u^* 1s < \sigma_g 2s < \sigma_u^* 2s < \pi_u 2p_x = \pi_u 2p_y < \sigma_g 2p < \pi_g^* 2p_x = \pi_g^* 2p_y < \sigma_u^* 2p$$

每个成键轨道填充完毕后, 相应的反键轨道才会被填充。 $\pi_u 2p$ 轨道与 $\sigma_g 2p$ 轨道能量接近, 并且以前认为 $\sigma_g 2p$ 分子轨道首先被填充。

分离原子描述	联合原子描述	按对称性编号
$\sigma_g 1s$	$1s\sigma_g$	$1\sigma_g$
$\sigma_u^* 1s$	$2p\sigma_u^*$	$1\sigma_u$
$\sigma_g 2s$	$2s\sigma_g$	$2\sigma_g$
$\sigma_u^* 2s$	$3p\sigma_u^*$	$2\sigma_u$
$\pi_u 2p$	$2p\pi_u$	$1\pi_u$
$\sigma_g 2p$	$3s\sigma_g$	$3\sigma_g$
$\pi_g^* 2p$	$3d\pi_g^*$	$1\pi_g$
$\sigma_u^* 2p$	$4p\sigma_u^*$	$3\sigma_u$

表 13.1: 同核双原子分子的分子轨道命名法

除了分离原子描述以外, 还有其他指定这些分子轨道的方法; 见表 13.1。该表的第二列给出了联合原子描述。第三列的命名法使用 $1\sigma_g$ 来表示能量最低的 σ_g 分子轨道, $2\sigma_g$ 表示下一个 σ_g 分子轨道, 以此类推。

图 13.16 展示了这些分子轨道与分离原子和联合原子的原子轨道之间的对应关系。由于不同分子中分子轨道的能量存在差异, 该图并非定量关系。(此处“相关性”一词用于表示对应关系, 其含义与“电子相关”一词中的含义不同。)

回忆 (问题 7.29 以及图 6.13) 联合原子轨道 $s, d, g, \dots$ 为偶函数, 因此与偶 (gerade, g) 分子轨道相关联; 而 $p, f, h, \dots$ 为奇函数, 因此与奇 (ungerade, u) 分子轨道相关联。

绘制轨道关联图时的一个有用原则是不相交定则 (noncrossing rule), 该规则指出: 在多电子双原子分子的分子轨道关联图中, 具有相同对称性的分子轨道能量不能相交。对于双原子分子轨道, 对称性指的是轨道是 g 型还是 u 型, 以及它是 σ 型、 π 型、 δ 型等。例如, 两个 σ_g 型分子轨道在关联图上不能相交。根据非相交规则, 我们得出结论: 给定对称性类型的最低分子轨道必须与该对称性类型的最低联合原子原子轨道相关联, 对于更高轨道也是如此。【对于多电子双原子分子的不同电子态, 势能曲线 $U(R)$ 也遵循类似的不相交定则。】不相交定则的证明稍显微妙; 详见 C. A. Mead, *J. Chem. Phys.*, **70**, 2276 (1979)。

正如我们通过填充原子轨道来讨论原子, 从而得到如 $1s^2 2s$ 之类的原子电子组态, 我们也将通过填充分子轨道来讨论同核双原子分子, 从而得到分子电子组态例如 $(\sigma_g 1s)^2 (\sigma_u^* 1s)^2$ 。(请记住: 对于单个原子组态, 存在一组相关的谱项、能级和状态; 分子组态也是如此; 见第 13.8 节。)




图 13.16: 同核双原子分子轨道的相关性图。(该图对 H_2^+ 不成立。) 虚线垂直线对应于分子轨道填充的顺序。

图13.17展示了从 $1s$ 、 $2s$ 和 $2p$ 原子轨道构建的分子轨道。




图 13.17: 从 $1s$ 、 $2s$ 和 $2p$ 原子轨道构建的分子轨道。

对于 H_2^+ ，我们有形成单电子键的基态组态 $\sigma_g 1s$ 。对于激发态，电子处于较高的分子轨道之一。

对于 H_2 ，我们将两个自旋相反的电子填入 $\sigma_g 1s$ 轨道，得到基态组态 $(\sigma_g 1s)^2$ 。两个成键电子形成一根单键。基态解离能 D_e 为 4.75 eV。

再来考虑 He_2 。两个电子填入 $\sigma_g 1s$ 分子轨道。另两个填入下一个分子轨道 $\sigma_u^* 1s$ 。基态组态为 $(\sigma_g 1s)^2 (\sigma_u^* 1s)^2$ 。具有两个成键电子和两个反键电子，我们预期的净结果为不会成键，这与氦的基态电子能级在势能曲线上没有显著的能量最低值这一事实相一致。然而，若一个电子从反键 $\sigma_u^* 1s$ 分子轨道被激发到更高的成键轨道，则整个分子将具有三个成键电子，只有一个反键电子。因此，我们预测 He_2 具有束缚激发态，每个这种状态在 $U(R)$ 曲线上都有一个显著的能量最低值。事实上，在

气体放电管中已通过光谱学方法观测到约二十余种 He_2 的束缚激发态。当然，此类激发态会衰变至基态，随后分子发生解离。

两个 $1s^2$ 的He原子之间排斥力主要来自于自旋平行的电子之间的泡利斥力（第10.3节）。每个氦原子都有一对自旋相反的电子，每对电子都倾向于排斥另一对电子，使其不能占据同一空间区域。

将一个反键电子从 He_2 中移出，得到了 He_2^+ 离子，其基态组态为 $(\sigma_g 1s)^2 (\sigma_u^* 1s)$ 且具有一个净成键电子。该分子的基态性质与 H_2^+ 的基态性质非常接近，详见本节后面的表13.2。

Li_2 的基态组态为 $(\sigma_g 1s)^2 (\sigma_u^* 1s)^2 (\sigma_g 2s)^2$ ，且具有两个净成键电子，因此得出了该分子包含一根Li-Li单键的描述。实验表明， Li_2 是一种稳定物质。在 Li_2 中， $1s$ 原子轨道的轨道指数显著高于 H_2^+ 或 H_2 中对应的轨道指数，因为核电荷从1升高到了3。这使得 $1s_a$ 和 $1s_b$ 的原子轨道更接近相应的原子核。因此，这两个原子轨道之间只有非常微小的重叠，对这些轨道而言，积分 S_{ab} 和 H_{ab} 都非常小。因此， Li_2 的 $\sigma_g 1s$ 和 $\sigma_u^* 1s$ 分子轨道能量几乎相等，且等于一个Li原子的 $1s$ 轨道能量。（对于非常小的 R 值，原子轨道 $1s_a$ 和 $1s_b$ 的重叠程度相当显著，但它们能量显著不同。） Li_2 的基态组态通常写为 $KK(\sigma_g 2s)^2$ ，表明分子形成时内层轨道能量的微小变化，这与化学家通常认为的仅涉及价电子的键合概念一致。 Li_2 中 $2s$ 原子轨道的轨道系数不超过1，因为这些电子被原子核附近的 $1s$ 电子屏蔽了。

Be_2 的基态组态为 $KK(\sigma_g 2s)^2 (\sigma_u^* 2s)^2$ ，不具有净成键电子。

B_2 的基态组态为 $KK(\sigma_g 2s)^2 (\sigma_u^* 2s)^2 (\pi_u 2p)^2$ 有两个净成键电子，表明其基态可以稳定存在，与实验相符。成键电子为 π 电子，这与单键总是 σ 键的观点相矛盾。我们有两个简并的 $\pi_u 2p$ 分子轨道。回忆当我们遇到如 $1s^2 2s^2 2p^2$ 原子组态时，我们获得了几个光谱项，这是由不同能量之间的电子间排斥势产生的。我们发现，总自旋角动量最大的谱项通常是最低的（洪特规则）。根据上述 B_2 的分子结构，我们还得到了一系列谱项。因为最低（ σ ）的分子轨道全满，它们的电子必须成对且对总角动量无贡献。若两个 $\pi_u 2p$ 电子都处于同一分子轨道中（例如，都在 $\pi_u 2p_{+1}$ 中），它们的自旋必须成对（自旋相反），则分子总电子角动量为零。然而，若一个电子处于 $\pi_u 2p_{+1}$ 中，另一个电子处于 $\pi_u 2p_{-1}$ 中，则两个电子可以自旋平行，净角动量则为1；根据洪特规则，该谱项将为能量最低的谱项， B_2 的基态谱项的自旋多重度为 $2S + 1 = 3$ 。对低温下固态氖中捕获的 B_2 的电子自旋共振光谱进行的调查表明， B_2 的基态谱项是三重态， $S = 1$ 。【L. B. Knight et al., *J. Am. Chem. Soc.*, **109**, 3521 (1987).】

C_2 的基态组态为 $KK(\sigma_g 2s)^2 (\sigma_u^* 2s)^2 (\pi_u 2p)^4$ ，具有四个净成键电子且形成一个具有双键的稳定基态。如前所述， $\pi_u 2p$ 和 $\sigma_g 2p$ 分子轨道能量接近。 C_2 组态 $KK(\sigma_g 2s)^2 (\sigma_u^* 2s)^2 (\pi_u 2p)^3 (\sigma_g 2p)$ 对应的三重谱项能量只比基态 $(\pi_u 2p)^4$ 单重态谱项高0.99 eV。

N_2 基态组态为 $KK(\sigma_g 2s)^2 (\sigma_u^* 2s)^2 (\pi_u 2p)^4 (\sigma_g 2p)^2$ ，具有六个净成键电子，形成一根叁键。与路易斯结构式 $\text{N} \equiv \text{N}$ 一致。

O_2 基态组态为

$$KK(\sigma_g 2s)^2 (\sigma_u^* 2s)^2 (\sigma_g 2p)^2 (\pi_u 2p)^4 (\pi_g^* 2p)^2$$

光谱学证据表明，在 O_2 和 F_2 中，分子轨道 $\sigma_g 2p$ 的能量比 $\pi_u 2p$ 更低。四个净成键电子形成一根双键。 $\pi_g^* 2p_x$ 和 $\pi_g^* 2p_y$ 分子轨道的能量相同，通过将自旋平行的电子填入这些轨道，我们得到了一个三重谱项。根据洪特规则，该谱项为能量最低的谱项。对 O_2 顺磁性的这一解释是分子轨道理论早期的重要成果之一。

F_2 的基态组态为 $\dots (\pi_g^* 2p)^4$ ，形成一根单键。

Ne_2 组态 $\dots (\pi_g^* 2p)^4 (\sigma_u^* 2p)^2$ 不具有净成键电子，不形成化学键。

我们可以进一步描述由下一周期原子所形成的同核双原子分子。 Na_2 的最低电子组态为 $KKLL(\sigma_g 3s)^2$ 。然而，与前一周期对应的分子相比，它们存在一些差异。 Al_2 的基态谱项为 $\dots (\sigma_g 3p)(\pi_u 3p)$

组态的三重态谱项，只比 $\dots(\pi_u 3p)^2$ 组态的三重态谱项能量低 0.02 eV 【C. W. Bauschlicher et al., *J. Chem. Phys.*, **86**, 7007 (1987)】。Si₂ 的基态谱项为 $\dots(\sigma_g 3p)^2(\pi_u 3p)^2$ 组态的三重态谱项，只比 $\dots(\sigma_g 3p)(\pi_u 3p)^3$ 组态的三重态谱项低 0.08 eV 【T. N. Kitsopolous et al., *J. Chem. Phys.*, **95**, 1441 (1991)】。

表13.2列出了某些同核双原子分子基态电子态的 D_e 、 R_e 以及 $\tilde{\nu}_e \equiv \nu_e/c$ 的值，其中 ν_e 为简谐振动频率 (13.27)。(在研究文献中， $\tilde{\nu}_e$ 写为 ω_e 。) 该表也列出了键级，即成键电子数与反键电子数之差的一半。【关于计算键级各种方法的综述，见 J. J. Jules and J. R. Lombardi, *THEOCHEM*, **664-665**, 255 (2003); see also J. F. Gonthier et al., *Chem. Soc. Rev.*, **41**, 4671 (2012).】随着键级的增加， D_e 和 $\tilde{\nu}_e$ 倾向于增加，而 R_e 减小。(H₂ 的高 ν_e 值是由于其较小的约化质量 μ_o 。) 该表中的谱项符号将在下一节中进行解释。

分子	基态谱项	键级	D_e/eV	$R_e/\text{\AA}$	$\tilde{\nu}_e/\text{cm}^{-1}$
H ₂ ⁺	$^2\Sigma_g^+$	$\frac{1}{2}$	2.79	1.06	2332
H ₂	$^1\Sigma_g^+$	1	4.75	0.741	4403
He ₂ ⁺	$^2\Sigma_u^+$	$\frac{1}{2}$	2.5	1.08	1698
He ₂	$^1\Sigma_g^+$	0	0.0009	2.97	33
Li ₂	$^1\Sigma_g^+$	1	1.07	2.67	361
Be ₂	$^1\Sigma_g^+$	0	0.115	2.45	276
B ₂	$^3\Sigma_g^-$	1	3.1	1.59	1051
C ₂	$^1\Sigma_g^+$	2	6.3	1.24	1855
N ₂ ⁺	$^2\Sigma_g^+$	$2\frac{1}{2}$	8.85	1.12	2207
N ₂	$^1\Sigma_g^+$	3	9.91	1.10	2358
O ₂ ⁺	$^2\Pi_g$	$2\frac{1}{2}$	6.78	1.12	1905
O ₂	$^3\Sigma_g^-$	2	5.12	1.21	1580
F ₂	$^1\Sigma_g^+$	1	1.66	1.41	917
Ne ₂	$^1\Sigma_g^+$	0	0.0036	3.1	14

表 13.2: 同核双原子分子基态电子态性质

成键分子轨道在核间产生电荷积累，而反键分子轨道电荷减少。因此，从成键分子轨道中移去电子通常减小 D_e 值，而从反键分子轨道中移去电子通常增大 D_e 值。(注意，随着图13.16中 R 的增加，成键分子轨道的能量下降，而反键分子轨道的能量上升。) 例如，N₂ 中的最高满占分子轨道为成键轨道，表13.2表明从N₂ 基态跃迁到N₂⁺ 基态时，分子解离能降低 (键长增加)。相反地，O₂ 中的最高满占分子轨道为反键轨道，O₂ 基态跃迁到O₂⁺ 基态时，分子解离能增加 (R_e 减小)。成键和反键的分类与电子对分子总能量的影响无关。无论移除哪个电子，电离一个稳定分子都需要能量。因此，稳定分子中的成键电子和反键电子都会降低分子的总能量。

如果两个基态氮原子的相互作用是严格排斥的 (如分子轨道理论所预测)，氮气中的原子将不会相互吸引，气体也永远不会液化。当然，氮气可以液化。组态相互作用计算和散射实验的直接实验证据表明，当两个氮原子相互接近时，会出现弱初始吸引力，势能会在 2.97 Å 处达到最低值，比分离原子能低 0.00095 eV。当距离小于 2.97 Å 时，由于电子概率密度的重叠，力的排斥作用越来越明

Λ	0	1	2	3	4
字母	Σ	Π	Δ	Φ	Γ

显。初始吸引力（称为**伦敦力**或**色散力**）（London or dispersion force）源于一个原子中电子的运动与第二个原子中电子的运动之间的瞬时相关。因此，需要包含电子相关的计算来处理色散吸引力。

所有分子间力的总称是**范德华力**（van der Waals force）。除了具有强极性的分子外，色散力是分子间吸引力的主要贡献者。色散力随着分子大小的增加而增大，因此沸点随着分子量的增加而趋于升高。

在相对较大的分子间距离下，由色散力产生的 $U(R)$ 曲线中的微小最小值可能足够深，以至于在低温下存在由色散相互作用结合的分子。此类分子被称为**范德华分子**（van der Waals molecules）。例如，在 100 K 的氩气中存在少量氩范德华分子。 Ar_2 满足 $D_e = 0.012 \text{ eV}$ 和 $R_e = 3.77 \text{ \AA}$ ，且具有七个束缚振动能级（ $v = 0, \dots, 6$ ）。

对于 He_2 的基态【对应于电子组态 $(\sigma_g 1s)^2 (\sigma_u^* 1s)^2$ 】，零点振动能只比与色散作用相关的解离能 D_e 低一点点，所以 $v = 0, J = 0$ 的能级是唯一的束缚能级。由于键合极弱， He_2 仅在极低温度下才能大量存在。通过质谱分析，在通过膨胀冷却至 10^{-3} K 的氦气束中检测到了 He_2 【F. Luo et al., *J. Chem. Phys.*, **98**, 3564 (1993); 100, 4023 (1994)】。对 He_2 的准确理论计算得出 $D_e = 0.000948 \text{ eV}$ ， $D_0 = 0.00000014 \text{ eV}$ ， $R_e = 2.97 \text{ \AA}$ ，以及平均核间距为 $\langle R \rangle \approx 47 \text{ \AA}$ 【M. Przybytek et al., *Phys. Rev. Lett.*, **104**, 183003 (2010); M. Jeziorska et al., *J. Chem. Phys.*, **127**, 124303 (2007)】。 $\langle R \rangle$ 的巨大值是因为 $v = 0$ 能级与解离极限非常接近。

某些双原子范德华分子及其 R_e 和 D_e 值如下： Ne_2 ， $R_e = 3.1 \text{ \AA}$ ， $D_e = 0.0036 \text{ eV}$ ； HeNe ， $R_e = 3.2 \text{ \AA}$ ， $D_e = 0.0012 \text{ eV}$ ； Ca_2 ， $R_e = 4.28 \text{ \AA}$ ， $D_e = 0.13 \text{ eV}$ ； Mg_2 ， $R_e = 3.89 \text{ \AA}$ ， $D_e = 0.0353 \text{ eV}$ 。观测到的多原子范德华分子包括 $(\text{O}_2)_2$ ， $\text{H}_2\text{-N}_2$ ， Ar-HCl 和 $(\text{Cl})_2$ 。对于范德华键合的分子，其 R_e 显著增大，而 D_e 远小于化学键合的分子。 Be_2 的键长为 $2.45 \text{ \AA}$ ，远小于范德华分子的典型键长； Be 中 $2p$ 和 $2s$ 轨道的靠近引起了 Be_2 中显著的 $2s - 2p$ 杂化，并且在色散作用之外可能还具有一定的共价性质。有关范德华分子的更多信息，见 *Chem. Rev.*, **88**, 813–988 (1988); **94**, 1721–2160 (1994); **100**, 3861–4264 (2000)。

13.8 双原子分子的电子谱项

我们现在考虑由给定分子电子组态所产生的电子谱项。

对于原子，每组简并的原子轨道构成一个原子亚层。例如，原子轨道 $2p_{+1}$ 、 $2p_0$ 和 $2p_{-1}$ 构成了 $2p$ 亚层。源自组态通过给定每个亚层中电子数来确定，例如， $1s^2 2s^2 2p^4$ 。对于分子，每组简并的分子轨道构成一个分子壳层（shell）。例如， $\pi_u 2p_{+1}$ 和 $\pi_u 2p_{-1}$ 分子轨道构成了 $\pi_u 2p$ 壳层。每个双原子 σ 壳层由一个分子轨道构成，而每个 π ， δ ， ϕ ，... 壳层包含两个分子轨道；双原子 σ 壳层可以容纳两个电子，非 σ 壳层最多可以容纳四个电子。通过给定每个壳层中的电子数，我们可以指定分子的电子组态（configuration），例如 $(\sigma_g 1s)^2 (\sigma_u^* 1s)^2 (\sigma_g 2s)^2 (\sigma_u^* 2s)^2 (\pi_u 2p)^3$ 。

对于 H_2^+ ，算符 $\hat{L}_z$ 与 $\hat{H}$ 可对易。对于多电子双原子分子，可以证明，总电子角动量轴向分量的算符与 $\hat{H}$ 也可对易。总电子角动量在分子轴向方向分量的可能值为 $M_L \hbar$ ，其中 $M_L = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 。为了计算 M_L ，我们只需将各个电子的 m 值进行代数相加。类似于表示单电子分子的符号 λ ，我们定义 Λ 为

$$\Lambda \equiv |M_L| \quad (13.84)$$

（一些人可能会将 Λ 定义为与 M_L 相等。）以下字母指定了 Λ 的值：当 $\Lambda \neq 0$ 时， M_L 有两个取值，

即 $+\Lambda$ 和 $-\Lambda$ 。与 H_2^+ 一致，电子能量取决于 M_L^2 ，因此，与 M_L 的两个值相关联的是一种二重简并。请注意，小写字母表示单个电子，而大写字母表示整个分子。

与原子中一致，独立电子自旋角动量的矢量和为总电子自旋角动量 $\mathbf{S}$ ，取值为 $[S(S+1)]^{1/2}\hbar$ ，其中 $S = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$ 。总电子自旋角动量在分子轴向方向的分量为 $M_S\hbar$ ，其中 $M_S = -S, -S+1, \dots, S-1, S$ 。正如在原子中一样， $2S+1$ 称为**自旋多重度** (spin multiplicity)，记在 Λ 字母的左上标处。具有相同电子组态且 Λ 和 S 值相同的双原子电子态被认为属于同一电子**谱项** (term)。我们现在考虑如何推导出属于给定电子组态的谱项。(我们假设拉塞尔-桑德斯耦合，该耦合适用于由原子序数不太高的原子组成的分子。)

一个分子闭壳层包含一个或两个全满分子轨道。对处于同一分子轨道中的电子而言，根据泡利不相容原理，一个电子满足 $m_s = +\frac{1}{2}$ 而另一个必须满足 $m_s = -\frac{1}{2}$ 。对于闭壳层的分子组态，由于 M_S 为每个独立 m_s 值的代数之和，所以 M_S 必须为零。因此，对于只包含闭壳层的组态，必须有 $S = 0$ 。闭 σ 壳层包含两个电子且满足 $m = 0$ ，所以 M_L 为零。闭 π 层包含 $m = +1$ 和 $m = -1$ 的电子各两个，则 M_L (为 m 的代数之和) 也为零。其他全满的 $\delta, \phi, \dots$ 壳层也类似。因此，闭壳层分子组态同时满足 S 和 Λ 均为零，谱项符号为 $^1\Sigma$ 。 H_2 的基态电子态就是一个例子。(回忆闭亚层原子组态只产生 1S 谱项。)在推导分子光谱项时，我们只需考虑闭壳层之外的电子。

单 σ 电子满足 $s = \frac{1}{2}$ ，则 S 只能取 $\frac{1}{2}$ ，得到 $^2\Sigma$ 谱项。一个例子为 H_2^+ 的基态电子组态。单 π 电子产生 $^2\Pi$ 谱项，以此类推。

再考虑多于一个电子的情况。处于不同分子壳层中的电子称为非等价或非同科 (nonequivalent) 电子。对于这类电子，我们无需担心给其中两个电子赋予相同的量子数，则光谱项的推导很容易。考虑两个非等价 σ 电子， $\sigma\sigma$ 组态。因为 m 都为零，有 $M_L = 0$ 。每个 s 的值都为 $\frac{1}{2}$ ，则 S 可以取 0 或 1。我们得到两个谱项： $^1\Sigma$ 和 $^3\Sigma$ 。类似地， $\sigma\pi$ 组态产生 $^1\Pi$ 和 $^3\Pi$ 谱项。

对于 $\pi\delta$ 组态，我们有单重态和三重态谱项。 π 电子满足 $m = \pm 1$ ， δ 电子满足 $m = \pm 2$ 。因此， M_L 可以取 $+3, -3, +1, -1$ ，得到 $\Lambda = 3$ 和 1。我们得到四个谱项： $^1\Phi, ^3\Phi, ^1\Pi$ 和 $^3\Pi$ 。(在原子中，我们将矢量 $\mathbf{L}_i$ 相加得到总 $\mathbf{L}$ ；因此 pd 原子组态产生 P, D 和 F 谱项。然而，在双原子分子中，我们将轨道角动量的 z 分量相加。这是一个代数之和而不是矢量和，因此 $\pi\delta$ 组态产生 Π 和 Φ 谱项而不产生 Δ 谱项。)

对于包含两个非等价电子的 $\pi\pi$ 组态，每个电子都满足 $m = \pm 1$ ，则 M_L 可以取 $+2, -2, 0, 0$ 。 Λ 的取值为 2, 0 和 0；谱项为 $^1\Delta, ^3\Delta, ^1\Sigma, ^3\Sigma, ^1\Sigma$ 和 $^3\Sigma$ 。 $+2$ 和 -2 对应于同一个 Δ 谱项的两个简并态。然而， Σ 谱项为非简并的 (除了自旋简并性之外)， M_L 为零的两个值暗示了两个不同的 Σ 谱项 (考虑自选后会变为四个 Σ 谱项。)

考虑 $\pi\pi$ 谱项对应波函数的形式。我们将两个 π 亚层称为 π 和 π' ，使用下标来表明 m 值。对于 Δ 谱项，每个电子都满足 $m = +1$ 或 $m = -1$ 。对于 $M_L = +2$ ，我们可以将波函数中的空间因子写作 $\pi_{+1}(1)\pi'_{+1}(2)$ 或 $\pi_{+1}(2)\pi'_{+1}(1)$ 。然而，这些函数在全同电子交换时既不满足交换对称也不满足交换反对称，因此是不可接受的。相反，我们必须取线性组合 (不考虑归一化常数)

$$^1\Delta: \quad \pi_{+1}(1)\pi'_{+1}(2) + \pi_{+1}(2)\pi'_{+1}(1) \quad (13.85)$$

$$^3\Delta: \quad \pi_{+1}(1)\pi'_{+1}(2) - \pi_{+1}(2)\pi'_{+1}(1) \quad (13.86)$$

类似地，若两个电子都满足 $m = -1$ ，则空间因子为

$$^1\Delta: \quad \pi_{-1}(1)\pi'_{-1}(2) + \pi_{-1}(2)\pi'_{-1}(1) \quad (13.87)$$

$$^3\Delta: \quad \pi_{-1}(1)\pi'_{-1}(2) - \pi_{-1}(2)\pi'_{-1}(1) \quad (13.88)$$

函数 (13.85) 和 (13.87) 在交换时满足交换对称。它们需与交换反对称的 $S = 0$ 双电子自旋因子 (11.60) 相乘。因此 (13.85) 和 (13.87) 为双重简并 $^1\Delta$ 谱项对应两个状态波函数的空间因子。(13.86)

和 (13.88) 必须与交换对称双电子自旋函数 (11.57)、(11.58) 和 (11.59) 相乘, 给出 $^3\Delta$ 谱项的六个状态。这些状态的能量都相同 (若我们忽略自旋-轨道耦合)。

现在考虑 Σ 谱项的波函数。这些谱项中一个电子满足 $m = +1$ 而另一个满足 $m = -1$ 。我们从四个函数开始:

$$\pi_{+1}(1)\pi'_{-1}(2), \quad \pi_{+1}(2)\pi'_{-1}(1), \quad \pi_{-1}(1)\pi'_{+1}(2), \quad \pi_{-1}(2)\pi'_{+1}(1)$$

将它们组合, 得到满足交换对称和交换反对称的函数, 有

$$\begin{aligned} {}^1\Sigma^+ &: \pi_{+1}(1)\pi'_{-1}(2) + \pi_{+1}(2)\pi'_{-1}(1) + \pi_{-1}(1)\pi'_{+1}(2) + \pi_{-1}(2)\pi'_{+1}(1) \\ {}^1\Sigma^- &: \pi_{+1}(1)\pi'_{-1}(2) + \pi_{+1}(2)\pi'_{-1}(1) - \pi_{-1}(1)\pi'_{+1}(2) - \pi_{-1}(2)\pi'_{+1}(1) \\ {}^3\Sigma^+ &: \pi_{+1}(1)\pi'_{-1}(2) - \pi_{+1}(2)\pi'_{-1}(1) + \pi_{-1}(1)\pi'_{+1}(2) - \pi_{-1}(2)\pi'_{+1}(1) \\ {}^3\Sigma^- &: \pi_{+1}(1)\pi'_{-1}(2) - \pi_{+1}(2)\pi'_{-1}(1) - \pi_{-1}(1)\pi'_{+1}(2) + \pi_{-1}(2)\pi'_{+1}(1) \end{aligned} \quad (13.89)$$

(13.89) 中的前两个函数满足交换对称。因此, 它们必须与交换反对称的 $S = 0$ 双电子自旋函数 (11.60) 相乘。很明显, 这两个空间函数的能量不同。(13.89) 中的后两个函数满足交换反对称, 因此为两个 $^3\Sigma$ 谱项对应波函数的空间因子。若将 (13.89) 中的四个函数通过包含分子 (z) 轴的 $xz\sigma_v$ 反映面对电子坐标进行反映, 它们的本征值为 $+1$ 或 -1 (问题 13.30)。上标 $+$ 和 $-$ 对应于该本征值。

观察 Δ 谱项 (13.85) 至 (13.88) 可以发现, 这些函数不是对称算符 $\hat{O}_{\sigma_v}$ 的本征函数 (第 12.1 节)。由于这些谱项与双重简并 (不包括自旋简并) 相关, 因此它们的波函数不一定是该算符的本征函数。然而, 因为 $\hat{O}_{\sigma_v}$ 与哈密顿量对易, 所以我们选择本征函数成为 $\hat{O}_{\sigma_v}$ 的本征函数。通过将属于简并能级的 (13.85) 至 (13.87) 进行组合, 得到

$$(13.85) + (13.87) \text{ 以及 } (13.85) - (13.87)$$

这两个线性组合是 $\hat{O}_{\sigma_v}$ 的本征函数, 分别对应于本征值 $+1$ 和 -1 , 我们可以将它们指定为 $^1\Delta^+$ 和 $^1\Delta^-$ 状态。由于它们具有相同的能量, 因此没有必要使用 1 和 2 的上标。因此 1 和 2 的表述只用于 Σ 谱项。然而, 当考虑分子转动角动量与电子轨道角动量之间的相互作用时, 会出现 $^1\Delta$ 谱项两个状态的非常微小的分裂【称为 Λ 型倍增 (Λ -type doubling)】。事实证明, 该微扰的零级校正波函数为 $\hat{O}_{\sigma_v}$ 本征函数的线性组合, 所以在这种情况下, 有必要区分 Δ^+ 和 Δ^- 状态。线性组合 (13.85) $\pm$ (13.87) 是 $\hat{O}_{\sigma_v}$ 的本征函数, 但不是 $\hat{L}_z$ 的本征函数, 而是本征值为 $+2$ 和 -2 的 $\hat{L}_z$ 本征函数的叠加。

我们可以区分单电子组态的 $+$ 和 $-$ 谱项。单 σ 电子波函数无 ϕ 因子, 因此必须对应于 Σ^+ 谱项。对于一个 π 电子而言, π_{+1} 和 π_{-1} 是 $\hat{L}_z$ 本征函数的分子轨道 (其概率密度关于 z 轴对称, 图 13.14)。 π_{+1} 和 π_{-1} 不是 $\hat{O}_{\sigma_v}$ 的本征函数, 但线性组合 $\pi_{+1} + \pi_{-1} = \pi_x$ 和 $\pi_{+1} - \pi_{-1} = \pi_y$ 却是。若考虑由分子转动引入的对电子波函数的微扰, 则 π_x 和 π_y 分子轨道 (其概率密度不关于 z 轴对称, 见图 13.15) 是零级校正波函数。对在 xz 平面内的反映, π_x 和 π_y 分子轨道的本征值分别为 $+1$ 和 -1 ; 而对于 yz 平面内的反映, 其本征值分别为 -1 和 $+1$ 。(算符 $\hat{L}_z$ 和 $\hat{O}_{\sigma_v}$ 不可对易; 问题 13.31。因此, $\hat{H}$ 的所有本征函数不一定同时是这些算符的本征函数。然而, 由于这些算符各自与电子哈密顿算符可对易, 且非简并能级的波函数中不存在可选择的元素, 则 σ 分子轨道一定同时是 $\hat{L}_z$ 和 $\hat{O}_{\sigma_v}$ 的本征函数。)

处于相同分子壳层中的电子称为等价或同科 (equivalent) 电子。因为泡利不相容原理的限制, 等价电子产生的谱项少于对应的非等价电子组态。因此, 对于由两个等价 π 电子构成的 π^2 组态, (13.85) 至 (13.89) 中的八个函数只有四个是允许的; 剩余的函数给出了 $^1\Delta$ 、 $^1\Sigma^+$ 和 $^1\Sigma^-$ 谱项。或者, 我们可以制作一个与表 11.1 类似的表格, 并利用它来推导等价电子的谱项。

表 13.3 给出了由不同电子组态产生的谱项。闭壳层必然产生单重态谱项 $^1\Sigma^+$ 。 π^3 组态与 π 组态给出相同的谱项。

组态	谱项
$\sigma\sigma$	$^1\Sigma^+, ^3\Sigma^+$
$\sigma\pi, \sigma\pi^3$	$^1\Pi, ^3\Pi$
$\pi\pi, \pi\pi^3$	$^1\Sigma^+, ^3\Sigma^+, ^1\Sigma^-, ^3\Sigma^-, ^1\Delta, ^3\Delta$
$\pi\delta, \pi^3\delta, \pi\delta^3$	$^1\Pi, ^3\Pi, ^1\Phi, ^3\Phi$
σ	$^2\Sigma^+$
$\sigma^2, \pi^4, \delta^4$	$^1\Sigma^+$
π, π^3	$^2\Pi$
π^2	$^1\Sigma^+, ^3\Sigma^-, ^1\Delta$
δ, δ^3	$^2\Delta$
δ^2	$^1\Sigma^+, ^3\Sigma^-, ^1\Gamma$

表 13.3: 双原子分子的电子谱项

对于同核双原子分子，我们在谱项中添加 g 或 u 的右下标来表示属于该谱项电子态的宇称性。由电子组态中奇数个电子占据奇宇称分子轨道所产生的谱项为奇项 (u)；其余所有谱项均为偶项 (g)。这一规则与原子中的情况相同。

表13.2中所列的谱项符号可直接由分子轨道组态推导得出。例如， O_2 的组态为 π^2 ，给出了三个谱项 $^1\Sigma_g^+$ ， $^3\Sigma_g^-$ 和 $^1\Delta_g$ 。根据洪特规则， $^3\Sigma_g^-$ 为最低谱项，如所列示。 O_2 的 $^1\Delta_g$ 和 $^1\Sigma_g^+$ 谱项的 $v=0$ 能级分别比基态 $^3\Sigma_g^-$ 谱项的 $v=0$ 能级高 0.98 eV 和 1.6 eV。单线态氧是许多有机、生化 and 无机反应中的反应中间体。【See C. S. Foote et al., eds., *Active Oxygen in Chemistry*, Springer, 1995; J. S. Valentine et al., eds., *Active Oxygen in Biochemistry*, Springer, 1995; C. Schweitzer and R. Schmidt, *Chem. Rev.*, **103**, 1685 (2003).】

大多数稳定双原子分子的基态谱项为 $^1\Sigma^+$ （同核双原子分子为 $^1\Sigma_g^+$ ）。然而 B_2 、 Al_2 、 Si_2 、 O_2 和 NO 是例外，它们的基态谱项为 $^2\Pi$ 。

光谱学家在分子的基态谱项前加上符号 X 。与基态谱项具有相同自旋多重度的激发态谱项被标记为 $A, B, C, \dots$ ，而具有不同自旋多重度的激发态谱项被标记为 $a, b, c, \dots$ 。 C_2 和 N_2 是例外，它们的基态谱项为 $^1\Sigma_g^+$ ，但使用 $A, B, C, \dots$ 来表示其激发三重态谱项。

与原子类似，自旋-轨道相互作用可以将分子谱项裂分为相邻的支项，从而使该谱项呈现出多重态结构。电子总自旋角动量 $\mathbf{S}$ 在分子轴向方向上的投影为 $M_S\hbar$ 。在分子中，量子数 M_S 称为 Σ （不要与 $\Lambda=0$ 的符号混淆）：

$$\Sigma = S, S-1, \dots, -S$$

电子轨道角动量和自旋角动量的轴向分量相加，得到电子角动量的总轴向分量 $(\Lambda + \Sigma)\hbar$ 。（回忆 Λ 为 M_L 的绝对值。当 Σ 与 Λ 方向相同时， Σ 为正值；而当 Σ 与 Λ 方向相反时， Σ 为负值。） $\Lambda + \Sigma$ 的可能值为

$$\Lambda + S, \Lambda + S-1, \dots, \Lambda - S$$

$\Lambda + \Sigma$ 的值卸载谱项符号的右下角处，表示该谱项的支项。因此 $^3\Delta$ 满足 $\Lambda=2$ 和 $S=1$ 且产生 $^3\Delta_3$ 、 $^3\Delta_2$ 和 $^3\Delta_1$ 三个支项。从某种意义上说， $\Lambda + \Sigma$ 是分子中与原子中的量子数 J 相对应的量。然而， $\Lambda + \Sigma$ 是总电子角动量在 z 方向分量的量子数，因此可以取为负值。则 $^4\Pi$ 谱项有四个

支项 ${}^4\Pi_{5/2}$ 、 ${}^4\Pi_{3/2}$ 、 ${}^4\Pi_{1/2}$ 和 ${}^4\Pi_{-1/2}$ 。 $\Lambda + \Sigma$ 的绝对值记为 Ω ：

$$\Omega \equiv |\Lambda + \Sigma| \quad (13.90)$$

可以证明，双原子分子中的自旋-轨道耦合能可以用 $A\Lambda\Sigma$ 来良好近似，其中 A 取决于 Λ 和核间距 R 但与 Σ 无关。因此，多重态各支项之间的间隔是固定的。当 A 为正时，具有最低 $\Lambda + \Sigma$ 值的支项能量最低，多重态为常规 (regular)；当 A 为负时，该多重态为反常 (inverted)。注意当 $\Lambda \neq 0$ 时，自旋多重度 $2S + 1$ 总是等于多重态成分。这对于原子来说并不总是成立的。

某 $\Lambda \neq 0$ 多重态的每个谱项都是双重简并的，对应于 M_L 的两个值。因此一个 ${}^3\Delta$ 谱项有六个不同的波函数【式 (13.86)、(13.88)、(11.57)、(11.59)】，因此有六个不同的分子电子态。自旋-轨道耦合将 ${}^3\Delta$ 谱项裂分为三个支项，每个都为两重简并。通过之前提到的 Λ 型倍增，我们消除了支项的双重简并。

对于 Σ 谱项 ($\Lambda = 0$)，自旋-轨道耦合非常小（一级近似为零），量子数 Σ 和 Ω 没有定义。

${}^1\Sigma$ 谱项总是对应于一个单重非简并能级。

13.9 氢分子

氢分子是含有电子对键的最简单的分子。原子单位制下 H_2 的纯电子哈密顿算符为

$$\hat{H} = -\frac{1}{2}\nabla_1^2 - \frac{1}{2}\nabla_2^2 - \frac{1}{r_{a1}} - \frac{1}{r_{a2}} - \frac{1}{r_{b1}} - \frac{1}{r_{b2}} + \frac{1}{r_{12}} \quad (13.91)$$

其中 1 和 2 是电子，而 a 和 b 是原子核（图 13.18 所示）。与氦原子一致，因为电子间排斥项 $1/r_{12}$ 的存在，该薛定谔方程无法分离变量。因此我们需要使用近似法。




图 13.18: H_2 中的粒子间距离。

我们从分子轨道理论入手。 H_2 的基态电子组态为 $(\sigma_g 1s)^2$ ，我们可以将近似波函数写出斯莱特行列式的形式

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \sigma_g 1s(1) \alpha(1) & \sigma_g 1s(1) \beta(1) \\ \sigma_g 1s(2) \alpha(2) & \sigma_g 1s(2) \beta(2) \end{vmatrix} &= \sigma_g 1s(1) \sigma_g 1s(2) \cdot 2^{-1/2} [\alpha(1) \beta(2) - \beta(1) \alpha(2)] \\ &= f(1) f(2) \cdot 2^{-1/2} [\alpha(1) \beta(2) - \beta(1) \alpha(2)] \end{aligned} \quad (13.92)$$

这与氦原子的 (10.26) 相似。为了节省时间，我们将 $\sigma_g 1s$ 分子轨道简写为 f 。正如第 10.4 节所示，在双电子问题中忽略自旋因子不影响交换积分。因此我们希望通过调整 f 来使下式最小化：

$$\frac{\iint f^*(1) f^*(2) \hat{H} f(1) f(2) dv_1 dv_2}{\iint |f(1)|^2 |f(2)|^2 dv_1 dv_2}$$

其中积分是针对两个电子的空间坐标进行的。理想情况下, f 应通过自洽场计算得出。为了简化起见, 我们使用类 H_2^+ 分子轨道。(若我们忽略 $1/r_{12}$ 项, 则 H_2 的哈密顿量为两个 H_2^+ 哈密顿量之和。) 在13.5中, 我们发现【式 (13.57)】

$$\frac{k^{3/2}}{(2\pi)^{1/2}(1+S_{ab})^{1/2}} (e^{-kr_a} + e^{-kr_b})$$

给出了对基态 H_2^+ 波函数的良好近似。因此, 我们尝试将 D_e 的变分函数 ϕ 定义为两个这样的原子轨道线性组合函数的乘积, 每个电子对应一个函数:

$$\phi = \frac{\zeta^3}{2\pi(1+S_{ab})} (e^{-\zeta r_{a1}} + e^{-\zeta r_{b1}}) (e^{-\zeta r_{a2}} + e^{-\zeta r_{b2}}) \quad (13.93)$$

$$\phi = \frac{1}{2(1+S_{ab})} [1s_a(1) + 1s_b(1)] [1s_a(2) + 1s_b(2)] \quad (13.94)$$

其中的有效核电荷 ζ 与 H_2^+ 的 k 不同。因为

$$\hat{H} = \hat{H}_1^0 + \hat{H}_2^0 + 1/r_{12}$$

其中 $\hat{H}_1^0$ 和 $\hat{H}_2^0$ 是两个电子的 H_2^+ 哈密顿量, 我们有

$$\int \int \phi^* \hat{H} \phi \, dv_1 \, dv_2 = 2W_1 + \int \int \frac{\phi^2}{r_{12}} \, dv_1 \, dv_2$$

其中的 W_1 由 (13.63) 给出, 但 k 被 ζ 取代。关于 $1/r_{12}$ 的积分计算很复杂, 此处忽略【见 Slater, *Quantum Theory of Molecules and Solids*, Volume 1, page 65, and Appendix 6】。Coulson 于 1937 年使用 (13.93) 进行了变分计算。【For the literature references of the H_2 calculations mentioned in this and later sections, see the bibliography in A. D. McLean et al., *Rev. Mod. Phys.*, **32**, 211 (1960).】Coulson 得出了 $R_e = 0.732 \text{ \AA}$, 与真实值 $0.741 \text{ \AA}$ 很接近; 计算得到的 $U(R)$ 曲线最小值给出了 $D_e = 3.49 \text{ eV}$, 与真实值 4.75 eV (表13.2) 相比。(当然, 电子总能量的百分比误差远小于 D_e 中的百分比误差, 但 D_e 是我们感兴趣的量。) ζ 在 $0.732 \text{ \AA}$ 处取 1.197, 比 H_2^+ 的 k 值小。我们认为这是由每个电子的核被另一个电子屏蔽所致。

如何改进上述分子轨道结果? 我们可以寻找式 (13.92) 中最佳的分子轨道函数 f , 以获得 H_2 的哈特里-福克波函数。这是由 Kolos 和 Roothaan 完成的。【W. Kolos and C. C. J. Roothaan, *Rev. Mod. Phys.* **32**, 219 (1960).】他们将 f 函数展开为椭圆坐标系中的形式【式 (13.34)】。因为基态满足 $m=0$, 所以自洽场分子轨道中的 $e^{im\phi}$ 因子为 1, 则 f 只是 ξ 和 η 的函数。使用的展开式为

$$f = e^{-\alpha\xi} \sum_{p,q} a_{pq} \xi^p \eta^q$$

其中 p 和 q 是整数, α 和 a_{pq} 是变分参数。哈特里-福克计算结果为 $R_e = 0.732 \text{ \AA}$, $D_e = 3.64 \text{ eV}$, 与简单的原子轨道线性组合分子轨道得出的结果 3.49 eV 相比略有改善。 H_2 的关联能为 -1.11 eV , 与双电子 He_2 的值 -1.14 eV 相近 (第11.3节)。要获得真正准确的结合能, 我们必须超越自洽场近似, 不再将波函数写成 $f(1)f(2)$ 的形式。我们可以采用与处理原子时相同的方法: 组态相互作用以及将 r_{12} 引入试探函数。

首先, 考虑组态相互作用 (CI, 下同)。为了得到准确基态波函数, 我们引入了自洽场 (或其他) 函数对所有与基态具有相同对称性的激发态的贡献。在第一近似中, 仅考虑最低能级激发态的贡献。 H_2 的第一激发态为 $(\sigma_g 1s)(\sigma_u 1s)$, 给出的谱项为 $^1\Sigma_u^+$ 和 $^3\Sigma_u^+$ 。(有一个 g 电子和一个 u 电子, 则谱项为奇宇称。) 基态组态 $(\sigma_g 1s)^2$ 是 $^1\Sigma_g^+$ 态。因此, 由于 $(\sigma_g 1s)(\sigma_u^* 1s)$ 与基态组态对称性不同, 所以该激发态没有贡献。再考虑组态 $(\sigma_u^* 1s)^2$ 。这是一个闭壳层组态, 具有单重态 $^1\Sigma_g^+$ 。它具有正确

的对称性, 有助于贡献到基态波函数中。作为一个简单的 CI 波函数, 我们取 $(\sigma_g 1s)^2$ 和 $(\sigma_u^* 1s)^2$ 组态的分子轨道波函数的线性组合。为了简化, 我们使用原子轨道线性组合-分子轨道来作为分子轨道的近似。因此有

$$\phi = \sigma_g 1s(1) \sigma_g 1s(2) + c \sigma_u^* 1s(1) \sigma_u^* 1s(2) \quad (13.95)$$

其中 $\sigma_g 1s$ 和 $\sigma_u^* 1s$ 由 (13.57) 和 (13.58) 给出, 且轨道指数为变量, c 为变分参数。这一计算是由 Weinbaum 于 1933 年完成的。键长的计算结果为 $0.757 \text{ \AA}$, 解离能为 4.03 eV , 与哈特里-福克的计算结果 $D_e = 3.64 \text{ eV}$ 相比改进明显。轨道指数的最佳值为 1.19 。我们可以通过采用各组态中分子轨道的更优形式, 并纳入更多组态函数来进一步优化这一结果。Hagstrom 曾进行过一次 CI 计算, 其中分子轨道通过椭圆坐标展开表示。使用 33 个组态函数后, 他得到的结果为 $D_e = 4.71 \text{ eV}$, 与真实值 4.75 eV 非常接近【S. Hagstrom and H. Shull, *Rev. Mod. Phys.*, **35**, 624 (1963)】。

现在考虑在 H_2 试探函数中使用 r_{12} 。氢分子基态的首次真正精确计算是由 James 和 Coolidge 于 1933 年完成的。他们使用了试探函数

$$\exp[-\delta(\xi_1 + \xi_2)] \sum c_{mnjpk} [\xi_1^m \xi_2^n \eta_1^j \eta_2^k + \xi_1^n \xi_2^m \eta_1^k \eta_2^j] r_{12}^p$$

其中求和是针对 m, n, j, k 和 p 的整数值进行的。变分参数为 δ 和 c_{mnjpk} 系数。James 和 Coolidge 函数在交换电子 1 和 2 时满足交换对称, 这正是我们所期望的, 因为我们有一个反对称的基态自旋函数。在和式中包含 13 项, James 和 Coolidge 发现 $D_e = 4.72 \text{ eV}$, 误差仅为 0.03 eV 。他们的研究成果得到了 Kolos、Wolniewicz 及其同事的进一步推进, 他们在求和中使用了多达 279 项。因为 D_0 由观测到的电子能谱所决定, 所以他们使用了 Cooley-Numerov 法 (第13.2节) 来从它们的理论 $U(R)$ 曲线中计算振动能级和 D_0 。引入相对论校正和对玻恩-奥本海默近似的修正后, 他们得出 $D_0/hc - 36118.1 \text{ cm}^{-1}$, 与光谱观测值 36118.1 cm^{-1} 完全一致【W. Kolos et al., *J. Chem. Phys.*, **84**, 3278 (1986); L. Wolniewicz, *J. Chem. Phys.*, **99**, 1851 (1993)】。通过进行相对论修正、玻恩-奥本海默近似修正以及量子电动力学修正的高精度计算, 研究人员计算出了更为精确的 D_0 值。这些计算使用了玻恩-奥本海默近似下的, 从多达 7000 项的波函数中计算得出的 $U(R)$, 结果为 $D_0/hc = 36118.0695(10) \text{ cm}^{-1}$, 其中括号内的数字表示最后一位的不确定度【K. Piszczatowski et al., *J. Chem. Theory Comput.*, **5**, 3039 (2009); www.fuw.edu.pl/~krp/papers/D0.pdf】。实验值为 $3.118.0696(4) \text{ cm}^{-1}$ 。(量子电动力学是 Feynman、Schwinger 和 Tomonaga 在 20 世纪 40 年代末提出的相对论性量子力学理论, 用于描述辐射与物质的相互作用, 是对狄拉克量子场论的改进。)

13.10 价键理论处理 H_2

氢分子的首个量子力学处理是由海特勒和海特勒于 1927 年完成的。他们的思想已被扩展为一种普遍的化学键理论, 即**价键理论** (valence-bond, VB theory)。价键方法与化学家关于分子由原子通过局域键结合而成的观念更为密切相关, 而分子轨道方法则不然。价键法将分子视为由原子核 (原子核加上内层电子) 和成键价电子组成。对于 H_2 , 两个电子都是价电子。

海特勒-伦敦处理 H_2 基态的第一步是将分子近似为两个基态氢原子。两个这样的非相互作用原子的波函数是

$$f_1 = 1s_a(1) 1s_b(2)$$

其中 a 和 b 指代的是原子核, 而 1 和 2 为电子。当然, 函数

$$f_2 = 1s_a(2) 1s_b(1)$$

也是有效的波函数。因此提出了试探函数

$$c_1 f_1 + c_2 f_2 = c_1 1s_a(1) 1s_b(2) + c_2 1s_a(2) 1s_b(1) \quad (13.96)$$

该线性变分函数引出了久期行列式方程 $\det(H_{ij} - S_{ij}W) = 0$ 【式 (8.57)】，其中 $H_{11} = \langle f_1 | \hat{H} | f_1 \rangle$, $S_{11} = \langle f_1 | f_1 \rangle = 1$, ...。

我们还可以用微扰理论来考虑这个问题（正如海特勒和伦敦所做的那样）。一个基态氢分子分解为两个基态氢原子。因此，我们将两个基态氢原子在无限远处的相互作用视为无扰系统。一个可能的零级（无扰）波函数为 $1s_a(1) 1s_b(2)$ 。然而，电子 2 也可能与原子核 a 结合，从而得到无扰波函数 $1s_a(2) 1s_b(1)$ 。这两个无扰波函数属于一个双重简并能级（交换简并）。在分子形成的微扰作用下，双重简并能级裂分为两个能级，而零阶校正波函数是这两个微扰波函数的线性组合：

$$c_1 1s_a(1) 1s_b(2) + c_2 1s_a(2) 1s_b(1)$$

该函数引出了 2×2 的久期行列式，除了 W 被 $E^{(0)} + E^{(1)}$ 取代以外，它与 (8.56) 一致；见问题 9.20。

我们现在来求解久期方程。哈密顿算符为厄米算符，所有函数都为实函数且 f_1 和 f_2 已归一化。因此，

$$H_{12} = H_{21}, \quad S_{12} = S_{21}, \quad S_{11} = S_{22} = 1$$

考虑 H_{11} 和 H_{12} ：

$$H_{11} = \langle 1s_a(1) 1s_b(2) | \hat{H} | 1s_a(1) 1s_b(2) \rangle$$

$$H_{22} = \langle 1s_a(2) 1s_b(1) | \hat{H} | 1s_a(2) 1s_b(1) \rangle$$

在 H_{22} 中将坐标号 1 和 2 交换就得到了 H_{11} ，因为该转换未改变 $\hat{H}$ 。因此 $H_{11} = H_{22}$ 。则久期方程 $(H_{ij} - S_{ij}W) = 0$ 变为

$$\begin{vmatrix} H_{11} - W & H_{12} - WS_{12} \\ H_{12} - WS_{12} & H_{11} - W \end{vmatrix} = 0 \quad (13.97)$$

该方程的形式与 (13.49) 相同，类比于 (13.51)，(13.57) 和 (13.58)，近似能量和波函数为

$$W_1 = \frac{H_{11} + H_{12}}{1 + S_{12}}, \quad W_2 = \frac{H_{11} - H_{12}}{1 - S_{12}} \quad (13.98)$$

$$\phi_1 = \frac{f_1 + f_2}{\sqrt{2}(1 + S_{12})^{1/2}}, \quad \phi_2 = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{2}(1 - S_{12})^{1/2}} \quad (13.99)$$

(13.99) 的分子为

$$f_1 \pm f_2 = 1s_a(1) 1s_b(2) \pm 1s_a(2) 1s_b(1)$$

根据我们之前的讨论，我们知道H₂ 的基态为 ¹Σ 态，具有反对称自旋因子 (11.60) 和对称空间因子。那么 ϕ_1 一定是基态。海特勒-伦敦基态波函数为

$$\frac{1s_a(1) 1s_b(2) + 1s_a(2) 1s_b(1)}{\sqrt{2}(1 + S_{12})^{1/2}} \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)] \quad (13.100)$$

最低 ³Σ 谱项对应三个状态的海特勒-伦敦波函数为

$$\frac{1s_a(1) 1s_b(2) - 1s_a(2) 1s_b(1)}{\sqrt{2}(1 - S_{12})^{1/2}} \begin{cases} \alpha(1)\alpha(2) \\ 2^{-1/2} [\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)] \\ \beta(1)\beta(2) \end{cases} \quad (13.101)$$

其中的 S_{12} 由问题 13.33 给出。

现在考虑基态能量表达式。我们将分子电子哈密顿算符表示为两个氢原子哈密顿算符的和再加上微扰项：

$$\hat{H} = \hat{H}_a(1) + \hat{H}_b(2) + \hat{H}' \quad (13.102)$$

$$\hat{H}_a(1) = -\frac{1}{2}\nabla_1^2 - \frac{1}{r_{a1}}, \quad \hat{H}_b(2) = -\frac{1}{2}\nabla_2^2 - \frac{1}{r_{b2}}, \quad \hat{H}' = -\frac{1}{r_{b1}} - \frac{1}{r_{a2}} + \frac{1}{r_{12}}$$

海特勒-伦敦计算并未在 $1s$ 函数中引入有效核电荷。因此 $1s_a(1)$ 是 $\hat{H}_a(1)$ 的本征函数，能量为 $-\frac{1}{2}$ hartree，即氢原子基态能量。利用这一结果，可以得到以下价键能量的表达式：

$$W_1 = -1 + \frac{Q + A}{1 + S_{ab}^2}, \quad W_2 = -1 + \frac{Q - A}{1 - S_{ab}^2} \quad (13.103)$$

其中的库仑积分 Q 和交换积分 A 定义为

$$Q \equiv \langle 1s_a(1) 1s_b(2) | \hat{H}' | 1s_a(1) 1s_b(2) \rangle \quad (13.104)$$

$$A \equiv \langle 1s_a(2) 1s_b(1) | \hat{H}' | 1s_a(1) 1s_b(2) \rangle \quad (13.105)$$

重叠积分 S_{ab} 由 (13.48) 定义。这些表达式中的 -1 hartree 为两个基态氢原子的能量。为了获得 $U(R)$ 势能曲线，我们将这些表达式与核间排斥势 $1/R$ 相加。

用于计算 W_1 和 W_2 所需的许多积分已在第 13.5 节对 H_2^+ 的处理中给出。唯一陌生的积分是包含 $1/r_{12}$ 的积分。最难的是两中心，两电子交换积分：

$$\int \int 1s_a(1) 1s_b(2) \frac{1}{r_{12}} 1s_a(2) 1s_b(1) dv_1 dv_2$$

两中心意味着被积函数包含以两个不同核 a 和 b 为中心的函数；双电子意味着被积函数中包含两个电子的坐标。这可以通过在共焦椭圆坐标系中对 $1/r_{12}$ 进行展开来计算，与球坐标系中问题 9.14 中的展开类似。该积分的详细计算过程在 *Slater, Quantum Theory of Molecules and Solids*, Volume 1, Appendix 6. 中给出。海特勒-伦敦处理的结果为 $D_e = 3.15 \text{ eV}$, $R_e = 0.87 \text{ \AA}$ 。与实验值 $D_e = 4.75 \text{ eV}$ 和 $R_e = 0.741 \text{ \AA}$ 的吻合程度一般。在此处理中，大部分结合能由交换积分 A 提供。

考虑对海特勒-伦敦函数 (13.100) 进行一些改进。一个显而易见的步骤是在 $1s$ 函数中引入轨道指数 ζ 。这一工作由 Wang 于 1928 年完成。当 R_e 和 D_e 优化至 3.78 eV 和 $0.744 \text{ \AA}$ 时， ζ 的优化值为 1.166。回顾一下，Dickinson 于 1933 年通过在原子轨道中引入部分 $2p_z$ 特征（杂化）来改进 Finkelstein-Horowitz 的 H_2^+ 试探函数。1931 年，Rosen 利用这一思路改进海特勒-海特勒-Wang 函数。他采用了试探函数

$$\phi = \phi_a(1)\phi_b(2) + \phi_a(2)\phi_b(1)$$

其中原子轨道 ϕ_a 定义为 $\phi_a = e^{-\zeta r_a}(1 + cz_a)$ ， ϕ_b 的表达式类似。这使得在分子形成过程中能够实现原子轨道的极化。得到结果为 4.04 eV 的结合能。另一项改进——采用离子结构——将在下一节中进行讨论。

13.11 分子轨道理论和价键理论的比较

让我们比较 H_2 基态的分子轨道理论与价键理论的处理方法。


若 ϕ_a 表示以原子核 a 为中心的原子轨道，空间因子为 H_2 基态的 LCAO-MO 波函数

$$[\phi_a(1) + \phi_b(1)][\phi_a(2) + \phi_b(2)] \quad (13.106)$$

在最简单的处理中, ϕ 为 $1s$ 原子轨道。(13.106) 等于

$$\phi_a(1)\phi_a(2) + \phi_b(1)\phi_b(2) + \phi_a(1)\phi_b(2) + \phi_b(1)\phi_a(2) \quad (13.107)$$

这些项的物理意义是什么? 最后两个项中的每个电子都位于以不同原子核为中心的原子轨道中。这些是共价项, 对应于原子之间电子的平等共享。前两个项中的两个电子都位于以同一原子核为中心的原子轨道中。这些是离子项, 对应于化学结构



共价项和离子项的权重相等, 因此这个简单的分子轨道函数使得氢原子的基态有 50% 的概率分解为两个中性氢原子, 也有 50% 的概率分解为一个质子和一个氢化物离子。实际上, H_2 的基态会分解为两个中性 H 原子。因此, 这个简单的分子轨道函数在 R 趋于无穷大时给出了错误的能量极限值。

我们该如何解决这个问题? 由于 H 是非极性分子, 化学直觉告诉我们, 离子项对波函数的贡献应远小于共价项。最简单的处理方法是省略分子轨道函数 (13.107) 中的离子项。这样得到

$$\phi_a(1)\phi_b(2) + \phi_b(1)\phi_a(2) \quad (13.108)$$

我们识别 (13.108) 为海特勒-伦敦函数 (13.100)。

尽管电子间排斥势使电子相互避开, 但仍有一定概率发现两个电子靠近同一个原子核, 这对应于离子结构。因此, 我们不应简单地从 (13.107) 中省略离子项, 而是可以尝试

$$\phi_{\text{VB,imp}} = \phi_a(1)\phi_b(2) + \phi_b(1)\phi_a(2) + \delta[\phi_a(1)\phi_a(2) + \phi_b(1)\phi_b(2)] \quad (13.109)$$

其中 $\delta(R)$ 为变分参数, 下标 imp 表示这是一个改进的价键函数。在价键理论的语言中, 该试探函数代表了**离子-共价共振** (ionic-covalent resonance)。当然, H_2 的基态波函数不会随时间在对应于 $\text{H}-\text{H}$ 结构的共价函数与离子函数之间来回变化。相反 (在我们考虑的近似中), 波函数是共价函数与离子函数的时不变混合。由于 H_2 会解离为中性原子, 我们知道 $\delta(\infty) = 0$ 。Weinbaum 于 1933 年使用 $1s$ 原子轨道并采用轨道指数进行的变分计算得出, 在 R 处参数 δ 的值为 0.26; 轨道指数被确定为 1.19, 解离能计算为 4.03 eV, 相较于海特勒-伦敦-Wang 值 3.78 eV 有所改善。当 δ 等于零时, 我们得到价键函数 (13.108)。当 δ 等于 1 时, 我们得到 LCAO-MO 函数 (13.107)。 δ 的最优值实际上更接近于 0 而非 1, 事实上, 海特勒-伦敦-Wang 价键函数给出的解离能优于 LCAO-MO 函数。

让我们将改进的价键试探函数 (13.109) 与通过组态相互作用改进的简单 LCAO-MO 函数进行比较。LCAO-MO 组态相互作用试探函数 (13.95) 具有 (未归一化的) 形式

$$\phi_{\text{MO,imp}} = [\phi_a(1) + \phi_b(1)][\phi_a(2) + \phi_b(2)] + \gamma[\phi_a(1) - \phi_b(1)][\phi_a(2) - \phi_b(2)]$$

因为该函数未归一化, 所以将其与常数 $1/(1-\gamma)$ 相乘并无不妥。这样做并重新排列项后, 我们得到

$$\phi_{\text{MO,imp}} = \phi_a(1)\phi_b(2) + \phi_b(1)\phi_a(2) + \frac{1+\gamma}{1-\gamma}[\phi_a(1)\phi_a(2) + \phi_b(1)\phi_b(2)]$$

再定义一个新常数 δ 为 $\delta = (1+\gamma)/(1-\gamma)$ 也无伤大雅。我们可以看到, 改进的分子轨道函数与改进的价键函数 (13.109) 是完全相同的。Weinbaum 将其 H_2 计算视为包含离子项的价键计算。我们已经证明, 同样可以将 Weinbaum 的计算视为包含组态相互作用的分子轨道计算。(这是在第 13.9 节中采纳的观点。)

分子轨道函数 (13.107) 低估了电子相关, 因为它认为两个电子都位于同一个原子的结构与每个电子位于不同原子的结构具有相同的概率。价键函数 (13.108) 高估了电子相关, 因为它不包含两个电子都位于同一个原子的结构的贡献。在分子轨道理论中, 电子相关可以通过组态相互作用引

入。在价键理论中，电子相关性因离子-共价共振而减弱。简单的价键方法在大 R 值下比简单的分子轨道方法更可靠，因为后者预测了错误的解离产物。为进一步阐明分子轨道法与价键法之间的差异，需考察两种方法如何将 H_2 电子哈密顿算符分解为无扰哈密顿算符与微扰哈密顿算符。对于分子轨道法，我们写为：

$$\hat{H} = \left[\left(-\frac{1}{2} \nabla_1^2 - \frac{1}{r_{a1}} - \frac{1}{r_{b1}} \right) + \left(-\frac{1}{2} \nabla_2^2 - \frac{1}{r_{a2}} - \frac{1}{r_{b2}} \right) \right] + \frac{1}{r_{12}}$$

其中无扰哈密顿算符由括号内的项组成。在分子轨道理论中， H_2 的无扰哈密顿算符为两个 H_2^+ 哈密顿算符之和，每个电子一个。因此，零级分子轨道波函数为两个类 H_2^+ 波函数的乘积，每个电子一个。因为 H_2^+ 函数很复杂，所以我们使用原子轨道线性组合来近似类 H_2^+ 分子轨道。通过自洽场分子轨道法，以平均方式考虑了 $1/r_{12}$ 扰动的影响。为考虑瞬时电子相关效应，可采用组态相互作用法。

对于价键法，哈密顿算符中的项可按以下两种方式分组：

$$\hat{H} = \left[\left(-\frac{1}{2} \nabla_1^2 - \frac{1}{r_{a1}} \right) + \left(-\frac{1}{2} \nabla_2^2 - \frac{1}{r_{b2}} \right) \right] - \frac{1}{r_{a2}} - \frac{1}{r_{b1}} + \frac{1}{r_{12}}$$

$$\hat{H} = \left[\left(-\frac{1}{2} \nabla_1^2 - \frac{1}{r_{b1}} \right) + \left(-\frac{1}{2} \nabla_2^2 - \frac{1}{r_{a2}} \right) \right] - \frac{1}{r_{a1}} - \frac{1}{r_{b2}} + \frac{1}{r_{12}}$$

无扰系统由两个氢原子组成。我们有两个零级函数，它们由氢原子波函数的乘积构成，且属于简并能级。基态零级校正波函数是式 (13.100) 所示的线性组合。

分子轨道法的使用频率远高于价键法，因为其计算复杂度远低于价键法。该方法由 Hund、Mulliken 和 Lennard-Jones 于 1920 年代末创立。最初主要用于分子的定性描述，而电子计算机的出现使得精确计算分子轨道函数成为可能（参见第 13.14 节）。关于分子轨道法与价键法相对优劣的讨论，详见 R. Hoffman et al., *Acc. Chem. Res.*, **36**, 750 (2003)。

13.12 同核双原子分子的分子轨道理论和价键理论波函数

分子轨道近似法将分子的电子置于分子轨道中，这些轨道覆盖整个分子。作为分子轨道的近似，我们通常采用原子轨道的线性组合。价键法则将分子的电子置于原子轨道中，并通过允许键合原子间原子轨道进行价电子对的“交换”来构造分子波函数。我们已比较了这两种方法对 H_2 分子的应用。接下来将探讨其他同核双原子分子。

从基态 He_2 开始。每个分立的氦原子基态组态为 $1s^2$ 。该闭壳层组态没有任何未成对电子来形成共价键，则价键波函数只是原子轨道函数的简单反对称乘积。在 (10.47) 的表示法中， He 的基态价键理论波函数为斯莱特行列式形式

$$|1s_a \overline{1s_a} 1s_b \overline{1s_b}| \quad (13.110)$$

下标 a 和 b 分别表示两个氦原子，横线表示自旋函数 β 。该波函数中的 $1s$ 函数为氦原子的 $1s$ 函数，该函数在理想情况下应为自洽场原子函数，但可通过使用有效核电荷的类氢函数进行近似。 He_2 的价键波函数中的每个电子都与同一原子轨道上的另一个电子配对，因此预测不存在键合。

在分子轨道近似中， He_2 的基态组态为 $(\sigma_g 1s)^2 (\sigma_u^* 1s)^2$ 。由于不具有净成键电子，我们也预测不存在键合，与价键理论一致。分子轨道近似得到的波函数为

$$|\sigma_g 1s \overline{\sigma_g 1s} \sigma_u^* 1s \overline{\sigma_u^* 1s}| \quad (13.111)$$

一种对该（未归一化）分子轨道的最简单近似为将它们看作氦原子轨道的线性组合： $\sigma_g 1s = 1s_a + 1s_b$ ， $\sigma_u^* 1s = 1s_a - 1s_b$ 。在该近似下，(13.111) 变为

$$|(1s_a + 1s_b) \overline{(1s_a + 1s_b)} (1s_a - 1s_b) \overline{(1s_a - 1s_b)}| \quad (13.112)$$

使用行列式的性质，可以证明（问题 13.34）(13.112) 等于

$$4 |1s_a \overline{1s_a} 1s_b \overline{1s_b}| \quad (13.113)$$

与（归一化后）的价键函数 (13.110) 相同。该结果可轻易推广为：对于由原子亚壳层完全填满的分离原子形成的双原子分子，简单的价键法与简单的 LCAO-MO 法将给出相同的近似波函数。现在我们可以将试函数 (13.110) 代入变分积分，并计算两个基态氮原子的排斥势曲线。

在开始计算 Li_2 之前，我们先把 H_2 的海特勒-伦敦价键函数表示为斯莱特行列式。基态海特勒-伦敦函数 (13.100) 和问题 13.33a 可以写为

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} (1 + S_{ab}^2)^{-1/2} \left\{ \begin{vmatrix} 1s_a(1)\alpha(1) & 1s_b(1)\alpha(1) \\ 1s_a(2)\alpha(2) & 1s_b(2)\alpha(2) \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1s_a(1)\beta(1) & 1s_b(1)\beta(1) \\ 1s_a(2)\beta(2) & 1s_b(2)\beta(2) \end{vmatrix} \right\} \\ = (2 + 2S_{ab}^2)^{-1/2} \{ |1s_a \overline{1s_b}| - |\overline{1s_a} 1s_b| \} \end{aligned} \quad (13.114)$$

在每个斯莱特行列式中，原子 a 中的电子都与 b 原子另一个自旋相反的电子配对，对应于路易斯结构式 $\text{H}-\text{H}$ 。对于最低能级的 H_2 三重态，其海特勒-伦敦函数 (13.101) 也可表示为斯莱特行列式形式。在忽略归一化常数后，我们可以将 H_2 的海特勒-伦敦函数写成

$$\text{单重态: } |\overline{1s_a} \overline{1s_b}| - |\overline{1s_a} 1s_b| \quad (13.115)$$

$$\text{三重态: } \begin{cases} |1s_a 1s_b| \\ |1s_a \overline{1s_b}| + |\overline{1s_a} 1s_b| \\ |\overline{1s_a} \overline{1s_b}| \end{cases} \quad (13.116)$$

现在来考虑 Li_2 。基态组态为 $1s^2 2s^1$ 。 Li_2 的路易斯结构式为 $\text{Li}-\text{Li}$ ，两个 $2s$ 的 Li 电子互相配对，而 $1s$ 电子保留在每个原子内壳层中。包含 $1s$ 电子的价键理论波函数应与 He_2 的函数 (13.110) 相似，而包含 $2s$ 电子的价键波函数应与 H_2 的海特勒-伦敦函数 (13.115) 相似。当然，由于电子的不可区分性，存在完全的电子民主制，我们必须允许每个电子出现在每个轨道中。因此，我们使用 6×6 的斯莱特行列式来书写锂的基态价键函数：

$$|1s_a \overline{1s_a} 1s_b \overline{1s_b} 2s_a \overline{2s_b}| - |1s_a \overline{1s_a} 1s_b \overline{1s_b} 2s_b \overline{2s_a}| \quad (13.117)$$

与 (13.110) 和 (13.115) 类比，我们写出了 (13.117)。要更充分地证明这一点，我们应证明它是自旋算符 $\hat{S}^2$ 和 $\hat{S}_z$ 的本征函数，且每个算符的本征值均为零，这对应于单态。这是可以证明的，但此处我们忽略。为了节省空间，(13.117) 通常写为

$$|1s_a \overline{1s_a} 1s_b \overline{1s_b} \widehat{2s_a 2s_b}| \quad (13.118)$$

其中的曲线表明 $2s_a$ 和 $2s_b$ 原子轨道的电子对成键。

Li_2 的分子轨道波函数为

$$|\sigma_g 1s \sigma_g \overline{1s} \sigma_u^* 1s \sigma_u^* \overline{1s} \sigma_g 2s \sigma_g \overline{2s}| \quad (13.119)$$

若我们使用 $1s_a \pm 1s_b$ 来近似最低两个分子轨道，采用与问题 13.34 相同的推导过程，证明式 (13.111) 与式 (13.110) 是同一个波函数，由此可得式 (13.119) 等同于

$$|1s_a \overline{1s_a} 1s_b \overline{1s_b} \sigma_g 2s \sigma_g \overline{2s}|$$

回忆 Li_2 基态组态的记号 $KK(\sigma 2s)^2$ 。

再考虑价键理论对 N_2 基态的处理。 N 原子的基态组态为 $1s^2 2s^2 2p^3$ 。根据洪特规则，最低的能级为 $^4S_{3/2}$ ，其中每个 $2p$ 轨道各有一个电子。因此，我们可以令两个 $2p_x$ 电子、两个 $2p_y$ 电子和两

个 $2s$ 电子配对, 而两个 $2p_z$ 电子互相配对来得到一根叁键。路易斯结构式为: $\text{N} \equiv \text{N}$ 。如何将该路易斯结构转化为价键波函数? 在价键方法中, 成键轨道被赋予相反自旋。我们有三对这样的轨道, 且每对成键原子轨道中的电子有两种方式赋予相反自旋。因此可构造 $2^3 = 8$ 种可能的斯莱特行列式。我们从以下开始:

$$D_1 = |1s_a \overline{1s_a} 2s_a \overline{2s_a} 1s_b \overline{1s_b} 2s_b \overline{2s_b} 2p_{xa} \overline{2p_{xb}} 2p_{ya} \overline{2p_{yb}} 2p_{za} \overline{2p_{zb}}|$$

在所有八个行列式中, 前八列将保持不变, 为节省空间, 我们将 D_1 记作

$$D_1 = |\cdots 2p_{xa} \overline{2p_{xb}} 2p_{ya} \overline{2p_{yb}} 2p_{za} \overline{2p_{zb}}| \quad (13.120)$$

将 $2p_{xa}$ 和 $2p_{xb}$ 中电子自旋方向反转, 我们得到

$$D_2 = |\cdots \overline{2p_{xa}} 2p_{xb} 2p_{ya} \overline{2p_{yb}} 2p_{za} \overline{2p_{zb}}| \quad (13.121)$$

另外还有六个由三对键合轨道内自旋交换形成的行列式, 而价键波函数是这八个行列式的线性组合 (见问题 13.35)。以下的规则 (见 *Kauzmann*, pages 421-422) 给出了本征值为 0 的 $\hat{S}^2$ 价键本征波函数 (正如对基态所期望的那样): 每个行列式的系数取值为 +1 或 -1, 取决于从 D_1 生成该行列式所需的自旋交换次数是偶数还是奇数。因此 D_2 的系数为 -1。【另见 (13.115)】。显然, 单行列式基态 N_2 分子轨道函数比八行列式价键函数更易于处理。

13.13 H_2 分子的激发态

我们主要关注双原子分子的基态电子态。本节将探讨 H_2 分子的部分激发态。图 13.19 给出了 H_2 部分电子能级的势能曲线。

能量最低的分子轨道组态为 $(1\sigma_g)^2$, 其中我们用到了表 13.1 中第三列的记号。该闭壳层组态只产生 $^1\Sigma_g^+$ 能级, 记作 $X^1\Sigma_g^+$ 。LCAO-MO 函数为 (13.93)。

第二低的组态为 $(1\sigma_g)(1\sigma_u^*)$, 产生谱项 $^1\Sigma_u^+$ 和 $^3\Sigma_u^+$ (表 13.3), 由于不存在轴向电子轨道角动量, 这些谱项各自对应一个支项。光谱学家将这些支项记作 $B^1\Sigma_u^+$ 和 $b^3\Sigma_u^+$ 。根据洪特规则, b 支项能级低于 B 。这些能级的 LCAO-MO 函数分别为 【见方程 (10.27) (10.30)】

$$b^3\Sigma_u^+ : 2^{-1/2} [1\sigma_g(1) 1\sigma_u(2) - 1\sigma_g(2) 1\sigma_u(1)] \begin{cases} \alpha(1) \alpha(2) \\ 2^{-1/2} [\alpha(1) \beta(2) + \alpha(2) \beta(1)] \\ \beta(1) \beta(2) \end{cases}$$

$$B^1\Sigma_u^+ : 2^{-1/2} [1\sigma_g(1) 1\sigma_u(2) + 1\sigma_g(2) 1\sigma_u(1)] 2^{-1/2} [\alpha(1) \beta(2) - \alpha(2) \beta(1)]$$

其中的 $1\sigma_g \approx N(1s_a + 1s_b)$, $1\sigma_u \approx N'(1s_a - 1s_b)$ 。 $b^3\Sigma_u^+$ 支项是三重简并的。而 $B^1\Sigma_u^+$ 支项是单态。 b 支项的海特勒-伦敦波函数由 (13.101) 给出。这两个支项各含一个成键电子和一个反键电子, 我们预期两者的势能曲线应呈排斥关系。实际上, B 能支项的 $U(R)$ 曲线存在极小值。该态的稳定性警示我们: 切勿从粗略的波函数推导中草率下结论。

我们预测下一个激发态组态为 $(1\sigma_g)(2\sigma_g)$, 产生 $^1\Sigma_g^+$ 和 $^3\Sigma_g^+$ 支项。 H_2 的这些支项记为 $E^1\Sigma_g^+$ 和 $a^3\Sigma_g^+$ 。根据洪特规则, 三重态的能量更低。 E 态的 $U(R)$ 曲线存在两个显著的极小值, 因此常被称为 EF 态。

虽然在周期表中 $2\sigma_u$ 比 $1\pi_u$ 分子轨道更先被填充, 但对 H_2 而言 $1\pi_u$ 能量低于 $2\sigma_u$ 。则组态 $(1\sigma_g)(1\pi_u)$ 产生谱项 $^1\Pi_u$ 和 $^3\Pi_u$, 记作 $C^1\Pi_u$ 和 $c^3\Pi_u$ 。 c 谱项产生的支项为 $c^3\Pi_{2u}$ 、 $c^3\Pi_{1u}$ 和 $c^3\Pi_{0u}$, 这些支项彼此极为接近, 通常在光谱学研究中无法分辨。 C 支项的势能曲线在较大 R 处呈现轻微凸起。每个支项均为双重简并态, 由此 $(1\sigma_g)(1\pi_u)$ 组态共产生八个电子态。




图 13.19: H_2 部分电子态的 $U(R)$ 曲线。【See W. Kolos and L. Wolniewicz, *J. Chem. Phys.*, **43**, 2429 (1965); 45, 509 (1966); J. Gerhauser and H. S. Taylor, *J. Chem. Phys.*, **42**, 3621 (1965); W. Kolos, *J. Mol. Spectry*, **143**, 237 (1990).】

13.14 双原子分子的自洽场波函数

本节展示了双原子分子中自洽场分子轨道波函数的若干实例。

分子轨道波函数中的空间轨道 ϕ_i 哥表示为一组单电子**基函数** (basis functions) χ_s 的线性组合:

$$\phi_i = \sum_s c_{si} \chi_s \quad (13.122)$$

在对双原子分子的自洽场计算中, 可以使用以分子中各原子为中心的斯莱特型轨道【式 (11.14)】作为基函数。(另见第15.4节中的替代选择。) 第14.3节讨论了用于确定每个单原子分子自洽场分子轨道中基函数系数 c_{si} 的计算方法。要获得原子轨道函数的完备集, 需要无限数量的斯莱特轨道, 但通过精心选择数量适中的斯莱特轨道, 可以对真实的分子哈特里-福克波函数进行精确逼近。分子自洽场计算的**最小基函数集** (minimal basis set) 要求每个原子的每个内层原子轨道和价层原子轨道各包含一个基函数。**扩展** (extended) 基函数集则比最小基函数集更大。最小基函数集的自洽场计算比扩展基函数集更简单, 但后者能获得更高的精度。

Ransil 采用最小基函数集计算了若干轻型双原子分子的自洽场波函数【B. J. Ransil, *Rev. Mod. Phys.*, **32**, 245 (1960)】。例如, 基态 Li_2 【分子轨道组态 $(1\sigma_g)^2 (1\sigma_u)^2 (2\sigma_g)^2$ 】满足 $R = R_e$ 时的自洽场分子轨道为

$$\begin{aligned} 1\sigma_g &= 0.706 (1s_a + 1s_b) + 0.009 (2s_{\perp a} + 2s_{\perp b}) + 0.0003 (2p\sigma_a + 2p\sigma_b) \\ 1\sigma_u &= 0.709 (1s_a - 1s_b) + 0.021 (2s_a - 2s_{\perp b}) + 0.003 (2p\sigma_a - 2p\sigma_b) \\ 2\sigma_g &= -0.059 (1s_a + 1s_b) + 0.523 (2s_{\perp a} + 2s_{\perp b}) + 0.114 (2p\sigma_a + 2p\sigma_b) \end{aligned} \quad (13.123)$$

这些方程中的原子轨道函数为斯莱特型轨道, 除了 $2s_{\perp}$ 。 $2s$ 斯莱特型原子轨道无径向节点, 且不与 $1s$ 斯莱特型原子轨道正交。哈特里-福克 $2s$ 原子轨道有一个径向节点 ($n - l - 1 = 1$), 且与 $1s$ 原

子轨道正交。通过对同一原子的 $1s$ 和 $2s$ 斯莱特型原子轨道进行以下归一化线性组合（施密特正交化），可构造出具有正确节点数的正交化 $2s$ 轨道：

$$2s_{\perp} = (1 - S^2)^{-1/2} (2s - S \cdot 1s) \quad (13.124)$$

其中的 S 为重叠积分 $\langle 1s|2s \rangle$ 。Ransil 将 Li_2 轨道用（未归一化的） $2s$ 斯莱特型原子轨道表示出来，但因为归一化的 $1\sigma_u$ 函数能更好表示 $2s$ 原子轨道，所以这些轨道写作 $2s_{\perp}$ 。这么做改变了 $1s$ 和 $2s$ 的系数，但事实上实际轨道并无变化，见问题 13.37。原子轨道的 $2p\sigma$ 表示 p 轨道沿分子 (z) 轴方向的延伸；即 $2p\sigma$ 原子轨道是 $2p_z$ 原子轨道。（ $2p_x$ 和 $2p_y$ 轨道称为 $2p\pi$ 原子轨道。）(13.123) 中轨道对应的优化轨道指数为 $\zeta_{1s} = 2.689$, $\zeta_{2s} = 0.634$, $\zeta_{2p\sigma} = 0.761$ 。

我们先前对这些分子轨道给出的简单表达式是

$$\begin{aligned} 1\sigma_g &= \sigma_g 1s = 2^{-1/2} (1s_a + 1s_b) \\ 1\sigma_u &= \sigma_u^* 1s = 2^{-1/2} (1s_a - 1s_b) \\ 2\sigma_g &= \sigma_g 2s = 2^{-1/2} (2s_a + 2s_b) \end{aligned}$$

将这些结果与 (13.123) 式进行比较，可知简单的 LCAO 函数是最小基组自洽场分子轨道的合理初始近似。该近似对 $1\sigma_g$ 和 $1\sigma_u$ 轨道尤其有效，而 $2\sigma_g$ 分子轨道在 $2s$ 原子轨道的贡献之外，还具有可观的 $2p\sigma$ 原子轨道成分。因此，相较于分离原子分子轨道表示法，表 13.1（第 13.7 节）第三列的记号更为可取。由于 $2s$ 和 $2p$ 原子轨道能量相近【参见式 (9.27)】，可预期存在显著的 $2s - 2p\sigma$ 杂化。这种杂化使得 $2s$ 原子轨道在分子形成过程中发生极化。

让我们比较 Ransil 使用最小基组计算的 F_2 基态在 R_e 处的 3σ 分子轨道，与 Wahl 使用扩展基组计算的结果【A. C. Wahl, *J. Chem. Phys.*, **41**, 2600 (1964)】：

$$3\sigma_{g,\min} = 0.038(1s_a + 1s_b) - 0.184(2s_a + 2s_b) + 0.648(2p\sigma_a + 2p\sigma_b)$$

$$\zeta_{1s} = 8.65, \quad \zeta_{2s} = 2.58, \quad \zeta_{2p\sigma} = 2.49$$

$$\begin{aligned} 3\sigma_{g,\text{ext}} &= 0.048(1s_a + 1s_b) + 0.003(1s_a + 1s_b) - 0.257(2s_a + 2s_b) \\ &+ 0.582(2p\sigma_a + 2p\sigma_b) + 0.307(2p\sigma'_a + 2p\sigma'_b) + 0.085(2p\sigma''_a + 2p\sigma''_b) \\ &- 0.056(3s_a + 3s_b) + 0.046(3d\sigma_a + 3d\sigma_b) + 0.014(4f\sigma_a + 4f\sigma_b) \end{aligned}$$

$$\zeta_{1s} = 8.27, \quad \zeta_{1s'} = 13.17, \quad \zeta_{2s} = 2.26$$

$$\zeta_{2p\sigma} = 1.85, \quad \zeta_{2p\sigma'} = 3.27, \quad \zeta_{2p\sigma''} = 5.86$$

$$\zeta_{3s} = 4.91, \quad \zeta_{3d\sigma} = 2.44, \quad \zeta_{4f\sigma} = 2.83$$

正如需要多个斯莱特型原子轨道才能精确表示哈特里-福克分子轨道的斯莱特型原子轨道线性组合（第 11.1 节），在精确表示哈特里-福克分子轨道的斯莱特型原子轨道线性组合中，也需要多个具有相同 n 和 l 的斯莱特型原子轨道。扩展基函数中的带撇号和双撇号原子轨道函数是具有不同轨道指数的斯莱特型原子轨道。 $3d\sigma$ 和 $4f\sigma$ 原子轨道算符是量子数 $m = 0$ 的原子轨道算符，即 $3d$ 和 $4f$ 原子轨道算符。对于最小计算和扩展计算，总能量分别为 $-197.877 E_h$ 和 $-198.768 E_h$ （其中的 E_h 为 hartree）。采用远大于 Wahl 所用基组的基组进行计算外推，得出 F_2 哈特里-福克能级在 R_e 处的能量为 $-198.773 E_h$ 【L. Bytautas et al., *J. Chem. Phys.*, **127**, 164317 (2007)】。在 R_e 处 F_2 的能量实验值为 $U(R_e) = -199.672 E_h$ 。相关能定义式 (11.16) 采用分子的非相对论能量。对 F_2 能量的相对论贡献值为 $-0.142 E_h$ ，则非相对论 F_2 能量准确值为 $-199.672 E_h + 0.142 E_h = -199.530 E_h$ 。因此， F_2 中的相关能为 $-199.530 E_h + 198.773 E_h = -0.757 E_h = -20.6 \text{ eV}$ 。




图 13.20: Wahl 计算所得 Li_2 基态电子密度 Hartree-Fock 分子轨道等值线图。【A. C. Wahl, *Science*, **151**, 961 (1966); *Scientific American*, April 1970, p. 54; *Atomic and Molecular Structure*: 4 Wall Charts, McGraw-Hill, 1970.】

在讨论 H_2^+ 和 H_2 时，我们看到了杂化（同个原子不同原子轨道的混合）是如何改进分子波函数的。人们往往认为杂化仅发生于特定分子几何构型中。自洽场计算明确表明，所有分子轨道都存在某种程度的杂化。因此，任何双原子分子 σ 分子轨道都是孤立原子 $1s, 2s, 2p_0, 3s, 3p_0, 3d_0, \dots$ 原子轨道的线性组合。

为协助确定哪些原子轨道参与构筑特定双原子分子轨道，我们采用两条规则。首先， σ 型原子轨道 ($s, p\sigma, d\sigma, \dots$) 只能参与形成 σ 型分子轨道； π 型原子轨道 ($p\pi, d\pi, \dots$) 只能参与形成 π 型分子轨道。其次，只有能量相当接近的原子轨道才能对特定分子轨道产生显著贡献。（具体实例可参见上文引用的最小基组和扩展基组分子轨道。）

Wahl 绘制了从 H_2 到 F_2 的同核双原子分子近哈特里-福克分子轨道的等高线。图 13.20 展示了 Li_2 分子的等高线图。

当然，哈特里-福克波函数只是对真实波函数的近似。可以证明：对于处于平衡组态区域中的核组态，哈特里-福克波函数可以很好地给出电子概率密度 $\rho(x, y, z)$ 的近似。仅涉及单电子算符的分子性质可表示为包含密度 ρ 的积分，参见式 (14.8)。因此，此类性质可通过哈特里-福克波函数精确计算。分子偶极矩即为一例【式 (14.21)】。例如，采用近似哈特里-福克 ψ 函数计算的 LiH 分子偶极矩为 6.00 D（德拜）(debyes)【S. Green, *J. Chem. Phys.*, **54**, 827 (1971)】，与真实值 5.83 D 相比较。（1 D = 3.33564×10^{-30} C m。）对于 NaCl ，计算偶极矩和实验偶极矩的值分别为 9.18 D 和 9.02 D【R. L. Matcha, *J. Chem. Phys.*, **48**, 335 (1968)】。此类计算中通常存在约 0.2 D 的误差，但在偶极矩较小的情况下，百分比误差可能较大。一个极端的例子是 CO ，其偶极矩的实验值为 0.11 D，极性为 $\text{C}-\text{O}^+$ ，但进哈特里-福克偶极矩为 0.27 D，得到了错误的极性 C^+O^- 。然而，组态相互作用波函数可以得出具有正确极性的 0.12 D 值【S. Green, *J. Chem. Phys.*, **54**, 827 (1971)】。

哈特里-福克法的主要缺陷在于其无法精确计算分子解离能。例如，扩展基组计算【P. E. Cade et al., *J. Chem. Phys.*, **44**, 1973 (1966)】得出的 N_2 分子解离能为 $D_e = 5.3$ eV，而真实值应为 9.9 eV。（计算哈特里-福克 D_e 时，需将 $U(R)$ 哈特里-福克曲线中分子能量的最小值从分离原子的哈特里-福克能量总和和中减去。）哈特里-福克分子波函数的另一个缺陷在于：当 R 趋于无穷时，其能量会趋近于错误的极限值。回忆对 H_2 分子轨道的讨论。

13.15 分子轨道理论处理异核双原子分子

异核双原子分子的处理方法与同核双原子分子类似。我们首先考虑分子轨道描述。

假设有两个核电荷数稍微不同的原子；例如 CO 。我们可以认为， CO 是通过电中性分子 N_2 中

的一个原子核逐渐向另一个原子核转移电荷而形成。在此假设转移过程中, 原始的 N_2 分子轨道将逐渐变化, 最终形成 CO 分子轨道。因此, 我们预计 CO 分子的分子轨道在某种程度上会与 N_2 的分子轨道相似。然而, 对于异核双原子分子, 电子哈密顿算符 (13.5) 在电子坐标反演时并非不变的 (即 $\hat{H}_{el}$ 不与 $\hat{\Pi}$ 对易), 则分子轨道的 g 和 u 对称性消失。 N_2 和 CO 壳层表示之间的关联性为

N_2	$1\sigma_g$	$1\sigma_u$	$2\sigma_g$	$2\sigma_u$	$1\pi_u$	$3\sigma_g$	$1\pi_g$	$3\sigma_u$
CO	1σ	2σ	3σ	4σ	1π	5σ	2π	6σ

具有相同对称性的分子轨道按照能量依次递增的顺序标号。因为缺少了 g 和 u 对称性, 同核和异核分子轨道对应的数字不同。图13.21是通过自洽场计算确定的 CO 分子轨道 $1\pi_{\pm 1}$ 等高线示意图【W. M. Huo, *J. Chem. Phys.*, **43**, 624 (1965)】。注意其轮廓与图13.13的相似性, 该图展示了同核双原子分子中 $1\pi_{u,\pm 1}$ 分子轨道的轮廓。




图 13.21: CO 中 $1\pi_{\pm 1}$ 分子轨道轮廓的横截面。

CO 的基态组态为 $1\sigma^2 2\sigma^2 3\sigma^2 4\sigma^2 1\pi^4 5\sigma^2$, 而 N_2 的基态组态为 $(1\sigma_g)^2 (1\sigma_u)^2 (2\sigma_g)^2 (2\sigma_u)^2 (1\pi_u)^4 (3\sigma_g)^2$ 。

与同核双原子分子类似, 异核双原子分子的分子轨道被近似为原子轨道的线性组合。系数通过第14.3节所述方法求得。例如, 采用斯莱特原子轨道 (按斯莱特规则设定非优化指数) 进行最小基组自洽场计算时, 在 $R = R_e$ 条件下, CO 分子的 5σ 、 1π 和 2π 分子轨道结果如下【B. J. Ransil, *Rev. Mod. Phys.*, **32**, 245 (1960)】:

$$5\sigma = 0.027 (1s_C) + 0.011 (1s_O) + 0.739 (2s_{\perp C}) + 0.036 (2s_{\perp O}) \\ - 0.566 (2p\sigma_C) - 0.438 (2p\sigma_O)$$

$$1\pi = 0.469 (2p\pi_C) + 0.771 (2p\pi_O), \quad 2\pi = 0.922 (2p\pi_C) - 0.690 (2p\pi_O)$$

π 分子轨道的表达式比 σ 分子轨道简单, 因为 s 和 $p\sigma$ 原子轨道无法参与贡献 π 分子轨道。作为对比, N_2 中 $R = R_e$ 处对应的分子轨道为 (Ransil, op. cit.):

$$3\sigma_g = 0.030 (1s_a + 1s_b) + 0.395 (2s_{\perp a} + 2s_{\perp b}) - 0.603 (2p\sigma_a + 2p\sigma_b)$$

$$1\pi_u = 0.624 (2p\pi_a + 2p\pi_b), \quad 1\pi_g = 0.835 (2p\pi_a - 2p\pi_b)$$

CO 分子轨道与 N_2 分子轨道的相似性显而易见。 CO 中的 1σ 分子轨道几乎与氧原子 $1s$ 原子轨道完全一致; 而 CO 中的 2σ 分子轨道本质上就是碳原子 $1s$ 原子轨道。一般而言, 对于异核双原子分子 AB , 当每个原子的原子轨道均为 s 型和 p 型, 且 A 的原子轨道与 B 的原子轨道能量差异不大时, 可预期其轨道能量分布符合图13.17所示模式:

$$\sigma s < \sigma^* s < \pi p < \sigma p < \pi^* p < \sigma^* p$$

即由 s 和 p 价层原子轨道形成的价层分子轨道具有较好适用性。

当 B 的价层原子轨道能量远小于 A 的价层原子轨道能量时, B 的 s 和 $p\sigma$ 价层原子轨道将比 A 的 s 价层原子轨道能量更低, 这将影响各分子轨道中参与构成的原子轨道。例如, 考虑 BF 。最小基组计算【Ransil, *Rev. Mod. Phys.*, **32**, 245 (1960)】给出的 1σ 分子轨道实际上是 $1s_F$, 而 2σ 分子轨道则是 $2s_B$ 。而 3σ 分子轨道则绝大多数是 $2s_F$, 并含有少量 $2s\sigma_B$, $2p\sigma_B$ 和 $2p\sigma_F$ 成分。 4σ 分子轨道则绝大多数是 $2p\sigma_F$, 也有大量的 $2s_B$ 和 $2s_F$ 成分, 还有微量的 $2p\sigma_B$ 成分。这与 N_2 的分子轨道显然不同, 其对应的分子轨道绝大多数由每个 N 的 $2s$ 原子轨道构成。 1π 分子轨道是 $2p\pi_F$ 和 $2p\pi_B$ 的成键组合。 5σ 分子轨道主要由 $2s_B$ 构成, 其中 $2p\sigma_B$ 贡献显著, $2p\sigma_F$ 亦有重要贡献。这也与 N_2 中对应的分子轨道不同, 其最大的贡献来自于每个原子的 $2p\sigma$ 原子轨道。 2π 分子轨道则是 $2p\pi_F$ 和 $2p\pi_B$ 的反键组合。 6π 分子轨道的重要贡献来自于 $2p\sigma_B$ 、 $2s_B$ 、 $2s_F$ 和 $2p\sigma_F$ 。

根据图 11.2, 我们知道 $2p_F$ 原子轨道能量低于 $2s_B$ 原子轨道能量。这使得 $2p\sigma_F$ 原子轨道对能量较低的分子轨道贡献显著, 而 $2s_B$ 原子轨道则对较高的分子轨道有较多贡献, 与 N_2 形成鲜明对比 (这种效应出现在 CO 中, 尽管程度较轻。注意 $2s_C$ 对 5σ 分子轨道的显著贡献。以及 $2p\sigma_O$ 对 4σ 分子轨道的贡献也很大。)

对于双原子分子 AB , 其中每个原子具有 s 和 p 价层原子轨道 (不包括氢和过渡元素), 且 A 与 B 的价层原子轨道能量差异显著, 我们可预期其价层分子轨道模式为: $\sigma < \sigma < \pi < \sigma < \pi < \sigma$, 但难以直接推测哪些原子轨道参与了不同分子轨道的形成, 亦难以判断这些分子轨道的成键或反键性质。通过将价电子填入这些分子轨道, 我们可以合理推测 AB 分子的未成对电子数及其基态 (见习题 13.38)。

双原子氢化物属于特殊情况, 因为 H 仅具有 $1s$ 价键原子轨道。以 HF 为例说明。 H 的原子基态组态为 $1s$, 而 F 则为 $1s^2 2s^2 2p^5$ 。我们预期 F 已填满的 $1s$ 和 $2s$ 亚层在键合中贡献甚微。 F 的四个 $2p\pi$ 的电子属于非键合电子 (H 原子上不存在 π 价层原子轨道)。 H 的 $1s$ 原子轨道与 F 的 $2p\sigma$ 原子轨道具有相同的对称性 (σ), 且能量相当接近 (见图 11.2)。这两种原子轨道的线性组合将形成用于成键电子对的 σ 分子轨道:

$$\phi = c_1(1s_H) + c_2(2p\sigma_F)$$

其中忽略了 $1s_F$ 和 $2s_F$ 原子轨道的贡献, 因为 F 的电负性远高于 H , 我们可以预测 $c_2 > c_1$ 。(除此以外, $1s_H$ 和 $2p\sigma_F$ 原子轨道形成了反键轨道, 但在基态时未占据)。

刚刚给出的 HF 图仅为粗略的定性近似。采用具有优化指数的斯莱特轨道进行最小基函数集的自洽场计算, 得出的分子轨道为【B. J. Ransil, *Rev. Mod. Phys.*, **32**, 245 (1960)】:

$$\begin{aligned} 1\sigma &= 1.000(1s_F) + 0.012(2s_{\perp F}) + 0.002(2p\sigma_F) - 0.003(1s_H) \\ 2\sigma &= -0.018(1s_F) + 0.914(2s_{\perp F}) + 0.090(2p\sigma_F) + 0.154(1s_H) \\ 3\sigma &= -0.023(1s_F) - 0.411(2s_{\perp F}) + 0.711(2p\sigma_F) + 0.516(1s_H) \end{aligned}$$

$$1\pi_{+1} = (2p\pi_{+1})_F, \quad 1\pi_{-1} = (2p\pi_{-1})_F$$

HF 的基态分子轨道组态为 $1\sigma^2 2\sigma^2 3\sigma^2 1\pi^4$ 。 $1s$ 分子轨道与 F $1s$ 原子轨道几乎完全相同。 2σ 分子轨道与 F $2s$ 原子轨道极为接近。根据对称性要求, 1π 分子轨道必须与对应的 F 原子 π 原子轨道相同。成键的 3σ 分子轨道主要由 F $2p\sigma$ 原子轨道和 H $1s$ 原子轨道贡献, 这与前文讨论的结果一致。然而, F $2s$ 原子轨道对该分子轨道贡献显著。(因为单 $2s$ 函数只是对 F $2s$ 原子轨道的近似, 我们不能使用该计算来准确得出 HF 分子轨道中 $2s$ 原子轨道的贡献。)

对于定性讨论 (而非定量工作), 异核双原子分子轨道的简单近似模型颇具实用价值。在最粗略的近似中, 可将异核双原子分子的每个价层分子轨道视为每个原子轨道 ϕ_a 和 ϕ_b 的线性组合。(正如 CO 和 BF 的讨论所示, 这种近似往往相当不准确。)从两个原子轨道出发, 我们可以形成两个分

子轨道:

$$c_1\phi_a + c_2\phi_b, \quad c'_1\phi_a + c'_2\phi_b$$

异核双原子分子缺乏对称性, 导致系数大小不一。这些系数通过求解久期方程确定【参见式 (13.45)】:

$$\begin{vmatrix} H_{aa} - W & H_{ab} - WS_{ab} \\ H_{ab} - WS_{ab} & H_{bb} - W \end{vmatrix} = 0$$

$$(H_{aa} - W)(H_{bb} - W) - (H_{ab} - WS_{ab})^2 = 0 \quad (13.125)$$

其中 $\hat{H}$ 是某种有效单电子哈密顿量。假设 $H_{aa} > H_{bb}$, 再令 (13.125) 的左侧为 $f(W)$ 。交换积分 S_{ab} 的值小于 1 (除了 $R = 0$ 处)。【A rigorous proof of this follows from Eq. (3.114) in *Margenau and Murphy*.】 $f(W)$ 中 W^2 的系数为 $(1 - S_{ab}^2) > 0$; 因此 $f(\infty) = f(-\infty) = +\infty > 0$ 。若 $W = H_{aa}$ 或 H_{bb} , 则 (13.125) 中的第一个乘积为零。因此 $f(H_{aa}) < 0$ 及 $f(H_{bb}) > 0$ 。当 $f(W)$ 为零时, (13.125) 才有解。因此, 根据连续性, 一个根必须介于 H_{aa} 和 H_{bb} 之间, 另一个根则介于 H_{bb} 和 $-\infty$ 之间。那么单分子轨道的能量同时比 H_{aa} 和 H_{bb} 低 (分子中两个原子轨道的能量, 第 13.5 节), 另一个分子轨道的能量则比 H_{aa} 和 H_{bb} 都高。两个原子轨道形成一个成键分子轨道和一个反键分子轨道。图 13.22 展示了在同核和异核情况下, 两个原子轨道形成成键与反键分子轨道的过程。这些示意图过于简化, 因为特定的分子轨道由多个原子轨道共同贡献, 而不仅限于两个。




图 13.22: 同核与异核情况下从原子轨道形成成键与反键分子轨道的过程。(参见习题 13.39)

图 13.22 异核成键分子轨道中的系数 c_1 和 c_2 都为正值, 则会引起核间电荷积累; 对于反键分子轨道, ϕ_a 和 ϕ_b 的系数符号相反, 导致核间电荷减少。

13.16 价键理论处理异核双原子分子

考虑 HF 的价键理论基态波函数。我们预期单键将由氢原子 $1s$ 轨道电子与氟原子未成对的 $2p\sigma$ 轨道电子配对形成。对应于该电子对的海特勒-伦敦函数为【式 (13.117)】

$$\phi_{\text{cov}} = |\cdots 1s_{\text{H}} \overline{2p\sigma_{\text{F}}}| - |\cdots 1s_{\text{H}} 2p\sigma_{\text{F}}| \quad (13.126)$$

其中的省略号表示 $1s_{\text{F}} \overline{1s_{\text{F}}} 2s_{\text{F}} \overline{2s_{\text{F}}} 2p_{x\text{F}} \overline{2p_{x\text{F}}} 2p_{y\text{F}} \overline{2p_{y\text{F}}}$ 。该键本质上是共价键, 两个原子共用电子。然而, 氟的高电负性促使我们同时考虑离子结构的贡献。离子价键理论波函数的形式为 $\phi_a(1)\phi_a(2)$ 【式 (13.109)】。引入必需的反对称自旋因子后, 得到 HF 中离子结构的价键函数:

$$\phi_{\text{ion}} = |\cdots 2p\sigma_{\text{F}} \overline{2p\sigma_{\text{F}}}|$$

则价键理论波函数写作

$$\phi = c_1\phi_{\text{cov}} + c_2\phi_{\text{ion}} \quad (13.127)$$

通过变分法可以求得系数 c_1 和 c_2 的最佳值。则需要求解常规久期方程。我们存在离子-共价“共振”，涉及结构 H-F 和 H^+F^- 。真实分子结构介于这两者之间。也可以引入对应于离子结构的项 $c_3 |1s_{\text{H}}\overline{1s_{\text{H}}}|$ ，但它对 HF 的贡献较小。对于离子性较弱的分子，两种离子结构都可能存在。

对于高度电离的分子，例如 NaCl ，我们预计价键函数满足 $c_2 \gg c_1$ 。人们可能会认为 NaCl 会解离成 Na^+ 和 Cl^- 离子对，但这是不可能的。 Na 的电离能为 5.1 eV ，而 Cl 的电子亲和能仅为 3.6 eV 。因此在气相中，基态的中性原子 $\text{Na}+\text{Cl}$ 比基态离子 Na^+ 和 Cl^- 更稳定（在水溶液中，离子因形成水合离子的作用而更稳定，这使得分离的离子甚至比双原子 NaCl 分子更稳定）。如果原子核被缓慢拉开，气态的 NaCl 分子将解离为中性原子。因此，随着 R 从 R_e 处开始增长时，(13.127) 中的比值 c_2/c_1 必须逐渐减小，在 $R = \infty$ 时趋于零。对于中等值的 R ，离子间的库仑吸引力大于电离势与电子亲和能之间 1.5 eV 的差值，此时分子主要呈离子态。当 R 值极大时，离子间的库仑吸引力小于 1.5 eV ，分子则主要呈共价态。然而，若 NaCl 中的原子核被极快地分离，电子将无暇调整其波函数形态——从离子态波函数转变为共价态波函数——此时两个成键电子将随 Cl 原子核转移，导致分子解离为离子。

铯的电离能最低，为 3.9 eV ，而氯的电子亲和能最高，为 3.6 eV 。因此，即使对于 CsCl 和 CsF 而言，分离的基态中性原子也比分离的基态离子更稳定。然而，存在某些双原子分子的激发态会解离为离子。

13.17 价电子近似

假设我们想处理具有 110 个电子的 Cs_2 分子。在分子轨道法中，我们首先写出一个分子轨道的 110×110 斯莱特行列式。我们将通过含变分参数的函数近似分子轨道，进而最小化变分积分。显然，大量电子的存在使这项任务变得极其艰巨。简化问题的途径之一是将电子分为两组：108 个核心（core）电子与两个 $6s$ 价（valence）电子（负责键合）。随后我们尝试将价电子与核心电子分开处理，将分子能视为核心电子能与价电子能之和。这种始于 1930 年代的方法被称为价电子近似法（valence-electron approximation）。

最简单的方法是把核心电子看作与原子核重合的点电荷。对于 Cs_2 ，这就给出了两个价电子的哈密顿算符且和 H_2 的电子哈密顿算符是一样的。如果我们继续最小化 Cs_2 中价电子的变分积分，对价电子试探函数不加限制，我们就有麻烦了。这样的过程会导致价电子的分子轨道“坍缩”到 $\sigma_g 1s$ 分子轨道，因为核心电子被视为不存在。为了避免这种坍缩，可以施加一个约束条件，即用于价电子的变分函数与核心电子的轨道正交。当然，保持价电子轨道与核心电子轨道正交意味着更多的工作。另一种稍有不同的方法是放弃将核心电子视为与原子核重合的近似处理，而是将其视为一种电荷分布，为价电子的运动提供某种有效的排斥势。这会得出价电子的有效哈密顿算符，然后将其用于变分积分。价电子近似在多原子分子的近似处理中被广泛使用（第 17 章）。

总结

习题

Chapter 14

分子量子力学理论

本章讨论在分子量子力学中应用的理论。第14.1节使用波函数来表示电子概率密度。第14.2节展示了如何从波函数中计算出分子的偶极矩。第14.3节给出了计算分子哈特里-福克波函数的步骤。第14.4至第14.7节给出了位力定理和赫尔曼-费恩曼定理，这些定理对我们理解化学键很有帮助。

14.1 电子概率密度

多电子分子的波函数与电子概率密度之间有何关联？我们想要找出在空间中位于点 (x, y, z) 的边长分别为 dx 、 dy 、 dz 的矩形体积元内找到一个电子的概率。电子波函数 ψ 是 n 个电子的空间坐标和自旋坐标的函数。（为简便起见，核构型的参数依赖性将不明确表示。）我们知道

$$|\psi(x_1, \dots, z_n, m_{s1}, \dots, m_{sn})|^2 dx_1 dy_1 dz_1 \dots dx_n dy_n dz_n \quad (14.1)$$

为在 (x_1, y_1, z_1) 处的体积微元 $dx_1 dy_1 dz_1$ 内找到自旋为 m_{s1} 的电子 1，在 (x_2, y_2, z_2) 处的体积微元 $dx_2 dy_2 dz_2$ 内找到自旋为 m_{s2} 的电子 2 等的概率。因为我们对在 (x, y, z) 处找到的电子处于何种自旋状态并不感兴趣，所以我们对所有可能的电子自旋态求和 (14.1)，从而给出同时在适当体积元内找到每个电子的概率，不考虑自旋：

$$\sum_{m_{s1}} \dots \sum_{m_{sn}} |\psi|^2 dx_1 \dots dz_n \quad (14.2)$$

假设我们希望求出在 (x, y, z) 处的体积微元 $dx dy dz$ 内找到电子 1 的概率。对于这个概率，我们并不关心电子 2 到 n 位于何处。因此，我们要把这些电子处于所有可能位置的概率相加。这相当于对电子的坐标进行积分

$$\left[\sum_{\text{all } m_s} \int \dots \int |\psi(x, y, z, x_2, y_2, z_2, \dots, x_n, y_n, z_n, m_{s1}, m_{s2}, \dots, m_{sn})|^2 dx_2 \dots dz_n \right] dx dy dz \quad (14.3)$$

其中从 x_2 到 z_n 共有 $(3n - 3)$ 重积分。

再假设我们希望求出在 (x, y, z) 处的体积微元 $dx dy dz$ 内找到电子 2 的概率。类比 (14.3) 该积分为

$$\left[\sum_{\text{all } m_s} \int \dots \int |\psi(x_1, y_1, z_1, x, y, z, x_3, \dots, z_n, m_{s1}, \dots, m_{sn})|^2 dx_1 dy_1 dz_1 dx_3 \dots dz_n \right] dx dy dz \quad (14.4)$$

当然，电子本身并不带有标记，这种不可区分性（第10.3节）意味着概率式 (14.3) 与 (14.4) 必须相等。该等式可轻易得到证明。在电子坐标交换时，波函数 ψ 满足反对称，因此电子交换时 $|\psi|^2$ 不变。

在 (14.4) 中交换 ψ 中电子 1 和 2 的空间和自旋坐标, 再重新标记虚拟变量, 我们发现 (14.3) 等于 (14.4)。因此 (14.3) 给出了在 $dx dy dz$ 的体积微元内找到任意特定电子的概率。因为系统有 n 个电子, 在 $dx dy dz$ 的体积微元内找到单个电子的概率为 n 乘以 (14.3)。(在得出这一结论时, 我们假设在无限小空间 $dx dy dz$ 内发现多个电子的概率与发现单个电子的概率相比可以忽略不计。这一假设显然成立, 因为发现两个电子的概率需要考虑六个无限小量的乘积, 而发现单个电子的概率仅需考虑三个无限小量的乘积。)

因此, 在某点 (x, y, z) 附近找到电子的概率密度 ρ 为

$$\rho(x, y, z) = n \sum_{\text{all } m_s} \int \cdots \int |\psi(x, y, z, x_2, \cdots, z_n, m_{s1}, \dots, m_{sn})|^2 dx_2 \dots dz_n$$

$$\rho(\mathbf{r}) = n \sum_{\text{all } m_s} \int \cdots \int |\psi(x, y, z, x_2, \cdots, z_n, m_{s1}, \dots, m_{sn})|^2 d\mathbf{r}_2 \dots d\mathbf{r}_n \quad (14.5)$$

其中我们用到了空间变量的向量表示 (第 5.2 节)。 ρ 的原子单位为 e/a_0^3 , 其中 e 为电子的电荷, a_0 为玻尔半径。

ρ 为电子概率密度。对应的电子电荷密度经时间平均后等于 $-e\rho(x, y, z)$, 其中 $-e$ 为电子的电荷。在原子单位制下, 电荷密度为 $-\rho$ 。此外, 还有原子核的正电荷。术语“电子电荷密度”(electronic charge density) 通常简称为“电荷密度”(charge density)。

分子的 ρ 值是一个实验可观测量, 可通过测量分子晶体的 X 射线衍射强度或气体的电子衍射强度获得。见 P. Coppens and M. B. Hall (eds.), *Electron Distributions and the Chemical Bond*, Plenum, 1982; D. A. Kohl and L. S. Bartell, *J. Chem. Phys.*, **51**, 2891, 2896 (1969); P. Coppens, *J. Phys. Chem.*, **93**, 7979 (1989); P. Coppens, *Annu. Rev. Phys. Chem.*, **43**, 663 (1992); C. Gatti and P. Macchi (eds.), *Modern Charge Density Analysis*, Springer, 2012.

为说明式 (14.5), 考虑简单价键理论和分子轨道理论基态 H_2 波函数的电子密度。波函数为空间因子和自旋函数 (11.60) 的乘积。(对于多于两个电子的分子, ψ 不能写成自旋部分和空间部分的乘积, 见第 10 章。) 将 (11.60) 对 m_{s1} 和 m_{s2} 求和, 结果为 1 (第 10.4 节)。因此, 对于 H_2 , (14.5) 变为

$$\rho(x, y, z) = 2 \int \int |\phi(x, y, z, x_2, y_2, z_2)|^2 dx_2 dy_2 dz_2$$

当 ϕ 分别取为价键理论函数 (13.100) 与问题 13.33 中的自旋因子或分子轨道函数 (13.94) 时, 我们得出 (问题 14.1)

$$\rho_{VB} = \frac{1s_a^2 + 1s_b^2 + 2S_{ab}1s_a1s_b}{1 + S_{ab}^2}, \quad \rho_{MO} = \frac{1s_a^2 + 1s_b^2 + 2(1s_a1s_b)}{1 + s_{ab}} \quad (14.6)$$

可以得出 (问题 14.2): 在共价键的中点处有 $\rho_{MO} > \rho_{VB}$ 。因此, 分子轨道函数 (该函数低估了电子相关效应) 在核间堆积的电荷比价键函数更多。

对于类 H_2^+ 分子轨道 $1s_A + 1s_B$ 【式 (13.65)】, (14.6) 中的分子轨道概率密度为 ρ 的两倍。可以证明, 对于多电子分子轨道波函数, ρ 可通过将每个分子轨道的概率密度函数与占据该轨道的电子数相乘, 再将结果求和得到:

$$\rho(x, y, z) = \sum_j n_j |\phi_j|^2 \quad (14.7)$$

其中针对所有不同的正交空间分子轨道求和, n_j (其可能值为 0、1 和 2) 为分子轨道 ϕ_j 中电子的数目。【我们用到了 (11.11)】。

通过高质量波函数计算得到的 ρ 值表明, 对于几乎所有分子而言, ρ 的局部极大值仅出现在原子核处。其中一个例外是 Li_2 的基态, 其 ρ 在共价键中点处有一个较小的极大值。【Bader, Section E2.1; G. I. Bersuker et al., *J. Phys. Chem.*, **97**, 9323 (1993)】。

令 $B(\mathbf{r}_i)$ 为在电子 i 在 x_i, y_i, z_i 处的空间坐标函数，此处用到了第5.2节中的向量表示法。对于 n 电子分子，考虑平均值

$$\left\langle \psi \left| \sum_{i=1}^n B(\mathbf{r}_i) \right| \psi \right\rangle = \int \psi^* \sum_{i=1}^n B(\mathbf{r}_i) \psi \, d\tau = \sum_{i=1}^n \int |\psi|^2 B(\mathbf{r}_i) \, d\tau$$

其中 ψ 是电子波函数。因为电子的不可区分性，求和 $\sum \int |\psi|^2 B \, d\tau$ 中的每一项都必须相等。因此有 $\langle \psi | \sum_{i=1}^n B(\mathbf{r}_i) | \psi \rangle = \int n |\psi|^2 B(\mathbf{r}_1) \, d\tau$ 。由于 $B(\mathbf{r}_1)$ 只依赖于 x_1, y_1, z_1 ，所以在对 x_1, y_1, z_1 积分以前，我们可以先对电子 2 到 n 的空间坐标积分 $n |\psi|^2$ ，再对所有自旋坐标求和。根据 (14.5)，该过程该出了电子概率密度 $\rho(\mathbf{r}_1)$ 。因此，我们得出 $\langle \psi | \sum_{i=1}^n B(\mathbf{r}_i) | \psi \rangle = \int \rho(\mathbf{r}_1) B(\mathbf{r}_1) \, d\mathbf{r}_1$ 。积分变量中的下标 1 是多余的，那么最终的结果为

$$\int \psi^* \sum_{i=1}^n B(\mathbf{r}_i) \psi \, d\tau = \int \rho(\mathbf{r}) B(\mathbf{r}) \, d\mathbf{r} \quad (14.8)$$

其中的积分包括三个自旋坐标 x, y, z 。该结果将在本章后续部分以及第15章中使用。

14.2 偶极矩

我们现在展示如何从波函数计算分子偶极矩。一组分立电荷 Q_i 电偶极矩 μ_{cl} 的经典表达式为

$$\mu_{\text{cl}} = \sum_i Q_i \mathbf{r}_i \quad (14.9)$$

其中 $\mathbf{r}_i$ 为从原点指向第 i 个点电荷的位置矢量【式 (5.33)】。电偶极矩为矢量，其 x 分量为

$$\mu_{x,\text{cl}} = \sum_i Q_i x_i \quad (14.10)$$

其 y 和 z 分量类似。对于电荷密度为 $\rho_Q(x, y, z)$ 的连续分布， μ_{cl} 可以通过对元电荷 $dQ_i = \rho_Q(x, y, z) \, dx \, dy \, dz$ 积分得到：

$$\mu_{\text{cl}} = \int \rho_Q(x, y, z) \mathbf{r} \, dx \, dy \, dz, \quad \text{其中 } \mathbf{r} \equiv x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} \quad (14.11)$$

再来考虑电偶极矩的量子力学定义。假设我们对原子或分子施加均匀外电场 $\mathbf{E}$ ，并考察其对系统能量的影响。为构造哈密顿算符，我们首先需要能量的经典表达式。电场强度 $\mathbf{E}$ 定义为 $\mathbf{E} \equiv \mathbf{F}/Q$ ，其中 $\mathbf{F}$ 为电场作用于电荷 Q 上的力。我们取外加电场的方向为 z 方向： $\mathbf{E} = \mathcal{E}_z \mathbf{k}$ 。势能 V 为【式 (4.24)】

$$dV/dz = -F_z = -Q\mathcal{E}_z \quad \text{以及} \quad V = -Q\mathcal{E}_z z$$

这是电场中单个电荷的势能。对于多个电荷的系统，

$$V = -\mathcal{E}_z \sum_i Q_i z_i \quad (14.12)$$

其中 z_i 为电荷 Q_i 的 z 坐标。将 (14.12) 式推广至电场指向任意方向的情况，可由 (4.24) 式得出，为

$$V = -\mathcal{E}_x \sum_i Q_i x_i - \mathcal{E}_y \sum_i Q_i y_i - \mathcal{E}_z \sum_i Q_i z_i = -\mathbf{E} \cdot \mu_{\text{cl}} \quad (14.13)$$

这是经典力学中描述均匀外加电场中电偶极子能量的表达式。

为了计算量子力学表达式, 我们使用微扰理论。与 (14.13) 对应的微扰算符 $\hat{H}'$ 为 $\hat{H}' = -\mathbf{E} \cdot \hat{\boldsymbol{\mu}}$, 其中 $\hat{\boldsymbol{\mu}}$ 为**电偶极矩算符** (electric dipole-moment operator)

$$\hat{\boldsymbol{\mu}} = \sum_i Q_i \hat{\mathbf{r}}_i = \hat{\mathbf{i}}\hat{\mu}_x + \hat{\mathbf{j}}\hat{\mu}_y + \hat{\mathbf{k}}\hat{\mu}_z \quad (14.14)$$

$$\hat{\mu}_x = \sum_i Q_i x_i, \quad \hat{\mu}_y = \sum_i Q_i y_i, \quad \hat{\mu}_z = \sum_i Q_i z_i \quad (14.15)$$

对能量的一级修正为【式 (9.22)】

$$E^{(1)} = -\mathbf{E} \cdot \int \psi^{(0)*} \hat{\boldsymbol{\mu}} \psi^{(0)} d\tau \quad (14.16)$$

其中 $\psi^{(0)}$ 为无扰波函数。将 (14.16) 与 (14.13) 相比较, 我们发现对应于 μ_{cl} 的量子力学量为积分

$$\boldsymbol{\mu} = \int \psi^{(0)*} \hat{\boldsymbol{\mu}} \psi^{(0)} d\tau \quad (14.17)$$

(14.17) 中的 $\hat{\boldsymbol{\mu}}$ 成为系统的量子力学**电偶极矩** (electric dipole moment)。

反对将 (14.17) 作为偶极矩的理由在于, 我们仅考虑了一阶能量修正项。若我们在 (14.16) 中引入了 $E^{(2)}$, 与 (14.13) 相比较, 我们无法得出 (14.17) 为偶极矩。实际上, (14.17) 表示系统在无外加电场作用下的偶极矩, 即永久电偶极矩。电场的作用使得波函数从 $\psi^{(0)}$ 发生畸变, 除了永久偶极矩外, 还产生了诱导电偶极矩。该诱导偶极矩对应于能量校正 $E^{(2)}$ 。(具体细节见 *Merzbacher*, Section 17.4.) 诱导偶极矩 $\boldsymbol{\mu}_{ind}$ 与外加电场 $\mathbf{E}$ 的关系为

$$\boldsymbol{\mu}_{ind} = \alpha \mathbf{E} \quad (14.18)$$

其中 α 为原子或分子的**极化率** (polarizability)。分子 B 的极化率越大, 两个 B 分子之间的伦敦色散力 (第13.7节) 就越强。

量子力学系统在施加电场作用下发生的能级位移称为斯塔克效应 (Stark effect)。一阶 (或线性) 斯塔克效应由式 (14.16) 给出, 根据式 (14.17), 当系统不具有永久电偶极矩时该效应消失。二阶 (或二次) 斯塔克效应由能量修正项 $E^{(2)}$ 描述, 其大小与施加电场的平方成正比。

电偶极矩算符 (14.14) 为坐标的奇函数。若 (14.17) 中的波函数是奇函数或偶函数, 则 (14.17) 中的被积函数为奇函数, 则对全空间积分为零。因此, 对于具有确定宇称的状态, 其永久偶极矩 $\hat{\boldsymbol{\mu}}$ 为零。

处于电子态 ψ_{el} 分子的永久电偶极矩为

$$\hat{\boldsymbol{\mu}} = \int \psi_{el}^* \hat{\boldsymbol{\mu}} \psi_{el} d\tau_{el} \quad (14.19)$$

根据同核双原子分子宇称的不同, 其电子波函数可以分为 g 和 u 。因此, 同核双原子分子具有零永久电偶极矩, 这一结果并不令人惊讶。具有对称中心的任何分子均遵循相同规律。分子的电偶极矩算符包含对电子电荷与核电荷的求和项:

$$\hat{\boldsymbol{\mu}} = \sum_{i=1}^n (-e\mathbf{r}_i) + \sum_{\alpha} Z_{\alpha} e\mathbf{r}_{\alpha} \quad (14.20)$$

其中的 $\mathbf{r}_{\alpha}$ 为从原点指向核电荷数为 Z_{α} 的原子核的矢量, $\mathbf{r}_i$ 为从原点指向电子 i 的矢量。因为偶极矩算符 (14.20) 和电子波函数都依赖于定义核组态的参数, 所以分子电偶极矩 $\hat{\boldsymbol{\mu}}$ 取决于核组态。为表明这一点, (14.19) 可称为分子的偶极矩函数。在书写 (14.19) 时, 我们忽略了核运动。当实验测定分子偶极矩时, 所测量的量值 (14.19) 是经过零点振动平均后的结果 (假设温度不足以使较高振

动能级被显著粒子占据)。我们用 $\hat{\mu}_0$ 表示经过零点振动平均后的偶极矩, 用 $\hat{\mu}_e$ 表示在平衡核组态处计算得到的偶极矩。

由于式 (14.20) 中的第二个和式与电子坐标无关, 故有

$$\begin{aligned}\hat{\mu} &= \int \psi_{\text{el}}^* \sum_{i=1} (-e\mathbf{r}_i) \psi_{\text{el}} d\tau_{\text{el}} + \sum_{\alpha} Z_{\alpha} e \mathbf{r}_{\alpha} \int \psi_{\text{el}}^* \psi_{\text{el}} d\tau_{\text{el}} \\ &= -e \int |\psi_{\text{el}}|^2 \sum_{i=1} \mathbf{r}_i d\tau_{\text{el}} + e \sum_{\alpha} Z_{\alpha} \mathbf{r}_{\alpha}\end{aligned}$$

再使用 (14.8), 我们有

$$\hat{\mu} = -e \int \int \int \rho(x, y, z) \mathbf{r} dx dy dz + e \sum_{\alpha} Z_{\alpha} \mathbf{r}_{\alpha} \quad (14.21)$$

其中 ρ 为电子概率密度。方程 (14.21) 是当我们假设电子被展宽成连续电荷分布时所得到的结果, 其电荷密度为 $-e\rho(x, y, z)$, 我们使用经典方程 (14.11) 来计算 $\hat{\mu}$ 。

14.3 分子哈特里-福克方法

量子化学的一项关键进展是针对众多双原子分子和多原子分子, 精确计算出自洽场波函数。分子自洽场分子轨道计算的原理, 与原子自洽场计算的原理 (见第11.1节) 本质上是一致的。我们将讨论范围限定在闭壳层构型。对于开壳层而言, 相关公式要更为复杂。

分子哈特里-福克方程可以写为自旋轨道反对称乘积 (斯莱特行列式), 其中每个自旋轨道又为空间轨道 ϕ_i 与自旋函数 α 或 β 的乘积。

分子哈特里-福克电子能表达式 E_{HF} 又变分理论给出, 为 $E_{\text{HF}} = \langle D | \hat{H}_{\text{el}} + V_{\text{NN}} | D \rangle$, 其中的 D 为哈特里-福克波函数斯莱特行列式, $\hat{H}_{\text{el}}$ 为纯电子哈密顿算符, V_{NN} 为核间排斥势, 由 (13.5) 和 (13.6) 给出。因为 V_{NN} 与电子坐标无关, 以及 D 已归一化, 所以我们有 $\langle D | V_{\text{NN}} | D \rangle = V_{\text{NN}} \langle D | D \rangle = V_{\text{NN}}$ 。算符 $\hat{H}_{\text{el}}$ 为单电子算符 $\hat{f}_i$ 和双电子算符 $\hat{g}_{ij}$ 之和; 我们有 $\hat{H}_{\text{el}} = \sum_{i=1} \hat{f}_i + \sum_j \sum_{i>j} \hat{g}_{ij}$, 其中 (原子单位制下)

$$\hat{f}_i = -\frac{1}{2} \nabla_i^2 - \sum_{\alpha} \frac{Z_{\alpha}}{r_{i\alpha}}, \quad \hat{g}_{ij} = \frac{1}{r_{ij}}$$

哈密顿算符 $\hat{H}_{\text{el}}$ 与原子哈密顿算符 $\hat{H}$ 的唯一区别在于 $\hat{f}_i$ 中用 $\sum_{\alpha} Z_{\alpha}/r_{i\alpha}$ 代替了 Z/r_i 。因此, (11.83) 可以用来计算 $\langle D | \hat{H}_{\text{el}} | D \rangle$ 。则只包含闭壳层的双原子或多原子分子的哈特里-福克能量为

$$E_{\text{HF}} = 2 \sum_{i=1}^{n/2} H_{ii}^{\text{core}} + \sum_{i=1}^{n/2} \sum_{j=1}^{n/2} (2J_{ij} - K_{ij}) + V_{\text{NN}} \quad (14.22)$$

$$H_{ii}^{\text{core}} \equiv \langle \phi_i(1) | \hat{H}^{\text{core}}(1) | \phi_i(1) \rangle = \left\langle \phi_i(1) \left| -\frac{1}{2} \nabla_1^2 - \sum_{\alpha} \frac{Z_{\alpha}}{r_{1\alpha}} \right| \phi_i(1) \right\rangle \quad (14.23)$$

$$J_{ij} \equiv \langle \phi_i(1) \phi_j(2) | 1/r_{12} | \phi_i(1) \phi_j(2) \rangle, \quad K_{ij} \equiv \langle \phi_i(1) \phi_j(2) | 1/r_{12} | \phi_j(1) \phi_i(2) \rangle \quad (14.24)$$

其中的单电子算符表示法从 $\hat{f}_1$ 替换为了 $\hat{H}^{\text{core}}(1)$ 。单电子核哈密顿算符 (one-electron core Hamiltonian)

$$\hat{H}^{\text{core}}(1) \equiv -\frac{1}{2} \nabla_1^2 - \sum_{\alpha} \frac{Z_{\alpha}}{r_{1\alpha}}$$

为电子 1 动能算符和电子 1 与所有原子核之间吸引势能算符的总和。 $\hat{H}^{\text{core}}(1)$ 忽略了电子 1 和其他电子之间的相互作用。对 i 和 j 的求和为对 n 电子分子 $n/2$ 个占据空间轨道 ϕ_i 的求和。在库仑积分 J_{ij} 和交换积分 K_{ij} 中, 积分是针对电子 1 和 2 的空间坐标进行的。

哈特里-福克法寻找使变分积分 E_{HF} 最小的轨道 ϕ_i 。每个空间轨道均已归一化: $\langle \phi_i(1) | \phi_i(1) \rangle = 1$ 。此外, 为了计算方便, 我们取空间轨道彼此正交: $\langle \phi_i(1) | \phi_j(1) \rangle = 0$ ($i \neq j$)。或许有人会认为, 如果取消正交性限制, 就能得到更低的能量, 但事实并非如此。闭壳层反对称波函数是斯莱特行列式, 利用行列式的性质可以证明, 由非正交轨道构成的斯莱特行列式等于通过施密特正交化或其他方法将轨道正交化后的斯莱特行列式; 见第15.9节和 F. W. Bobrowicz and W. A. Goddard, Chapter 4, Section 3.1 of *Schaefer, Methods of Electronic Structure Theory*。事实上, 泡利反对称要求已经排除了不满足正交性要求的轨道。

推导确定能使 E_{HF} 最小的轨道的方程很复杂, 此处忽略。(详细推导见 *Lowe and Peterson, Appendix 7; Szabo and Ostlund, Section 3.1 and 3.2; Parr, pages 21-23.*) 可以证明, 闭壳层正交哈特里-福克分子轨道满足

$$\hat{F}(1) \phi_i(1) = \varepsilon_i \phi_i(1) \quad (14.25)$$

其中 ε_i 为轨道能量, $\hat{F}(1)$ 为**【哈特里】-福克算符【(Hartree) -Fock operator】**, 在原子单位制下为

$$\hat{F}(1) = \hat{H}^{\text{core}}(1) + \sum_{j=1}^{n/2} [2\hat{J}_j(1) - \hat{K}_j(1)] \quad (14.26)$$

$$\hat{H}^{\text{core}}(1) \equiv -\frac{1}{2}\nabla_1^2 - \sum_{\alpha} \frac{Z_{\alpha}}{r_{1\alpha}} \quad (14.27)$$

其中的**库仑算符** (Coulomb operator) $\hat{J}_j(1)$ 和**交换算符** (exchange operator) $\hat{K}_j(1)$ 定义为

$$\hat{H}f(1)f(1) = f(1) \int |\phi_j(2)|^2 \frac{1}{r_{12}} dv_2 \quad (14.28)$$

$$\hat{K}_j(1)f(1) = \phi_j(1) \int \frac{\phi_j^*(2)f(2)}{r_{12}} dv_2 \quad (14.29)$$

其中的 f 为任意函数, 积分为全空间的积分。

(14.27) 右侧的第一项为单电子动能算符。第二项为电子 1 与所有原子核之间的吸引势能算符。库仑算符 $\hat{J}_j(1)$ 表示电子 1 与电荷密度为 $|\phi_j(2)|^2$ 的电子云之间的平均排斥作用。(14.26) 中的因子 2 表示每个空间轨道中有两个电子。交换算符 $\hat{K}_j(1)$ 没有经典对应项, 仅来自于电子交换时波函数需满足反对称的要求。(11.9) 中也没有出现交换算符。(14.25) 中的哈特里-福克分子轨道 ϕ_i 为 $\hat{F}$ 的本征函数, 本征值为轨道能量 ε_i 。

分子轨道的正交性极大简化了分子轨道计算, 使许多积分项归零。相比之下, 价键法采用原子轨道, 而不同原子中心的原子轨道之间并不正交。分子轨道计算远比价键计算简单, 因此分子轨道法的应用更为广泛。

真实哈密顿算符和波函数包括了所有 n 个电子的坐标。哈特里-福克算符 $\hat{F}$ 是单电子算符 (也就是说, 它只包含了一个电子的坐标), (14.25) 是单电子微分方程。通过将 $\hat{F}$ 和 ϕ_i 写作电子 1 的坐标函数, 该结论可以得到验证。当然, 我们可以使用任何电子的坐标。算符 $\hat{F}$ 的特殊性在于它依赖于自身的本征函数【参见式 (14.26) 至 (14.29)】, 而这些本征函数在初始阶段尚未确定。因此, 哈特里-福克方程必须通过迭代法求解, 该过程始于对分子轨道的初始猜测。

为了求出轨道能量 ε_i 的表达式, 我们将 (14.25) 左乘 $\phi_i^*(1)$ 并对全空间积分。使用 ϕ_i 已归一化和问题 14.8 的结论, 我们得到 $\varepsilon_i = \int \phi_i^*(1) \hat{F}(1) \phi_i(1) dv_1$ 以及

$$\varepsilon_i = \langle \phi_i(1) | \hat{H}^{\text{core}}(1) | \phi_i(1) \rangle + \sum_{j=1}^{n/2} [2 \langle \phi_i(1) | \hat{J}_j(1) | \phi_i(1) \rangle - \langle \phi_i(1) | \hat{K}_j(1) | \phi_i(1) \rangle]$$

$$\varepsilon_i = H_{ii}^{\text{core}} + \sum_{j=1}^{n/2} (2J_{ij} - K_{ij}) \quad (14.30)$$

其中的 H_{ii}^{core} 、 J_{ij} 和 K_{ij} 分别由 (14.23) 和 (14.24) 定义。

将 (14.30) 对 $n/2$ 个占据轨道求和, 得到

$$\sum_{i=1}^{n/2} \varepsilon_i = \sum_{i=1}^{n/2} H_{ii}^{\text{core}} + \sum_{i=1}^{n/2} \sum_{j=1}^{n/2} (2J_{ij} - K_{ij}) \quad (14.31)$$

从该方程中解出 $\sum_i H_{ii}^{\text{core}}$ 并将其代入 (14.22), 得到哈特里-福克能量为

$$E_{\text{HF}} = 2 \sum_{i=1}^{n/2} \varepsilon_i - \sum_{i=1}^{n/2} \sum_{j=1}^{n/2} (2J_{ij} - K_{ij}) + V_{\text{NN}} \quad (14.32)$$

因为每个分子轨道有两个电子, 所以 $2 \sum_i \varepsilon_i$ 为所有电子的轨道能量之和。通过对 (14.32) 中的双求和进行减法运算, 可避免对每个电子间排斥作用进行重复计数, 如第 11.1 节所述。

使精确分子自洽场波函数计算成为可能的关键进展, 是罗特汉 (Roothaan) 于 1951 年提出的将空间轨道 ϕ_i 展开为单电子基函数 χ_s 线性组合的方案:

$$\phi_i(1) = \sum_{s=1}^b C_{si} \chi_s \quad (14.33)$$

为了能精确表示分子轨道 ϕ_i , 基函数 χ_s 必须构成一个完备集。这实际上要求我们有无穷多个基函数。然而在实际计算中, 我们必须使用有限数 b 的基函数。若 b 足够大, 以及 χ_s 函数组的选择合理, 则我们可以近似地表示分子轨道, 误差可忽略不计。

为了避免歧义, 我们使用字母 r, s, t, u 来表示基函数下标, 使用字母 i, j, k, l 来表示分子轨道下标。(通常, 我们用希腊字母 $\mu, \nu, \lambda, \sigma$ 来表示基函数。)

将展开式 (14.33) 代入哈特里-福克方程 (14.25), 得到

$$\sum_s c_{si} \hat{F} \chi_s = \varepsilon_i \sum_s c_{si} \chi_s$$

左乘 χ_r^* 并对全空间积分, 得到

$$\sum_{s=1}^b c_{si} (F_{rs} - \varepsilon_i S_{rs}) = 0, \quad r = 1, 2, \dots, b \quad (14.34)$$

$$F_{rs} \equiv \langle \chi_r | \hat{F} | \chi_s \rangle, \quad S_{rs} \equiv \langle \chi_r | \chi_s \rangle \quad (14.35)$$

方程组 (14.34) 为关于 b 个未知数 $c_{si}, s = 1, 2, \dots, b$ 的线性齐次方程组, 它可以表示 (14.33) 中的分子轨道 ϕ_i 。为了得到非平凡解, 我们必须有

$$\det(F_{rs} - \varepsilon_i S_{rs}) = 0 \quad (14.36)$$

这是一个久期方程, 它的根给出了轨道能量 ε_i 。(哈特里)-福克-罗特汉方程【(Hartree)-Fock-Roothaan equations】(14.34) 必须通过迭代法求解, 因为积分 F_{rs} 依赖于轨道 ϕ_i (通过 $\hat{F}$ 依赖于 ϕ_i), 而这些轨道又依赖于未知系数 c_{si} 。

我们从猜测占据分子轨道的表达式为基函数的线性组合开始, 正如 (14.33) 所示。最初得到分子轨道集合可以用来从 (14.26) 至 (14.29) 计算福克算符 $\hat{F}$ 。再计算矩阵元 (14.35), 计算久期方程 (14.36) 来得出最初的 ε_i 集合。我们使用这些 ε_i 和 (14.34) 来计算系数的改进集合, 从而得到改进

的分子轨道和改进的 $\hat{F}$, 等等。持续进行直至分子轨道系数与能量值在相邻迭代周期间不再出现改善。计算过程通过计算机完成。(求解罗特汉方程组最有效的方法是采用矩阵代数方法; 详见本节末尾部分。)

我们交替使用术语自洽场波函数 (SCF wave function) 和哈特里-福克波函数 (Hartree-Fock wave function)。实际上, 自洽场波函数可以用于任何通过迭代法求解罗特汉方程得到的波函数, 并不取决于基函数组是否足够大以至于可以得到对哈特里-福克自洽场波函数的准确近似。仅存在唯一的真实哈特里-福克波函数, 这是能以自旋轨道的斯莱特行列式形式表示的最佳波函数。凭借当前的计算机算力, 可为小分子构建超大基函数集, 所得波函数与真实哈特里-福克波函数的偏差可忽略不计。由于哈特里-福克波函数计算结果存在局限性, 目前广泛应用多种超越该方法的改进技术 (详见第16章)。

福克矩阵元

为了求解罗特汉方程 (14.34), 我们首先需要将福克矩阵元 (积分) 【Fock matrix elements (integrals)】 F_{rs} 用基函数 χ 表示。福克算符 $\hat{F}$ 由 (14.26) 给出, 则

$$F_{rs} = \langle \chi_r(1) | \hat{F}(1) | \chi_s(1) \rangle$$

$$F_{rs} = \langle \chi_r(1) | \hat{H}^{\text{core}}(1) | \chi_s(1) \rangle + \sum_{j=1}^{n/2} [2 \langle \chi_r(1) | \hat{J}_j(1) | \chi_s(1) \rangle - \langle \chi_r(1) | \hat{K}_j(1) | \chi_s(1) \rangle] \quad (14.37)$$

将 (14.28) 中的 f 替换为 χ_s , 再使用展开式 (14.33), 得到

$$\hat{J}_j(1) \chi_s(1) = \chi_s(1) \int \frac{\phi_j^*(2) \phi_j(2)}{r_{12}} dv_2 = \chi_s(1) \sum_t \sum_u c_{tj}^* c_{uj} \int \frac{\chi_t^*(2) \chi_u(2)}{r_{12}} dv_2$$

将其与 $\chi_r^*(1)$ 左乘并对电子 1 的坐标进行全空间积分, 得到

$$\langle \chi_r(1) | \hat{J}_j(1) | \chi_s(1) \rangle = \sum_t \sum_u c_{tj}^* c_{uj} \int \int \frac{\chi_r^*(1) \chi_s(1) \chi_t^*(2) \chi_u(2)}{r_{12}} dv_1 dv_2$$

$$\langle \chi_r(1) | \hat{J}_j(1) | \chi_s(1) \rangle = \sum_{t=1}^b \sum_{u=1}^b c_{tj}^* c_{uj} (rs|tu) \quad (14.38)$$

其中双电子排斥积分 (two-electron repulsion integral) $(rs|tu)$ 定义为

$$(rs|tu) \equiv \int \int \frac{\chi_r^*(1) \chi_s(1) \chi_t^*(2) \chi_u(2)}{r_{12}} dv_1 dv_2 \quad (14.39)$$

(14.39) 中广泛使用的符号不应被误解为重叠积分。电子排斥积分采用多种符号表示, 其中部分符号相互矛盾, 因此查阅作者的定义始终是明智之举。

同样地, 将 (14.29) 中的 f 替换为 χ_s , 得到 (问题 14.9)

$$\langle \chi_r(1) | \hat{K}_j(1) | \chi_s(1) \rangle = \sum_{t=1}^b \sum_{u=1}^b c_{tj}^* c_{uj} (ru|ts) \quad (14.40)$$

将 (14.38) 和 (14.40) 代入 (14.37), 再改变求和的顺序, 我们就得到了期望的, 用基函数 χ 的积分

表示的 F_{rs} 表达式:

$$F_{rs} = H_{rs}^{\text{core}} + \sum_{t=1}^b \sum_{u=1}^b \sum_{j=1}^{n/2} c_{tj}^* c_{uj} [2(rs|tu) - (ru|ts)]$$

$$F_{rs} = H_{rs}^{\text{core}} + \sum_{t=1}^b \sum_{u=1}^b P_{tu} \left[(rs|tu) - \frac{1}{2} (ru|ts) \right] \quad (14.41)$$

$$P_{tu} \equiv 2 \sum_{j=1}^{n/2} c_{tj}^* c_{uj}, \quad t = 1, 2, \dots, b; \quad u = 1, 2, \dots, b \quad (14.42)$$

$$H_{rs}^{\text{core}} \equiv \langle \chi_r(1) | \hat{H}^{\text{core}}(1) | \chi_s(1) \rangle$$

P_{tu} 为密度矩阵元 (density matrix element) 或电荷, 键级矩阵元 (charge, bond order matrix element)。【某些工作者使用如下定义: $P_{tu} \equiv 2 \sum_{j=1}^{n/2} c_{tj}^* c_{uj}$ 。】将展开式 (14.33) 带入 (14.7), 得到闭壳层分子的电荷概率密度 ρ 为

$$\rho = 2 \sum_{j=1}^{n/2} \phi_j^* \phi_j = 2 \sum_{r=1}^b \sum_{s=1}^b \sum_{j=1}^{n/2} c_{rj}^* c_{sj} \chi_r^* \chi_s = \sum_{r=1}^b \sum_{s=1}^b P_{rs} \chi_r^* \chi_s \quad (14.43)$$

为了将哈特里-福克能量用基函数 χ 的积分表示, 我们先求解 (14.31), 得到 $\sum_i \sum_j (2J_{ij} - K_{ij})$, 将结果带入 (14.32), 得到

$$E_{\text{HF}} = \sum_{i=1}^{n/2} \varepsilon_i + \sum_{i=1}^{n/2} H_{ii}^{\text{core}} + V_{NN}$$

再使用展开式 (14.33), 我们有

$$H_{ii}^{\text{core}} = \langle \phi_i(1) | \hat{H}^{\text{core}}(1) | \phi_i(1) \rangle = \sum_r \sum_s c_{ri}^* c_{si} \langle \chi_r | H^{\text{core}} | \chi_s \rangle = \sum_r \sum_s c_{ri}^* c_{si} H_{rs}^{\text{core}}$$

$$E_{\text{HF}} = \sum_{i=1}^{n/2} \varepsilon_i + \sum_r \sum_s c_{ri}^* c_{si} H_{rs}^{\text{core}} + V_{NN}$$

$$E_{\text{HF}} = \sum_{i=1}^{n/2} \varepsilon_i + \frac{1}{2} \sum_{r=1}^b \sum_{s=1}^b P_{rs} H_{rs}^{\text{core}} + V_{NN} \quad (14.44)$$

一种对 E_{HF} 的替代表达式很有用。将 $\hat{F}\phi_i = \varepsilon_i \phi_i$ 【式 (14.25)】左乘 ϕ_i^* 并对全空间积分, 得到 $\varepsilon_i = \langle \phi_i | \hat{F} | \phi_i \rangle$ 。将 $\phi_i = \sum_{s=1}^b c_{si} \chi_s$ 【式 (14.33)】代入, 得到 $\varepsilon_i = \sum_r \sum_s c_{ri}^* c_{si} \langle \chi_r | \hat{F} | \chi_s \rangle = \sum_r \sum_s c_{ri}^* c_{si} F_{rs}$ 。 (14.44) 中的第一个求和变为 $\sum_i \varepsilon_i = \sum_r \sum_s \sum_i c_{ri}^* c_{si} F_{rs} = \frac{1}{2} \sum_r \sum_s P_{rs} F_{rs}$, 其中用到了 P_{rs} 的定义 (14.42)。则方程 (14.44) 变为

$$E_{\text{HF}} = \frac{1}{2} \sum_{r=1}^b \sum_{s=1}^b P_{rs} (H_{rs}^{\text{core}} + F_{rs}) + V_{NN} \quad (14.45)$$

该式给出了用密度矩阵元、福克矩阵元和单电子核矩阵元 (均由基函数 χ_r 计算得出) 表示的闭壳层分子哈特里-福克能量。

例题: 使用由两个轨道系数分别为 $\zeta_1 = 1.45$ 和 $\zeta_2 = 2.91$ 的斯莱特型原子轨道构成的基函数组, 对氮原子基态进行自洽场计算。【经过反复尝试, 这些指数为该基函数集的最优化指数; 见 C. Roetti and E. Clementi, *J. Chem. Phys.*, **60**, 4725 (1974).】

根据 (11.14), 归一化基函数为 (原子单位制下)

$$\chi_1 = 2\zeta_1^{3/2} e^{-\zeta_1 r} Y_0^0, \quad \chi_2 = 2\zeta_2^{3/2} e^{-\zeta_2 r} Y_0^0, \quad \zeta_1 = 1.45, \quad \zeta_2 = 2.91 \quad (14.46)$$

为了解罗特汉方程 (14.34), 我们需要计算积分 F_{rs} 和 S_{rs} 。重叠积分 S_{rs} 为:

$$S_{11} = \langle \chi_1 | \chi_1 \rangle = 1, \quad S_{22} = \langle \chi_2 | \chi_2 \rangle = 1$$

$$S_{12} = S_{21} = \langle \chi_1 | \chi_2 \rangle = 4\zeta_1^{3/2} \zeta_2^{3/2} \int_0^\infty e^{-(\zeta_1 + \zeta_2)r} r^2 dr = \frac{8\zeta_1^{3/2} \zeta_2^{3/2}}{(\zeta_1 + \zeta_2)^3} = 0.8366$$

其中用到了附录中的积分 (A.8)。

积分 F_{rs} 由 (14.41) 给出, 它依赖于 H_{rs}^{core} 、 P_{tu} 和 $(rs|tu)$ 。由 (14.27), $\hat{H}^{\text{core}} = -\frac{1}{2}\nabla^2 - 2/r = -\frac{1}{2}\nabla^2 - \zeta/r + (\zeta - 2)/r$ 。积分 H_{rs}^{core} 的处理方法与第 9.4 节中对氦原子基态的变分处理方法相同。我们有 (问题 14.12)

$$H_{11}^{\text{core}} = \langle \chi_1 | \hat{H}^{\text{core}} | \chi_1 \rangle = -\frac{1}{2}\zeta_1^2 + (\zeta_1 - 2)\zeta_1 = \frac{1}{2}\zeta_1^2 - 2\zeta_1 = -1.8488$$

$$H_{12}^{\text{core}} = H_{21}^{\text{core}} = \langle \chi_1 | \hat{H}^{\text{core}} | \chi_2 \rangle = -\frac{1}{2}\zeta_2^2 S_{12} + \frac{4(\zeta_2 - 2)\zeta_1^{3/2}\zeta_2^{3/2}}{(\zeta_1 + \zeta_2)^2}$$

$$H_{12}^{\text{core}} = H_{21}^{\text{core}} = \frac{\zeta_1^{3/2}\zeta_2^{3/2}(4\zeta_1\zeta_2 - 8\zeta_1 - 8\zeta_2)}{(\zeta_1 + \zeta_2)^2} = -1.8826$$

许多电子排斥积分 $(rs|tu)$ 都相等。对于实基函数, 可以证明 (问题 14.13)

$$(rs|tu) = (sr|tu) = (rs|ut) = (sr|ut) = (tu|rs) = (ut|rs) = (tu|sr) = (ut|sr) \quad (14.47)$$

可以使用问题 9.14 中 $1/r_{12}$ 的展开式 (9.124) 来计算电子排斥积分。可以得出 【见式 (9.53) 和问题 14.14】

$$(11|11) = \frac{5}{8}\zeta_1 = 0.9062, \quad (22|22) = \frac{5}{8}\zeta_2 = 1.8188$$

$$(11|22) = (22|11) = (\zeta_1^4\zeta_2 + 4\zeta_1^3\zeta_2^2 + \zeta_1\zeta_2^4 + 4\zeta_1^2\zeta_2^3) / (\zeta_1 + \zeta_2)^4 = 1.1826$$

$$(12|12) = (21|12) = (12|21) = (21|21) = 20\zeta_1^3\zeta_2^3 / (\zeta_1 + \zeta_2)^5 = 0.9536$$

$$(11|12) = (11|21) = (12|11) = (21|11) = \frac{16\zeta_1^{9/2}\zeta_2^{3/2}}{(3\zeta_1 + \zeta_2)^4} \left[\frac{12\zeta_1 + 8\zeta_2}{(\zeta_1 + \zeta_2)^2} + \frac{9\zeta_1 + \zeta_2}{2\zeta_1^2} \right] = 0.9033$$

$$(12|22) = (22|12) = (21|22) = (22|21)$$

$$= (11|12) \text{ 其中的 1 和 2 交换} = 1.2980$$

为了开始计算, 我们首先需要猜测 (14.33) 中基态原子轨道展开式的系数 c_{si} , 从而可以得到 (14.41) 中最初的密度矩阵元 P_{tu} 。在 9.4 节中, 我们已经看到, 包含 1s 斯莱特型原子轨道的氦原子轨道最优化轨道指数为 $\frac{27}{16} = 1.6875$ 。因为轨道指数 ζ_1 远比 ζ_2 更靠近 1.6875, 所以我们猜测展开式 $\phi_1 = c_{11}\chi_1 + c_{21}\chi_2$ 中 χ_1 的系数远大于 χ_2 。首先猜测 $c_{11}/c_{21} \approx 2$ 。【一种更通用的猜测系数 c_{si} 的方法是先忽略 (14.41) 中的电子排斥积分, 在久期方程 (14.36) 中将 F_{rs} 近似为 H_{rs}^{core} ; 随即求解 (14.36) 和 (14.34)。该方法得出 $c_{11}/c_{21} \approx 1.5$ (问题 14.15)。】归一化条件 $\int |\phi_1|^2 d\tau = 1$ 给出了实系数 (问题 14.17)

$$c_{21} = (1 + k^2 + 2kS_{12})^{-1/2}, \quad k \equiv c_{11}/c_{21} \quad (14.48)$$

将 $k = 2$ 和 $S_{12} = 0.8366$ 代入, 得到 $c_{21} = 0.3461$ 和 $c_{11} \approx 2c_{21} = 0.6922$ 。再由 $n = 2$ 和 $b = 2$, 方程 (14.42) 给出

$$P_{11} = 2c_{11}^*c_{11}, \quad P_{22} = 2c_{21}^*c_{21}, \quad P_{21} = P_{12}^*, \quad P_{22} = 2c_{21}^*c_{11} \quad (14.49)$$

最初的猜测 $c_{11} \approx 0.6922$ 和 $c_{21} \approx 0.3461$ 给出了最初的密度矩阵元

$$P_{11} = 0.9583, \quad P_{12} = P_{21} = 0.4791, \quad P_{22} = 0.2396$$

福克矩阵元通过在 (14.41) 中令 $b = 2$ 给出。使用 (14.47), 以及对实函数有 $P_{12} = P_{21}$, 我们有 (问题 14.16a)

$$\begin{aligned} F_{11} &= H_{11}^{\text{core}} + \frac{1}{2}P_{11}(11|11) + P_{12}(11|12) + P_{22}\left[(11|22) - \frac{1}{2}(12|21)\right] \\ F_{12} = F_{21} &= H_{12}^{\text{core}} + \frac{1}{2}P_{11}(12|11) + P_{12}\left[\frac{3}{2}(12|12) - \frac{1}{2}(11|22)\right] + \frac{1}{2}P_{22}(12|22) \\ F_{22} &= H_{22}^{\text{core}} + P_{11}\left[(22|11) - \frac{1}{2}(21|12)\right] + P_{12}(22|12) + \frac{1}{2}P_{22}(22|22) \end{aligned}$$

将 H_{rs}^{core} 和之前列出的 $(rs|tu)$ 数值代入, 得到 (问题 14.16b)

$$F_{11} = -1.8488 + 0.4531P_{11} + 0.9033P_{12} + 0.7058P_{22} \quad (14.50)$$

$$F_{12} = F_{21} = -1.8826 + 0.4516P_{11} + 0.8391P_{12} + 0.6400P_{22} \quad (14.51)$$

$$F_{22} = -1.5860 + 0.7058P_{11} + 1.2980P_{12} + 0.9094P_{22} \quad (14.52)$$

将 P_{tu} 的猜测值代入 (14.50) 至 (14.52), 得到 F_{rs} 矩阵元的最初估计值:

$$F_{11} = -0.813, \quad F_{12} = F_{21} = -0.892, \quad F_{22} = -0.070$$

对久期方程 $\det(F_{rs} - S_{rs}\varepsilon_i) = 0$ 的最初求解为

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} -0.813 - \varepsilon_i & -0.892 - 0.8366\varepsilon_i \\ -0.892 - 0.8366\varepsilon_i & -0.070 - \varepsilon_i \end{vmatrix} &\approx 0 \\ 0.3001\varepsilon_i^2 - 0.609\varepsilon_i - 0.739 &\approx 0 \\ \varepsilon_1 &\approx -0.854, \quad \varepsilon_2 \approx 2.885 \end{aligned}$$

将较小根 ε_1 代入 $r = 2$ 的罗特汉方程 (14.34), 得到

$$c_{11}(F_{21} - \varepsilon_1 S_{21}) + c_{21}(F_{22} - \varepsilon_1 S_{22}) \approx 0$$

$$-0.1775c_{11} + 0.7840c_{21} = 0$$

$$c_{11}/c_{21} \approx 4.42$$

将 $k = 4.42$ 和 $S_{12} = 0.8366$ 代入归一化条件 (14.48), 得到

$$c_{21} \approx 0.189, \quad c_{11} = kc_{21} \approx 0.836$$

将改进的系数代入 (14.49), 得到改进的密度矩阵元

$$P_{11} = 1.398, \quad P_{12} = P_{21} = 0.316, \quad P_{22} = 0.071$$

将其代入 (14.50) 至 (14.52), 得到改进的福克矩阵元 F_{rs} :

$$F_{11} = -0.880, \quad F_{12} = F_{21} = -0.940, \quad F_{22} = -0.124_6$$

改进的久期方程为

$$\begin{vmatrix} -0.880 - \varepsilon_i & -0.940 - 0.8366\varepsilon_i \\ -0.940 - 0.8366\varepsilon_i & -0.124_6 - \varepsilon_i \end{vmatrix} \approx 0$$

$$\varepsilon_1 \approx 0.842, \quad \varepsilon_2 \approx 2.810$$

改进的 ε_1 给出了 $c_{11}/c_{21} \approx 4.61$, 从而得到

$$c_{11} \approx 0.842, \quad c_{21} \approx 0.183$$

再进行一轮循环运算, 得出 (问题 14.18):

$$P_{11} = 1.418, \quad P_{12} = P_{21} = 0.308, \quad P_{22} = 0.067$$

$$F_{11} = -0.881, \quad F_{12} = F_{21} = -0.940, \quad F_{22} = -0.124_5 \quad (14.53)$$

$$\varepsilon_1 = -0.918, \quad \varepsilon_2 = 2.809 \quad (14.54)$$

$$c_{11} = 0.842, \quad c_{21} = 0.183$$

这些最后的 c 值与前一个周期的相同, 因此计算已收敛, 我们完成计算。则该基函数下的氦原子基态自洽场原子轨道为

$$\phi_1 = 0.842\chi_1 + 0.183\chi_2$$

自洽场能量由 (14.44) 给出, 其中 $n = 2$, $b = 2$:

$$\begin{aligned} E_{\text{HF}} &= -0.918 + \frac{1}{2} [1.418(-1.8488) + 2(0.308)(-1.8826) + 0.067(-1.5860)] + 0 \\ &= -2.862 \text{ hartrees} = -77.9 \text{ eV} \end{aligned}$$

另一种轨道指数为 $\zeta_1 = 1.45363$ 、 $\zeta_2 = 2.91093$ 的更准确计算给出了自洽场能量为 -2.8616726 hartrees, 与通过五个基函数计算得到的哈特里-福克能量极限值 -2.8616799 hartrees 相比 【C. Roetti and E. Clementi, *J. Chem. Phys.*, **60**, 4725 (1974)】。

罗特汉方程的矩阵形式

求解罗特汉方程组最有效的方法是使用矩阵方法。罗特汉方程组 (14.34) 如下:

$$\sum_{s=1}^b F_{rs} c_{si} = \sum_{s=1}^b S_{rs} c_{si} \varepsilon_i, \quad r = 1, 2, \dots, b$$

根据 $\phi_i = \sum_{s=1}^b c_{si} \chi_s$, 系数 c_{si} 将分子轨道 ϕ_i 与基函数 χ_s 联系起来。令 $\mathbf{C}$ 为 b 阶方阵, 其元素为系数 c_{si} 。令 $\mathbf{F}$ 为 b 阶方阵, 其元素为 $F_{rs} = \langle \chi_r | \hat{F} | \chi_s \rangle$ 。令 $\mathbf{S}$ 为 b 元素满足 $S_{rs} = \langle \chi_r | \chi_s \rangle$ 的方阵。令 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 为对角矩阵, 其对角线元素为轨道能量 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_b$, 则 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 的元素可以写为 $\varepsilon_{mi} = \delta_{mi} \varepsilon_i$, 其中 δ_{mi} 为克罗内克 δ 函数。

使用矩阵的乘法规则 (7.107), 我们可以得出矩阵乘积 $\mathbf{C}\boldsymbol{\varepsilon}$ 的第 (s, i) 个元素为 $(\mathbf{C}\boldsymbol{\varepsilon})_{si} = \sum_m c_{sm} \varepsilon_m$

$\varepsilon_{mi} = \sum_m c_{sm} \delta_{mi} \varepsilon_i = c_{si} \varepsilon_i$ 。因此，罗特汉方程组可以写为

$$\sum_{s=1}^b F_{rs} c_{si} = \sum_{s=1}^b S_{rs} (\mathbf{C}\boldsymbol{\varepsilon})_{si} \quad (14.55)$$

根据乘法规则，(14.55) 的左侧为 $(\mathbf{FC})$ 的第 (r, i) 个元素，右侧为 $(\mathbf{SC}\boldsymbol{\varepsilon})$ 的第 (r, i) 个元素。因为 $\mathbf{FC}$ 和 $\mathbf{SC}\boldsymbol{\varepsilon}$ 的每个元素都相等，所以这些矩阵相等：

$$\mathbf{FC} = \mathbf{SC}\boldsymbol{\varepsilon} \quad (14.56)$$

这就是罗特汉方程的矩阵形式。

用来展开分子轨道的基函数集 χ_s 并不构成一个正交集。然而，我们可以使用施密特正交化或其他方法来构建一个正交线性组合基函数集 χ'_s ，得到一个新的，满足正交关系的基函数集 $\chi'_s = \sum_t a_{ts} \chi_t$ ，以及 $S'_{rs} = \langle \chi'_r | \chi'_s \rangle = \delta_{rs}$ （正交化的细节见问题 8.57、8.58 和 Szabo and Ostlund, Section 3.4.5.）。有了这个正交集，那么重叠矩阵就是单位阵，罗特汉方程 (14.56) 就能得到简化：

$$\mathbf{F}'\mathbf{C}' = \mathbf{C}'\boldsymbol{\varepsilon} \quad (14.57)$$

其中 $F'_{rs} = \langle \chi'_r | \hat{F} | \chi'_s \rangle$ ， $\mathbf{C}'$ ， $\mathbf{C}'$ 为将分子轨道与正交基函数 $\phi_i = \sum_s c'_{si} \chi'_s$ 联系起来的系数矩阵。可以证明（问题 8.57c）：矩阵 $\mathbf{F}$ 和 $\mathbf{F}'$ 、 $\mathbf{C}$ 和 $\mathbf{C}'$ 之间的关系为

$$\mathbf{F}' = \mathbf{A}^\dagger \mathbf{F} \mathbf{A}, \quad \mathbf{C} = \mathbf{A} \mathbf{C}'$$

其中 $\mathbf{A}$ 为 $\chi'_s = \sum_t a_{ts} \chi_t$ 的系数 a_{ts} 矩阵，所以我们可以从 $\mathbf{F}$ 中计算出 $\mathbf{F}'$ ，并从 $\mathbf{C}'$ 中计算出 $\mathbf{C}$ 【问题 8.57 中的 $\mathbf{H}$ 对应于 (14.56) 中的 $\mathbf{F}$ 】。

矩阵方程 (14.57) 与 $\mathbf{HC} = \mathbf{CW}$ 的方程 (8.87) 一致，其中的 $\mathbf{C}$ 和 $\mathbf{W}$ 【由 (8.86) 定义】分别为 $\mathbf{H}$ 的本征向量矩阵和本征值矩阵。因此，轨道能量 ε_i 为 $\mathbf{F}'$ 的本征值， $\mathbf{C}'$ 的每一列为 $\mathbf{F}'$ 的本征向量。又因为福克算符 $\hat{F}$ 为厄米算符，所以 $\mathbf{F}'$ 为厄米矩阵。正如导出 (8.94) 的段落所示，厄米矩阵 $\mathbf{F}'$ 的本征向量矩阵 $\mathbf{C}'$ 为酉矩阵，意味着其逆矩阵等于其共轭转置 【式 (8.92)】： $\mathbf{C}'^{-1} = \mathbf{C}'^\dagger$ 。（有了酉系数矩阵 $\mathbf{C}'$ ，分子轨道 ϕ_i 是正交的，见问题 14.22。）将 (14.57) 左乘 $\mathbf{C}'^{-1} \mathbf{C}'^\dagger$ ，得到

$$\mathbf{C}'^\dagger \mathbf{F}' \mathbf{C}' = \boldsymbol{\varepsilon} \quad (14.58)$$

该方程的形式与 (8.94) 相同。

以下流程通常用于在指定分子几何构型下执行自洽场分子轨道计算。

1. 选择基函数集 χ_s 。
2. 计算积分 H_{rs}^{core} 、 S_{rs} 和 $(rs|tu)$ 。
3. 使用重叠积分 S_{rs} 和归一化条件计算能给出正交基函数 $\chi'_s = \sum_t a_{ts} \chi_t$ 的系数 a_{ts} 矩阵 $\mathbf{A}$ 。
4. 猜测分子轨道 $\phi_i = \sum_s c_{si} \chi_s$ 的系数 c_{si} 。根据该猜测值，计算 (14.42) 中的密度矩阵元 P_{rs} 。
5. 使用 (14.41) 从 $\mathbf{P}$ 中计算福克矩阵元 F_{rs} ，以及积分 $(rs|tu)$ 和 H_{rs}^{core} 。
6. 使用 $\mathbf{F}' = \mathbf{A}^\dagger \mathbf{F} \mathbf{A}$ 计算 $\mathbf{F}'$ 。
7. 根据矩阵对角化法（第 8.6 节），求出 $\mathbf{C}'$ 和 $\mathbf{F}'$ 的本征值和本征向量矩阵 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 。
8. 计算系数矩阵 $\mathbf{C} = \mathbf{A} \mathbf{C}'$ 。

9. 通过 $\mathbf{P}^* = 2\mathbf{C}\mathbf{C}^\dagger$, 从 $\mathbf{C}$ 中计算新的密度矩阵元 P_{rs}^* , 它具有与 (14.42) 相同的形式 (问题 14.10c)。
10. 将改进后的 $\mathbf{P}$ 与之前的 $\mathbf{P}$ 进行比较。若所有对应的矩阵元之间差异可忽略不计, 则计算已收敛, 此时可使用收敛的自洽场波函数计算分子性质。若计算未收敛, 则返回步骤 (5), 基于当前 $\mathbf{P}$ 矩阵计算改进的 $\mathbf{F}$ 矩阵, 随后执行后续步骤。

一种开始自洽场计算的方法是首先通过 $F_{rs} \approx H_{rs}^{\text{core}}$ 来估算福克矩阵元, 即忽略了 (14.41) 中的双重求和项。这是一种非常粗略的估计。更常见的做法是通过分子进行半经验计算 (第 17.4 节) 来获得密度矩阵的初始估计值。半经验计算速度极快。另一种方法是利用分子组成原子的密度矩阵来构造 $\mathbf{P}$ 矩阵的初始猜测。要确定分子的平衡几何构型, 需在多个连续构型下进行系列自洽场计算 (参见第 15.10 节)。对于系列中的第二次及后续自洽场计算, 可将邻近构型的自洽场波函数对应的 $\mathbf{P}$ 值作为 $\mathbf{P}$ 的初始猜测。

14.4 位力定理

现在我们来推导位力定理 (virial theorem)。令某处于定态束缚态 ψ 系统的定态哈密顿算符满足

$$\hat{H}\psi = E\psi \quad (14.59)$$

设 $\hat{A}$ 为线性定态算符。考虑积分

$$\int \psi^* [\hat{H}, \hat{A}] \psi d\tau = \langle \psi | \hat{H}\hat{A} - \hat{A}\hat{H} | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{H} | \hat{A}\psi \rangle - E \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle \quad (14.60)$$

其中用到了 (14.59)。因为 $\hat{H}$ 为厄米算符, 所以我们有

$$\langle \psi | \hat{H} | \hat{A}\psi \rangle = \langle \hat{A}\psi | \hat{H} | \psi \rangle^* = E^* \langle \hat{A}\psi | \psi \rangle^* = E \langle \psi | \hat{A}\psi \rangle = E \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle$$

则 (14.60) 变为

$$\int \psi^* [\hat{H}, \hat{A}] \psi d\tau = 0 \quad (14.61)$$

方程 (14.61) 称为**超位力定理** (hypervirial theorem)。【其应用见 J.O. Hirschfelder, *J. Chem. Phys.*, **33**, 1462 (1960); J. H. Epstein and S. T. Epstein, *Am. J. Phys.*, **30**, 266 (1962).】在推导 (14.61) 的过程中, 我们用到了 $\hat{H}$ 的厄米性质。对 $\hat{p}_x$ 和 $\hat{p}_x^2$ 厄米性和 $\hat{H}$ 厄米性的证明要求 ψ 在 $\pm\infty$ 处趋于零【见方程 (7.17)】。因此, 超位力定理对连续态不适用, 因为连续态波函数在 $\pm\infty$ 处不趋于零。

现在从 (14.61) 出发来推导位力定理。我们选择 $\hat{A}$ 为

$$\sum_i \hat{q}_i \hat{p}_i = -i\hbar \sum_i q_i \frac{\partial}{\partial q_i} \quad (14.62)$$

其中的求和是对 n 个粒子的 $3n$ 个笛卡尔坐标进行的。(粒子 1 的笛卡尔坐标为 q_1, q_2, q_3 , 其线动量分量为 p_1, p_2, p_3 。本章中, 我们使用符号 q 来表示笛卡尔坐标。) 为了计算 $[\hat{H}, \hat{A}]$, 我们使用 (5.4)、(5.5)、(5.8) 和 (5.9), 得到

$$\begin{aligned} \left[\hat{H}, \sum_i \hat{q}_i \hat{p}_i \right] &= \sum_i [\hat{H}, \hat{q}_i \hat{p}_i] = \sum_i \hat{q}_i [\hat{H}, \hat{p}_i] + \sum_i [\hat{H}, \hat{q}_i] \hat{p}_i \\ &= i\hbar \sum_i \hat{q}_i \frac{\partial V}{\partial q_i} - i\hbar \sum_i \frac{1}{m_i} \hat{p}_i^2 = i\hbar \sum_i q_i \frac{\partial V}{\partial q_i} - 2i\hbar \hat{T} \end{aligned} \quad (14.63)$$

其中的 $\hat{T}$ 和 $\hat{V}$ 为系统的动能和势能算符。将 (14.63) 代入 (14.61)，得到

$$\left\langle \psi \left| \sum_i q_i \frac{\partial V}{\partial q_i} \right| \psi \right\rangle = 2 \langle \psi | \hat{T} | \psi \rangle \quad (14.64)$$

由于 B 的量子力学平均值可以写作 $\langle B \rangle$ ，所以我们可以将 (14.64) 写为

$$\left\langle \sum_i q_i \frac{\partial V}{\partial q_i} \right\rangle = 2 \langle \hat{T} \rangle \quad (14.65)$$

方程 (14.65) 就是量子力学**位力定理** (virial theorem)。注意它只对束缚态有效。(vires 来自拉丁文，意为“力”。在经典力学中，势能的导数给出了力分量的负值。还存在经典力学的位力定理。)

对于特定的系统来说，位力定理的形式不同。为了讨论这些系统，我们引入齐次函数的思想。设满足以下条件的，关于多个变量的函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_j)$ 为**齐 n 次函数** (homogeneous function of degree n):

$$f(sx_1, sx_2, \dots, sx_j) = s^n f(x_1, x_2, \dots, x_j) \quad (14.66)$$

其中的 s 为任意参数。例如，函数 $g = 1/y^3 + x/y^2 z^2$ 为齐 -3 次函数，因为 $g(sx_1, sy_1, sz_1) = 1/s^3 y^3 + sx/s^2 y^2 s^2 z^2 = s^{-3} g(x_1, y_1, z_1)$ 。

关于齐次函数的欧拉定理 (Euler's theorem) 指出：若 $f(x_1, x_2, \dots, x_j)$ 为齐 n 次函数，则

$$\sum_{k=1}^j x_k \frac{\partial f}{\partial x_k} = n f \quad (14.67)$$

该定理的证明如下。令

$$u_1 \equiv sx_1, \quad u_2 \equiv sx_2, \quad \dots, \quad u_j \equiv sx_j$$

对 (14.66) 的左侧对 s 求偏导，并使用链式法则，得到

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(u_1, \dots, u_j)}{\partial s} &= \frac{\partial f}{\partial u_1} \frac{\partial u_1}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial u_2} \frac{\partial u_2}{\partial s} + \dots + \frac{\partial f}{\partial u_j} \frac{\partial u_j}{\partial s} \\ &= x_1 \frac{\partial f}{\partial u_1} + x_2 \frac{\partial f}{\partial u_2} + \dots + x_j \frac{\partial f}{\partial u_j} = \sum_{k=1}^j x_k \frac{\partial f}{\partial u_k} \end{aligned}$$

则 (14.66) 对 s 的偏导为

$$\sum_{k=1}^j x_k \frac{\partial f(u_1, \dots, u_j)}{\partial u_k} = n s^{n-1} f(x_1, x_2, \dots, x_j) \quad (14.68)$$

令 $s = 1$ ，则 $u_i = x_i$ ；那么 (14.68) 就变为 (14.67)，得证。

现在，我们回到位力定理 (14.65)。若势能函数 V 为笛卡尔坐标系下的齐 n 次函数，则由欧拉定理 (14.67)，我们有

$$\sum_i q_i \frac{\partial V}{\partial q_i} = n V \quad (14.69)$$

那么束缚态的位力定理 (14.65) 简化为

$$2 \langle T \rangle = n \langle V \rangle \quad (14.70)$$

因为 (问题 6.35)

$$\langle T \rangle + \langle V \rangle = E \quad (14.71)$$

我们可以将 (14.70) 写成另外两个形式

$$\langle V \rangle = \frac{2E}{n+2} \quad (14.72)$$

$$\langle T \rangle = \frac{nE}{n+2} \quad (14.73)$$

例题：将位力定理应用于 (a) 一维谐振子；(b) 氢原子；(c) 某多电子原子。

(a) 对于一维谐振子，其势能函数为 $V = \frac{1}{2}kx^2$ ，为齐 2 次函数 ($n = 2$)。由 (14.70) 和 (14.72)，我们得出

$$\langle T \rangle = \langle V \rangle = \frac{1}{2}E = \frac{1}{2}\hbar\nu \left(v + \frac{1}{2} \right) \quad (14.74)$$

对于基态，该式已在问题 4.9 中得到证明。

(b) 对于氢原子，其势能函数在笛卡尔坐标系和原子单位制下为 $V = -1/(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$ ，为齐 -1 次函数 ($n = -1$)。因此

$$2\langle T \rangle = -\langle V \rangle \quad (14.75)$$

对于基态，该式已在问题 6.36 中得证。对于任意氢原子束缚态，有

$$\langle V \rangle = 2E, \quad \langle T \rangle = -E \quad (14.76)$$

(c) 对于忽略了自旋-轨道耦合的多电子原子，

$$V = -Z \sum_{i=1}^n \frac{1}{(x_i^2 + y_i^2 + z_i^2)^{1/2}} + \sum_i \sum_{j>i} \frac{1}{[(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 + (z_i - z_j)^2]^{1/2}}$$

将每个 $3n$ 坐标替换为 s 乘以这些坐标，我们发现 V 为齐 -1 次函数 ($n = -1$)。因此，式 (14.75) 和 (14.76) 适用于所有原子。

现在来考虑分子。在珀恩-奥本海默近似中，分子波函数为【式 (13.12)】

$$\psi = \psi_{\text{el}}(q_i; q_\alpha) \psi_N(q_\alpha)$$

其中 q_i 为电子坐标， q_α 为核坐标。电子波函数 ψ_{el} 可通过求解电子薛定谔方程 (13.7) 得出：

$$\hat{H}_{\text{el}} \psi_{\text{el}} = E_{\text{el}}(q_\alpha) \psi_{\text{el}}(q_i) \quad (14.77)$$

$$\hat{T}_{\text{el}} = -\frac{1}{2} \sum_i \left(\frac{\partial^2}{\partial x_i^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_i^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_i^2} \right) \quad (14.78)$$

$$\begin{aligned} \hat{V}_{\text{el}} = & - \sum_i \sum_\alpha \frac{Z_\alpha}{[(x_i - x_\alpha)^2 + (y_i - y_\alpha)^2 + (z_i - z_\alpha)^2]^{1/2}} \\ & + \sum_i \sum_{j>i} \frac{1}{[(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 + (z_i - z_j)^2]^{1/2}} \end{aligned} \quad (14.79)$$

设系统处于定态电子态 ψ_{el} 。若我们在 (14.59) 中给 $\hat{H}$ 和 ψ 分别设置下标 el，并将 ψ_{el} 的变量设为电子坐标 q_i (核坐标 q_α 为参数)，则位力定理 (14.65) 的导出似乎也对电子的动能和势能算符成立：

$$2 \langle \psi_{\text{el}} | \hat{T}_{\text{el}} | \psi_{\text{el}} \rangle = \left\langle \psi_{\text{el}} \left| \sum_i q_i \frac{\partial V_{\text{el}}}{\partial q_i} \right| \psi_{\text{el}} \right\rangle \quad (14.80)$$

若将 V_{el} 视为电子坐标的函数，则它不是齐次函数，因为

$$\left[(sx_i - x_\alpha)^2 + (sy_i - y_\alpha)^2 + (sz_i - z_\alpha)^2\right]^{-1/2} \neq s^{-1} \left[(x_i - x_\alpha)^2 + (y_i - y_\alpha)^2 + (z_i - z_\alpha)^2\right]^{-1/2}$$

因此，对于分子电子平均动能和势能，位力理论将不再具有对原子成立的 (14.75) 的形式。然而，我们可以将 V_{el} 看作同时是电子和核笛卡尔坐标的函数。则 V_{el} 为齐 -1 次函数 ($n = -1$)，因为

$$\left[(sx_i - sx_\alpha)^2 + (sy_i - sy_\alpha)^2 + (sz_i - sz_\alpha)^2\right]^{-1/2} = s^{-1} \left[(x_i - x_\alpha)^2 + (y_i - y_\alpha)^2 + (z_i - z_\alpha)^2\right]^{-1/2}$$

因此，考虑将 V_{el} 视为电子和核坐标的函数并应用欧拉定理 (14.67)，我们得到

$$\sum_i q_i \frac{\partial V_{\text{el}}}{\partial q_i} + \sum_\alpha q_\alpha \frac{\partial V_{\text{el}}}{\partial q_\alpha} = -V_{\text{el}}$$

在 (14.80) 中使用上式，我们得出

$$2 \langle \psi_{\text{el}} | \hat{T}_{\text{el}} | \psi_{\text{el}} \rangle = -\langle \psi_{\text{el}} | V_{\text{el}} | \psi_{\text{el}} \rangle - \left\langle \psi_{\text{el}} \left| \sum_\alpha q_\alpha \frac{\partial V_{\text{el}}}{\partial q_\alpha} \right| \psi_{\text{el}} \right\rangle \quad (14.81)$$

与原子位力理论 (14.75) 相比，该式包含了一个额外项。考虑该额外项，我们有

$$\left\langle \psi_{\text{el}} \left| \sum_\alpha q_\alpha \frac{\partial V_{\text{el}}}{\partial q_\alpha} \right| \psi_{\text{el}} \right\rangle = \sum_\alpha q_\alpha \int \psi_{\text{el}}^* \frac{\partial V_{\text{el}}}{\partial q_\alpha} \psi_{\text{el}} d\tau_{\text{el}}$$

其中我们把核坐标 q_α 提到积分外面，对电子坐标积分。在第14.7节中，我们将证明【见 (14.126) 后括号中的说明】：

$$\int \psi_{\text{el}}^* \frac{\partial V_{\text{el}}}{\partial q_\alpha} \psi_{\text{el}} d\tau_{\text{el}} = \frac{\partial E_{\text{el}}}{\partial q_\alpha} \quad (14.82)$$

【方程 (14.82) 是赫尔曼-费恩曼定理的一个例子。】在分子电子位力定理 (14.81) 中使用上述两个方程，我们得出

$$\begin{aligned} 2 \langle \hat{T}_{\text{el}} \rangle &= -\langle V_{\text{el}} \rangle - \sum_\alpha q_\alpha \frac{\partial E_{\text{el}}}{\partial q_\alpha} \\ 2 \langle T_{\text{el}} \rangle &= -\langle V_{\text{el}} \rangle - \sum_\alpha q_\alpha \frac{\partial E_{\text{el}}}{\partial q_\alpha} \end{aligned} \quad (14.83)$$

其中的 q_α 为核坐标。再使用

$$\langle T_{\text{el}} \rangle + \langle V_{\text{el}} \rangle = E_{\text{el}} \quad (14.84)$$

我们可以从 (14.83) 中消去 $\langle T_{\text{el}} \rangle$ 或 $\langle V_{\text{el}} \rangle$ ，得到位力定理的分子形式。

再来考虑双原子分子。电子能是 R 的函数， R 为核间距： $E_{\text{el}} = E_{\text{el}}(R)$ 。(14.83) 中的求和是对核的笛卡尔坐标 $x_a, y_a, z_a, x_b, y_b, z_b$ 进行的。我们有

$$\begin{aligned} \frac{\partial E_{\text{el}}}{\partial x_a} &= \frac{dE_{\text{el}}}{dR} \frac{\partial R}{\partial x_a}, \quad \frac{\partial E_{\text{el}}}{\partial x_b} = \frac{dE_{\text{el}}}{dR} \frac{\partial R}{\partial x_b} \\ R &= \left[(x_a - x_b)^2 + (y_a - y_b)^2 + (z_a - z_b)^2\right]^{1/2} \\ \frac{\partial R}{\partial x_a} &= \frac{x_a - x_b}{R}, \quad \frac{\partial R}{\partial x_b} = \frac{x_b - x_a}{R} \end{aligned} \quad (14.85)$$

y 和 z 坐标的表达式类似。则 (14.83) 中的求和变为

$$\begin{aligned} \sum_\alpha q_\alpha \frac{\partial E_{\text{el}}}{\partial q_\alpha} &= \frac{1}{R} \frac{dE_{\text{el}}}{dR} [x_a(x_a - x_b) + x_b(x_b - x_a) + y_a(y_a - y_b) + y_b(y_b - y_a) \\ &\quad + z_a(z_a - z_b) + z_b(z_b - z_a)] \\ \sum_\alpha q_\alpha \frac{\partial E_{\text{el}}}{\partial q_\alpha} &= R \frac{dE_{\text{el}}}{dR} \end{aligned}$$

其中用到了 $(x_a - x_b)^2 + (y_a - y_b)^2 + (z_a - z_b)^2 = R^2$ 。因此，双原子分子的电子位力定理为

$$2 \langle T_{\text{el}} \rangle = - \langle V_{\text{el}} \rangle - R \frac{dE_{\text{el}}}{dR} \quad (14.86)$$

再使用 (14.84)，我们有两个备选的形式

$$\langle T_{\text{el}} \rangle = E_{\text{el}} - R \frac{dE_{\text{el}}}{dR} \quad (14.87)$$

$$\langle V_{\text{el}} \rangle = 2E_{\text{el}} + R \frac{dE_{\text{el}}}{dR} \quad (14.88)$$

在推导分子电子位力理论 (14.83) 时，我们在电子哈密顿算符 (14.77) 至 (14.79) 中忽略了核间排斥势

$$V_{NN} = \sum_{\beta} \sum_{\alpha > \beta} \frac{Z_{\alpha} Z_{\beta}}{\left[(x_{\alpha} - x_{\beta})^2 + (y_{\alpha} - y_{\beta})^2 + (z_{\alpha} - z_{\beta})^2 \right]^{1/2}} \quad (14.89)$$

令

$$V = V_{\text{el}} + V_{NN}$$

其中的 V_{el} 由 (14.79) 给出。我们可以将电子薛定谔方程 $\hat{H}_{\text{el}} \psi_{\text{el}} = E_{\text{el}} \psi_{\text{el}}$ 改写为 【式 (13.4)】

$$(\hat{T}_{\text{el}} + \hat{V}) \psi_{\text{el}} = U(q_{\alpha}) \psi_{\text{el}}$$

其中

$$U(q_{\alpha}) = E_{\text{el}}(q_{\alpha}) + V_{NN}$$

$U(q_{\alpha})$ 是核运动的势能函数。考虑当我们将 V_{NN} 加入到 V_{el} 中和 E_{el} 中时，(14.83) 的右侧会发生什么。我们有

$$- \int \psi_{\text{el}}^* (\hat{V}_{\text{el}} + V_{NN}) \psi_{\text{el}} d\tau_{\text{el}} - \sum_{\alpha} q_{\alpha} \frac{\partial U}{\partial q_{\alpha}} = - \langle \psi_{\text{el}} | \hat{V}_{\text{el}} | \psi_{\text{el}} \rangle - V_{NN} - \sum_{\alpha} q_{\alpha} \frac{\partial E_{\text{el}}}{\partial q_{\alpha}} - \sum_{\alpha} q_{\alpha} \frac{\partial V_{NN}}{\partial q_{\alpha}} \quad (14.90)$$

因为 V_{NN} 为核笛卡尔坐标的齐 -1 次函数，所以欧拉定理给出了

$$\sum_{\alpha} q_{\alpha} \frac{\partial V_{NN}}{\partial q_{\alpha}} = -V_{NN}$$

那么 (14.90) 变为

$$- \langle \psi_{\text{el}} | \hat{V}_{\text{el}} + V_{NN} | \psi_{\text{el}} \rangle - \sum_{\alpha} q_{\alpha} \frac{\partial U}{\partial q_{\alpha}} = - \langle \psi_{\text{el}} | \hat{V}_{\text{el}} | \psi_{\text{el}} \rangle - \sum_{\alpha} q_{\alpha} \frac{\partial E_{\text{el}}}{\partial q_{\alpha}} \quad (14.91)$$

将 (14.91) 代入 (14.83)，得出

$$2 \langle \psi_{\text{el}} | \hat{T}_{\text{el}} | \psi_{\text{el}} \rangle = - \langle \psi_{\text{el}} | \hat{V}_{\text{el}} + V_{NN} | \psi_{\text{el}} \rangle - \sum_{\alpha} q_{\alpha} \frac{\partial U}{\partial q_{\alpha}} \quad (14.92)$$

$$2 \langle T_{\text{el}} \rangle = - \langle V \rangle - \sum_{\alpha} q_{\alpha} \frac{\partial U}{\partial q_{\alpha}}$$

其形式与 (14.83) 一致。因此，无论我们是否考虑核间排斥势，分子电子位力定理均成立。对于双原子分子，对应于式 (14.86) 至 (14.88)，我们得到：

$$2 \langle T_{\text{el}} \rangle = - \langle V \rangle - R (dU/dR) \quad (14.93)$$

$$\langle T_{\text{el}} \rangle = U - R (dU/dR) \quad (14.94)$$

$$\langle V \rangle = 2U + R (dU/dR) \quad (14.95)$$

若所有粒子（电子和原子核）之间的距离都为无穷大，则势能 $V = V_{\text{el}} + V_{\text{NN}} = 0$ 为零。因此，(14.93) 至 (14.95) 中的 $U(R)$ 在 $R = \infty$ 不趋于零，但趋于孤立原子的能量之和，该总和为负数。

对于 V 是坐标的齐次函数的某系统，其真实（非相对论）波函数必须满足形式为 (14.70) 的位力定理。什么决定了此类系统的近似波函数是否满足 (14.70)？答案是：通过在每个笛卡尔坐标前插入变分参数作为乘数，并选择该参数使变分积分最小化，我们可使任意试探变分函数满足位力定理。（证明详见 *Kauzmann*, page 229.）此过程称为标度化（scaling），乘于各坐标的变分参数称为标度因子（scale factor）。对于分子试探函数，标度参数必须置于核坐标与电子坐标之前。

考虑一些例子。类氢原子的零级微扰波函数 (9.49) 没有标度因子，因此不满足位力定理。若我们希望从 (9.49) 中计算出 $\langle T \rangle$ 和 $\langle V \rangle$ ，会得到 $2\langle T \rangle \neq -\langle V \rangle$ ，见问题 14.26。H₂ 的海特勒-伦敦试探函数 (13.100) 不具有标度因子，因此也不满足位力定理。引入了由变量决定的轨道指数的海特勒-伦敦-王函数满足位力定理。哈特里-福克函数满足位力定理，注意斯莱特基函数 (11.14) 中的标度因子。

14.5 位力定理和化学键

我们现在用位力定理来考察两个原子形成双原子分子共价键时，电子动能和势能的变化。为了形成一根稳定的共价键， $U(R)$ 曲线必须存在显著的最小值。在该最小值处有

$$\left. \frac{dU}{dR} \right|_{R_e} = 0 \quad (14.96)$$

则 (14.93) 至 (14.95) 变为

$$2\langle T_{\text{el}} \rangle|_{R_e} = -\langle V \rangle|_{R_e} \quad (14.97)$$

$$\langle T_{\text{el}} \rangle|_{R_e} = U|_{R_e} \quad (14.98)$$

$$\langle V \rangle|_{R_e} = 2U|_{R_e} \quad (14.99)$$

这些方程与原子对应的方程有些类似【式 (14.75) 和 (14.76)】。在 $R = \infty$ 处，分子解离成孤立原子，根据原子位力定理，有

$$2\langle T_{\text{el}} \rangle|_{\infty} = -\langle V \rangle|_{\infty}, \quad \langle T_{\text{el}} \rangle|_{\infty} = -U(\infty), \quad \langle V \rangle|_{\infty} = 2U(\infty) \quad (14.100)$$

$U(\infty)$ 为两个孤立原子的能量之和。方程 (14.98) 至 (14.100) 表明

$$\langle T_{\text{el}} \rangle|_{R_e} - \langle T_{\text{el}} \rangle|_{\infty} = U(\infty) - U(R_e) \quad (14.101)$$

$$\langle V \rangle|_{R_e} - \langle V \rangle|_{\infty} = 2[U(R_e) - U(\infty)] \quad (14.102)$$

为了能成键，我们有 $U(R_e) < U(\infty)$ 。因此方程 (14.101) 和 (14.102) 表明 R_e 处分子平均势能小于两个孤立原子的平均势能，而 R_e 处分子平均动能大于 ∞ 处的动能。势能的降低是动能增加的两倍，因此允许电子感受到来自两个原子核的吸引，也可能导致分子中轨道指数的增加（见第13.5节）。平衡解离能 (13.9) 为 $D_e = \frac{1}{2} (\langle V \rangle|_{\infty} - \langle V \rangle|_{R_e})$ 。

考虑 R 值很大时，平均势能和动能的行为。无电荷原子和分子之间（不同于成键作用）的力称为范德华力（van der Waals forces）。对于两个中性原子，至少有一个原子处于 s 态，量子力学微扰理论给出了范德华力的吸引势正比于 $1/R^7$ ，势能的表现

$$U(R) \approx U(\infty) - \frac{A}{R^6}, \quad R \text{ large} \quad (14.103)$$

其中的 A 为正常数（见 *Kauzmann*, Chapter 13.）该表达式最先由伦敦导出，则中性原子之间的范德华力也称为伦敦力（London forces）或色散力（dispersion forces）。（回忆第13.7末尾的讨论。）

对 (14.103) 求导, 将 U 和 dU/dR 的表达式代入 (14.94) 和 (14.95), 再使用 (14.100), 我们得到

$$\langle V \rangle \approx \langle V \rangle|_{\infty} + \frac{4A}{R^6}, \quad \langle T_{\text{el}} \rangle \approx \langle T_{\text{el}} \rangle|_{\infty} - \frac{5A}{R^6}, \quad R \text{ large} \quad (14.104)$$

因此, 当 R 从无穷大逐渐减小时, 平均势能首先增加, 而平均动能首先减少。将这些结论与我们有关 $\langle V \rangle|_{R_e}$ 和 $\langle T_{\text{el}} \rangle|_{R_e}$ 的结论结合起来发现, 在 R_e 到无穷远处的某区域内, $\langle V \rangle$ 有最大值, 而 $\langle T_{\text{el}} \rangle$ 有最小值。

再来考虑 R 较小的情况。我们可以对双原子分子应用微扰理论, 将其视为分由分子的两个原子合并而成的联合原子 (UA)。再将分子和联合原子哈密顿算符之间的区别视为微扰: $H' = \hat{H}_{\text{mol}} - \hat{H}_{\text{UA}}$ 。可以证明, 分子的纯电子能量在 R 很小时有如下形式【W. A. Bingel, *J. Chem. Phys.*, **30**, 1250 (1959); I. N. Levine, *J. Chem. Phys.*, **40**, 3444 (1964); **41**, 2044 (1965); W. Byers Brown and E. Steiner, *J. Chem. Phys.* **44**, 3934 (1966)】:

$$E_{\text{el}} = E_{\text{UA}} + aR^2 + bR^3 + cR^4 + dR^5 + eR^5 \ln R + \dots \quad (14.105)$$

其中的 E_{UA} 为联合原子的能量, a, b, c, d, e 为常数。当 $R \ll R_e$ 时, 我们可以使用 (14.105) 和 $U = E_{\text{el}} + V_{\text{NN}}$ 【式 (13.8)】来得出

$$U(R) \approx \frac{Z_a Z_b}{R} + E_{\text{UA}} + aR^2, \quad R \text{ small} \quad (14.106)$$

则位力定理给出了 (原子单位制下)

$$\langle T_{\text{el}} \rangle \approx -E_{\text{UA}} - 3aR^2, \quad R \text{ small}$$

$$\langle V \rangle \approx \frac{Z_a Z_b}{R} + 2E_{\text{UA}} + 4aR^2, \quad R \text{ small}$$

由于位力定理 (14.76) 对联合原子也成立, 所以有 $\langle T_{\text{el}} \rangle|_0 = -E_{\text{UA}}$ 和 $\langle V \rangle|_0 = 2E_{\text{UA}}$ 。因此,

$$\langle T_{\text{el}} \rangle \approx \langle T_{\text{el}} \rangle|_0 - 3aR^2, \quad R \text{ small} \quad (14.107)$$

$$\langle V \rangle \approx \frac{Z_a Z_b}{R} + \langle V \rangle|_0 + 4aR^2, \quad R \text{ small} \quad (14.108)$$

由于核间排斥势的作用, 当 R 趋于零时, $\langle V \rangle$ 趋于无穷。

找到 $\langle V \rangle$ 和 $\langle T_{\text{el}} \rangle$ 作为 R 当函数的一般行为后, 我们可以绘制出图象 14.1。该图并非针对某特定分子, 但与已知的 H_2 和 H_2^+ 图象曲线类似。【W. Kolos and L. Wolniewicz, *J. Chem. Phys.*, **41**, 3663 (1964); Slater, *Quantum Theory of Molecules and Solids*, Volume 1, p. 36.】其他双原子分子存在类似的曲线图象【see Fig. 1 in J. Hernandez-Trujillo et al., *Faraday Discuss.*, **135**, 79 (2007)】。

我们如何解释平均动能和势能随 R 的变化情况? 考虑 H_2^+ 。电子势能函数在原子单位制下为

$$V_{\text{el}} = -\frac{1}{R_a} - \frac{1}{R_b} \quad (14.109)$$

若在分子轴上绘制 V_{el} 点 (对应较大 R 值) 的分布, 将得到如图 14.2 所示的曲线, 其形态酷似两条氢原子势能曲线 (图 6.7) 并列排列。我们看到, 形成分子中的重叠 $1s$ 原子轨道使基态核间电荷密度升高。然而, 图 14.2 显示, 当 R 很大时, 在两个原子核之间的中间区域, 势能相对较高。因此, 当 R 从无穷大逐渐减小时, $\langle V \rangle$ 首先增加。再考虑动能。不确定性原理 (5.13) 给出了 $(\Delta x)^2 (\Delta p_x)^2 \geq \hbar^2/4$ 。对于某定态, $\langle p_x \rangle$ 为零【见式 (3.92)、问题 14.31】, 方程 (5.11) 给出了 $(\Delta p_x)^2 = \langle p_x^2 \rangle$ 。因此, $(\Delta x)^2$ 很小的值意味着 $\langle p_x^2 \rangle$ 很大, 进而意味着动能平均值 $\langle p^2 \rangle/2m$ 也很大。因此, 某紧凑的 ψ_{el} 对应于




图 14.1: 双原子分子平均势能与动能的变化。能量单位取分离原子间的电子动能。




图 14.2: H_2^+ 分子在较大核间距条件下, 沿核间轴方向电子运动的势能。采用原子单位制。

较大的电子动能。在分子形成的初始阶段, 原子核之间概率密度的积累对应于波函数的紧凑性低于分离原子状态。因此, 当 R 从无穷大减小时, 电子动能最初会减小。图14.2给出了 H_2^+ 两个最低能态的能量 E_{el} 。当 R 较大时, 原子核间的区域为经典禁区, 但根据量子力学 (隧穿效应), 该区域是可及的。

现在考虑当 R 进一步减小时的情况。当 R 取中间值时绘制 (14.109) 的图象, 可发现此时两个原子核之间的区域成为低势能区——因为该区域内的电子同时受到两个原子核的显著吸引力 (见图14.3)。因此在 R 的中间值范围内, 原子核间的电荷重叠积累降低了势能。相较于大 R 值, 波函数在 R 的中间值范围内变得更为紧凑, 当 R 减小时, 有 $\langle T_{\text{el}} \rangle$ 增加。事实上, 从图14.1和式 (14.101) 可见, 与分离的原子相比, 分子中 R_e 处的 $\langle T_{\text{el}} \rangle$ 更大。因此 R_e 处的分子波函数比对应的分离原子波函数更紧密。

若 R 非常小, 则由于核间排斥势的存在, 平均势能趋于无穷大。然而, 对于 $R = R_e$ 时, 图14.1表明 $\langle V \rangle$ 在 R 减小时仍急剧减小, 导致了 $\langle T_{\text{el}} \rangle$ 的增加, 而不是核间排斥势, 使得当 R 小于 R_e 时 $U(R)$ 曲线上升。分子波函数被压缩到更小的区域, 伴随 $\langle T_{\text{el}} \rangle$ 值的增加, 这一过程比核间排斥势更重要, 是导致原子间初始排斥力的关键因素。




图 14.3: H_2^+ 分子在中等核间距条件下，沿核间轴方向电子运动的势能。

14.6 赫尔曼-费恩曼定理

14.7 静电力定理

总结

习题

Chapter 15

分子的电子结构

- 15.1 从头计算、密度泛函、半经验和分子力学方法
- 15.2 多原子分子的分子光谱项
- 15.3 自洽场方法、分子轨道理论求解多原子分子
- 15.4 基函数
- 15.5 自洽场方法、分子轨道理论求解H₂O 分子
- 15.6 布居分析和键级
- 15.7 分子静电势、分子表面和原子电荷
- 15.8 定域分子轨道
- 15.9 自洽场方法、分子轨道理论求解甲烷、乙烷和乙烯
- 15.10 分子结构学
- 15.11 构象搜寻
- 15.12 分子振动频率
- 15.13 热力学定律
- 15.14 从头计算方法的量子化学程序
- 15.15 进行从头计算
- 15.16 快速 Hartree-Fock 计算方法
- 15.17 溶剂效应

Chapter 16

电子关联方法

16.1 关联能

16.2 组态相互作用

16.3 多体微扰理论

16.4 耦合簇方法

16.5 密度泛函理论

16.6 能量计算的复合方法

16.7 扩散量子 Monte Carlo 法

16.8 非共价相互作用

16.9 NMR 屏蔽常数

16.10 碎裂法

16.11 相对论效应

16.12 价键理论求解多原子分子

16.13 GVB (广义价键波函数)、VBSCF (价键自洽场)、BOVB
(呼吸轨道价键) 方法

16.14 化学反应

习题

Chapter 17

半经验和分子力学方法求解分子

17.1 半经验分子轨道求解平面共轭分子

17.2 Hückel 分子轨道理论

17.3 PPP 方法

17.4 一般的半经验分子轨道和密度泛函方法

17.5 分子力学方法

17.6 经验和半经验方法处理溶剂效应

17.7 化学反应

17.8 量子化学的未来

20 世纪 50 年代，人们普遍认为，除了非常小的分子之外，对所有分子性质进行有意义的从头计算法是不可能的。在这一时期撰写的量子化学书籍中，有这样的表述：“我们永远无法指望（对有机化合物）进行令人满意的从头计算法”，“对于比氢分子离子更复杂的系统，从一开始就放弃获得薛定谔方程精确解的尝试是明智的”。1959 年，Mulliken 和 Roothaan 发现了多原子分子量子力学精确计算的“瓶颈”，即评估多中心积分的困难。现在，这一瓶颈已被消除。

对中等尺寸分子进行 Hartree-Fock 从头计算法和几何优化已成为常规工作，并可采用计算效率较高的方法（如 DFT、MP2 和 SCS-MP2）将电子相关性包括在内。各种量子力学方法和基集的可靠程度已通过大量计算得到证实。可以进行精确从头计算法或密度泛函计算的分子大小受到现有电子计算机的速度和存储容量的限制。随着更大、更快计算机的开发，处理更大的分子将变得可行。

近年来，量子化学取得了长足进步，量子力学计算已成为帮助解决各种实际化学问题的重要工具。多年前，有关分子的量子力学计算主要局限于理论化学家阅读的期刊，而现在，这类计算经常出现在各种化学家阅读的期刊上，如《美国化学会志》。量子化学正被应用于溶液中离子的水合、表面催化、反应中间产物的结构和能量、生物分子的构象以及酶催化反应的研究等问题。在许多情况

下，理论计算可能无法给出明确的答案，但它们往往足以让理论与实验进行富有成效的互动。此外，伍德沃德-霍夫曼规则等定性概念也为化学反应过程和化学键的研究提供了重要启示。

1998 年诺贝尔化学奖由沃尔特·科恩 (Walter Kohn) (密度函数理论的开发者之一) 和约翰·波普尔 (John A. Pople) (高斯系列程序和广泛使用的高斯基集、PPP 方法、CNDO 和 INDO 方法的开发者之一，以及最早将 MP 和 CC 方法应用于分子计算的人之一) 分享。诺贝尔奖委员会指出：计算量子化学正在“彻底改变整个化学”。

习题

附录 A

附录

A.1 Complex Numbers

A complex number $z = x + iy$ can be expressed as:

$$z = re^{i\theta}, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \tan^{-1}(y/x) \quad (\text{A.1})$$

A.2 Calculus Formulas

Key differentiation and integration formulas:

$$\frac{d}{dx}(e^{ax}) = ae^{ax} \quad (\text{A.2})$$

$$\int \sin(ax) \, dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C \quad (\text{A.3})$$

附录 B

参考文献

参考文献

- [1] Levine, I. N. (2014). *Quantum Chemistry* (7th ed.). Pearson.

附录 C

部分习题答案

附录 D

索引