
LESIONES EN LA PIEL


DR. PABLO DURAN

CARCINOMA BASOCELULAR Y ESCAMOSO

- Carcinoma basocelular: el cáncer de piel más común (80%, 800,000 casos al año); crecimiento lento, metástasis raras; 97% se curan.
- Carcinoma escamoso: 20% de los cánceres de piel; puede dar grandes metástasis a diferencia del basocelular.
- Causas: radiación solar UVB, carcinógenos químicos (arsénico, aceites, creosota), cigarrillo, virus del papiloma, xerodermia pigmentosa, albinismo, inmunosupresión.
- Patofisiología del basocelular: se origina de células germinales del epitelio y apéndices epiteliales; crecimiento local agresivo (puede invadir cartílago y hueso) pero sin metástasis.



Basal cell carcinoma



Squamous cell carcinoma

CBC NODULAR

- El más agresivo: crecimiento vertical temprano con invasión profunda de la dermis.

LENTIGO MALIGNO

- Zonas fotoexpuestas de adultos mayores.

ACRAL LENTIGINOSO

- Palmas, plantas y lecho ungueal; no relacionado con el sol; predominante en piel oscura (Bob Marley).



PREVENCIÓN

- Fotoprotección: protector solar diario, ropa protectora y evitar la exposición solar en horas pico.
- Autoexamen de la piel y revisión dermatológica periódica, sobre todo en personas de alto riesgo.

OTRAS LESIONES CUTÁNEAS MALIGNAS

- Sarcoma de Kaposi (angiosarcoma): tumor vascular maligno, asociado a inmunosupresión.
- Tumor de células de Merkel: asociado al poliomavirus (60-80% de los casos) o a mutaciones en TP53 y RB1 en los casos virus-negativos.
- Células de Merkel: derivan de células madre totipotenciales; factores de riesgo: exposición solar, inmunosupresión (24 veces más riesgo en trasplantados), VIH y linfoma de células B.

REGLA AEIOU DEL TUMOR DE MERKEL

- Asimétrico (88%). Expande rápido, en menos de 3 meses (63%). Inmunosupresión presente (8%). Older than 50, mayor de 50 años (90%). UV: áreas expuestas al sol, sobre todo cabeza y cuello (81%).
- Manejo general: biopsia, resección con bordes amplios, valorar ganglio centinela; ya no se hace disección ganglionar de rutina; inmunoterapia adyuvante en casos avanzados.

AEIOU Criteria	
A	Asymptomatic
E	Expanding rapidly
I	Immunosuppressed
O	Over 50 years of age
U	Ultraviolet exposure