OFIDISMO Y MORDEDURA HUMANA

DR. ALFREDO MATOS

TIPOS DE SERPIENTES VENENOSAS

- Viperidae (víboras, crótalos): hemotóxico, afecta sangre y tejidos.
- Elapidae (cobras, mambas, coralillos): neurotóxico.
- Hydrophiidae (serpientes de mar): neurotóxico y miotóxico.
- Colubridae (algunas especies): hemotóxico o neurotóxico.

COMPLICACIONES DEL OFIDISMO

- Síndrome compartimental por edema progresivo; necrosis tisular extensa que puede requerir fasciotomía o amputación.
- Insuficiencia renal aguda por rabdomiólisis o hemólisis; coagulación intravascular diseminada en envenenamientos graves.

SÍNTOMAS DEL OFIDISMO

- Locales: dolor intenso, inflamación, equimosis, necrosis en casos severos.
- Sistémicos: neurotóxicos (parálisis, dificultad respiratoria, ptosis), hemotóxicos (coagulopatía, choque hipovolémico), miotóxicos (rabdomiólisis).
- Generales: náuseas, mareos, sudoración, taqui/bradicardia.



TRATAMIENTO DE LA MORDEDURA HUMANA

- Limpieza meticulosa con agua y jabón; control del sangrado con presión directa.
- Evaluación médica de profundidad/extensión; antibióticos si hay signos de infección o herida profunda; actualizar vacuna antitetánica; cirugía en casos severos.

TRATAMIENTO DEL OFIDISMO

- Primeros auxilios: mantener la calma, inmovilizar en posición funcional, evitar torniquetes y cortes, traslado rápido.
- Antiveneno: tratamiento más efectivo, específico según la especie.
- Soporte: control del dolor, fluidoterapia IV, transfusión si coagulopatía, diálisis si daño renal; cirugía en casos graves (desbridamiento, reparación de tejido).

TRATAMIENTO
Antiofidico polivalente (Botrópico y Crotálico): Vial x 10ml. Se administró 5 ampollas en infusión continua al ingreso por 5 horas en una solución de dextrosa al 5% de 500cc.
Antimicrobianos: - Ceftriaxona 2 gr c/día VO. - Levofloxacino 750 mgr/día EV. por 10 días.
Analgésicos: - Ketorolaco 30 mg. VO, Tramadol 50 mg VO. - Morfina a 5 gamas por hora en infusión continua los primeros 10 días luego a 3mg subcutáneo cada 8 horas. - Dopamina a 6 gamas hora en infusión continúa por 3 días.

CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD

- Leve: edema local, sin manifestaciones sistémicas. Moderada: edema progresivo + alteraciones leves de coagulación. Severa: shock, sangrado activo o insuficiencia respiratoria.
- La gravedad determina la dosis de antiveneno, no el tipo de serpiente por sí solo.

MORDEDURA HUMANA

- Causas: accidentales, defensivas, impulsivas o intencionales (violencia interpersonal).
- Consecuencias: heridas abiertas, alto riesgo de infección (flora bacteriana oral abundante), lesión de tejidos blandos, riesgo de transmisión de hepatitis B/C o VIH.

PREVENCIÓN

- Ofidismo: educación comunitaria, calzado/ropa protectora, cuidado al mover piedras o leña, evitar manipular serpientes.
- Mordedura humana: resolución pacífica de conflictos, manejo de emociones, protección personal en entornos de riesgo.