



Acta Urológica

Algoritmos de Decisão em Urologia

Carcinoma da Próstata PSA e toque rectal

E. Silva, J. P. Jorge da Silva, J. M. Lencastre

Director

Editor

Editores Adjuntos

Francisco Rolo

Tomé Lopes


Branco Palma, Carlos Silva, Francisco Martins, Jorge Ribeiro, José Dias

Algoritmos de Decisão em Urologia

Carcinoma da Próstata PSA e toque rectal

E. Silva; J.P. Jorge da Silva; J. M. Lencastre

Assistentes graduados de Urologia



TR – Toque Rectal

PSA – Prostate Specific Antigen

^{*} Outros autores consideram diferentes valores de cutt-off de PSA: 0,15 a 0,25

Algoritmos de Decisão em Urologia

Carcinoma da Próstata PSA e toque rectal

E. Silva; J.P. Jorge da Silva; J. M. Lencastre

Assistentes graduados de Urologia

Valores normais de PSA total		
ldade	ng/ml	
40 - 50	2,5	
50 - 60	3,5	
60 - 69	4,5	
70 - 79	6,5	

PSA total	Risco de cancro
0 -2	1%
2 -4	15%
4 - 10	25%
> 10	>50%

(limites superiores da normalidade)			
Idade	Caucasiana	Negra	Oriental
40 -49	2,5	2,0	2,0
50 -59 60 -69	3,5 4,5	4,0 4,5	3,0 4,0
70-79	6,5	5,5	5,0

Risco de Neoplasia (%)

Psa total de 2,5 a 4,0 ng/ml			
%PSA livre	< 60 anos	>60 anos	Todas idades
<7	84	95	91
7 - 15	25	49	43
16 - 25	10	27	22
>25	2	7	6

Psa	Psa total de 4,01 a 10,0 ng/ml			
%PSA livre	< 60 anos	>60 anos	Todas idades	
<7	87	95	93	
7 - 15	27	50	48	
16 - 25	12	27	27	
>25	3	7	7	

Psa total de 10,01 a 20,0 ng/ml			
%PSA livre	< 60 anos	>60 anos	Todas idades
<7	93	97	93
7 - 15	43	71	67
16 - 25	22	47	45
>25	5	15	15

Leitura recomendada

Prostate Câncer Research Foundation of Canada William Catalona et al (1994)

% **PSA livre** é a relação entre o PSA livre e o PSA total X 100.

% PSA livre < 20% - suspeito de ${\bf Ca}\ {\bf P}$

% PSA livre > 20% - a favor de HBP

PSA – V = elevação do valor sérico do PSA, em três medições consecutivas, num período mínimo de 18 meses.

PSA - V < 0.75 ng/ml/ano - sugestivo de HBP PSA - V > 0.75 ng/ml/ano - sugestivo de Ca P

PSA – D é a relação entre o PSA sérico em ng/ml e o volume prostático em cc.

PSA - D < 0.15 – sugestivo de **HBP** PSA - D = 0.15 – sugestivo de **Ca P**

Causas de elevação do PSA

- 1. Prostatite aguda e crónica
- 2. Retenção urinária aguda
- 3. Biopsia prostática
- 4. HBP
- 5. Ejaculação
- 6. RTU-P
- 7. Prostatectomia
- 3. Carcinoma da próstata

Oesterling et al (1993) Weld ve, Neuvirth H, Bennett PM Ca P Cure, Dianon Rua Nova do Almada, 95 - 3º A - 1200-288 LISBOA - Portugal Tel. (351) 213 243 590 - Fax (351) 213 243 599 E-mail: apurologia@mail.telepac.pt - Internet: www.apurologia.pt



Publicação com o patrocínio

