

**PREFEITURA DE MARINGÁ  
SECRETARIA DE SAÚDE  
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO**

## **Fórmulas magistrais específicas para Psoríase ( prescrição somente por dermatologistas)**

**FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL:  
SUZANA ESTER NASCIMENTO OGAVA – CRF PR 4392**

**FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE  
RAMAL 3146**

## **Critérios para fornecimento:**

- Ser morador de Maringá e ser vinculado e acompanhado pela UBS de referência
- Ser portador de Psoríase
- Possuir prescrição de médico dermatologista do SUS ou médico dermatologista de projetos sociais vinculados a Secretaria de Saúde ( EX. Instituição Lins e Vasconcelos).
- A Unidade de saúde deverá enviar a receita para a farmácia de manipulação da Secretaria de Saúde, após a comprovação dos critérios estipulados acima.
- A farmácia de manipulação receberá a receita, produzirá o medicamento e enviará o mesmo para a Unidade de Saúde para que o paciente possa retirar o medicamento na própria Unidade.
- A farmácia de manipulação não receberá a receita e nem entregará o medicamento diretamente ao paciente, estes procedimentos deverão ser feitos sempre pela UBS ao qual o paciente está vinculado.
- Dúvidas favor entrar em contato com a farmacêutica Suzana Ogava , na Farmácia de Manipulação da Secretaria de Saúde pelo Ramal 3146.

## **Medicamentos padronizados:**

XAMPU DE CLOBETASOL 0,05% - Frasco contendo 100 mL

ESMALTE DE CLOBETASOL 8% - Frasco de vidro com aplicador contendo 10 ml

GEL CREME COM HIDROCORTISONA 1% - Gel creme . Bisnaga 30 gramas

SOLUÇÃO CAPILAR TÓPICA COM BETAMETASONA 0,1% - Frasco conta gotas 60 ml

## XAMPU DE CLOBETASOL 0,05%

### FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO:

Xampu. Frasco contendo 100 mL

**CÓDIGO SISTEMA GESTOR: 1078844**

### FÓRMULA:

<i>Componentes</i>	<i>Quantidade</i>
Clobetasol , propionato	0,05%
Ext glic. <i>Calendula officinalis</i>	10%
Xampu base qsp	100 mL

### ARMAZENAMENTO:

Manter em local fresco, ao abrigo da luz, calor e umidade.

### INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS

Psoríase

### MODO DE USAR

Uso externo.

Aplicar na área afetada uma ou duas vezes ao dia

### ADVERTÊNCIAS

Não utilizar em lesões abertas.

Não utilizar durante a gestação

Manter fora do alcance de crianças.

### NOTA

**Fórmula magistral específica para Psoríase  
(prescrição somente por dermatologistas)**

## ESMALTE DE CLOBETASOL 8%

### FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO:

Esmalte. Frasco de vidro com aplicador contendo 10 ml

**CÓDIGO SISTEMA GESTOR: 1078845**

### FÓRMULA:

<i>Componentes</i>	<i>Quantidade</i>
Clobetasol , propionato	8%
Esmalte base qsp	10 ml

### ARMAZENAMENTO:

Manter em local fresco, ao abrigo da luz, calor e umidade.

### INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS

Psoríase ungueal

### MODO DE USAR

Uso externo. De acordo com prescrição médica.

### ADVERTÊNCIAS

Manter fora do alcance de crianças.

### NOTA

**Fórmula magistral específica para Psoríase  
(prescrição somente por dermatologistas)**

## GEL CREME COM HIDROCORTISONA 1%

### FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO:

Gel creme . Bisnaga 30 gramas

**CÓDIGO SISTEMA GESTOR: 1078846**

### FÓRMULA:

<i>Componentes</i>	<i>Quantidade</i>
Hidrocortisona	1 %
Gel creme hidratante qsp	30 g
<i>Composição do gel creme hidratante base: óleo de girassol, Aloe vera</i>	

### ARMAZENAMENTO:

Manter em local fresco, ao abrigo da luz, calor e umidade.

### INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS

Psoríase

### MODO DE USAR

Uso externo.

Aplicar na área afetada de acordo com prescrição médica

### ADVERTÊNCIAS

Não utilizar em lesões abertas.

Não utilizar durante a gestação

Manter fora do alcance de crianças.

### NOTA

**Fórmula magistral específica para Psoríase  
( prescrição somente por dermatologistas)**

## SOLUÇÃO CAPILAR TÓPICA COM BETAMETASONA 0,1%

### FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO:

Solução hidroalcoólica . Frasco conta gotas 60 ml

**CÓDIGO SISTEMA GESTOR: 1078847**

### FÓRMULA:

<i>Componentes</i>	<i>Quantidade</i>
Betametasona	0, 1 %
Ácido salicílico	3%
Propilenoglicol	10%
Álcool 70% qsp	60ml

### ARMAZENAMENTO:

Manter em local fresco, ao abrigo da luz, calor e umidade.

### INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS

Psoríase

### MODO DE USAR

Uso externo.

Aplicar na área afetada de acordo com prescrição médica

### ADVERTÊNCIAS

Não utilizar em lesões abertas.

Não utilizar durante a gestação

Manter fora do alcance de crianças.

### NOTA

**Fórmula magistral específica para Psoríase  
( prescrição somente por dermatologistas)**