

ÁREA E ÍNDICE DE SEVERIDADE DA PSORÍASE (PASI)

Área e índice de serveridade da psoríase (PASI) é um escore de classificação quantitativo utilizado para medir a gravidade das lesões psoriásicas com base na área de cobertura e da aparência da placa

Característica da placa	Escore	Cabeça	MMSS	Tronco	мми	
Eritema	0 = Nenhum 1 = Leve 2 = Moderado 3 = Grave 4 = Muito intenso					
Endurecim./Espessura						
Escala						
Some junto cada uma das 3 pontuações para cada região do corpo para dar 4 somas separadas (A).						
Soma das pontuações das lesões						

Porcentagem de área afetada	Escore da área	Cabeça	MMSS	Tronco	мми	
Escore da área (B) Grau de envolvimento como uma porcentagem para cada região do corpo afetada (pontuação de cada região com pontuação entre 0-6)	0 = 0% 1 = 1% - 9% 2 = 10% - 29% 3 = 30% - 49% 4 = 50% - 69% 5 = 70% - 89% 6 = 90% - 100%					
Multiplique a Soma de (A) pela Pontuação (B), para cada região do corpo, para obter 4 subtotais individuais (C).						
Subtotais (C)						
Multiplique cada um dos Subtotais (C) pela quantidade de . área de superfície corporal						
Área da superfície corporal		x 0,1	x 0,2	x 0,3	x 0,4	
Total (D)						
Some cada uma das pontuações para obter a pontuação final do PASI.						

PASI	Escore =	
------	----------	--

Severidade da psoríase

≤9 leve; 10 a 15 moderada; ≥ 16 severa