





MINISTÉRIO DA SAÚDE Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA)

Entender por que se fuma e como isso afeta a saúde

DEIXANDO DE FUMAR SEM MISTÉRIOS

2ª edição, 8ª reimpressão



s e s s ã o

MANUAL DO PARTICIPANTE

MINISTÉRIO DA SAÚDE Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA)

ENTENDER POR QUE SE FUMA E COMO ISSO AFETA A SAÚDE

DEIXANDO DE FUMAR SEM MISTÉRIOS

Manual do Participante - Sessão 1

2ª edição, 8ª reimpressão

Rio de Janeiro, RJ **INCA** 2019

2005 Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva/ Ministério da Saúde.



Esta obra é disponibilizada nos termos da Licença Creative Commons - Atribuição - Não Comercial - Compartilha igual 4.0 Internacional. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte.

Esta obra pode ser acessada, na íntegra, na Biblioteca Virtual em Saúde Prevenção e Controle de Câncer (http://controlecancer.bvs.br/) e no Portal do INCA (http://www.inca.gov.br).

Tiragem: 194.000 exemplares - 2ª edição, 8ª reimpressão - 2019

Elaboração, distribuição e informações

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Instituto Nacional de Câncer José Alencar
Gomes da Silva (INCA)
Coordenação de Prevenção e Vigilância
Rua Marquês de Pombal, 125
CEP 20230-240 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 3207-5500
E-mail: conprev@inca.gov.br
www.inca.gov.br

Coordenação de Elaboração

Tânia Maria Cavalcante

Tradução e adaptação da 1ª edição

Luísa da Costa e Silva Goldfarb Ricardo Henrique Sampaio Meirelles Tânia Maria Cavalcante Tereza Maria Piccinini Feitosa Vera Luiza da Costa e Silva

Colaboradores

Catarina Maria Ribeiro Ferreirinha José Augusto Barbosa Stella Aguinaga Vera Maria Stiebler Leal

Impresso no Brasil / Printed in Brazil
Fox Print

Revisores da 2ª edição

Cleide Regina da Silva Carvalho Mariana Coutinho Marques de Pinho Ricardo Henrique Sampaio Meirelles Tânia Maria Cavalcante Vaneide Marcon Cachoeira

Projeto Gráfico e Editoração

Master Publicidade S.A.

Normalização editorial

Taís Facina Rita Machado

Ficha catalográfica da 2ª edição

lara Rodrigues de Amorim

Diagramação da 2ª edição Cecilia Pachá

159e Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva.

Entender por que se fuma e como isso afeta a saúde : manual do participante - sessão 1 / Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, Coordenação de Prevenção e Vigilância ; coordenação de elaboração Tânia Maria Cavalcante. - 2. ed., 8. reimpr. - Rio de laneiro : Inca. 2019.

12 p. : il. - (Deixando de fumar sem mistérios)

ISBN 85-7318-094-3

1. Comunicação em saúde. 2. Tabagismo. 3. Transtorno por uso de tabaco. 4. Abandono do uso de tabaco. 5. Educação em saúde. 6. Prospecto para educação de pacientes. I. Cavalcante, Tânia Maria, coord. II. Título. III. Série.

CDD 302.232

Catalogação na fonte - Serviço de Educação e Informação Técnico-Científica

Títulos para indexação

Em ingles: Stop smoking with no mysteries – Understanding why people smoke and how it affects health Em espanhol: Dejar de fumar sin misterios – Comprender porqué uno fuma y como eso afecta su sanidad

Seu objetivo





Faça seu teste

1. É muito difícil para você ficar 12 horas sem fumar?	SIM	NÃO
2. Você tem um desejo intenso e compulsivo ("fissura") por cigarros?	SIM	NÃO
3. Você sente necessidade de fumar pelo menos um certo número de cigarros por dia?	SIM	NÃO
4. Você freqüentemente se encontra fumando sem ter percebido que havia acendido um cigarro?	SIM	NÃO
5. Você associa o ato de fumar com outros comportamentos tais como tomar café ou falar ao telefone?	SIM	NÃO
6. Você já passou, por acaso, um dia inteiro sem fumar?	SIM	NÃO
7. Você fuma mais depois de ter uma discussão com alguém?	SIM	NÃO
8. Fumar é um dos prazeres mais importantes da sua vida?	SIM	NÃO
9. O pensamento de nunca mais fumar o torna infeliz?	SIM	NÃO



Corrigindo o teste

Se nas perguntas

1

2

3

você respondeu SIM a duas ou três delas, está **fisicamente dependente** de cigarros.

Se nas perguntas

4

5

6

você respondeu SIM a duas ou três delas, está **fazendo associações de comportamentos** envolvendo o ato de fumar.

Se nas perguntas

7

8

9

você respondeu SIM a duas ou três delas, está **psicologicamente dependente** de cigarros.

Muitos fumantes verificam que respondem SIM à maioria das perguntas e que estão dependentes física e psicologicamente do cigarro, além de fazerem associações de comportamento. Se esse é o seu caso, não se desespere: você não está sozinho. Procure determinar qual dos aspectos do tabagismo é o obstáculo mais difícil para você deixar de fumar.

Considere as informações a seguir.

A nicotina é uma substância que causa dependência. Se você tem uma necessidade compulsiva por cigarro — isto é, tem um desejo intenso (fissura) — e não consegue parar ou ficar algumas horas sem fumar, é provável que esteja dependente da nicotina. É normal, portanto, que os primeiros dias sem cigarros sejam os mais difíceis; depois desse período, ficar sem cigarro é tão fácil para você quanto para os que pararam há mais tempo.

A dependência psicológica do cigarro refere-se ao sentido ou à função que ele tem. A forma mais comum de dependência psicológica é o uso do cigarro para lidar com situações de estresse. Muitas pessoas sentem que o cigarro as relaxa; então, elas fumam sempre que estão tensas. Se fumar ajuda você a relaxar é porque o cigarro lhe é familiar — ele é familiar da mesma forma que um amigo próximo — e, assim, é uma fonte de alívio. Outras pessoas usam o cigarro como uma forma de lidar com a solidão; em um sentido muito real, o cigarro se torna um amigo. Dessa forma, a pessoa se sente triste ao pensar em parar de fumar — ao pensar em perder um companheiro. Alguns fumantes acham que o cigarro os estimula a serem criativos e assim fumam mais quando estão trabalhando. Outros fumam mais quando estão contentes ou se divertindo. O cigarro parece estender o prazer. Esses são exemplos das maneiras como os indivíduos se tornam psicologicamente dependentes do cigarro.

O ato de fumar envolve várias associações de comportamento ligadas aos hábitos individuais e sociais que criaram, progressivamente, vínculos, tais como tomar café e logo em seguida acender um cigarro. Se for o seu caso, veja como funcionam essas e outras associações de um comportamento. Inicialmente, você começou acendendo um cigarro após tomar café, pois lhe parecia um momento apropriado, ou era uma atividade social comum. Depois de algumas repetições, essas associações se tornaram constantes, de forma que, agora, cada vez que você pega uma xícara de café, tem desejo de

você pega uma xícara de café, tem desejo de fumar. Outras associações comuns são: fumar e ingerir bebidas alcoólicas, fumar e falar ao telefone, fumar e escrever um relatório, fumar e assistir à televisão ou fumar depois de comer. Pense a respeito dessas associações. Existem situações particulares, eventos ou comportamentos que parecem, quase sempre, fazer com que você automaticamente procure um cigarro?



O que fazer?

Agora você pode estar dividido, questionando o seu desejo de parar de fumar.

O pensamento de adiar essa decisão pode ser atraente neste momento.

Muitos fumantes sentem-se divididos quanto à decisão de parar de fumar.

Eles querem parar, mas gostariam de continuar fumando para sempre.

Um fato importante para você saber sobre esse desejo ambivalente é que não é necessário livrar-se totalmente do desejo de fumar antes de efetivamente parar.

Isto é, o desejo de fumar só vai embora se você parar. O que é importante saber é: você quer parar mais do que quer continuar a fumar? Faça, a seguir, duas listas que vão ajudá-lo a aumentar e fortalecer sua motivação para deixar de fumar.

Seja o mais honesto e cuidadoso possível ao fazer as duas listas. Faça cada lista da forma mais completa possível. Gaste bastante tempo pensando sobre o que faz você parar e o que faz querer continuar fumando. Seja justo com ambos os lados da questão.

Depois de completar as duas listas, volte e faça um círculo nos itens mais importantes de cada uma.

Finalmente, ponha uma estrela próxima ao item que é mais importante para você, levando em consideração todos os itens.



Por que desejo fumar? Por que desejo parar de fumar?



Agora, você está pronto para a avaliação final. Sente-se e olhe para as duas listas, analisando-as. Responda à pergunta:

O QUE EU QUERO MAIS: PARAR DE FUMAR OU CONTINUAR FUMANDO?

Pode ser que sua decisão, qualquer que tenha sido, tenha ganho por pouco.

Lembre-se de que existem poucas decisões na vida que podem ser feitas na base de 100% de preferência.



Um ponto importante é decidir o que você mais quer e agir de acordo com essa decisão.

Mesmo que você decida parar de fumar agora, parte de você pode querer continuar a fumar por algum tempo. Em um curto período, seu desejo de fumar e sua necessidade de ser um fumante vão desaparecer.

Avalie os métodos para deixar de fumar

PARADA ABRUPTA (de uma só vez)

É quando se pára de fumar de uma hora para outra, cessando totalmente o uso de cigarro. Assim, o indivíduo interrompe abruptamente o uso de nicotina. Em outras palavras, se seu consumo é de dois maços por dia, você pára abruptamente quando fuma seus dois maços usuais hoje e nenhum cigarro amanhã. Qualquer método gradual de parar não é abrupto. A maior parte dos indivíduos que conseguiram se tornar ex-fumantes pararam abruptamente.

PARADA GRADUAL (aos poucos)

No entanto, você pode achar melhor adotar um método gradual. Se você decidir deixar de fumar utilizando uma estratégia gradual, não deve gastar mais do que duas semanas nesse processo. Diminuir o número de cigarros usando um período de tempo longo pode tornar a experiência de deixar de fumar mais difícil do que o necessário, ou seja, pode-se tornar uma forma de adiar e não de parar. As formas de parada gradual são: redução e adiamento.



REDUÇÃO

Uma abordagem gradual para deixar de fumar é a redução. Reduzir significa contar os cigarros e fumar um número menor, predeterminado, a cada dia. Por exemplo: um fumante de 30 cigarros por dia pode reduzir o número de cigarros em cinco, a cada dia, por seis dias, até a data escolhida por ele para deixar de fumar.

EXEMPLO: No primeiro dia, ele pode fumar os seus 30 cigarros usuais.

No segundo	25
No terceiro	20
No quarto	15
No quinto	10
No sexto	5

O dia seguinte, o sétimo dia, será sua data para deixar de fumar, ou seja, seu primeiro dia sem cigarros.

ADIAMENTO

Uma segunda abordagem gradual para deixar de fumar é o adiamento, que significa adiar a hora na qual você começa a fumar por um número de horas predeterminado a cada dia. Ao começar a fumar em cada dia, não conte seus cigarros nem se preocupe em reduzir o número que você fuma. Assim, tome a decisão de adiar a hora na qual começa a fumar por duas horas a cada dia, por seis dias, até a sua data de parar de fumar.

EXEMPLO: No primeiro dia, pode começar a fumar às 9 horas.

No segundo	às 11 horas		
No terceiro	às 13 horas		
No quarto	às 15 horas		
No quinto	às 17 horas		
No sexto	às 19 horas		

O dia seguinte, o sétimo dia, será sua data para deixar de fumar, ou seja, seu primeiro dia sem cigarros.

Considere estas informações sobre o tabagismo e seus prejuízos à saúde

O tabagismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde como a principal causa evitável de morte.

Você provavelmente conhece os malefícios à saúde causados pelo uso dos derivados do tabaco. Lembre-se de que não é apenas o câncer de pulmão, mas vários outros cânceres, além de enfisema, infarto do miocárdio, bronquite crônica, sinusite, derrame cerebral e envelhecimento prematuro da pele, que são também causados ou agravados pelo tabagismo, entre inúmeras outras doenças.

O monóxido de carbono (CO), presente na fumaça do cigarro, não permite que a qualidade adequada de oxigênio alcance os tecidos dos órgãos de seu corpo. Ninguém está imune aos efeitos danosos do monóxido de carbono, que priva o coração do oxigênio necessário ao seu bom funcionamento, levando ao infarto do miorcárdio. Na gestante, diminui o oxigênio que chega ao bebê, trazendo problemas ao seu desenvolvimento.

A nicotina, por sua vez, diminui o calibre dos vasos sangüíneos, dificultando a circulação do sangue pelo corpo. Como um estimulante, a nicotina causa aumento da ansiedade em pessoas predispostas. Ela é a substância do cigarro responsável pela dependência química.

Finalmente, o alcatrão pode provocar o aparecimento de câncer.

