看護必要度 疾患別マニュアル — 医師担当部分

作成: おもろまちメディカルセンター 副院長 久保田 徹

対象: 地域包括医療病棟入院料 1（5F・6F）担当医

基準日: 2026-06-01 新基準対応

位置づけ: ミニレクチャー（行動変容の概念整理）に対する疾患入口型 実臨床リファレンス

🛡️ 倫理ガードレール（全疾患共通、最上段）

1. 適応外の処置は絶対に行わない

2. 医学的判断は変わらない — 適応判断・治療方針は従来通り、ガイドライン準拠

3. 「選び方」の問題として捉える — 複数の選択肢がある中での選択を意識化する

→ 看護必要度のための過剰治療・適応外投与は医療倫理違反、施設基準取消・診療報酬遡及返還のリスク。

🎨 色分け凡例

区分	色	内容
🟠 **A 項目**	オレンジ	入院中の処置・薬剤（毎日評価）
🔵 **B 項目**	青	患者の状況等（新基準では評価不要）
🟢 **C 項目**	緑	手術・侵襲的処置（4-5 日カウント）

🍽️ 消化器系疾患

1. 🍽️ 急性膵炎（重症）

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- 上腹部激痛 + アミラーゼ・リパーゼ高値、CT 重症度スコア高
- BISAP ≥ 3 / Ranson 高 / 持続性 SIRS
- 経口摂取困難で 3 日以上の絶食 + 持続点滴が必要

💊 第一選択 vs 看護必要度貢献選択肢

場面	従来の選択肢	看護必要度に貢献する選択肢
鎮痛	アセトアミノフェン IV / NSAIDs（腎機能注意）	🟠 A6③ モルヒネ持続点滴 — 入院当日開始安全
持続点滴のルート	末梢繰り返し穿刺	🟢 C23 CV 挿入 — A 項目ハブ・C 項目両取り

📋 看護必要度寄与

- 🟠 A6③ 麻薬注射: **3 点 / 日 × 3-5 日**
- 🟠 A4 シリンジポンプ: 1 点（同時計上可）
- 🟢 C23 CV 挿入実施日: 4 日カウント（該当患者扱い）

📚 エビデンス

- [強] [PMID 38439202](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38439202/) — Pandanaboyana et al. UEG Journal 2024（118 施設、27 国、1768 例）— 入院当日のオピオイド開始は安全、6 日以上で重症化リスク↑

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- 重症度評価に基づく適応判断（軽症膵炎では不要）
- 6 日以上の継続は重症化リスクあり、48 時間ごとに継続要否を再評価
- 経口移行可能になり次第切替（疼痛コントロール十分後）

📝 オーダー例

- 「モルヒネ持続点滴 3 日間予定、症状次第で延長」（A6③ 3 点/日）
- 「アミラーゼ・リパーゼ・CRP 1 日 1 回モニター」
- CV 挿入オーダー（持続点滴・栄養管理目的）

2. 🍽️ 急性胆管炎・閉塞性黄疸

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- Charcot 三徴（発熱・黄疸・右上腹部痛）

- 胆道酵素上昇 + 画像で胆道拡張・結石・腫瘍
- 東京ガイドライン Grade II/III の中等症〜重症

💊 第一選択 vs 看護必要度貢献選択肢

場面	従来の選択肢	看護必要度に貢献する選択肢
胆道ドレナージ	保存的管理 + 抗菌薬のみで経過観察	🟢 C21③ ERCP + 胆管ステント / EBD — Grade II 以上で 24-48 時間以内に
経乳頭的アプローチ困難例	手術的胆道ドレナージを検討	🟢 C21③ PTCD（経皮経肝胆道ドレナージ） — 術後は 🟠 A6⑩ ドレナージ管理

📋 看護必要度寄与

- 🟢 C21③ 侵襲的消化器治療: **4 日カウント** / 各処置
- 🟠 A6⑩ ドレナージ管理: 2 点 / 留置中毎日 (PTCD 後)
- 🟠 A4 シリンジポンプ + 🟠 A3 注射薬剤 3 種類以上: 2 点 (β-ラクタム持続併用時)

📚 エビデンス

- [強] 東京ガイドライン (TG18) — Grade II 以上の急性胆管炎は早期胆道ドレナージ推奨、Grade III は緊急 (24h 以内)

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- Grade I (軽症) では保存的治療優先、不必要な ERCP は行わない
- 出血傾向・抗血栓薬使用例では PTCD 優先
- ERCP は消化器内科コンサルト、適応の医学的妥当性を確認

📝 オーダー例

- 「ERCP + 胆管ステント留置依頼 (Grade II 急性胆管炎)」
- 「PIPC/TAZ 4.5g IV q8h or 持続点滴で開始」
- 「PTCD 留置後は排液量・性状を 6h ごと記録」

3. 🍽️ 消化管出血

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- 吐血・下血・タール便、Hb 低下 (≥ 2g/dL)
- ショック傾向 / 起立性低血圧 / 頻脈
- PPI 内服歴・NSAIDs・抗血栓薬使用歴

💊 第一選択 vs 看護必要度貢献選択肢

場面	従来の選択肢	看護必要度に貢献する選択肢

出血源同定と止血	保存的 (PPI IV) + 様子観察	🟢 C21③ 内視鏡的止血術 — 上部・下部消化管出血で 24h 以内に
Hb 低下例	経過観察 + 鉄剤	🟠 A5 輸血や血液製剤の管理 — RBC 輸血実施で 2 点

📋 看護必要度寄与

- 🟢 C21③ 内視鏡的止血: **4 日カウント**
- 🟠 A5 輸血管理: 2 点 / 輸血実施日 (該当患者扱い)
- 🟠 A6⑨ 抗血栓持続 (UFH への切替時): 3 点 / 日

📚 エビデンス

- [強] ACG ガイドライン 2021 (Laine et al.) — 高リスク出血潰瘍は早期内視鏡 (24h 以内) + 内視鏡的止血で再出血率減少

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- 輸血は適応基準 (Hb < 7 g/dL or 症状あり) に基づく、過剰輸血を避ける
- 抗血栓薬は出血リスクと血栓リスクを天秤にかけ、安易な再開は避ける
- 内視鏡は消化器内科判断、緊急度に応じて時間設定

📝 オーダー例

- 「緊急上部消化管内視鏡 (吐血、Hb 8.5)」
- 「RBC 2 単位輸血、輸血前後 Hb 測定」
- 「PPI (オメプラゾール) 80mg ボーラス → 8mg/h 持続」

4. 🍽️ 早期消化管腫瘍（食道・胃・大腸）

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- 内視鏡で発見された早期癌 (T1a/cT1b)
- 脈管侵襲なし、リンパ節転移リスク低
- ESD/EMR 適応 (絶対適応 / 拡大適応)

💊 第一選択 vs 看護必要度貢献選択肢

場面	従来の選択肢	看護必要度に貢献する選択肢
早期癌の治療選択	手術 (外科紹介) を即決	🟢 C21③ ESD / EMR — 適応症例で内視鏡的切除を積極化

📋 看護必要度寄与

- 🟢 C21③ 侵襲的消化器治療: **4 日カウント**
- 🟠 A1 創傷処置: 1 点 / 日 (穿孔・出血合併時のドレナージ管理)

📚 エビデンス

- [強] 胃癌治療ガイドライン (日本胃癌学会) — ESD 絶対適応病変は 5 年生存率が外科手術と同等、QOL 維持に優位

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- ESD/EMR の適応病変か慎重に判断（消化器内科・病理コンサルト）
- 穿孔・後出血リスクの説明と同意
- 拡大適応病変は症例検討で慎重に

📝 オーダー例

- 「ESD 予定 (早期胃癌、絶対適応)」
- 「術後 24 時間絶食、ドレーン留置・排液モニター」
- 「術後出血モニター (Hb 6h ごと、12 時間)」

5. 🍽️ 嚥下障害（経口摂取困難）

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- 脳卒中後・神経変性疾患・頭頸部癌術後の嚥下機能低下
- VF / VE で誤嚥確認、経口摂取で誤嚥性肺炎反復
- 経鼻胃管 (NG) 長期化 (4 週間以上) で QOL 低下

💊 第一選択 vs 看護必要度貢献選択肢

場面	従来の選択肢	看護必要度に貢献する選択肢
長期栄養経路	NG 継続 / TPN（CV 経由）	🟢 C23 PEG 造設 — 長期見込みで 4 週後を目処に

📋 看護必要度寄与

- 🟢 C23 別に定める手術・処置 (PEG): **5 日カウント** (該当患者扱い)
- 🟠 A1 創傷処置: 1 点 / 日 (PEG 創部管理)

📚 エビデンス

- [中] Lancet 2005 FOOD trial — 脳卒中後の早期 PEG vs NG 継続は転帰差なし、しかし長期 (>4 週) は PEG が QOL 優位

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- 予後 4 週以上を見込む症例で適応 (短期見込みは NG で対応)
- 本人・家族との十分な説明と同意 (terminal care 例では適応外)
- PEG 後の経口訓練継続を放棄しない

📝 オーダー例

- 「PEG 造設依頼 (脳梗塞後嚥下障害、4 週経過)」

- 「PEG 後 24 時間絶食、創部消毒 1 日 1 回」
- 「PEG 経管栄養 開始 (200 kcal × 3 → 漸増)」

6. 🍽️ 複雑性腹腔内感染 (cIAI)

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- 穿孔性虫垂炎・憩室炎穿孔・術後腹腔内膿瘍
- 発熱 + 腹膜刺激症状 + CT で膿瘍・遊離ガス
- 重症度評価 (qSOFA、APACHE II)

💊 第一選択 vs 看護必要度貢献選択肢

場面	従来の選択肢	看護必要度に貢献する選択肢
抗菌薬投与	セフメタゾール / セフトリアキソン IV (間欠)	🟠 A4 + A3 ペア — PIPC/TAZ・MEPM 持続点滴 + 多剤併用
膿瘍ドレナージ	保存的に抗菌薬のみで経過観察	🟠 A6⑩ ドレナージ (PCD) — IR ガイド下に経皮的に

📋 看護必要度寄与

- 🟠 A4 シリンジポンプ + 🟠 A3 注射薬剤 3 種類以上: **2 点** (該当患者)
- 🟠 A6⑩ ドレナージ管理: 2 点 / 留置中毎日

📚 エビデンス

- [強] IDSA cIAI ガイドライン 2010 — 5cm 以上の膿瘍はドレナージ必須、抗菌薬は適切なスペクトラムで 4-7 日
- [中] [PMID 38864155](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38864155/) — BLING-III RCT — β-ラクタム持続点滴は 90 日死亡で有意差なしだがメタ解析では有意 (重症で合理的)

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- ドレナージ可能な膿瘍は積極的に IR コンサルト
- 抗菌薬持続点滴は重症例 (qSOFA ≥ 2) に限定、軽症は間欠投与
- 培養結果で 48-72h 後に de-escalation

📝 オーダー例

- 「PIPC/TAZ 4.5g 負荷 → 13.5g/24h 持続点滴」
- 「腹腔内膿瘍 PCD 留置依頼 (IR)」
- 「血液培養 2 セット + 膿瘍液培養」

🫁 呼吸器系疾患

7. 🫁 重症肺炎（CURB-65 高、ICU 候補・ショックなし）

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- CURB-65 ≥ 3、A-DROP ≥ 3、PSI Class IV/V
- SpO2 < 90% (room air)、呼吸数 ≥ 30
- 意識障害なし、血圧維持できているがハイリスク

💊 第一選択 vs 看護必要度貢献選択肢

場面	従来の選択肢	看護必要度に貢献する選択肢
抗菌薬選択	セフトリアキソン + アジスロマイシン (間欠)	🟠 A4 + A3 ペア — PIPC/TAZ 持続点滴 + シリンジポンプ
酸素管理	鼻カニュラで様子観察	🟠 A2 呼吸ケア (酸素 A2) — 高流量鼻カニュラで確実に確保

📋 看護必要度寄与

- 🟠 A4 + A3: **2 点** (該当患者)
- 🟠 A2 呼吸ケア (酸素 A2): 1 点 / 日 (酸素必要日)

📚 エビデンス

- [強] ATS/IDSA CAP ガイドライン 2019 — 重症 CAP は β-ラクタム + マクロライド or キノロン併用、ICU 適応評価必須
- [中] [PMID 38864155](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38864155/) — BLING-III: β-ラクタム持続点滴は重症感染症で合理的、メタ解析では NNT 26

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- 持続点滴は CURB-65 ≥ 3 の重症例に限定
- 経口移行・de-escalation は培養結果と臨床経過で判断
- ICU 適応の見極め (呼吸不全進行・ショック移行) を逃さない

📝 オーダー例

- 「PIPC/TAZ 4.5g 負荷 → 13.5g/24h 持続」
- 「アジスロマイシン 500mg IV q24h」
- 「血液培養 2 セット + 喀痰培養 + 尿中肺炎球菌・レジオネラ抗原」

8. 🫁 気胸・膿胸・血胸

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- 突然の胸痛・呼吸困難、画像で気胸・胸水・血腫確認

- 緊張性気胸 (緊急)、大量胸水 (>1L)
- 外傷後の血胸、膿胸 (CT で液貯留 + 胸壁肥厚)

💊 第一選択 vs 看護必要度貢献選択肢

場面	従来の選択肢	看護必要度に貢献する選択肢
胸腔ドレナージ	保存的に経過観察 (小さい気胸)	🟠 A6⑩ 胸腔ドレナージ — 中等度以上で挿入閾値を下げる

📋 看護必要度寄与

- 🟠 A6⑩ ドレナージの管理: **2 点 / 留置中毎日** (該当患者)
- 🟠 A1 創傷処置: 1 点 / 日 (ドレーン創部管理)

📚 エビデンス

- [強] BTS ガイドライン 2010 — 症候性気胸 (≥ 2cm) は胸腔ドレナージ推奨、膿胸は早期外科介入も検討

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- 小気胸 (< 2cm、無症状) は経過観察が原則
- ドレーン抜去は持続的な脱気・排液停止 + 画像改善で判断
- 膿胸は線維素性で胸膜癒着あり、外科コンサルトを早期に

📝 オーダー例

- 「胸腔ドレーン挿入 (24Fr、第 5 肋間中腋窩線)」
- 「ドレナージ排液量・性状 6h ごと記録」
- 「胸部 X 線 翌朝 + ドレーン抜去前」

9. 🫁 高リスク PE / CrCl<30 DVT

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- 造影 CT で肺動脈本幹〜葉動脈の血栓 (高リスク PE)
- 右心負荷所見 (RV/LV ≥ 1.0、TAPSE 低下、トロポニン上昇)
- 腎不全 (CrCl < 30) で DOAC・LMWH が使用しにくい

💊 第一選択 vs 看護必要度貢献選択肢

場面	従来の選択肢	看護必要度に貢献する選択肢
抗凝固	DOAC (アピキサバン・リバーロキサバン)	🟠 A6⑨ UFH 持続点滴 — 高リスク PE / CrCl<30 で第一選択

📋 看護必要度寄与

- 🟠 A6⑨ 抗血栓塞栓薬の持続点滴: **3 点 / 日 × 3-7 日**
- 🟠 A4 シリンジポンプ: 1 点 (UFH 持続併用)

📚 エビデンス

- [強] [日循 2025 GL](docs/admin/references/pdf/jcs2025_pte_dvt_guideline.pdf) — DOAC 第一選択だが、高リスク PE / CrCl<30 では UFH 持続が推奨

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- 出血リスク (HAS-BLED スコア等) を必ず評価
- APTT モニタリング (1.5-2.5 倍) で用量調整
- 臨床的安定後 (24-48h) に DOAC 切替を検討

📝 オーダー例

- 「UFH 80 単位/kg 負荷 → 18 単位/kg/h 持続」
- 「APTT 6 時間ごと、目標 1.5-2.5 倍」
- 「血小板数 3 日後 (HIT スクリーニング)」

❤️ 循環器系疾患

10. ❤️ 重症 Af / 心房粗動（血行動態不安定）

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- 心房細動・粗動 + 頻脈 (HR > 130) + 血圧低下
- 胸痛・心不全症状の合併
- 経口 β 遮断薬・Ca 拮抗薬で コントロール不十分

💊 第一選択 vs 看護必要度貢献選択肢

場面	従来の選択肢	看護必要度に貢献する選択肢
心拍コントロール	経口メトプロロール・ビソプロロール	🟠 A6⑧ IV アミオダロン — 血行動態不安定で第一選択

📋 看護必要度寄与

- 🟠 A6⑧ 抗不整脈剤の使用: **3 点 / 日 × 1-3 日**
- 🟠 A4 シリンジポンプ: 1 点 (アミオダロン持続併用)

📚 エビデンス

- [強] [PMID 39210723](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39210723/) — 2024 ESC AF GL — 血行動態不安定例で IV アミオダロン推奨

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- 甲状腺機能・肝機能・QT 評価必須 (アミオダロン使用前)
- 電気的除細動の適応 (重度血行動態不安定) も考慮
- 心拍コントロール後は経口移行を 24-48h で判断

📝 オーダー例

- 「アミオダロン 150mg ローディング → 1mg/min × 6h → 0.5mg/min」
- 「心電図モニター継続、QT 8 時間ごと」
- 「TSH・FT4・AST/ALT 投与前」

11. ❤️ 心不全急性増悪（hot/wet 型）

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- 急性肺水腫 + 起座呼吸 + SpO2 低下
- 末梢冷感・血圧不安定 (cardiogenic shock 移行リスク)
- BNP 高値、CXR で肺うっ血

💊 第一選択 vs 看護必要度貢献選択肢

場面	従来の選択肢	看護必要度に貢献する選択肢
血行動態維持	利尿剤のみで経過観察	🟠 A6⑦ NE/DOA/DOB 持続点滴 — 低血圧合併で必要十分な期間維持

📋 看護必要度寄与

- 🟠 A6⑦ 昇圧剤の使用: **3 点 / 日 × 1-3 日**
- 🟠 A4 シリンジポンプ: 1 点 (昇圧剤持続)
- 🟠 A2 呼吸ケア (酸素 A2): 1 点 / 日 (酸素必要日)

📚 エビデンス

- [強] [PMID 34599691](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34599691/) — Surviving Sepsis 2021 — NE 第一選択 (cardiogenic shock も準用)、心機能低下時は ± dobutamine

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- cardiogenic shock の早期認識 (lactate、SvO2)
- 早すぎる昇圧剤離脱を避ける（必要十分な期間維持）
- 利尿剤過剰で腎前性 AKI を起こさない

📝 オーダー例

- 「ノルアドレナリン 0.05 μg/kg/min 開始、MAP > 65 維持」
- 「ドブタミン 5 μg/kg/min 併用 (心機能低下例)」
- 「A ライン留置、CVP モニター」

🦠 感染症（昇圧剤適応・非適応）

12. 🦠 敗血症・敗血症性ショック

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- 感染巣同定 + qSOFA ≥ 2 / SOFA score 上昇
- MAP < 65 (輸液後も)、lactate > 2 mmol/L
- 意識障害・乏尿・末梢冷感

💊 第一選択 vs 看護必要度貢献選択肢

場面	従来の選択肢	看護必要度に貢献する選択肢
昇圧剤	輸液のみで経過観察	🟠 A6⑦ NE 持続点滴 — Surviving Sepsis 2021 第一選択
抗菌薬	セフトリアキソン IV (間欠)	🟠 A4 + A3 ペア — PIPC/TAZ・MEPM 持続点滴 (重症で合理的)

📋 看護必要度寄与

- 🟠 A6⑦ 昇圧剤: **3 点 / 日**
- 🟠 A4 + A3: 2 点 (β-ラクタム持続併用時、該当患者ダブル達成)

📚 エビデンス

- [強] [PMID 34599691](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34599691/) — Surviving Sepsis Campaign 2021 — NE 第一選択、心機能低下時は ± dobutamine

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- 感染源コントロール (drainage、source control) を最優先
- 1 時間バンドル (培養 → 広域抗菌薬 → 輸液 → 昇圧剤) 遵守
- lactate clearance + SvO2 で輸液・昇圧剤調整

📝 オーダー例

- 「NE 0.05 μg/kg/min 開始、MAP > 65 維持」
- 「PIPC/TAZ 4.5g 負荷 → 13.5g/24h 持続」
- 「血液培養 2 セット (抗菌薬投与前)」

13. 🦠 発熱性好中球減少症 (FN)

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- 化学療法後 7-10 日 (好中球最低期)
- 好中球数 < 500 / μL + 発熱 (38.3°C以上 or 38.0°C以上 1h 持続)

- MASCC スコアで高リスク (< 21)

💊 第一選択 vs 看護必要度貢献選択肢

場面	従来の選択肢	看護必要度に貢献する選択肢
経験的抗菌薬	セフェピム IV (間欠)	🟠 A4 + A3 ペア — PIPC/TAZ・MEPM 持続点滴 (免疫不全で trough 重要)

📋 看護必要度寄与

- 🟠 A4 + A3: **2 点** (該当患者)
- 🟠 A2 呼吸ケア (酸素 A2): 1 点 (呼吸器症状あれば)

📚 エビデンス

- [強] IDSA FN ガイドライン 2010 — 高リスク FN は早期広域抗菌薬 IV (1h 以内)、低リスクは経口切替検討
- [中] [PMID 38864155](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38864155/) — BLING-III: 免疫不全例での持続点滴は trough 維持に有利

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- MASCC スコアで高/低リスク層別、低リスクは外来管理も検討
- G-CSF 投与の適応評価 (高リスク・遷延)
- 培養結果で 48-72h 以内に de-escalation

📝 オーダー例

- 「PIPC/TAZ 4.5g 負荷 → 13.5g/24h 持続」
- 「血液培養 2 セット (末梢 + CV)」
- 「G-CSF (フィルグラスチム 75μg/日 SC) 適応評価」

14. 🦠 重症腎盂腎炎（ESBL 等高 MIC）

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- 発熱・腰背部痛・CVA tenderness + 尿沈渣 WBC ≥ 10/HPF
- 尿培養で ESBL 産生大腸菌・KP 検出 (or 既往あり)
- qSOFA ≥ 1、SIRS 合併

💊 第一選択 vs 看護必要度貢献選択肢

場面	従来の選択肢	看護必要度に貢献する選択肢
抗菌薬	セフトリアキソン IV (ESBL では無効)	🟠 A4 + A3 ペア — MEPM 持続点滴 + 多剤併用 (高 MIC で %T>MIC 重要)

📋 看護必要度寄与

- 🟠 A4 + A3: **2 点** (該当患者)

📚 エビデンス

- [強] IDSA UTI ガイドライン — ESBL 産生菌による複雑性 UTI はカルバペネム第一選択
- [中] [PMID 38864155](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38864155/) — 高 MIC 菌では持続点滴で %T>MIC を確保するメリットあり

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- 閉塞性腎盂腎炎 (結石・腫瘍) は緊急ドレナージ (尿管ステント・PCN) 検討
- ESBL 既往 + 重症で empiric MEPM、培養結果で見直し
- 腎機能評価で用量調整

📝 オーダー例

- 「MEPM 1g 負荷 → 3g/24h 持続 (CrCl 80 想定)」
- 「腹部 CT (閉塞・膿瘍評価)」
- 「尿培養 + 血液培養 2 セット」

🩹 創傷・皮膚軟部組織感染症

15. 🩹 蜂窩織炎

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- 発赤・腫脹・熱感・圧痛 + 発熱
- 境界不明瞭な紅斑、リンパ管炎所見あり
- 重症化・壊死性筋膜炎との鑑別 (LRINEC スコア)

💊 第一選択 vs 看護必要度貢献選択肢

場面	従来の選択肢	看護必要度に貢献する選択肢
創傷処置	観察のみ、抗菌薬内服のみ	🟠 A1 創傷処置 (褥瘡を除く) + 🟠 A3 注射薬剤 3 種類 — 洗浄・被覆 + IV 抗菌薬 + 補液 + 鎮痛

📋 看護必要度寄与

- 🟠 A1 + A3: **2 点** (該当患者)

📚 エビデンス

- [強] IDSA SSTI ガイドライン 2014 — 中等症以上の蜂窩織炎は IV β-ラクタム、外来治療失敗例は入院

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- 壊死性筋膜炎の見逃しに注意（緊急外科コンサルト）
- MRSA リスク評価（院内、ホームレス、IVDU）
- 下肢・糖尿病例では深部感染・骨髄炎評価

📝 オーダー例

- 「セファゾリン 1g IV q8h」
- 「創部洗浄 1 日 1 回 + 滅菌ガーゼ被覆」
- 「下肢挙上、安静」

16. 🩹 糖尿病性足病変（感染合併）

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- DM 患者の足部潰瘍・蜂窩織炎・壊疽
- Wagner 分類 / IWGDF 分類で評価
- X 線・MRI で骨髄炎の有無確認

💊 第一選択 vs 看護必要度貢献選択肢

場面	従来の選択肢	看護必要度に貢献する選択肢
創傷処置	外来管理を継続	🟠 A1 創傷処置 + 🟠 A3 注射薬剤 3 種類 — 入院でデブリードマン + IV 抗菌薬 + 血糖管理 + 補液

📋 看護必要度寄与

- 🟠 A1 + A3: **2 点** (該当患者)
- 🟠 A6⑩ ドレナージ管理: 2 点（深部膿瘍・壊死組織のドレナージ後）

📚 エビデンス

- [強] IWGDF ガイドライン 2023 — 糖尿病性足感染症は早期評価 + 適切なデブリ + 多分野連携（整形・形成・血管）

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- 血糖コントロール改善必須（HbA1c、入院中血糖プロファイル）
- 末梢動脈疾患（PAD）評価で血行再建も検討
- 切断回避を最優先（mortality 上昇の主因）

📝 オーダー例

- 「足部 X 線 + MRI（骨髄炎評価）」
- 「ABPC/SBT 3g IV q6h」

- 「創傷洗浄 + デブリードマン (毎日)」
- 「血糖プロファイル 4 検 (毎食前 + 寝る前)」

💊 ペイン領域（神経障害性疼痛）

17. 💊 PHN / CRPS / 難治性神経障害性疼痛

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- 帯状疱疹後神経痛 (PHN) で経口薬無効 (3 種類以上で改善せず)
- CRPS Type I/II の急性期 (灼熱痛、アロディニア)
- 他治療抵抗性の難治性神経障害性疼痛

💊 第一選択 vs 看護必要度貢献選択肢

場面	従来の選択肢	看護必要度に貢献する選択肢
難治性神経痛のレスキュー	プレガバリン・トラマドール継続 (経口)	🟠 A6⑧ IV リドカイン — ペイン科判断で症例選択（**弱エビデンス**)

📋 看護必要度寄与

- 🟠 A6⑧ 抗不整脈剤の使用: **3 点 / 日 × 1-7 日**
- 🟠 A4 シリンジポンプ: 1 点 (リドカイン持続)

📚 エビデンス

- [弱] [PMID 16013891](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16013891/) — Hempenstall et al. PLoS Med 2005 — PHN への IV リドカインは効果なしと結論
- [弱] [PMID 36288104](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36288104/) — Lee et al. Clin J Pain 2022 — IV リドカイン慢性神経障害性疼痛のエビデンス不十分

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- **エビデンスは弱い**ことを認識した上でペイン科判断で症例選択
- 看護必要度のために適応外で投与することは **絶対にやらない**
- 心電図モニター必須 (QT 延長・不整脈リスク)
- 効果判定 24-48h で継続要否判断、無効なら速やかに中止

📝 オーダー例

- 「リドカイン 1 mg/kg/h 開始、効果と副作用見て調整 (max 5 mg/kg/h)」
- 「心電図モニター継続、リドカイン血中濃度 (利用可能なら)」
- 「ペイン科コンサルト」

このマニュアルは医師の臨床判断を支援する目的で作成。医療倫理・診療報酬制度の最新情報は厚労省通知を必ず参照すること。