

SUSYQM

Toshiya Tanaka

November 10, 2022

1 SUSY in QM

Definition 1.1 (最小超対称関係)

3 種類の Hermitian operator H : Hamiltonian, Q : Supercharge, $(-1)^F$: ???があって

$$H = Q^2 \quad (1)$$

$$Q(-1)^F = -(-1)^F Q, \quad \text{or} \quad \{Q, (-1)^F\} = 0 \quad (2)$$

$$((-1)^F)^2 = 1 \quad (3)$$

を満たす関係を最小超対称関係という。

超対称性がある系には、必ずこの関係がある。

実は、簡単な量子力学系にもこの構造が隠れている。

1.1 円周上の自由粒子

半径 R の円周上の自由粒子を考える。定義域を $-\pi R \leq x \leq \pi R$ とし、周期的境界条件 $\psi(x + 2\pi R) = \psi(x)$ を入れる。Hamiltonian は $H = -1/(2m) d/dx$ であるので、Schrödinger 方程式を解くと、固有関数として、次の固有関数を得る。

$$\phi_{n,+}(x) = N_{n,+} \cos\left(\frac{n}{R}x\right) \quad (4)$$

$$\phi_{n,-}(x) = N_{n,-} \sin\left(\frac{n}{R}x\right). \quad (5)$$

これらの固有エネルギーは、

$$E = \frac{1}{2mR^2} n^2 \quad (6)$$

で、各固有空間は 2 次元あることがわかる。Hamiltonian を“因数分解”して supercharge を得る。 $H = (-i/(\sqrt{2m}) d/dx)^2$ より、 $Q := -i/(\sqrt{2m}) d/dx = p/\sqrt{2m}$ とする。

また、parity \mathcal{P} は $(-1)^F$ の働きをする。

よって、この系には、最小超対称関係を満たす演算子たちが存在することがわかる。これらは Hermitian であることも確かめられる^{*1}。

今、周期的境界条件で考えたが、ひねった境界条件 $\psi(x + 2\pi R) = e^{i\theta} \psi(x)$ を入れると面白い^{*2}。 θ の連続変形でスペクトラムの構造は連続的に変化し^{*3}、 $\theta = n\pi$ のところでは SUSY の構造が現れるが、その他のところでは現れない。実際計算すると、固有エネルギーと固有状態は

$$\psi_n = N_n e^{i(n+\theta/(2\pi))x/R} \quad (7)$$

$$E_n = \frac{1}{2mR^2} \left(n + \frac{\theta}{2\pi}\right)^2 \quad (8)$$

となる。

$\theta \neq n\pi$ で SUSY が壊れているのは、parity が上手くいっていないからである。境界条件を考えると、 $\psi(x + 2\pi R) = e^{i\theta} \psi(x)$ だが、 $x' = -x - 2\pi R$ とおくと、 $\psi(x' + 2\pi R) = e^{-i\theta} \psi(x')$ となってしまう、 $\theta \neq n\pi$ では parity で境界条件が不変でないので、同じ系の中で対応が作れない。

^{*1} A が Hermitian とは、今定まっている内積 $\langle \psi, \phi \rangle = \int dx (\psi(x))^* \phi(x)$ に対して、 $\langle A\psi, \phi \rangle = \langle \psi, A\phi \rangle$ が成り立つことである。

^{*2} Aharonov–Bohm のように、磁場を使うと、実際に作ることができる。

^{*3} spectral flow という。

1.2 超対称性の基本性質

SUSY がある系は最小超対称関係

- $H = Q^2$
- $\{Q, (-1)^F\} = 0$
- $((-1)^F)^2 = 1$

が必ずある。

この関係から, $[H, Q] = 0$, $[H, (-1)^F]$ がなりたつので, H と $(-1)^F$ の同時固有状態 $|E, \lambda\rangle$ をとることができる。
 $((-1)^F)^2 = 1$ なので, $\lambda = \pm 1$ である。
 以下の 4 つの性質が成り立つ。

Property 1

エネルギー固有値が非負. $E \geq 0$.

次の式変形からわかる^{*4}.

$$E = \langle E, \lambda | H | E, \lambda \rangle \quad (9)$$

$$= \langle E, \lambda | Q^2 | E, \lambda \rangle \quad (10)$$

$$= \|Q | E, \lambda \rangle\|^2 \quad (11)$$

$$\geq 0. \quad (12)$$

□

Property 2

正エネルギー状態は, $(-1)^F$ の固有値が ± 1 の固有状態 $|E, \pm\rangle$ で対を成し, エネルギー固有値は縮退する。

まず, $E > 0$ として, $|E, +\rangle$ を考える. $(-1)^F Q |E, +\rangle = -Q (-1)^F |E, +\rangle = -Q |E, +\rangle$ なので, $Q |E, +\rangle \propto |E, -\rangle$.
 $|E, -\rangle$ についても同様に, $Q |E, -\rangle \propto |E, +\rangle$ である。

また, 比例定数は

$$\|Q |E, +\rangle\|^2 = \langle E, + | Q^\dagger Q | E, + \rangle \quad (13)$$

$$= \langle E, + | H | E, + \rangle \quad (14)$$

$$= E \quad (15)$$

となるので^{*5},

$$Q |E, \pm\rangle = \sqrt{E} |E, \mp\rangle \quad (16)$$

と決まる^{*6}.

このとき, $|E, \pm\rangle$ は Q を通じて対を成しており, supermultiplet を成すという. この状況を模式的に $|E, +\rangle \xleftrightarrow{Q} |E, -\rangle$ と書く。 □

Property 3

ゼロエネルギー状態^{*7}は必ずしも縮退しない. ゼロエネルギー状態が存在するならば, $Q |E = 0\rangle = 0$ を満たす。

Eq. (16) に $E = 0$ を代入すると直ちにわかる. $E \neq 0$ のときとは異なり, Q を通じた supermultiplet をなさない. この状況を $|E = 0, +\rangle \xrightarrow{Q} 0 \xleftarrow{Q} |E = 0, -\rangle$ と書く。 □

ゼロエネルギー状態が $Q |E = 0, \pm\rangle$ を満たすことは, ゼロエネルギー状態は 1 階の微分方程式の解であることを意味する。

Property 4

Witten index $\Delta_W := \mathcal{N}_{E=0}^+ - \mathcal{N}_{E=0}^-$ は topological invariant.

ここで, $\mathcal{N}_{E=0}^\pm$ は $(-1)^F$ の固有値が ± 1 の固有状態の数である。

topological invariant とは, 理論のパラメータの連続変形で不変な量という意味で用いる. S^1 上の自由粒子の例では m や R を大きくとると, $n \neq 0$ に置いても $E_n \rightarrow 0$ となるが, もともと non zero であるものは対で存在するので, ゼロエネルギー状態の数の差は変わらない。 □

^{*4} Q が Hermitian であることは本質的である。

^{*5} phase は実にとると

^{*6} Q は H を “因数分解” して作ったことを思い出すと, 大きさは \sqrt{E} になると思える。

^{*7} SUSY の文脈でこのような状態を BPS state という。

2 $\mathcal{N} = 2$ 超対称代数

2.1 一般性質

Definition 2.1 (実 supercharge と $\mathcal{N} = 2$ ^{*8} 超対称代数)

最小超対称関係を満たす三つのエルミート演算子 $H, Q, (-1)^F$ から, エルミート演算子^{*9} $Q_1 := Q, Q_2 := -iQ(-1)^F$ を定める. H, Q_1, Q_2 は,

$$\{Q_i, Q_j\} = 2H\delta_{ij} \quad (17)$$

$$[H, Q_i] = 0 \quad (18)$$

の関係を満たす.

これは, 最小超対称関係と等価だが, $(-1)^F$ を加えて議論することが多い. $(-1)^F$ は余分な演算子なので, 束縛関係 $iQ_1Q_2 = H(-1)^F$ で結ばれる^{*10}.

Definition 2.2 (複素 supercharge と $\mathcal{N} = 2$ 超対称代数)

$\mathcal{Q} := (Q_1 + iQ_2)/\sqrt{2}$ を定める. このとき, \mathcal{Q}, H は

$$\{\mathcal{Q}^\dagger, \mathcal{Q}\} = 2H \quad (19)$$

$$\{\mathcal{Q}, \mathcal{Q}\} = \{\mathcal{Q}^\dagger, \mathcal{Q}^\dagger\} = 0 \quad (20)$$

$$[H, \mathcal{Q}] = [H, \mathcal{Q}^\dagger] = 0 \quad (21)$$

の関係を満たす.

Eq. (20) は $\mathcal{Q}^2 = (\mathcal{Q}^\dagger)^2 = 0$ と書け, 2 乗してゼロになるこの性質を nilpotency という^{*11}.

複素の場合も, $\mathcal{N} = 2$ 超対称代数に $(-1)^F$ を加え考えることが便利である. この場合の束縛関係は $(\mathcal{Q}^\dagger \mathcal{Q} - \mathcal{Q} \mathcal{Q}^\dagger)/2 = H(-1)^F$ である. 左辺を実 supercharge で計算すれば, iQ_1Q_2 になり, 実の場合の束縛を使うと導ける.

複素 supercharge で基本性質を見る.

Property 1

$E \geq 0$.

Property 2

$E > 0$ なら次の supermultiplet の構造がある.

$$0 \leftarrow_{\mathcal{Q}} |E, -\rangle \xleftarrow{\mathcal{Q}^\dagger} |E, +\rangle \xrightarrow{\mathcal{Q}^\dagger} 0 \quad (22)$$

Property 3

$E = 0$ なら, $\mathcal{Q}, \mathcal{Q}^\dagger$ で消える.

$$0 \leftarrow_{\mathcal{Q}} |E = 0\rangle \xrightarrow{\mathcal{Q}^\dagger} 0 \quad (23)$$

Property 4

Witten index がトポロジカルな量.

Witten index については全く同じ.

2.2 S^1 上自由粒子での具体例

以下では, 上で見た $\mathcal{N} = 2$ 超対称代数を, 具体的に S^1 上の自由粒子の例について見る.

前回, この系は $H := -1/(2m) d^2/dx^2, Q := -i/(2m) d/dx, (-1)^F := \mathcal{P}$ が最小超対称関係を満たすことを見たが, もう少し具体的に見る.

この系では, 周期的境界条件から, エネルギーは $E_n = n^2/(2mR^2), n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ で対応する固有状態は二つあり,

$$\psi_{n,+}(x) = N_{n,+} \cos(nx/R) \quad n \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \quad (24)$$

$$\psi_{n,-}(x) = N_{n,-} \sin(nx/R) \quad n \in \mathbb{Z}_{> 0} \quad (25)$$

であるが, これは, Q が一階微分演算子であり, \sin と \cos が入れ替わることを考えると, Q を通して移り合う.

^{*8} \mathcal{N} は supercharge の数である. ところが, 実 (エルミート) で数える流儀と複素で数える流儀があり, 文献を比較する際は確認する必要がある. 今は実で数えている.

^{*9} エルミートという意味で, 実 supercharge という.

^{*10} $(-1)^F$ という余分な演算子が現れたとき, H をかければ最小限の Q_1, Q_2 のみで書けるということ.

^{*11} nilpotency は場の理論の Grassmann 数の対称性である BRS 対称性による保存量である BRS charge, de Rham cohomology などでも重要な働きをするそう. 実際 SUSYQM で微分幾何をやるという話もある.

また、規格化定数の phase を $N_{n,-} = iN_{n,+} =: iN_n$ ととると、

$$Q\psi_{n,+} = \sqrt{n^2/(2mR^2)}iN_n \sin(nx/R) \quad (26)$$

$$= \sqrt{E_n}\psi_{n,-} \quad (27)$$

と規格化定数も含めて、一般の結果が再現できる。

次に、複素 supercharge を用いて考える。以下では、具体的な微分などは考えず、 H と Q と P の代数的性質を用いて考察する。

今、 $P_{\pm} := (1 \pm P)/2$ を定めると、複素 supercharge は $Q = (Q + i(-iQP))/\sqrt{2} = \sqrt{2}Q/P_+$ 、 $Q^{\dagger} = \sqrt{2}QP_-$ となる。

Theorem 2.3

P_+ 、 P_- はそれぞれ関数 $f(x)$ の偶関数成分、奇関数成分を取り出す演算子である。

$f(x) = (f(x) + f(-x))/2 + (f(x) - f(-x))/2$ と書き直したとき、第一項は偶関数であり、第二項は奇関数である。これらを偶関数成分、奇関数成分と呼ぶ。

$P_{\pm}(f(x)) = (f(x) \pm f(-x))/2$ は実際に成り立つ。 \square

Theorem 2.4

P_{\pm} は射影演算子である。すなわち、次の性質を満たす。

- $(P_{\pm})^2 = P_{\pm}$
- $P_+ + P_- = 1$
- $P_+P_- = 0$

これを用いて、Eq. (22) のスペクトラムは理解できる。

- $\psi_{n,+}$ は偶関数なので、 $Q^{\dagger} \sim P_-$ で消える。
- $\psi_{n,-}$ は奇関数なので、 $Q \sim P_+$ で消える。
- $\psi_{n,+}$ は偶関数なので、 $Q \sim Q$ で奇関数に移る。
- $\psi_{n,-}$ は奇関数なので、 $Q^{\dagger} \sim Q$ で偶関数に移る。

また、Eq. (23) のスペクトラムは次のように理解できる。

- ground state は定数関数なので、微分で消える。
- 偶関数でもあるので、 P_- でも消える。

3 Witten model

Definition 3.1 (Witten model)

Hamiltonian を 2 成分で

$$H = \begin{pmatrix} A^{\dagger}A & 0 \\ 0 & AA^{\dagger} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H_+ & 0 \\ 0 & H_- \end{pmatrix} \quad (28)$$

の形で与える量子力学系を Witten model や $\mathcal{N} = 2$ 超対称量子力学 ($\mathcal{N} = 2$ SUSYQM) という。量子力学なので、具体的に A は

$$A := \frac{1}{\sqrt{2m}} \left(-i\hbar \frac{d^2}{dx^2} - iW'(x) \right) \quad (29)$$

と書け、 $W(x)$ は superpotential^{*12}という。また、

$$H_+ = \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2m} (W'(x))^2 - \frac{\hbar}{2m} W''(x) \quad (30)$$

$$H_- = \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2m} (W'(x))^2 + \frac{\hbar}{2m} W''(x) \quad (31)$$

である。これに伴い、波動関数は二成分考える必要があり、 $\Psi(x) = (\psi_+(x), \psi_-(x))^{\top}$ と書く。

Witten model は定義した H に加え、

$$Q := \begin{pmatrix} 0 & A^{\dagger} \\ A & 0 \end{pmatrix}, \quad (-1)^F = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (32)$$

を定めると、これらは最小超対称関係を満たす。

これから定義に従って計算すると、実 supercharge は

$$Q_1 = \begin{pmatrix} 0 & A^{\dagger} \\ A & 0 \end{pmatrix}, \quad Q_2 = \begin{pmatrix} 0 & iA^{\dagger} \\ -iA & 0 \end{pmatrix}, \quad (33)$$

^{*12} $W'(x)$ のことを superpotential という流儀もあって、実際 Witten の原論文はそうだが、 $W(x)$ のほうがふさわしいらしい。

複素 supercharge は

$$\mathcal{Q} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \sqrt{2}A & \end{pmatrix} = \sqrt{2}A\sigma_- \quad (34)$$

$$\mathcal{Q}^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{2}A^\dagger \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \sqrt{2}A^\dagger\sigma_+ \quad (35)$$

となる。\$\sigma_\pm\$ は冪零行列なので、複素 supercharge の冪零性はここから自然にわかる。

エネルギーの縮退の構造に関して、今までどおり、\$H\$ と \$(-1)^F\$ の同時固有状態を考える。\$(-1)^F = \sigma_3\$ の形から、固有状態は \$(\psi_+(x), 0)^\top, (0, \psi_-(x))^\top\$ であり、\$H\Psi_E(x) = E\Psi_E(x)\$ は

$$A^\dagger A\psi_{E,+}(x) = E\psi_{E,+}(x) \quad (36)$$

$$AA^\dagger\psi_{E,-}(x) = E\psi_{E,-}(x) \quad (37)$$

を解けば良いことになる。

Theorem 3.2

ここで、\$E > 0\$ の場合

$$A\psi_{E,+}(x) = \sqrt{E}\psi_{E,-}(x), \quad (38)$$

$$A^\dagger\psi_{E,-}(x) = \sqrt{E}\psi_{E,+}(x) \quad (39)$$

の超対称関係がある。

今、Eq. (38) の一つの解 \$\psi_{E,+}(x)\$ を取って、\$A\psi_{E,+}(x)\$ を考えると、\$AA^\dagger(A\psi_{E,+})(x) = EA\psi_{E,+}(x)\$ より Eq. (39) の解になる。規格化は \$\|A\psi_{E,+}\|^2 = \langle\psi_{E,+}, A^\dagger A\psi_{E,+}\rangle = E\$ なので \$A\psi_{E,+}(x) = \sqrt{E}\psi_{E,-}(x)\$ である。もうひとつも同様。□

Witten model は二成分で考えているが³、別個の 2 つの量子力学系 \$H_+ = A^\dagger A\$, \$H_- = AA^\dagger\$ を二つ取ってきたと思うと、その間に \$A\$ と \$A^\dagger\$ を通して対応がついたことになる。\$H_+\$ と \$H_-\$ を超対称パートナー Hamiltonian という。

Witten model のゼロエネルギー状態を調べると、Witten index に幾何的解釈をつけることができる。ゼロエネルギー状態は他とは異なり、一階の微分方程式の解になっている。\$A\psi_{0,+}(x) = 0\$, \$A^\dagger\psi_{0,-}(x) = 0\$ だが³、微分を明らかに書くと、

$$\frac{-i\hbar}{\sqrt{2m}}\left(\frac{d}{dx} + \frac{1}{\hbar}W'(x)\right)\psi_{0,+}(x) = 0 \quad (40)$$

$$\frac{-i\hbar}{\sqrt{2m}}\left(\frac{d}{dx} - \frac{1}{\hbar}W'(x)\right)\psi_{0,-}(x) = 0 \quad (41)$$

なので、簡単に解けて、

$$\psi_{0,+}(x) = N_{0,+}e^{-W(x)/\hbar} \quad (42)$$

$$\psi_{0,-}(x) = N_{0,-}e^{W(x)/\hbar} \quad (43)$$

となる。\$N_{0,\pm}\$ は適当な規格化定数である。ただし、量子力学としては、この解であり規格化可能なものだけが取りうる状態なので規格化可能性を調べる必要がある。

便宜上、superpotential が \$p\$ 次多項式で \$W(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_px^p\$, \$a_p \neq 0\$ で与えられるとする。規格化可能性を考えると、ゼロエネルギー状態はあるとしたら superpotential の最高次が偶数次の場合で、符号が正なら \$(-1)^F\$ の固有値が \$+1\$ の方に存在し、負なら \$-1\$ の方に存在することになる。³

Table 1 ✓ の入っている場合が規格化可能.

	\$W(\infty)\$	\$W(-\infty)\$	\$\psi_{0,+}\$	\$\psi_{0,-}\$
\$a_p > 0, p\$: even	\$\infty\$	\$\infty\$	✓	×
\$a_p > 0, p\$: odd	\$\infty\$	\$-\infty\$	×	×
\$a_p < 0, p\$: even	\$-\infty\$	\$\infty\$	×	✓
\$a_p < 0, p\$: odd	\$-\infty\$	\$-\infty\$	×	×

Witten index は

$$\Delta_W = \begin{cases} +1, & a_p > 0, p: \text{even} \\ -1, & a_p < 0, p: \text{even} \\ 0, & p: \text{odd} \end{cases} \quad (44)$$

だが、これは superpotential の二回微分が正の極値の数 − 負の極値の数 に等しいことが知られている^{*13}。感覚的には、superpotential を連続変形しても漸近的振る舞いを変えない限り、この数が変わらないこととして Witten index が topological 不変量であることが理解できる。

^{*13} Witten1981 に書いてあるらしいが³、見つけれなかった。

現象論にも Witten index は重要で、現状、SUSY は現実世界で観測されていないので、low energy では SUSY は破れていないといけない。

ground state $|\text{vac}\rangle$ として、 $Q|\text{vac}\rangle = Q^\dagger|\text{vac}\rangle = 0$ のとき SUSY は破れていない、そうでないとき SUSY は破れているという。エネルギーの言葉ではこれは ground energy $E_0 = 0$ のとき SUSY が破れている、そうでないとき SUSY が破れていないことになる。

Witten index の言葉では、 $\Delta_W \neq 0$ なら、かならずゼロエネルギー状態があるので、SUSY は破れていない。SUSY が破れているならば、 $\Delta_W = 0$ である。(逆は成り立たない。)

SUSY が破れている現象論模型を作るためには、 $\Delta_W = 0$ を満たすように作らなければいけない。