

Statistical Mechanics

Toshiya Tanaka

April 19, 2022

1 磁性体の統計力学

1.1 方針

大まかな流れは、次のようである。

1. 分配関数の計算
2. エネルギー, 磁化, 磁化率の期待値の計算
3. 温度, 磁場に対する振る舞いを考察

この方針は変えず, 個々の系に対し様々なテクニックを使う。

1.2 すべての spin が独立にある場合

N 粒子系を考える。粒子 j の spin を $\sigma_j = \pm 1$ で指定し, スピン角運動量の固有値は $\pm\mu_0$ とする。磁場 H 中にある系のエネルギー固有値は

$$E = - \sum_{j=1}^N \mu_0 \sigma_j H \quad (1.1)$$

で, 一つの粒子だけに注目したとき

$$E_j = -\mu_0 \sigma_j H \quad (1.2)$$

である。spin1 つの期待値は期待値の定義から

$$\langle \sigma_j \rangle = \frac{1}{Z_j(\beta)} (\mu_0 e^{\beta \mu_0 H} - \mu_0 e^{-\beta \mu_0 H}) \quad (1.3)$$

$$= \mu_0 \tanh(\beta \mu_0 H) \quad (1.4)$$

である。

独立なので, 一粒子の情報がわかれば十分で, 一粒子の分配関数は

$$Z_j(\beta) = e^{\beta \mu_0 H} + e^{-\beta \mu_0 H} \quad (1.5)$$

$$= 2 \cosh(\beta \mu_0 H) \quad (1.6)$$

である。よって, N 粒子あったとき, 分配関数は

$$Z(\beta) = (2 \cosh(\beta \mu_0 H))^N \quad (1.7)$$

となる。エネルギー期待値は

$$\langle H \rangle = - \frac{\partial}{\partial \beta} \log(2 \cosh(\beta \mu_0 H)) \quad (1.8)$$

$$= -N \mu_0 H \tanh(\beta \mu_0 H) \quad (1.9)$$

である。

Definition 1.1 (磁化)

磁化を

$$m = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \mu_0 \sigma_j \quad (1.10)$$

と定める。スピンの平均値と思ってよい。

Table 1 Eq. (1.19) のスピンを含む箇所の計算結果.

(σ_1, σ_2)	$(1, 1)$	$(1, -1)$	$(-1, 1)$	$(-1, -1)$
$\sigma_1 \sigma_2$	1	-1	-1	1
$\sigma_1 + \sigma_2$	2	0	0	-2
$E_{N=2}$	$-J - 2\mu_0 H$	J	J	$-J + 2\mu_0 H$

磁化の期待値は, Eq. (1.4) と期待値の線形性から

$$\langle m \rangle = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \mu_0 \langle \sigma_j \rangle \quad (1.11)$$

$$= \mu_0 \tanh(\beta \mu_0 H) \quad (1.12)$$

である.

Definition 1.2 ($H = 0$ での磁化率)

磁化率 χ を

$$\chi = \left. \frac{\partial m}{\partial H} \right|_{H=0} \quad (1.13)$$

と定める. 磁場 H を揺すったときの磁石になりやすさと解釈できる.

磁化率も計算する.

$$\chi = \frac{\mu_0^2}{k_B T} \quad (1.14)$$

となる.

本筋とは外れるが, エントロピーを計算する. そのためにまず, Helmholtz free energy の計算をする.

$$F(\beta, H, N) = -\frac{1}{\beta} \log Z(\beta) \quad (1.15)$$

$$= -N k_B T \log \left(2 \cosh \left(\frac{\mu_0 H}{k_B T} \right) \right) \quad (1.16)$$

ここから, エントロピーが計算できて,

$$S(\beta, H, N) = -\frac{\partial}{\partial T} F(\beta, H, N) \quad (1.17)$$

$$= N k_B \frac{\mu_0 H}{k_B T} \left(\cosh \left(\frac{\mu_0 H}{k_B T} \right) - \log \left(2 \cosh \left(\frac{\mu_0 H}{k_B T} \right) \right) \right) \quad (1.18)$$

となり, H/k_B 単位で現れる. これを用いて, $(T_1, H_1) \rightarrow (T_2, H_2)$ の断熱準静操作を行うとき, エントロピーが普遍なので, この単位も不変である. 磁場 H をゆっくり変えることで温度を変えることが^{i.}できる. これを断熱消磁と呼ぶ.

1.3 ペアを形成し, ペア同士は独立な場合

次に, 二つの粒子が相互作用しペアを形成していて, ペア同士は相互作用していない状況を考える. 粒子数 N はわかりやすく, 偶数としておく.

このときのエネルギー固有値は

$$E_\sigma = -J \sum_{j=1}^{N/2} \sigma_{2j-1} \sigma_{2j} - \mu_0 H \sum_{k=1}^N \sigma_k \quad (1.19)$$

とする. 第一項が相互作用による項で Heisenberg 交換相互作用とよばれる.

J は物質による定数で, J が正の場合ペアのスピンは揃いやすく, 負の場合, 反対を向きやすい.

以上の設定で考える.

まず, ペアたちは独立なので, (σ_1, σ_2) だけ選んで考える. Eq. (1.19) にでてくる量を計算し, Table. 1.3 これで, 分配関数が計算できる.

$$Z(\beta) = e^{-\beta(-J-2\mu_0 H)} + 2e^{-\beta J} + e^{-\beta(-J+2\mu_0 H)} \quad (1.20)$$

$$= 2e^{\beta J} (\cosh(2\beta \mu_0 H) + e^{-2\beta J}). \quad (1.21)$$

^{i.} 主に低温を作る.

エネルギー期待値は

$$\langle H \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z(\beta) \quad (1.22)$$

$$= -\frac{N}{2} \frac{J(e^{-2\beta J} - \cosh(2\beta\mu_0 H)) - 2\mu_0 H \sinh(2\beta\mu_0 H)}{\cosh(2\beta\mu_0 H) + e^{-2\beta J}} \quad (1.23)$$

となる。ここで、 $H = 0$ とすると、

$$\langle H \rangle = -\frac{N}{2} \tanh \beta J \quad (1.24)$$

である。

spin のペアの期待値は

$$\langle \sigma_1 + \sigma_2 \rangle = \frac{1}{Z(\beta)} \left(2e^{\beta(J+2\mu_0 H)} - e^{-\beta(J-2\mu_0 H)} \right) \quad (1.25)$$

$$= \frac{2 \sinh(2\beta\mu_0 H)}{\cosh(2\beta\mu_0 H) + e^{-2\beta J}} \quad (1.26)$$

磁化は

$$\langle m \rangle = \left\langle \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \sigma_j \right\rangle \quad (1.27)$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N/2} \langle \sigma_{2j-1} \sigma_{2j} \rangle \quad (1.28)$$

$$= \frac{\sinh(2\beta\mu_0 H)}{\cosh(2\beta\mu_0 H) + e^{-2\beta J}} \quad (1.29)$$

$$= \frac{2\beta\mu_0^2 H + \mathcal{O}((\beta\mu_0 H)^3)}{1 + \mathcal{O}((\beta\mu_0 H)^2) + e^{-2\beta\mu_0 H}} \quad (1.30)$$

となる。最後は磁化率を求めるために H を含む冪で展開した。

磁化率は H で微分して $H = 0$ とするので、二次以上の項は消えて、

$$\chi(\beta) = \left. \frac{\partial \langle m \rangle}{\partial H} \right|_{H=0} \quad (1.31)$$

$$= \frac{2\beta\mu_0^2}{1 + e^{2\beta J}} \quad (1.32)$$

となる。

1.4 1-d Ising model

エネルギー固有値は

$$E_\sigma = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i \sigma_j - \mu_0 H \sum_{i=1}^N \sigma_i \quad (1.33)$$

とする。ここで、 $\langle i,j \rangle$ は隣り合う i, j に関して和をとることを表し、周期的境界条件 $\sigma_{N+1} = \sigma_1$ を入れると、

$$E_\sigma = -J \sum_{i=1}^N \sigma_i \sigma_{i+1} - \mu_0 H \sum_{i=1}^N \left(\frac{\sigma_i + \sigma_{i+1}}{2} \right) \quad (1.34)$$

と書き換えることができる。

分配関数は

$$Z(\beta) = \sum_{\sigma} e^{E_{\sigma}} \quad (1.35)$$

$$= \sum_{\sigma} e^{\sum_{i=1}^N (\beta J \sigma_i \sigma_{i+1} + \beta \mu_0 H (\sigma_i + \sigma_{i+1})/2)} \quad (1.36)$$

$$= \sum_{\sigma_1=\pm 1} \cdots \sum_{\sigma_N=\pm 1} \prod_{i=1}^N e^{\beta J \sigma_i \sigma_{i+1} + \beta \mu_0 H (\sigma_i + \sigma_{i+1})/2} \quad (1.37)$$

$$= \sum_{\sigma_1=\pm 1} \cdots \sum_{\sigma_N=\pm 1} \prod_{i=1}^N M_{\sigma_i, \sigma_{i+1}} \quad (1.38)$$

となる。行列 M は転送行列とよばれ、

$$M = \begin{pmatrix} e^{\beta J + \beta \mu_0 H} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta J - \beta \mu_0 H} \end{pmatrix} \quad (1.39)$$

である。さらに分配関数は計算できて、

$$Z(\beta) = \text{Tr} (M^N) \quad (1.40)$$

$$= \lambda_+^N + \lambda_-^N \quad (1.41)$$

で、 λ_{\pm} は転送行列の固有値で

$$\lambda_{\pm} = e^{\beta J} \cosh \beta \mu_0 H \pm \sqrt{e^{2\beta J} \cosh^2 \beta \mu_0 H - 2 \sinh \beta J} \quad (1.42)$$

である。

これを用いて、各物理量を求める。自由エネルギー密度は

$$f_N(\beta) = -\frac{1}{\beta N} \log Z(\beta) \quad (1.43)$$

$$= -\frac{1}{\beta} \log \lambda_+ - \frac{1}{\beta N} \log \left(1 + \frac{\lambda_-}{\lambda_+} \right) \quad (1.44)$$

なので、 $N \rightarrow \infty$ で $f(\beta) = -\log \lambda_+ / \beta$ となる。

磁化は

$$m(\beta, H) = \frac{\mu_0 \sinh \beta \mu_0 H}{\sqrt{\sinh^2 \beta \mu_0 H + e^{-4\beta J}}} \quad (1.45)$$

で、磁化率は

$$\chi(\beta) = \beta \mu_0^2 e^{2\beta J} \quad (1.46)$$

である。

これらは連続関数で 1-d Ising model は相転移を起こさないこと^{ii.}がわかる。

1.5 2-d Ising model

二次元では相転移を起こす。しかし、直接解くのは大変である^{iii.}。

他の状況でも使える、かなり雑だが有用な近似である平均場近似の方法と相転移温度を正しく導出できる Kramers–Wannier 双対性を用いた議論を行うことにする。

1.5.1 Kramers–Wannier 双対性

ここでは見やすさの都合上、分配関数を $\beta J =: K$ の関数と見て考えることにする。また、外部磁場 $H = 0$ とする。

ひたすら分配関数を書き換えてゆく。まず、

$$e^{K \sigma_i \sigma_j} = \cosh K \sum_{t \in \{0,1\}} (\sigma_i \sigma_j \tanh K)^t \quad (1.47)$$

と書き換える。よくわからないが、正しいことは少し計算すればわかる。これは各スピンのペアに対して定まり、ペアに関して積をとることはそれらを結ぶ辺について積をとることと同じであることに注意すると、次のように書き換えることができる。

^{ii.} 強いていえば、 $\beta \rightarrow \infty$ で発散するので、絶対零度が相転移点ということもできる。

^{iii.} 2022/04/19 時点では私は解けていない。

$$Z(K) = \sum_{\sigma} e^{K \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i \sigma_j} \quad (1.48)$$

$$= \sum_{\sigma} \prod_{\langle i,j \rangle} e^{K \sigma_i \sigma_j} \quad (1.49)$$

$$= (\cosh K)^{2N} \sum_{\sigma} \sum_{\{t\}} \prod_{\text{辺}} (\sigma_i \sigma_j \tanh K)^t \quad (1.50)$$

$\sum_{\{t\}}$ は、各辺に 0, 1 を割り当てるすべての配位に関する和で、 $\prod_{\text{辺}}$ は一つ選んだ配位に関して積をとる操作である。この積について、 $t = 0$ が与えられた辺は 1 で寄与する。 $t = 1$ が与えられた配位について考える。先に σ についての和をとることを考える。これは有限和なので、文句なしに可能である。このとき、各 σ_i でくくると、 $n \in \mathbb{Z}$ とすると

$$\sum_{\sigma_i = \pm 1} \sigma_i^{2n-1} = 0, \quad (1.51)$$

$$\sum_{\sigma_i = \pm 1} \sigma_i^{2n} = 2 \quad (1.52)$$

であるので、 $t = 1$ が偶数個集まる点からは $2 \tanh K$ で寄与する。模型に対応付けると、 $t = 1$ の線が一つだけ集まることは線の端があることに対応して、一つでもこれがあると積はゼロになるので、閉曲線になっているところだけが積に寄与することになる。

結局、分配関数は

$$Z(K) = (\cosh K)^{2N} \sum_{\{\text{閉曲線}\}} (2 \tanh K)^{\text{閉曲線の長さ}} \quad (1.53)$$

$$= (2 \cosh K)^{2N} \sum_{\{\text{閉曲線}\}} (2 \tanh K)^{\text{閉曲線の長さ}} \quad (1.54)$$

となる。ここで、格子には閉曲線の中と外という二つの状態ができる。これをスピンの上下に対応させることを考える。このスピン配位を μ と書くことにする。

今、閉曲線に関して和を取っているが、これはスピンの配位 μ に関して和を取っているとおもってもよい。また、閉曲線周りでは隣接するスピンは逆向きで、 $\mu_i \mu_j = -1$ になるので、 $(1 - \mu_i \mu_j)/2$ で隣接する i, j について和をとると閉曲線で 1、そうでない場所で 0 と区別ができる。さて、分配関数は

$$Z(K) = (2 \cosh K)^{2N} \sum_{\{\mu\}} \prod_{\text{辺}} (\tanh K)^{(1 - \mu_i \mu_j)/2} \quad (1.55)$$

$$= (2 \cosh K)^{2N} (\tanh K)^N \sum_{\mu} \prod_{\langle i,j \rangle} (\tanh K)^{\mu_i \mu_j / 2} \quad (1.56)$$

$$= (\sinh 2K)^{N/2} Z(K') \quad (1.57)$$

と変形できる。ここで、 $e^{K'} = \tanh^{-1/2} K$ とおいた。つまり、パラメータ K の二次元イジングモデルは K' の二次元イジングモデルと関係していることがわかる。この関係を Kramers–Wannier 双対性 [KW41] という。

さて、この変換を二回行くと

$$Z(K) = (\sinh K \sinh K')^N Z(K) \quad (1.58)$$

となるので、 $\sinh 2K \sinh 2K' = 1$ でないといけない。sinh は単調関数なので、変なことが起こるとすれば $K = K'$ と予想できる。これを解くと、

$$K_c = \frac{1}{2} \log(1 + \sqrt{2}) \quad (1.59)$$

となる。この解は正しい臨界温度を与えることが知られている。

References

[KW41] H. A. Kramers and G. H. Wannier, *Statistics of the two-dimensional ferromagnet. part i*, [Phys. Rev. **60** \(1941\) 252–262](#).