

ROYAUME DU MAROC

Ministère de la Santé
et de la Protection Sociale

Le Ministre



المملكة المغربية
+٠XIIΛΞ+ I HCYΘΞΘ
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
+٠C٠LI٠O+ I +Λ٠ΘΞ Λ %HO.X

الوزير

C٠LI٠O٠O

- 87

Circulaire DP-19/2025/

02 SEP. 2025

Direction Régionale de la Santé
et de la Protection Sociale
Tanger - Tétouan - Al Hoceima

Monsieur le Directeur Général du Groupement Sanitaire Territorial

Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Mesdames et Messieurs les Directeurs Régionaux de la Santé

et de la Protection Sociale

03 SEP. 2025

Bureau d'Ordre

N° Arrivé :

5379

Objet : Introduction du vaccin antipneumococcique conjugué : Prevenar13® dans le
Programme National d'Immunisation.

Au Maroc, le taux de la mortalité infanto-juvénile des enfants de moins de 5 ans a connu une baisse significative grâce à la mise en place d'interventions sanitaires ciblées, notamment l'introduction dans le Calendrier National de Vaccination, depuis 2010, du vaccin antipneumococcique.

Dans l'objectif de consolider ces acquis et d'assurer la protection de la population pédiatrique ciblée, le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale a procédé à l'acquisition du vaccin antipneumococcique conjugué 13-valent : Prevenar 13® sous forme liquide prêt à l'emploi et en présentation de flacon à 4 doses.

Suivant les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)*, le Prevenar 13® est administré selon un schéma à trois doses : la première à 8 semaines, la deuxième à 16 semaines et la troisième à 12 mois.

Le vaccin Prevenar 13® sera réservé aux nourrissons nouvellement recrutés pour la vaccination. Les modalités d'utilisation, de stockage, de conservation ainsi que les dispositions relatives à la coexistence des deux vaccins antipneumococciques conjugués 13-valent : PCV13-TT et Prevenar 13®, dans les structures de vaccination, sont précisées dans la fiche technique ci-jointe et seront détaillées d'avantage dans la formation qui va soutenir cette introduction.

Les quantités du vaccin antipneumococcique PCV13-TT, actuellement disponibles au niveau des provinces, seront destinées pour compléter la vaccination des enfants ayant commencé leur vaccination antipneumococcique par ce type de vaccin.

*Organisation Mondiale de la Santé, Weekly Epidemiol Recd. N°8, 22 février 2019.

Pour garantir une mise en place optimale et réussie du vaccin Prevenar®, le Programme National d'Immunisation prévoit des mesures d'accompagnement, particulièrement sur les aspects programmatiques et techniques.

Eu égard à ce qui précède, je vous demande, Mesdames et Messieurs les Directeurs, de veiller à assurer :

- Une large diffusion de la présente Circulaire Ministérielle.
- La tenue de sessions de formation des professionnels de santé impliqués dans cette vaccination sur ce nouveau vaccin.
- Le suivi rigoureux des états de stocks des vaccins antipneumococciques et tenir le Programme National d'Immunisation informé.
- La dispensation continue de cette vaccination dans l'ensemble des Etablissements de Soins de Santé Primaires et dans le cadre des activités des équipes mobiles.
- Le rattrapage des enfants qui sont non ou incomplètement vaccinés par le vaccin antipneumococcique.

Comptant sur votre engagement, je vous demande, Monsieur le Directeur Général et Mesdames et Messieurs les Directeurs Régionaux de la Santé et de la Protection Sociale, de veiller personnellement à l'application des termes de la présente Circulaire et à mettre en œuvre ses dispositions. *my*

Ministre de la Santé
et de la Protection Sociale

Amine TEHRAOUI


Ampliations:

- Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale.
- Monsieur l'Inspecteur Général du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale.
- Madame et Messieurs les Directeurs de l'Administration Centrale.
- Monsieur le Directeur Général du Groupement Sanitaire Territorial Tanger-Tétouan-Al Hoceima.
- Madame et Messieurs les Directeurs des Centres, Instituts et Ecole relevant du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale.

PJ : Fiche technique de l'introduction du vaccin Prevenar 13®



Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
et de la Protection Sociale



المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴰⵏⵜ

Direction de la Population
Programme National d'Immunisation

Vaccin antipneumococcique conjugué 13-valent : Prevenar 13®

Fiche technique

I. Introduction :

Dans le cadre de la consolidation des acquis nationaux en matière de la vaccination de routine, et en particulier de la vaccination antipneumococcique, le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale a procédé à l'acquisition du vaccin antipneumococcique conjugué 13-valent : Prevenar 13®. Cette initiative vise à garantir la disponibilité continue du vaccin, à renforcer la protection de la population cible et à assurer la pérennité des efforts nationaux en matière de prévention des maladies évitables par la vaccination.

II. Présentation du vaccin antipneumococcique conjugué 13-valent : Prevenar 13® :

Prevenar 13®	
Maladies pouvant être évitées grâce au vaccin	Pneumococcies : infections invasives (pneumonie, méningite, autres maladies invasives) et non invasives (otite moyenne, sinusite, bronchite), dues aux sérotypes vaccinaux.
Type du vaccin	Vaccin polysaccharidique conjugué adsorbé, contenant 13 sérotypes de vaccin antipneumococcique : 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F et 23F.
Population cible	Nourrissons à partir de 6 semaines.
Présentation du flacon	Suspension injectable en flacon multidose : 4 doses, avec pastille de contrôle du vaccin (PCV).



	À une température comprise entre 2°C et 8°C. Le Prevenar 13® ne doit pas être congelé. En cas de doute, on peut procéder à un « test d'agitation » pour vérifier si ces vaccins ont subi le gel, s'il est congelé, il doit être jeté selon les normes nationales en vigueur ;
Conservation	- Les flacons multi-doses de Prevenar 13® dont une ou plusieurs doses de vaccin ont été retirées lors d'une séance de vaccination peuvent être utilisés lors de séances ultérieures pendant un maximum de 28 jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies : - La date de péremption n'est pas dépassée ; - Le vaccin est stocké dans des conditions de chaîne du froid appropriées (entre +2°C et +8°C) ; - Le septum du flacon de vaccin n'a pas été immergé dans l'eau ; - Le respect de l'asepsie a pour prélever toutes les doses ; - La PCV du flacon de vaccin n'a pas atteint le point de rejet.
Type de pastille de contrôle du vaccin (PCV)	Type 30, c'est-à-dire que ce vaccin est assez stable et qu'il peut être conservé dans l'étage supérieur du réfrigérateur.
Schéma vaccinal	En 3 prises : la première à 8 semaines, la deuxième à 16 semaines et la troisième à 12 mois est recommandé par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)*. * Organisation Mondiale de la Santé. Weekly Epidemiological record. N°8, 22 février 2019.
Site d'injection	Face antérolatérale de la cuisse gauche.
Voie d'administration	Voie intramusculaire.
Volume de la prise	0,5 ml.
Administration simultanée	- Le Prevenar 13® : - Peut être administré en toute sécurité avec des doses d'autres vaccins ; - Ne doit pas être mélangé avec d'autres vaccins dans la même seringue ; - Peut être plus douloureux que les autres, il est donc préférable de l'administrer en dernier ; - Les sites d'injection, en cas d'administration de vaccins simultanément, doivent être distants d'au moins 2,5 cm.
Ne pas administrer le vaccin Prevenar 13®	- Aux enfants ayant présenté des réactions d'hypersensibilité sévères à une dose antérieure du vaccin ; - En cas de maladie fébrile grave et aiguë. Dans ce cas, il faut reporter la vaccination jusqu'à la guérison ; - En cas d'administration d'une dose antérieure de ce vaccin au cours des 4 dernières semaines.
Interchangeabilité entre les vaccins antipneumococciques	En cas d'indisponibilité confirmée du PCV 13-TT ou du Prevenar 13®, la vaccination sera assurée par le vaccin disponible, et ce dans le respect strict des modalités de son administration*. * Organisation Mondiale de la Santé. Weekly Epidemiological record. N°8, 22 février 2019.



- Conditions d'administration du Prevenar 13® :

Il est important de rappeler qu'il est obligatoire, comme l'ensemble des autres vaccins, de veiller à :

- Assurer la vaccination dans les conditions de sécurité définies par le PNI avec notamment :
 - La disponibilité dans le site de vaccination de la trousse complète d'urgence ;
 - Le respect des conditions d'hygiène.
- Vérifier la date de péremption et l'état de la pastille de contrôle du vaccin (PCV) ;
- Respecter la chaîne du froid des vaccins (condition du stockage, transport et au moment de l'utilisation).
- Respecter les règles de la gestion des déchets :
 - Dépôt, avec précaution, de toutes les seringues usagées dans une boîte de sécurité dédiée, immédiatement après leur utilisation ;
 - Jeter les flacons de vaccin vide, dans un récipient prévu pour les déchets ou dans un conteneur.

- Gestion des événements indésirables :

Le Prevenar 13® est un vaccin le plus souvent très bien toléré. Les effets indésirables sévères sont extrêmement rares. Cependant, des effets indésirables modérés peuvent survenir, les plus fréquemment rapportés sont une irritabilité, des pleurs (très habituels), une enflure et des rougeurs autour du site d'injection et une fièvre momentanée > 39°.

Toutefois, en plus de la surveillance de ces événements indésirables, comme c'est le cas pour les autres vaccins, leur gestion s'impose à travers leurs prises en charge et leurs déclarations au Centre Anti-Poison et de pharmacovigilance du Maroc (CAPM) soit à travers :

- Le remplissage de la fiche de déclaration à envoyer par :
 - ✦ Courrier postal : Rue Lamfedel Cherkaoui BP 6671 Rabat institut- Madinate AL Irfane-Rabat
 - ✦ Fax : 05 37 7 71 79
- Le remplissage de la forme électronique qui se trouve sur le site : www.capm.ma
- La déclaration directement par téléphone : 0801 000 180, 24 heures /24 et 7 jours /7.

- Système d'information :

Le système d'information actuel est adapté à la mise en place du vaccin Prevenar 13® et ne requiert pas d'ajustement.

III. Gestion de la coexistence des deux vaccins antipneumococciques, le Prevenar 13® et le PCV 13-TT :

La coexistence des deux vaccins antipneumococciques, le Prevenar 13® et le PCV 13-TT, au niveau des ESSP, exige une vigilance accrue quant à leur utilisation simultanée :

- ✦ Le Prevenar 13® sera administré aux nourrissons nouvellement recrutés pour la vaccination antipneumococcique.



- Le PCV 13-TT sera réservé aux nourrissons ayant déjà débuté leur vaccination antipneumococcique avec ce même produit.

	Prevenar 13®	PCV-13 TT
Population cible	Nourrissons de 8 semaines, débutant la vaccination antipneumococcique.	Enfants ayant déjà commencé leur schéma vaccinal avec PCV13-TT.
Nombre de doses	3 doses.	4 doses.
Schéma vaccinal	1ère dose à 8 semaines, avec le VPO1, le Rota1 et la Penta1 ; 2ème dose à 16 semaines, avec la VPO3, le Rota3, le Penta3 Et le VPI1 ; 3ème dose à 12 mois.	1ère dose à 10 semaines, avec un décalage de 15 jours par rapport aux doses du vaccin pentavalent ; 2ème dose à 18 semaines, avec un décalage de 15 jours par rapport aux doses du vaccin pentavalent ; 3ème dose à 6 mois ; 4ème dose à 12 mois.
Statut vaccinal final	Enfant considéré comme complètement vacciné après 3 doses du Prevenar 13®.	Enfant considéré comme complètement vacciné après 4 doses du PCV-13 TT.

- Rattrapage vaccinal par les vaccins antipneumococciques, selon l'âge du début de la vaccination :

Âge du début de la vaccination antipneumococcique	Prevenar 13®	PCV-13 TT
Nourrissons de 2 à 6 mois	3 doses : 2 doses à 2 mois d'intervalle et un rappel à l'âge de 12 mois.	4 doses : 3 doses à 2 mois d'intervalle et un rappel après 6 mois.
Nourrissons de 7 à 11 mois	3 doses : 2 doses à 2 mois d'intervalle et un rappel à 18 mois.	3 doses à 2 mois d'intervalle : la troisième dose doit être administrée après l'anniversaire d'un an, à au moins 2 mois d'intervalle de la deuxième dose.
Nourrissons de 12 à 23 mois	2 doses à 2 mois d'intervalle.	2 doses à 2 mois d'intervalle.

