



Circulaire DP-19/2024 142

Mesdames et Messieurs les Directeurs Régionaux de la Santé
et de la Protection Sociale

Objet: Introduction de la deuxième dose du vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) dans le Calendrier National de Vaccination (CNV).

L'Initiative Mondiale pour l'Éradication de la Poliomyélite (IMEP) a accompli des progrès significatifs en réduisant considérablement l'incidence de la poliomyélite dans le monde. La déclaration officielle de l'éradication des poliovirus sauvages de type 2 et de type 3, respectivement en 2015 et 2019, témoigne de ces avancées. Cependant, pour atteindre l'objectif ultime de l'éradication complète, la Stratégie Mondiale d'Éradication de la Poliomyélite 2022-2026 met l'accent sur une approche intégrée, avec la vaccination comme élément essentiel.

Ainsi, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande, pour les enfants âgés de moins d'un an, un schéma vaccinal composé d'au moins deux doses du VPI. Ce schéma va permettre de garantir une protection optimale contre tous les types de poliovirus et de prévenir de nouvelles infections, consolidant les acquis en matière de vaccination contre la poliomyélite.

À ce jour, le CNV contre la poliomyélite préconise dans la première année de vie, outre quatre doses du vaccin antipoliomyélitique oral (VPO), une dose unique du VPI à l'âge de 4 mois.

Dans l'objectif de renforcer la lutte contre la poliomyélite dans notre pays et suivant les recommandations de l'OMS à ce sujet, le Comité National Technique et Scientifique Consultatif de Vaccination a approuvé la pertinence de renforcer le CNV par une **deuxième dose du VPI** à l'âge de 9 mois et d'une façon concomitante avec l'administration de la première dose du vaccin Rougeole et la Rubéole (voir la fiche technique).

De ce fait, Mesdames et Messieurs les Directeurs Régionaux de la Santé et de la Protection Sociale sont appelés à assurer :

- La diffusion de ce nouveau schéma vaccinal auprès des professionnels de santé ;
- L'information et la formation des professionnels de santé impliqués dans la vaccination, et ce en étroite collaboration avec le Programme National d'Immunisation ;

88P
Ministère de la Santé et de la Protection Sociale
Direction Régionale de la Santé et de la Protection Sociale
Tetouan - Al Hoceima
142

- L'atteinte des taux de couverture vaccinale supérieurs ou égaux à 95%, uniformes pour les différentes doses du VPO et du VPI ;
- Le renforcement de la surveillance des Paralyse flasques Aigües (PFA), à travers la recherche active et l'investigation épidémiologique immédiate des cas de PFA, ainsi que la déclaration obligatoire de toute paralysie ou parésie.

Eu égard à ce qui précède, je vous demande, Mesdames et Messieurs les Directeurs Régionaux, de veiller à l'exécution des termes de cette circulaire et d'en assurer une large diffusion.

Pour Le Ministre et par Délégation
Le Secrétaire Général

Dr Abdelkrim Meziane Bellefquih

PJ : Fiche technique de l'introduction de la deuxième dose du vaccin VPI.

Ampliations:

- Monsieur le Chef de Cabinet de Monsieur le Ministre de la Santé et de la Protection Sociale.
- Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale.
- Monsieur l'Inspecteur Général du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale.
- Madame et Messieurs les Directeurs de l'Administration Centrale.
- Madame et Messieurs les Directeurs du Centre, Instituts et École relevant du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale.

W





**Direction de la Population
Programme National d'Immunisation**

**Introduction de la deuxième dose du vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI)
dans le Calendrier National de Vaccination**

Fiche technique

I. Introduction :

Afin de consolider les acquis de notre pays et pour s'aligner sur les recommandations de l'OMS en matière de la vaccination antipoliomyélitique, le Comité National Technique et Scientifique Consultatif de Vaccination (CNTSCV) a pris la décision d'introduire une deuxième dose du vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) dans le Calendrier National de Vaccination.

II. Objectif :

Renforcer la protection de la population cible contre tous les poliovirus et contre la paralysie provoquée par le Poliovirus Circulant Dérivé d'une souche Vaccinale de type 2 (PVDVc2).

III. Aspects techniques :

1. Population cible :

Les populations cibles du VPI sont les enfants âgés de 4 mois et de 9 mois, le nombre de ces populations correspond à la population âgée de moins d'un an.

2. Vaccin VPI :

- **Type de vaccin utilisé et présentation :** Suspension pour injection en flacon multidose (flacon de 5 doses) ;
- **Conservation :** Au réfrigérateur à une température comprise entre 2°C et 8°C, ou dans le porte vaccin avec des accumulateurs de froid conditionnés. Le vaccin ne doit pas être congelé, s'il est congelé, il doit être jeté selon les normes nationales en vigueur. Les flacons multidoses du VPI, utilisés actuellement par le Ministère de la Santé et la Protection Sociale qui ont été prélevés pendant une séance de vaccination peuvent être utilisés pour les séances ultérieures de vaccination jusqu'à **28 jours maximum**, pourvu que toutes les conditions des flacons multidoses de l'OMS soient remplies ;
- **Site d'administration :** la face antérolatérale de la cuisse gauche ;
- **Voie d'administration :** le VPI est administré par voie intramusculaire ou par voie sous-cutanée ;
Il faut utiliser les seringues auto-bloquantes pour l'injection du VPI ;
- **Dose par prise :** 0,5 ml ;
- **Administration simultanée :** Le VPI peut être administré en toute sécurité avec des doses d'autres vaccins.



La deuxième dose du VPI va être injectée à l'âge de 9 mois, d'une façon concomitante avec la première dose du vaccin contre la Rougeole et Rubéole : RR1.

Les deux vaccins ne devraient jamais être mélangés dans la même seringue, ni administrés dans le même site : le **RR1** va être injecté dans le côté **droit**, alors que le **VPI 2** va l'être au niveau du côté **gauche**.

• **Contre-indications :**

- Hypersensibilité à un des composants du vaccin ;
- Survenue d'anaphylaxie ou de choc anaphylactique dans les 24 heures suivant l'administration d'une dose du vaccin : il ne faut pas administrer les doses subséquentes ;
- Maladie fébrile grave et aiguë : la vaccination devrait être reportée jusqu'à la guérison ;
- Administration au cours des 4 dernières semaines d'une dose du VPI.

3. Conditions de sécurité :

Il est important de souligner l'obligation de veiller à :

- Assurer la vaccination dans les conditions de sécurité définies par le PNI avec notamment :
 - La disponibilité, dans le site de vaccination, de la trousse complète d'urgence ;
 - Le respect des conditions d'hygiène.
- Respecter la chaîne du froid des vaccins (condition du stockage, transport et au moment de l'utilisation).
- Respecter les règles de la gestion des déchets :
 - Dépôt, avec précaution, de toutes les seringues usagées dans une boîte de sécurité dédiée, immédiatement après leur utilisation ;
 - Jeter les flacons de vaccin vide, dans un récipient prévu pour les déchets ou dans un conteneur.

4. Gestion des événements indésirables :

Le VPI est un vaccin le plus souvent très bien toléré, cependant des effets indésirables peuvent survenir, les plus fréquemment rapportés sont des réactions au site d'injection : douleur, érythème, induration et réactions systémiques telles que la fièvre modérée transitoire. Les autres réactions sont l'arthralgie et la myalgie modérées et transitoires, des convulsions, des maux de tête, la paresthésie modérée et transitoire se produisant dans les deux jours après la vaccination. Les effets indésirables sévères sont extrêmement rares.

Toutefois, en plus de la surveillance de ces événements indésirables, comme c'est le cas pour les autres vaccins, leur gestion s'impose à travers leurs prises en charge et leurs déclarations au Centre Anti-Poison et de pharmacovigilance du Maroc (CAPM) soit à travers :

- Le remplissage de la fiche de déclaration à envoyer par :
 - Courrier postal : Rue Lamfedel Cherkaoui BP 6671 Rabat institut- Madinate AL Irfane-Rabat
 - Fax : 05 37 7 71 79
- Le remplissage de la forme électronique qui se trouve sur le site : www.capm.ma
- La déclaration directement par téléphone : 0801 000 180, 24 heures /24 et 7 jours /7.

5. Système d'information :

Le système d'information papier doit être adapté, au niveau local et provincial, à l'introduction de la deuxième dose du VPI. L'intégration de la donnée dans l'application SREC va être réalisée dans les délais optimaux.

