



**Direction de la Population
Programme National d'Immunisation**

**Introduction de la deuxième dose du vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI)
dans le Calendrier National de Vaccination**

Fiche technique

I. Introduction :

Afin de consolider les acquis de notre pays et pour s'aligner sur les recommandations de l'OMS en matière de la vaccination antipoliomyélitique, le Comité National Technique et Scientifique Consultatif de Vaccination (CNTSCV) a pris la décision d'introduire une deuxième dose du vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) dans le Calendrier National de Vaccination.

II. Objectif :

Renforcer la protection de la population cible contre tous les poliovirus et contre la paralysie provoquée par le Poliovirus Circulant Dérivé d'une souche Vaccinale de type 2 (PVDVc2).

III. Aspects techniques :

1. Population cible :

Les populations cibles du VPI sont les enfants âgés de 4 mois et de 9 mois, le nombre de ces populations correspond à la population âgée de moins d'un an.

2. Vaccin VPI :

- **Type de vaccin utilisé et présentation** : Suspension pour injection en flacon multidose (flacon de 5 doses) ;
- **Conservation** : Au réfrigérateur à une température comprise entre 2°C et 8°C, ou dans le porte vaccin avec des accumulateurs de froid conditionnés. Le vaccin ne doit pas être congelé, s'il est congelé, il doit être jeté selon les normes nationales en vigueur. Les flacons multidoses du VPI, utilisés actuellement par le Ministère de la Santé et la Protection Sociale qui ont été prélevés pendant une séance de vaccination peuvent être utilisés pour les séances ultérieures de vaccination jusqu'à **28 jours maximum**, pourvu que toutes les conditions des flacons multidoses de l'OMS soient remplies ;
- **Site d'administration** : la face antérolatérale de la cuisse gauche ;
- **Voie d'administration** : le VPI est administré par voie intramusculaire ;
- **Dose par prise** : 0,5 ml ;
- **Administration simultanée** : Le VPI peut être administré en toute sécurité avec des doses d'autres vaccins.



La deuxième dose du VPI est injectée à l'âge de 9 mois, d'une façon concomitante avec la première dose du vaccin contre la Rougeole et la Rubéole : **RR 1**, les deux vaccins ne devraient jamais être mélangés dans la même seringue, ni administrés dans le même site. En pratique :

- **La première dose du vaccin RR (RR 1)** est administrée par voie **sous-cutanée** au niveau **du deltoïde gauche** ;
- **La deuxième dose du VPI (VPI 2)** est administrée par voie **intramusculaire** au niveau de la **face antérolatérale de la cuisse gauche**.

• **Contre-indications :**

- ▶ Hypersensibilité à un des composants du vaccin ;
- ▶ Survenue d'anaphylaxie ou de choc anaphylactique dans les 24 heures suivant l'administration d'une dose du vaccin : il ne faut pas administrer les doses subséquentes ;
- ▶ Maladie fébrile grave et aiguë : la vaccination devrait être reportée jusqu'à la guérison ;
- ▶ Administration au cours des 4 dernières semaines d'une dose du VPI.

3. Conditions de sécurité :

Il est important de souligner l'obligation de veiller à :

- Assurer la vaccination dans les conditions de sécurité définies par le PNI avec notamment :
 - La disponibilité, dans le site de vaccination, de la trousse complète d'urgence ;
 - Le respect des conditions d'hygiène.
- Respecter la chaîne du froid des vaccins (condition du stockage, transport et au moment de l'utilisation).
- Respecter les règles de la gestion des déchets :
 - Dépôt, avec précaution, de toutes les seringues usagées dans une boîte de sécurité dédiée, immédiatement après leur utilisation ;
 - Jeter les flacons de vaccin vide, dans un récipient prévu pour les déchets ou dans un conteneur.

4. Gestion des événements indésirables :

Le VPI est un vaccin le plus souvent très bien toléré, cependant des effets indésirables peuvent survenir, les plus fréquemment rapportés sont des réactions au site d'injection : douleur, érythème, induration et réactions systémiques telles que la fièvre modérée transitoire. Les autres réactions sont l'arthralgie et la myalgie modérées et transitoires, des convulsions, des maux de tête, la paresthésie modérée et transitoire se produisant dans les deux jours après la vaccination. Les effets indésirables sévères sont extrêmement rares.

Toutefois, en plus de la surveillance de ces événements indésirables, comme c'est le cas pour les autres vaccins, leur gestion s'impose à travers leurs prises en charge et leurs déclarations au Centre Anti-Poison et de pharmacovigilance du Maroc (CAPM) soit à travers :

- Le remplissage de la fiche de déclaration à envoyer par :
 - ▶ Courrier postal : Rue Lamfedel Cherkaoui BP 6671 Rabat institut- Madinate AL Irfane-Rabat
 - ▶ Fax : 05 37 7 71 79
- Le remplissage de la forme électronique qui se trouve sur le site : www.capm.ma
- La déclaration directement par téléphone : 0801 000 180, 24 heures /24 et 7 jours /7.

5. Système d'information :

Le système d'information papier doit être adapté, au niveau local et provincial, à l'introduction de la deuxième dose du VPI. L'intégration de la donnée dans l'application SREC va être réalisée dans les délais optimaux.