

***Direction de la Population
Programme National d'Immunisation***

Gestion de la transition et de la coexistence des vaccins antipneumococciques conjugués 13-valents : PrimoVax13®, PCV 13-TT et Prevenar 13®

Fiche technique

I. Introduction :

Assurer la continuité de l'offre vaccinale constitue une priorité stratégique nationale dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination. Les perturbations enregistrées dans les chaînes d'approvisionnement des vaccins antipneumococciques ont rendu nécessaire un renforcement des niveaux de vigilance, notamment en matière de suivi des stocks, d'anticipation des besoins et de coordination de la communication interne ainsi que de l'adaptabilité du Calendrier National de Vaccination à cette situation.

La situation devrait progressivement se normaliser, permettant la reprise du schéma vaccinal, par l'utilisation exclusive du vaccin PrimoVax13®.

Dans ce contexte, les stocks disponibles du vaccin Prevenar 13® devront être réservés uniquement pour les nourrissons ayant initié leur vaccination avec ce vaccin.

II. Rappel des schémas vaccinaux des vaccins antipneumococciques :

Vaccins	Schémas vaccinaux
• PrimoVax13® • PCV13-TT	• Schéma à 4 doses : - 10 semaines ; - 18 semaines ; - 6 mois ; - 12 mois.
• Prevenar 13®	• Schéma à 3 doses : - 8 semaines ; - 16 semaines ; - 12 mois.

III. Situations et conduites à tenir :

1. Enfants n'ayant jamais été vaccinés par le Prevenar 13® :

Situations	Conduites à tenir	Observations
Enfant n'ayant jamais été vacciné par un vaccin contre le pneumocoque.	Commencer la vaccination par le PrimoVax13®, suivant le Calendrier National de Vaccination.	- Respecter un intervalle d'au moins 2 mois entre les prises ; - Toujours décaler de 15 jours la vaccination par le PrimoVax13® et le PCV 13-TT par rapport à la vaccination par le vaccin pentavalent.
Enfant ayant commencé la vaccination par le PCV13-TT.	Poursuivre la vaccination par le PCV13-TT ou le PrimoVax13®.	

2. Enfants ayant été vaccinés que par le Prevenar 13® :

Situations	Disponibilité du Prevenar 13®	Conduites à tenir	Observations
Enfant ayant reçu une (1) dose du Prevenar 13®.	OUI	- Poursuivre la vaccination par deux doses du Prevenar 13® : - 16 semaines ; - 12 mois.	- Respecter un intervalle d'au moins 2 mois entre les prises ; - Toujours décaler de 15 jours la vaccination par le PrimoVax13® et le PCV 13-TT par rapport à la vaccination par le vaccin pentavalent.
	NON	- Poursuivre la vaccination par 3 doses de PrimoVax13®/PCV13-TT - 18 semaines ; - 6 mois ; - 12 mois.	
Enfant ayant reçu deux doses du Prevenar 13®.	OUI	- Poursuivre la vaccination par une (1) dose du Prevenar 13® : - 12 mois.	
	NON	- Poursuivre la vaccination par une (1) dose de PrimoVax13®/PCV13-TT - 12 mois.	

3. Enfants ayant commencé sa vaccination par le PCV13-TT et a reçu par la suite une seule dose du Prevenar 13® :

Situations	Disponibilité du Prevenar 13®	Conduites à tenir	Observations
Enfant ayant reçu une (1) dose du Prevenar 13®.	OUI	- Poursuivre la vaccination par deux doses du Prevenar 13® : - 16 semaines ; - 12 mois.	- Respecter un intervalle d'au moins 2 mois entre les prises ; - Toujours décaler de 15 jours la vaccination par le PrimoVax13® et le PCV 13-TT par rapport à la vaccination par le vaccin pentavalent.
	NON	- Poursuivre la vaccination par 3 doses de PrimoVax13®/PCV13-TT - 18 semaines ; - 6 mois ; - 12 mois.	

NB :

- Il est primordial de rappeler de mentionner dans le carnet de santé de l'enfant : le nom et le numéro de lot de chaque vaccin administré ;
- Pour le schéma de rattrapage : voir la fiche technique relative à la présentation du Vaccin Pneumococcique Polyosidique Conjugué 13-valent : PrimoVax13®.