


Calendrier national de vaccination 2023

[illegible]



Dénomination	Vaccin Pneumococcique Polyosidique Conjugué 13-valent ® (PCV 13 – TT) WEUPHORIA
Forme pharmaceutique et Présentation	- Suspension injectable - Seringue préremplie unidose (0,5 ml) - Boîte unitaire. 
Composition	Chaque dose (0,5 ml) du vaccin contient : Polyoside pneumococcique de 13 sérotypes (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F et 23F) - Protéines vectrices : une protéine vectrice, la toxine tétanique. - Composition qualitative en excipient : Chlorure de sodium, dihydrogénophosphate de sodium, hydrogénophosphate disodique, phosphate d'aluminium et eau pour préparations injectables.
Mode de conservation et de transport	- Au réfrigérateur à une température comprise entre 2°C et 8 °C, - A l'abri de la lumière. - NE PAS CONGELER. Le vaccin doit être jeté s'il est congelé.
Indication	- Le vaccin est indiqué chez les nourrissons et enfants âgés de 6 semaines à 5 ans pour la prévention des maladies invasives causées par 13 sérotypes : 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F et 23F de Streptococcus pneumoniae.
Schéma vaccinal	Dans le cadre du Programme National d'Immunisation, le vaccin antipneumococcique est administré - Pour les nourrissons âgés de 2 mois selon schéma 4 doses à l'âge de : • 10 semaines. • 18 semaines. • 6 mois. • 12 mois. - Calendrier de rattrapage : Age à la Dose 1 • Entre 7 à 11 mois : trois doses : Les 2 premières doses séparées d'au moins 2 mois ; la troisième dose après l'anniversaire d'un an, séparée de la deuxième dose d'au moins 2 mois. • Entre 12-23 mois : deux doses à au moins 2 mois d'intervalle. • De 24 mois à 5 ans (avant l'âge de 6ème anniversaire) : 1 dose.
Administration	- Agiter vigoureusement le vaccin immédiatement avant utilisation afin d'obtenir une suspension blanche et homogène. - Injection intramusculaire uniquement. - Le volume d'injection est de 0,5 ml pour chaque dose humaine unique.
Contre-indications	- Hypersensibilité à tout composant du produit, y compris les substances actives, les excipients, ou la toxine tétanique.

Effets indésirables post vaccinaux (EIPV)	- Effets indésirables systémiques très fréquents : fièvre, diarrhée - Fréquents : pleurs, toux, nausées/vomissements, fatigue/somnolence, réaction allergique - Peu fréquents : myalgie - Effets indésirables locaux Très fréquents : rougeur - Fréquents : gonflement, douleur, induration Peu fréquent : démangeaisons - Rare : éruption cutanée (au site d'injection)
Précaution d'emploi	- Ce vaccin ne doit pas être administré • Par voie intraveineuse. • Chez les prématurées • En co-administration dans la même séance de vaccination avec les autres vaccins, il faut garder un intervalle d'au moins 15 jours. - Des précautions doivent être prises lors de la vaccination des personnes souffrant de thrombocytopénie, d'une coagulopathie ou qui reçoivent un traitement anticoagulant. - Étant donné qu'aucune donnée de sécurité et d'immunogénicité n'est disponible pour le PCV13-TT chez les personnes immunodéprimées (par exemple, souffrir d'une affection maligne ou d'un syndrome néphrotique), la vaccination de ce groupe spécial doit être envisagée sur une base individuelle. - En aucun cas, la toxine tétanique contenue dans le vaccin ne peut remplacer la vaccination antitétanique de routine ou combinée.