

6. Situations en pratique :

• Situation 1 : Statut vaccinal vérifié à la suite de la consultation d'un document :

➤ Vaccin contre la rougeole et la rubéole :

Cas	Conduite à tenir	Observations
• Enfant ayant reçu 2 doses du vaccin antirougeoleux soit sous forme de vaccin : VAR, RR ou RRO.	• Ne rien administrer.	
• Enfant ayant reçu uniquement une dose du vaccin antirougeoleux soit sous forme de vaccin : VAR, RR ou RRO.	• Administrer la 2ème dose du vaccin RR.	Respecter un intervalle minimum de 4 semaines entre les deux prises de vaccin contenant la composante VAR, RR ou RRO.
• Enfant n'ayant reçu aucune dose du vaccin antirougeoleux soit sous forme de vaccin : VAR, RR ou RRO.	• Administrer la première dose du vaccin RR et ajouter une 2ème dose du RR après un mois.	

➤ Vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche :

• Enfant âgé de moins de 7 ans (qui n'a pas encore fêté son anniversaire de 7 ans) :

Cas	Conduite à tenir	Observations
• Enfant ayant reçu 3 doses en primovaccination et les 2 doses de rappel du vaccin contenant les antigènes diphtérie, le tétanos et la coqueluche.	• Ne rien administrer.	
• Enfant ayant reçu 4 doses de vaccins contenant les antigènes diphtérie, le tétanos et la coqueluche.	• Si âge > 5 ans : administrer une dose du 2ème rappel DTC.	Respecter : • Un intervalle minimum de 4 semaines entre



• Enfant ayant reçu 3 doses de vaccins contenant les antigènes de la diphtérie, le tétanos et la coqueluche	• Si âge > à 18 mois et < 3 ans : administrer une dose du vaccin DTC, puis suivre le schéma de vaccination selon le CNV. • Si âge > 3 ans : administrer une dose du vaccin DTC.	les trois doses de la primo vaccination. • Un intervalle minimum de 6 mois entre la prise du Penta et la 1ère prise du rappel DTC.
• Enfant ayant reçu 2 doses de vaccins contenant les antigènes de la diphtérie, le tétanos et la coqueluche soit sous forme de Penta ou DTC.	• Si âge < 18 mois : administrer une dose du vaccin Penta, puis suivre le schéma de vaccination selon le CNV (6 mois entre Penta3 et le premier rappel avec DTC, 4 ans entre deuxième rappel avec DTC). • Si âge > 18 mois et < 3 ans : administrer une dose du vaccin Penta puis une dose du vaccin DTC avec 6 mois d'intervalle, puis le 2ème rappel après 4 ans. • Si âge > 3 ans et < 7 ans : administrer 2 doses du vaccin DTC à 6 mois d'intervalle.	• Un intervalle minimum de 4 ans entre la 1ère dose du rappel DTC et 2ème dose du rappel DTC/Td.
• Enfant ayant reçu une dose de vaccins contenant les antigènes de la diphtérie, le tétanos et la coqueluche soit sous forme de Penta ou DTC.	• Si âge < 18 mois : administrer 2 doses du vaccin Penta, à un mois d'intervalle, puis suivre le schéma de vaccination selon le CNV. • Si âge > 18 mois et < 3 ans : administrer une dose du vaccin Penta puis une dose du vaccin DTC un mois plus tard. Donner par la suite le premier rappel après 6 mois et le 2ème après 4 ans (DTC si âge < 7 ans, Td si âge > 7 ans) ; • Si âge > 3 ans et < 7 ans : administrer 2 doses du vaccin DTC à un mois d'intervalle, puis donner le premier rappel après 6 mois.	Respecter : • Un intervalle minimum de 4 semaines entre les trois doses de la primo vaccination. • Un intervalle minimum de 6 mois entre la prise du Penta et la 1ère prise du rappel DTC.

Enfant n'ayant reçu aucune dose de vaccins contenant les antigènes de la diphtérie, le tétanos et la coqueluche.	- Si âge < 12 mois : administrer 3 doses du vaccin Penta, à un mois d'intervalle au minimum, puis une dose : premier rappel après 6 mois et deuxième rappel après 4 ans. - Si âge > 12 mois et < 3 ans : administrer > 3 doses : 2 doses du vaccin Penta puis 1 dose du vaccin DTC avec un mois d'intervalle, > 2 doses de rappel - La première 6 mois après ; - La deuxième dose 4 ans après. Utiliser DTC si âge < 7 ans, Td si âge dépasse 7 ans.	Un intervalle minimum de 4 ans entre la 1ère dose du rappel DTC et 2ème dose du rappel DTC/Td.
--	--	--

- Enfant de plus de 7 ans :

À cet âge, il faut vérifier que l'enfant a reçu 5 doses du vaccin contenant la composante DTC ou Td (y compris sous forme Penta ou autre) et assurer le rattrapage en respectant l'intervalle minimum entre les doses et en utilisant le vaccin Td. L'intervalle minimal entre les doses :

- 1 et 2 : 4 semaines ;
- 2 et 3 : 4 semaines ;
- 3 et 4 : 6 mois ;
- 4 et 5 : 1 an.

➤ **Vaccin contre la poliomyélite oral (VPO) :**

- S'assurer des doses reçus en fonction de l'âge et compléter la vaccination si besoin :

Si âge ≤ 12 mois	Si âge > 12 mois
L'enfant a besoin de 4 doses y compris la dose zéro	L'enfant a besoin au moins de 5 doses y compris la dose Zéro

- Conserver un intervalle minimum de 4 semaines entre les doses.
- Si pas de données sur les antécédents de la vaccination, donner 4 doses (dose de VPI à administrer avec la 1ère dose de VPOb si l'enfant est âgé de moins de 9 ans)



- Situation 2 : Statut vaccinal inconnu :

- Si la preuve d'une vaccination antérieure ne peut être établie, il convient de supposer que l'individu n'a pas bénéficié du/des vaccin(s) et de lui proposer la vaccination.
- Vacciner à nouveau des individus ayant déjà été vaccinés ne présente aucun risque.

NB : Conduite à tenir pour chaque vaccin : voir l'indication ci-haut.

7. Administration simultanée :

L'administration simultanée de plusieurs doses de vaccin peut se faire en toute sécurité, cela permettra à l'individu d'être protégé dès que possible, de réduire le nombre de visites annexes nécessaires et de minimiser le risque de vaccination manquée.

8. Notification au niveau des supports d'information :

Il faut veiller à l'enregistrement de toutes les doses de vaccin administrées aux enfants au niveau du système d'information mis en place à cette fin et au niveau des registres de vaccination et des carnets de santé.