

Catégorie A				
Les enfants de 3 mois – 1 année (Avant le premier anniversaire)	1ere visite	2ème Visite	3ème Visite	Vaccination additionnelle
		1 mois après 1ere Visite	1 mois après 2ème Visite	Au-delà de 12 mois
	BCG1 dose			
	VPI 1 dose			
	Penta1 ^{ere} dose	Penta 2ème dose	Penta 3ème dose	DTC (2 doses de rappel à 18 mois et 5 ans)
	Pneumo 1 ^{ere} dose		Pneumo 2ème dose	Pneumo 3ème dose à au moins 6 mois après la dernière dose de la primovaccination
	VPO 1 ^{ere} dose	VPO 2ème dose	VPO3ème dose	VPO (2 doses à 18 mois et 5 ans)
	Vaccin combiné Penta - Intervalle minimum entre doses (1ères séries) : 4 semaines			
	Le rappel DTC : - Doit être administré au moins 6 mois après la série de la primovaccination - Les doses de rappel devraient être espacées d’au moins 4 ans			
	Vaccin Antirotavirus : - 3 doses peuvent être données à au moins 1 mois d’intervalle. - Ne pas commencer la série si l’enfant a plus de 4 mois. - La série doit être terminée avant l’âge de 8 mois.			
	Pneumo : - < 6 mois : 2 doses à 2 mois d’intervalle et rappel > 12mois. - 7 – 11 mois : 2 doses à 2 mois d’intervalle minimum et rappel au moins 5 mois plus tard et avant 2 ans			
	Vaccin combiné RR : - 1ere dose à 9 mois au plus - 2ème dose à 18 mois			

Catégorie B

Entre 1 an et 5 ans

1ere visite	2ème Visite	3ème Visite	4ème Visite	5ème Visite	Vaccination additionnelle
	1 mois après 1ere Visite	1 mois après 2ème Visite	1 mois après 3ème Visite	4 mois après 4ème Visite	6 mois après la 4ème Visite
Penta 1ere dose*	DTC 1ere dose			DTC 2ème dose	Voir en bas
Pneumo 1ere dose**		Pneumo 2ème dose			
	RR 1ere dose	RR 2ème dose			
VPO 1ere dose	VPO 2ème dose	VPO 3ème dose	VPO 4ème dose		
VPI 1 dose					
	Hépatite B 1ere dose			Hépatite B 3ème dose	
BCG : Rechercher la cicatrice du BCG, si n'existe pas, donner une dose du BCG					
Vaccin combiné Penta : Primovaccination					
- La première dose c'est un Penta (DTC-Hib-HB), * si enfant a moins de 3 ans. - Les 2 autres on utilise le DTC pour terminer la série de la primovaccination. - Intervalle d'au moins 4 semaines entre 1ère et 2ème dose et au moins 6 mois entre 2ème et 3ème dose.					
HB :					
- Comptabiliser les prises incluses dans le Penta - La deuxième dose doit être administrée au moins <u>1 mois après la première</u> et la troisième dose 6 mois <u>après la première.</u>					
Pneumo : Uniquement pour les enfants de moins de 2 ans.					
- **Entre 12 - 24 mois : 2 doses à 2 mois d'intervalle minimum. Le rappel au moins 5 mois plus tard et avant 2 ans, - Entre 2 - 3 ans, et uniquement pour les enfants présentant un risque fort d'accru d'infection invasive : 2 doses à 2 mois d'intervalle.					
Vaccin combiné DTC : Rappel					
- Au moins 6 mois entre la série de la primovaccination et le rappel - Les deux doses de rappel devraient être espacées d'au moins 4 ans					

Catégorie c					
Entre 5 ans et 7 ans Après le cinquième anniversaire et avant le septième anniversaires)	1ere visite	2ème Visite	3ème Visite	4ème Visite	Vaccination additionnelle
		1 mois après 1ere Visite	1 mois après2ème Visite	6 mois après3ème Visite	Au-delà de 12 mois
	DTC 1 dose	DTC 2 dose		DTC 3 dose	Voir en bas
	RR 1ere dose	RR 2ème dose			
	VPO 1ere dose	VPO 2ème dose	VPO 3ème dose	VPO 4ème dose	
	VPI 1 dose				
		Hépatite B 1ere dose	Hépatite B 2ème dose	Hépatite B 3ème dose	
	BCG : Pas d'intérêt pour cette tranche d'âge et au-delà				
	Vaccin combiné Penta : Primovaccination - Pas de Penta donner en primovaccination. - Donner 3 doses de vaccin DTC. - Respectez l'Intervalle d'au moins 4 semaines entre 1ère et 2ème dose et au moins 6 mois entre 2ème et 3ème dose.				
	HB : - Comptabiliser les prises incluses dans le Penta si l'enfant a déjà reçu des doses. - La deuxième dose devant être administrée au moins <u>1 mois après la première</u> et la troisième dose 6 mois <u>après la première</u>.				
	Rappel vaccin DTC: - Au moins 6 mois entre la série de la primovaccination et le rappel - Les doses du rappel doivent être séparées d'au moins 1 an entre les doses. Vaccin utilisé : moins de 7 ans DTC , plus de 7 ans Td				