

CE 145-66

DESCRIPTION GENERALE

Date d'obtention : **1980**

Date d'homologation : **1986**

Espèce : ***Sorghum bicolor* (L.) Moench subsp. *bicolor***

Synonyme : ***Sorghum caudatum* (Hack.) Stapf**

Race : ***caudatum***

Pedigree : **68-19** (IS 2220) * **Naga white** (écotype du Ghana)

Nature génétique : **Lignée**

Obtenteur : **ISRA-IRAT**

Lieu de sélection : **Bambey, Sénégal**

N° de sélection : **IRAT 202 ; IS 80-4**



CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Caractéristiques de la plante

Cycle 50% plantes avec une panicule : **75 jas**

Nervure principale de la feuille paniculaire :

- Etendue de sa décoloration : **Faible**
- Intensité coloration verte par rapport au limbe : **Pâle**
- Coloration jaune : **Forte**

Aristation de la glumelle : **Absente**

Pigmentation anthocyannique stigmat : **Absente**

Coloration jaune stigmat : **Absente**

Hauteur de la plante : **190 cm**

Panicule :

- Compacité : **Semi-compact**
- Forme : **Massue**
- Exsertion : **Bien saillante**
- Couleur glumes à maturité : **Brun clair**

Caractéristiques du grain

Couleur du caryopse après battage : **Blanc ivoiré**

Poids de 1 000 grains : **20 – 25 gr**

Tâches d'anthocyane : **Absentes**

Couche brune : **Présente**

Teneur en acide tannique : **0,109% M.S.**

Texture de l'endosperme (vitrosité) : **Faible (4 IPBGR)**

Couleur de l'albumen vitreux : **Blanc**

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES et TECHNOLOGIQUES

Vocation culturale : **Culture pluviale (zones entre 500 et 700 mm de pluie)**

Vigueur à la levée : **Bonne**

Cycle maturité : **100 jas**

Photosensibilité : **Faible**

Résistance au striga : **Présente**

Résistance aux maladies foliaires : **Présente**

Résistance aux moisissures des grains : **Présente**

Résistance à la verse : **Absente**

Sensibilité au *Macrophomina* : **Sensible**

Rendement potentiel en grains : **2,9 – 5,4 t/ha**

Teneur en protéines : **12,4% M.S.**

Taux de glucide :

Teneur en cellulose :

Teneur en phosphore (*mg/100g*) :