

AMOUL MOROM



Obtention : Caroline du Nord, USA
Origine génétique : NC Ac 10811
Groupe variétal : Virginia
N° de sélection: ICGV 7878
Dénomination ISRA : ISAR10-16

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION	CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES ET TECHNOLOGIQUES
➤ Caractéristiques de la plante Port à la floraison: Semi-érigé Densité de ramification: Moyenne Cycle maturité: 120 jours Couleur des folioles: Vert foncé Distribution générale des fleurs: Alterne Distribution des fleurs sur la tige ppale: Absente	Vocation culturale: Huilerie Tolérance à la sécheresse: Rien à signaler Résistance aux maladies: Bonne tolérance à la cercosporiose précoce et à la cercosporiose tardive Rendement potentiel en gousses: 2,5 t/ha Rendement potentiel en fanes: 3,5 t/ha Teneur en huile: 47%
➤ Caractéristiques de la Gousse: Étranglement: Faible Texture en surface: Fine Nombre de graine: 2 Proéminence du bec : Absent ou très peu apparent Forme du bec: Courbé	Teneur en acide oléique: Teneur en acide linoléique: Quantité de semences par hectare: 70 kg Densité pratique de semis: 135 000 pieds (50 x 15 cm) Disque de semis: Semoir à disque à 30 crans
➤ Caractéristiques de la graine Poids de 100 graines: 59 g Longueur (Taille): 1,2 cm Forme: Sphérique Méplat: Marqué Nombre de couleur du tégument mûr: Unique Couleur du tégument unicolore: Rose foncé Période de dormance: Longue (30 jours) Pourcentage graines au décortilage: 65-70%	➤ Observations: Variété très productive et particulièrement adaptée au Sud Bassin Arachidier, Sénégal Oriental et la Basse Casamance.