

Ndiambour

DESCRIPTION GENERALE

Date d'obtention : **1969**

Date d'homologation :

Espèce : ***Vigna unguiculata* (L.) Walp.**

Synonyme : ***Vigna sinensis* (L.) Savi**

Pedigree : **58-41 x 58-57**

Nature génétique : **Lignée pure**

Obtenteur : **ISRA**

Lieu de sélection : **Bambey, Sénégal**

N° de sélection :

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Caractéristiques de la plante

Pigmentation anthocyanique de la plante : **Absente**

Port : **Rampant**

Croissance : **Indéterminé**

Hauteur de la tige principale (soutenue) :

Couleur des feuilles : **Vert foncé**

Cycle 50% floraison : **48 jas**

Couleur de la fleur : **Bicolor blanche**

Gousse (*à maturité pour le marché du frais*) :

- Longueur : **25 cm**
- Largeur : **2 cm**
- Torsion : **Absente**
- Pigmentation anthocyanique : **Absente**
- Nombre de gousse par pédoncule :
- Couleur : **Vert**
- Forme : **longue et courbée**

Caractéristiques de la graine

Poids de 100 graines : **18 gr.**

Longueur :

Forme : **Elliptique**

Couleur principale : **Blanc crème**

Présence de couleur secondaire : **Présente**

Distribution de la couleur secondaire : **Hile**

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES et TECHNOLOGIQUES

Vocation culturale : **Culture irriguée ; pluviale
(Louga, Thiès, Diourbel)**

Cycle 95% maturité : **61 – 71 jas**

Cowpea (yellow) mosaic virus (CPMV) : **Absente**

Résistance au chancre bactérien : **Absente**

Résistance au striga : **Absente**

Résistance à *Amsacta* : **Absente**

Résistance aux pucerons : **Absente**

Résistance aux thrips : **Absente**

Résistance aux bruches : **Absente**

Rendement graines : **0,9 – 1,3 t/ha**

Rendement battage : **78%**

Rendement en fanes : **2 – 4,3 t/ha**