

IR 8

DESCRIPTION GENERALE

Date d'obtention : **1970**
 Date d'homologation : **1994**
 Espèce : ***Oryza sativa* L.**
 Synonyme :
 Groupe variétal : ***Indica***
 Pedigree : Peta * Dee-Geo-Woo-Gen
 Nature génétique : **Lignée pure**
 Obtenteur : **IRRI**
 Lieu de sélection : **Los Baños, Philippines**
 N° de sélection : **IR 8-288-3**

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Caractéristiques de la plante

Pigmentation anthocyanique des oreillettes de la feuille :
 Port limbe paniculaire (*obs. précoce*) :
 Port limbe paniculaire (*obs. tardive*) : **Erigé**
 Pigmentation anthocyanique apex glumelle inférieure (*obs. précoce*) :
 Pubescence de la glumelle inférieure :
 Couleur du stigmate :
 Cycle 50% d'épiaison* : **Hiv 90 jas / CSC 115 jas**
 Hauteur tige (*panicule non comprise*) : **95 cm**
 Pigmentation anthocyanique des nœuds :
 Panicule :

- Port : **Retombant**
- Exsertion : **Bien saillante**
- Longueur : **18 cm**
- Aristation : **Absente**
- Répartition des arêtes :
- Port des ramifications :

Caractéristiques du grain

Poids de 1 000 grains : **32 gr.**
 Caryopse :

- Longueur : **6,2 mm**
- Forme (*de profil*) : **Demi-fusifforme**
- Couleur :
- Arôme :

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES

et TECHNOLOGIQUES

Vocation culturale : **cultures irriguée et submergée (fleuve Sénégal, Casamance)**
 Cycle maturité : **Hiv 125 jas / CSC 145 jas**
 Photosensibilité : **Faible**
 Résistance aux maladies : **Absente**
 Résistance aux insectes :
 Résistance à la verse : **Présente**
 Résistance à la salinité : **Présente**
 Résistance à la toxicité ferreuse : **Présente**
 Sensibilité à l'Egrenage : **Faible**
 Rendement potentiel en grains : **Subm 7 ; Irr 8 t/ha**
 Rendement au décorticage :
 Rendement à l'usinage :
 Teneur en amylose :
 Teneur en protéines :
 Tenue à la cuisson : **Bonne**

* Hiv= en hivernage ; CSC= en contre-saison chaude ; Jas= jours après semis